

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





FENDAN: WILL



Ritters Carl von Linne' Königlich Schwedischen Leibarztes w. w. vollständigen

# Ratursystems

Supplements:

unb

Register : Band

feche Theile oder Claffen bes Thierreichs.

Dit einer

aussührlichen Erklärung ausgefertiget

Philipp Ludwig Statius Müller, fin der Raturgeschichte zu Erlang, Mitglied der Rom. Kaiserl. Middemie, wie auch der Berlinischen Gesellschaft der Raturforscher te.



Mit Churfurftl. Cachfifcher Frenheit.

Nurnbera, bey Gabriel Nicolaus Raspe, 1776 Cogle

Web.1911 23977



ir liefern hier den versprochenen Supplements, und Register, band, und zwar eher als wir anfänglich Willens waren; lediglich aus der Absicht, damit unsere geneigte Leser nicht so lange auf das Register, welches ben Büchern diese Art ganz unentbehrlich ist, warten diesen.

**)**(2

Was

Bas nun die Supplemente betrifte so sind vorerst alle Addenda, Apendices und Mantissae des Ritters von Linne gehörig eingeschaltet worden. Nebst die fen haben wir aus andern berühmten Schriftstellern, als Buffon, Schreber, Boddaert, Pallas und andern, viele Bentrage gemacht, jedoch und mehren. theils der Rurge befliffen, um die Grengent eines ordentlichen Bandes nicht zu überschreiten. Vorzüglich aber haben wit alle Arten mitgenommen, welche sich in bes Berrn Pallas Reisen befinden, weil felbige samt und sonders um so mehr merkwürdig sind, da man bisher wenig oder fast gar nichts aus den entlegenen rußis ichen Gegenden kannte. Wir haben boben zwar keinen Uebersetzer abgegeben. find

sind aber dach in diesen Benträgen um deswillen am weitläustigsten gewesen, weil der Herr Pallas ein sehr accurater Naturbeschreiber ist, aus dessen Feder keine andere als zuverläßige Wahrnehmungen sließen,

Wir mussen unsere Leser um Verzeistung bitten, wenn wir etwa unrichtig eingeschaltet haben, welches um deswillen gar wohl möglich ist, weil nicht jeder Schriftsteller seine Gegenstände aus einem Linneischen Gesichtspuncte beschreibet, mitbin der entscheidende Character, wornach die genauere Einschaltung vorgenommen werden sollte, öfters mangelt. Und eben so hoffen wir Verschonung, wenn sich gewisse Gegenstände ohne unser Zuthun, durch die Abgelegenheit des Oruckorts an

)(3

der

der unrechten Stelle befinden, wie zum Erempel das 27ste Geschlecht der Cameele, S. 50; welches S. 51. in der fünften Ordnung stehen sollte.

Ob wir nun wohl das Thierreich mit diesem Supplementsbande beschließen, fo find wir doch weit entfernt, zu glauben. daß wir alle Arten der Thiere erschöpft hatten. Nein; wir versichern vielmehr, daß wir allein aus vor uns liegenden Schriften neuerer Naturforscher noch einen farken Band neuentdedter Geschöpfe zusammen tragen könnten, wenn es ums nicht an Zeit mangelte, alles zusammen zu suchen; ohne auf das zu sehen, was noch täglich entdeckt wird. Die neuen englischen Reisen der Naturforscher, unter der Aufsicht des Herren Bofrath Maldis.

Balchs, die Arbeiten der berlinischen Sesellschaft der natursorschenden Freunde, welche von Herrn D. Martini besordert werden; ein Busson, Rosel, Cramer, de Geer, Sepp, Scopoli, Pennant, d'Aubenton und wie viele andere noch? würden Stof gesung zu einem abermaligen starken Supplementsbande liefern

Wer wurde es aber von uns fordern, daß wir ben vielen ununterbrochenen Amtsgeschäften, und ben Fertigung unse, ver bisherigen und fortgehenden Schriften, auch noch alles mangelnde rein erschöpfen sollten? Wir hoffen dahero eine gelinde Beurtheilung, und versichern wenigstens, daß wir uns über den Vorwurf: daß in unserm Supplementsbande noch sehr vie-

X 4

(4)

les mangle, keinen Augenblick beunruhigen gen werden; versprechen aber hingegen, von nun an, so viel uns Zeit übrig sem wird, alles sleißig zusammen zu tragen, was uns noch im Wurf kommt, um vielesicht in etlichen Jahren einen zwenten und ergiebigern Supplementsband zu liefern.

Erst in etlichen Jahren? Wer wird darauf warten? Wer wirds erleben? Wohlan! wir wollen einen andern Vorschlag thun. Zehen Augen sehen mehr als zwen, und hundert mehr als zehen. Viele naturforschende Freunde und Liebhaber der Natur, gerathen von ohngesehr auf eine Stelle ben einem Schriftsteller, wo sie ein Thier befannt gemacht sinden, das sie im Linneischen

Spftem nicht antreffen; oder sie besitzen etwas in ihrer Sammlung, das noch nire gends beschrieben ist; oder sie finden und entdecken selbst etwas neues, haben aber feine Gelegenheit, solches bekannt zu maden, oder achten es um ein, zwen oder drener Gegenstände willen, nicht der Mube werth, eine Schrift davon zu verfertigen. Alle diese Freunde der Naturwissen. wift laden wir hiemit ein, uns mit ibren Buschriften zu beehren, und uns ihre gemachten Anmerkungen mitzutheis len, um sie durch den erwehnten zwenten Supplementsband der Welt befannt zu machen. Zu einer folden Anzeige wird nothia senn:

1) Eine kurze haracteristische Beschreis bung des Gegenstandes, wo Groß

)(5

fil

fe, Sestalt, Farbe und Vaterland, nebst den Geschlechtsmerkmalen angegeben ist.

- pung, Geschlecht und Art, in dem Linneischen Spstem, wohin man es zu gehören glaubt, und Bestimmung, ob es eine neue Art, oder nur eine blosse Verschiedenheit von einer Linneischen Art sen?
- 3) (Wo jemand Lust und Gelegenheit hätte,) eine gute Abbildung das von, und endlich
- 4) Im Fall der Gegenstand schon beschrieben worden, eine Anweising auf den Schriftsteller nach
  der

der pagina, oder welches bester file einen kurzen Auszug aus selbigen.

Wir versichern, daß wir dergleichen geschätzte Correspondenz getreu sammeln, und mit unsern Benträgen bereichert, so bald es einen guten Band ausmacht, mit dem Namen eines jeden Erfinders, oder Bahrnehmers, ben seiner mitgetheilten Aut, an das Licht geben wollen.

Eben so schätzbar würden uns die Anzeigen sein, wo wir selbst gefehlet haben,
oder wo man glaubte, daß der Linneus
könnte verbessert werden, um das Sy,
stem der Natur je länger je mehr zur Bollständigkeit zu bringen. Und dieses
wollten wir uns nicht nur im Thierreiche,
sondern in allen dreven Reichen wünschen,
gleichwir wir uns schon wichtiger Benträ-

ge in dem Mineralreiche von Gonnern umd Freunden in Bien, die zugleich Kenner und Verehrer der Naturwissenschaft sind, zu erfreuen haben.

Erlang den 4ten Januar 1776.

P. L. St. Müller.

Nachricht.

Digitized by Google



## Nachricht des Verlegers.

beutschen Naturspstems bereits bekannt, duß es dem Höchsten gefallen, den gelehrten durn Versasser am fünften Jänner in seinen schinsten Jahren, und den einer vermeinten vollskommenen Gesundheit, zu seinen Aktern zu verssammeln; und dadurch dessen Absicht, das Misneral = und Pflanzenreich in wenigen Jahren auf gleiche Art auszuarbeiten, auch ausserende Schristen heraus zu geben, zu vernichten.

Man wurde mich ohne Zweisel entschuldigen, wenn ich ben einem so unerwarteten Falle mein Versprechen, das ganze Naturspstem mit deutschen Commentarien zu liefern, zurück nähme, weil es sich ganzlich auf den unermüdeten Fleiß dieses wurdigen Gelehrten bezog.

Da

#### Madricht des Berlegers.

Da mir aber die Wunsche so vieler Liebshaber dieses Werks bekannt sind, so halte ich es für meine Pflicht, ihrer Erwartung Genüsge zu leisten; und versichre also hiemit, daß das Pflanzens und Mineralreich, durch die Bemüshungen anderer gelehrter Männer, jedes in vier bis sechs Theilen von Messen zu Messen solschen das ganze Spistem in wenigen Jahren geendiget senn wird. Ich werde daben die bisherige Sorgsalt für die Schönheit des Pappiers, des Drucks und der Kupfer sortsehen, und die Zusriedenheit, dem Publico einen angenehmen und nühlichen Dienst geleistet zu haben, sur meinen größten Wortheil annehmen.





## Verzeichnis der Kupfertafeln.

						Ġ	Seite
Tab. L	fig. 1.	Der	Langari	m. 1	Homo	Lar.	ار 4
			Choras				•
	•		non.				6
	fig. 3.	Die	Mone.	Sin	nia M	oha.	Ź
	_		rothe A				Ž
			schwarzn				•
	0. ).		alapion		-		8
Tab.II.	fio t		•		Sim	is Pa	•
	<b>p</b>		aurista.	wir.	OIIII.	ia I C-	2
	fig a		Mohraf	Fa. (	- Simia	Mair	•
	115. 4.		g: B:	•• •	aiinia	Mau-	ÿ
	fio s		Sutaffe	S	mia S	inica	9
			Duct.				-
							10
	ng. ).	_	Palatin	ane.	Simi	a Ko-	
			way.		-	•	IQ
	ng. 6.	Ma	Mico.	Sin	nia a	rgen-	٠
		ti	ita.	۵		÷	İŢ
					Tab. II		

#### Berzeichnis ber Rupfertafeln.

	6	Eeite
Tab. II. fig. 7. Der Winkelschwang.	Le-	
mur flavus.	٠	i3
Tab. III. fig. t. Der caapsche Savia.	Cavia	
Capensis.	٠,	48
fig. 2. Das athiopische Si	hwein.	
Sus Aethiopicus.		39
fig. 3. Der Känguruh. Caeng	guruh.	62
fig. 4. Sirene des Bartholin	g. Si-	•
ren Barthol.	<b>-</b>	ì 97
fig. 5. Die Sidechsensirene.	Siren	L
Lacertina.	•	199



Einleis

NB. Die Aupfertaseln werden hinter dem spste=
stematischen Register, und vor dem Unis
bersalregister eingebunden.

C

# Erste Classe.

# Saugende Thiere.



## Erfte Ordnung.

## Menschenahnliche.

Mammalia Primates.

1. Geschlecht. Der Mensch.

Primates Homo.

#### 1. 2. Der Cagmenfck . Homo diumus.

A) ad pag. 104. des ersten Theils.

in Sommer 1777, starb in Engelland Sir Sprones, im 57sten Jahre seines Alters. Er wog 169 Pfund, und war über den Schultern vier Schuß dreh Joll becit. Achtzehn Träger waren kaum im Stans de, ihn auf die Baare zu winden. Er wurde eine nal in einer Zänkeren mit einem ziemlich langen kedermesset gestochen, doch drang es wegen der dien Lage Fett nicht in die Eingeweide. Er wog aben Lage Fett nicht in die Eingeweide. Er wog aben Lage Pfund weniger als Bouart Brige, we neun Pfund schwerer, als Sie Jacob Poswel in Stebbing, welcher Anno 1754 lebte, und 160 Pfund wog. Wir grinnern uns auch in Peswisburg einen kast vier Schuh breiten Engels

Lage menfa. Diur-

#### 4 Erfte Cl. I. Orbn. Menschenabnliche.

lander gefeben zu haben, welcher die gange Breice eines Bagens einnahm.

## B) ad pag. 105. des ersten Theils.

Im October 1775 befand fich ju Amfterdam auf den Bootermarkt in No. 40. ein Madchen von vier Kabren, welches ranbhaarig mar, und drenerlen Daare am Rorper trug, als Rehe Birfche und Ligerhaare mit Ligerflecken. Das Kind mar fonft icon, gart, und mohl gebildet, übrigens aber ein Begenftand ber Bermunderung fur alle Merste.

#### 3. Der Langarm. Homo Lar.

Bir murden biefes Gefchopfe mit bem herrn

Lange arm. Lar.

fig. I.

Sofrath Schreber unter bie Affen, dabin es auch gehoret, gefest haben, wenn wir une nicht vorgenommen hatten, ben Linne unverandert ju laffen. Da wir es nun in diefes großen Matur-Tab. I. forschers System, und zwar im Appendix anges Beiget finden, fo bleiben wir ben ber Linneifchen Ordnung. Die Abbildung aber Tab. I. fig. 1. ift aus unfere gelehrten Gonners und Rreundes Des herrn hofrath Schrebers, vortreffichem Werke genommen, so wie auch die übrigen Affenabbildungen aus felbigem gezogen find, weil man auf die Zuverläßigfeit diefer Abbildungen and beften Staat machen fann.

> Der Lar alfo, welcher in Engelland Golock, foult aber Longarmed ape, nach bem Dennant, genennet wird, ift derjenige, ber vom Biffon in feinem vierzehnten Bande, unter bem Mamen Grand Gibbon beschrieben wird. fann mohl unter bie Menfchen mit Recht nicht gegablet werben, ba er Backentafchen und Schwies len

Im am After hat, ob er gleich sonft bem Menschen (ben Verstand ausgenommen) fehr ahnlich ist.

Das merkwürdigste an diesem Thiere sind die langen Arme, die fast die auf den Grund reichen, wenigstens kann es fast aufgerichtet, dennoch viers sissig geben. Der Körper ist ungeschwänzt, gertade, so lang wie ein Mensch, und schwarzbraun. Das Apgesicht ist incarnatfärbig, um die Augen brum, desgleichen um die Nase und den Mund, sall. Der Umfang des Gesichts ist etwas haarig mod aschgrau. Die Haare auf dem Kopfe stehen gerade in die Hohe. Der After ist weiß, und bat eine kleine Schwüle. Die Haare sind schwarz. Siehe Tab. I, sig. 1,

Man hat ihn in Paris lebendig gehabt. Er war von einem trägen, fillen und sanften Naturell, und so järtlich, daß er weder Nässe noch Kälte vertragen konnte, Er aß Brod und Baumsstützt, besonders Mandeln, und nahm selbige

fer bescheiden an.

Das Waterland ist in Malacca, auf den moinceischen Inseln, an den Gränzen von Chie na, und in den bengalischen Wäldern. Line neus. Buffon.

Der Bleinere Gibbon ist eine Nebenart, seine Arme sind um ein Drittel kurzer, und in der Fache ist auch einiger Unterschied. Dieser kommt en Malacca.

Derr Pennant sahe benm tond Clive noch eine Spielart, die sehr zahm und posirlich, und ben schonerem Wuche war, dieser hatte am teibe, Irmen mid Beinen filberfarbige Haare, die Arme warn fürzer, und das ganze Thier nur dren Schuh lech.

Schreber Sangthiere Tab. IIL

A 3

2. Ses

## 2. Geschlecht. Affen.

Primates: Simia.

B. Aurzges schwänze

P. Kurzgeschwänzte Affen. (Papio.)

6. .a. Der Choras. Simia Mormon.

6. 2. Eberas Mormon.

Tab. I.

iefer Bavian bat ein langes plattes Befid mit auswerts gebogener Stirn, und eine fteifen Saarbusch auf dem Ropfe, welcher die & stalt einer Grenadiermuge hat. Die Rafe blutroth, die Bacten find Schief mit Ralten befet und himmelblau; die Augen liegen tief, und b ben einen schwarzen Kern im braunen Ringe. Schnauge ift flumpf und gerandelt, die rothe Da erhaben, ber Schnurbart beftebet aus vielen fu gen Saaren, die Seitengahne find am langfter Die Backentafchen geraumlich Die Ohren furs ur ffeif, bas Rinn mit einem weiffen Borte geziere ber Sals fury und bich, ber Korper mit bichten la gen Sagren befest, auf bem Rucken braungrat auf der Bruft gelbliche und am Bauche gang wei Der Schwanz ift zwen Boll lang. Der After hat e ne erhabene herzformige blutrothe nactte Schwiel ber Hobenfack und die Ruthe find tahl, und m einer weissen Saut überzogen. Siehe Tab. fig. 2.

Dieses Thier frift saftige Fruchte, Citronci mark, auch Ruffe, Dafer, gekochtes Fleisch un Eper, beren es acht zugleich in die Backentasche

stecke

feden kann. Es ift febr geil, grunzet wie eine Sau, ift gelehrig, und laffet fich bandigen.

Es wurde 1764 durch Deutschland herums geführet, und war, angeblich, aus Ceylon ges bracht worden. Aalstromer.

Schreber Caugthiere Tab. VIII.

#### C. Langgeschwänzte Affen. Simia Cercopithecus.

C. Langger fcwangr te.

#### 17. a Die Mone. Simia Mona.

Dieser Affe wird in der Barbarey, und etlischen warmen Seelandern Asiens gefunden. Er Mone, den warmen Seelandern Asiens gefunden. Er Mone, dat einen runden Kopf, plattes Besicht von Mona, schwärzlicher Fleisthfarbe, eine diese kurze Schnaus de, steise Varthaare, über den Augen einen erhas fig. 3. denen Wusse, und darauf eine weisse hälbmond, sormige Binde. Rings um das Gesicht einen Kranz von weißgrauen mit gelb und schwarz untersmengten langen Haaren. Vom Auge dis zum Ohr, und von da zu den Schultern und Armen, besindet sich ein schwarzer Strich. Der Rücken ist rothlich, die Arme sind schwarz, und die Beine schwarzbraun, Brust und Bauch sind weißlich. Dieses Thier ist sanstmutchig und gelehrig, fristelle Affentost, auch gekochter Fleisch, Ameisen, Spinnen und andere Insecten. Bussen. Siehe Tab. I. sig. 3.

Edreber Caugthiere Tab. XV.

#### 17. b. Der rothe Affe. Simia Patas.

Der Kopf ist langlich, das Gesicht sleischfar, 17. b. Bother big, über den Augen besindet sich ein Wulft, mit Antereinem schönen schwarzen und weissen Querstrich, Patas. Die Nase ist zwischen den Tab. I. A 4 Augen ig. 4

#### 8 Erfte Cl. I. Orbn. Menfchenehnliche.

C. Augen fark erhaben, und mit kurzen schwarzen Langge Haaren bedeckt. Die Schmause ist diet, die Ohsschwänster von dunne, ohne Saum und fleischschröße. Der Körper oder die Haare desselben sind suchst, und blutroth, vorneher gelbliche weißgrau. Die Näsgel sind schwarz. Die Länge des Thieres ist ans derthalbe Schuh. Der Ausenthalt ist an der Kuste Senegal. Busson. Siehe Tab. L. sig. 4. Schreber Säugthiere Tab. XVI.

#### 18. a. Der schwarznasige Affe. Simia Talapoin.

Das platte fleischfarbige Besicht bat eine Samart furge Schnauge, und eine ichmarge Rafe. Die pafiger Ohren find rund und schwarz, so wie auch die Diffe. Buffohlen. Die Baden haben hinterwarts ge-Talafehrte Baare, die wie der Rucken gefarbet find. poin. Der Bart ift furz. Ropf, Rucken und Schwanz find olivenfarbig mit schwarz gemischt. Bart, Tab. I. fig. 5. Bruft und Bauch hingegen find, nebft ber untern Seite des Schwanzes, weißlichigelb. Das Thier ist einen Schub boch, und der Schwanz anderte balbe Schub lang. Buffon. Siehe Tab. I. fig. s. Schreber Saugthiere Tab. XVII.

#### 23. a. Die Beifinafe. Simia Petaurifte.

abern gehet ein erhabener schwarzer, und von eis nem Backen zum andern, ein weisser Strich auf kangge-einem schwarzen Erunde. Der Rucken ist oliven, ich farbig, nach unten zu mehr fchwatz. Bruft und Bauch find weiß. Das Baterland ift Guinea. Siebe Tab. II. fig. 1. Allamand.

Schreber Canathiere Tab. XIX. B.

#### 23. b. Der Mohraffe. Simia Maura.

Er bat einen langlichen Ropf, furges Beficht, Dobbe schiefe Rungeln über die Bacten, eine furze, zwie affe. schen den Augen breite und erhabene Rase, und Maura, breite Ohren ohne Saum. Die Augenlieder, und der Raum vor den Augen bis an das Ende der Tab.IL Mafe, find tabl. Die Dase hat dunne hellbraune fig. 2. heare. Etwas dunklere ftehen über ber Stirn, mid um die Augen. Uebrigens ift bas Beficht, Sim und Baden, mit feinen gelblichen Sarchen bewachsen. Oben auf dem Ropfe ift er braun. Der Rucken, die Arme und Sande find fcmarge braun. Bauch und Bruft find gelblich, und bunne baarig. Das Thier ift fixend fieben Boll boch, mo der Schwanz ist etwas langer. Siehe Tab: II. fig. 2. Das Vaterland ift, nach Seba, Zeis lon, nach Edwards, die Ruste von Guinea.

Schreber Saugibiere Tab, XXII. B.

#### 23. c. Der Dutoffe. Simia sinica.

Er hat dem Wirbel gleichsam mit einem Dus Butaffe. te bedeckt, denn es gehen aus dem Mittelpuncte Sinica. des Wirbels die Daare nach allen Seiten ju, in eis nern runden Umfange berum. Die Ohren find Tab.IL groß, nadt, faft rund, ohne Saum, und hinten fig. 3. etwas edig ausgeschweift. Die Stirn ift etwas boch, mit weißgrauen Saaren dunn bewachsen. Die

#### 10 Erfte Cl. 1. Orbn. Menfchenahnliche.

Die Nase ist platt, und etwas zwischen den Augen Laugger erhaben. Die Oberlippe ist diet, auch mit einzelschwänten Barthaaren besetzt. Der Scheltel und der Rucken sind in der Mitte kastanienbraun, die Arime hingegen dis zum Ellenbogen hellbraun. Die Vörderarme, Beine und Hände sind gelblich, Brüste und Bauch dumhaarig und braunlich. Der Schwanz ist langer als der Körper. Das Vaterland ist Bengalen. Busson, Linpeus, Siehe Tab. II. sig. 3.

Schreber Saugthiere Tab. XXIII.

#### 23. d. Der Duck. Simia Nemacus.

Duct. Nomaeus.

fig. 4.

In dem Reiche Cochinchina halt sich ein großer geschwänzter Affe auf, welcher keinen Bartz haarige Backen, und einen weissen Schwanz hat. Er ist so groß wie ein Zavian. Das Gesicht, und die Ohrläplein sind roch. Die Stirn ist weißz die Augenringe und die Lippen sind braun. In den Schläsen zeigen sich etwas längere, weißlicht graue Haare. Der Kragen ist kastanienbraun. Oberhalb der Stirn und an den Armen ist er schwarz. Der After ist mit Haaren besetzt, und der Schwanz kaum so lang als der Körper. Siehe Tab. II. sig. 4. Zuston. Linneus.

Schreber Saugthiere Tab. XXIV.

## 23. c. Der Palatinaffe. Simia Roloway.

Das Gesicht ist dreneckig, platt, schwarz, palar tinasse.
Rolo: se von Haaren eingefasset, der an einem weissen Way.
Barte anschließet, so daß es scheinet, als ob er einen Palatin um hatte. Der Rucken ist dunkel schwarzbraun. Der Kopf, die Arme und Beine haben zwar auch solche Haare, sie scheinen aber gespudert

padert zu fenn, weil jedes Haar eine weisse Spike bat, wenigstens in einem talteren Clima; benn in Langger bem warmen Buinea, wo biefe Thiere ber find, te. sollen die Haarspitten pomeranzenfärbig senn. Siehe Tab. II. fig. 5. Buffon. Allamand.

Schreber Saugthiere Tab. XXV.

#### 26. 2. Der Mico. Simia argentata.

Er ift allenthalben mit weißgranen, sanften, 2d.a. glänzenden langen Haaren bedeckt, Gesicht und Mico. Ohren aber find kahl rosenroth. Der Schwanz Argentata. ift fast noch einmal so lang ale ber Korper, aber tata. glanzend fastanienbraun. Das Baterland ist um Tab. IL den Amazonenfluß in Sudamerica. Siehe fig. 6. Tab. II. fig. 6. Buffort. Linneus.

Schreber Saugtbiere Tab. XXXVI.

#### 12 Erfte El. I. Ordn. Menfchenahnliche.

## 3. Geschlecht. Gespenstthiere.

Primates: Lemur.

#### I. a. Der Potto. Lemur Potto.

Botto. Potto.

Mone

шŚ. Mon∙ goz.

٠

r ift bem Langschleicher (Lemur tardigradus oder Loris) fehr ahnlich. Es wird ibm aber vom Bogman ein Schwang zuerkannt, ber jeboch furger als ber Leib ift. Der Kopf ift uns formlich bick, ber Korper grob und mit rothen haaren bedeckt. Das Baterland ift Guinea.

2. a. Der Mongus. Lemur mongoz.

Man bat noch funf Werschiedenheiten.

1) Sang grau, ober braun. Des Mierembergs Simius Zambus.

- 2) Braun, mit weisser Dase und Banben. Des Briffons Prosimia fusca,
- 3) Braun, mit einem ichmargen Flecken um bie Augen. Perivers Simia sciurus.
- 4) Dunkelbraun, mit ichwarzem Befichte Banden.
- 5) Grau, mit ichwarzem Befichte und Sanden. Buffons Mongous. Schreber Saugthiere Tab. XXIX. A.

4. a. Der

## 3. Geschlecht. Gespenstihiere. 13

### 4. a. Der Winfelfdmanz. Lemur flavus.

Dieser wohner in den Gebürgen von Jamai 3.2.
ca, hat einen breiten Kopf, hangende Ohren, Winkeldinge Schnause, kurze dicke Beine, fünf Zähen komans mit gebogenen Klauen, kurze gelbe, mit schwarz demengte Haue, und über dem Rücken und Bauch Tab.II. die länge himunter einen schwarzen Strich. Dens fg. 7. dant. Siehe Tab. II. fig. 7.

Schreber Saugthiere Tab. XI.II.

## 4. Geschlecht. Fledermäuse.

Primates: Vespertilio.

#### 7. Die Rleeblemafer Vespertilio hastatus,

7. Ricer blatnafe Haftatus. und folgende, etlicher anderer Arten Ers wähnung gethan, wir wollen sie aber hier ordents lich auseinander setzen. Was die jezige betrift, so hat sie eingefaßte Nasenlächer, über welche ein Blat gesetzt ist, so, daß die Nase einem Kleeblat ähnlich siehet. Die Ohren sind kürzer als der Kopf, oben und unten stehen jedesmal vier Vorsberzähne im Kiefer, so wie in dem Vampyrus, Spectrum, Spasma und Perspicillatus. Die Farbe ist dunkelbraun, und fällt ins schwarze. Der Körper ist vierthalbe Zoll lang. Das Vatersland Sudamerica. Pallas.

Schreber Caugthiere Tab. XLVI. B.

#### 8. Die Sperrnase. Vespertilio soricinus.

Sperce nafe. Soricinus. Die Schnause ist lang, kegelformig und mit einzelnen langen Haaren besett. Die Masenlöcher sind gerändelt, und führen ein gerades ovales spistiges Blat, von welchem eine Erhöhung zwischen den Nasenlöchern herunter läuft. Das Kinn hat drepeckige Vertiefungen. Oben und unten stehen jedesmal vier Vörderzähne, wie an der vorigen Art. Der Schwanz ist kurz. Die Haare sind sauft, oben bräunlich aschgrau, unten weißlich.

Der Korper ift etwas über zwen Zoll lang. Er if auch in Sudamerica ju haufe. herr hofe rath Schreber aber zweifelt, ob fie nicht megen ber langen, fpitigen collindrifchen Bunge, von bem Vesp. Vampyrus senn fonnte? Dallas.

Schrebet Sangthiere Tab. XLVII.

#### 9. Die hasenscharte. Vespertilio leporinus.

Der Kopf ift rund und hat eine Mopsschnaue M. Die obere Lippe ift gespalten, und die ungere Dafen ha bren Kerben. Das Gebiff, in Absicht auf Die Borbergabne, ift fo, wie in der vorigen Art bee rinus, weffen. Die Augen find flein und schwarz. Die Offen groß und spigig. Der Schwanz fürzer als de Schwanzhaut, und in derfelben verftecft. Die wirt find eifengrau, und auf dem Ructen lauft in weiser Strich himmtet. Die Flughaut ift tha b, wie bie Daare, gefarbet. Das Thier ift b mig wie eine Rage, mit ausgebreiteten Flus son imen Schuh und dren Boll breie. Diese Art wir von bem Ricter schon in der zehnten Auflage eingeschaltet. Das Vaterland ift Sudamerica. Linneng.

Coreber Caugibiere Tab. LX.

### 10. Die Speckmaus. Vespertilio lardarius.

Derr hofrath Schreber hat fie unter bem Damen Speckmaus eingeschaltet, wozu wir ben Specke Bennamen Lardarius fügen. Sie hat oben viet Larda. und unten feche Borbergahnchen. Schnaute rius. Nak und Ohren find flein, lettere oval abge-Imet, und mit einem fleinen, runben Dettel birfehen. Der Schwanz ift ganz mit der Schwanz faut eingefasset und etwas furger als ber Leib. Die Farbe ift Schmutig braun, oben etwas dunt. 1957 ler

# 16 Erfte Cl. I. Orbn. Menfchenahnliche.

ler als unten. Die Nase, Ohren, Flughant und Beine sind glanzend schwarz. Sie wohnet in Frankreich und Deutschland, und riecht übel. Schreber Saugthiere Tab. LII.

# 11. Die blasse Flebermaus. Vespertilio serotine.

Blaffe Fledere mans. Secotions Die Schnauze ist länglich, oben sind vier und unten sechs Börderzähne besindlich. Die Ohren sind kurz und breit, und haben unterhalb der Abrumdung einen kleinen Ausschnitt. Der Ohrendeckel ist klein und rundlich. Der Rücken lichtbraun, und rothfahl. Der Bauch hellgrau und gelblich. Die Flughaut schwärzlich. Der Schwanz ist sast so lang als der Körper, welcher zwen und einen Biertelszoll halt. Das Baterland ist Frankreich und Deutschland. Daubenton.

Schreber Caugthiere Tab. LIII.

### 12. Die Zwergstebermaus. Vespertilio Pipistrelle.

12. Iwerge flebers mus. Pipiftrelle, Die Schnauße ist kurz, und mit langen zarten Borsten besetz, die Mase ist breit, etwas aufges worfen, und hat weite köcher. Die Ohren sind erwas länger als der Kopf, enformig, unten weit, in der Mitte ausgeschweift, der Ohrendeckel aber ist schmal, und der Schwanz sast so lang als der Körper. Die Farbe der Haure ist lichtbraun, der Boden des Peizes aber schwarz. Schnauze, Ohren, Flughaut und Beine sind dumkel schwarzbraum und glänzend. Ihre känge beträgt ein und einen Wiertelszoll. Das Waterland ist Frankreich. Daubencon.

Schreber Saugthiere Tab, LIV.

13. Das

#### 13. Das Rutzmaul. Vespertilio Barbastelle.

Die Schnauge ift fehr fury, und die Masen. locher kommen hinter der erhöheten Oberlefze her- maulvor. Die Backen find erhaben und mit ftarten Barba. Dearen befest. Die Dhren find lang und breit, ftelle. und ihr innerer Rand bedockt die Stirn. Sowang flicht über der Schwanzhaut hervor, und ift etwas furger als ber Leib. Der Ohrendeckel ift mir halb fo lang und breit, als das Ohr. Der Riden ift Schwarzbraun, Bruft und Bauch find grau. Die lange ist zwen Boll, die Flügelweite aber berragt zehn und einen halben Boll. Gie ift in Burgund in alten Mauren gefunden worden. Daubenton.

Schreber Caugthiere Tab. XV.

#### 14. Die Bartstedermaus. Vespertilio barbatus.

Die Schnauße ist unter der Stirn fart ein gedruckt. Die Masenlocher werden nicht durch eine Bart. Scheidewand abgesondert, sondern find Ausgange fleder, befenderer Nasenrinnen. Die Ohren find lang und Barbafibmal. Der Rucken ift rothbraun, das übrige tus weißlich mit einen gelbbrannlichen, oder auch wohl efdgrauen Schatten ichwach überloffen. Die Dhe re und Aughaut find rothlich und fchwargliche bram. Der Korper ift anderthalbe Boll lang, bet Schwanz eben fo lang, und in ber Blughaut gang verfectt. Sie ift in Senegal ju haufe. Abanfon.

Sorebet Saugtbiere Tab. LVI.

#### 15. Der Buntflügel. Vespettilio pictus,

Aus bet Infel Cepton bringt man eine Bler Bunte bermans, deren Glügel vorzüglich abweichen; benn Pictus, Linne Supl. B. Die

Digitized by Google

#### 18 Erfte Cl. I. Orbn. Menschenahnliche.

die Felder sind dunkelbraun, und ringsherum mit einem hellbraunen Saumt eingefaßt. Die Schnausse ist kurz. Im obern Kiefer stecken vier und im untern gar acht Vorderzähne. Die Nase ist klein, die Ohren sind vorwärts gekehret, kurz, weit, und am äussern Mande ausgeschweist. Die Ohrendeschel sind, wie ein Faden, lang und schmal. Der Rücken ist bräunlich und der Bauch weißlich. Die Größe des Körpers ist fast zwen Zoll. Pallas.

Schreber Saugthiere Tab. XLIX.

# 16. Das Spinohr. Vespertillio Marmotte.

pigo ohr. Marmotte. Die Ohren sind diek und spisig, der Ohrenbeckel schmal und fast halb so lang als die Ohren. Die Schnause ist mäßig lang, und vorne diek. Oben stecken im Maule zwen, unten aber sechs Vörderzähne. Der Schwanz ist ein Viertel körzer als der Leib, und bis auf zwen hervorstechende Wirbelbeine, mit der Schwanzhaut eingefaßt. Ropf, Hals und Rucken sind gelblichbraun, mit aschgrau melirt. Vrust und Vauch sind etwas blasser. Die Länge des Körpers beträgt vier Zoll. Das Vaterland ist Senegall. Daubenton.

Schreber Saugthiere Tab. LVIII.

# 17. Das Hundsmaul. Vespertilio Molossus.

Dunds, Maul. Moloilus.

Die Schnause ist die, gestust und mit hans genden Oberlefzen, nach Art der Bullendeiser, perssehen. Im Maule besinden sich oben zwen, und unten vier Vorderzähnchen. Die Ohren sind breit, rund, vorwärts gekehret, und stossen über der Stirn unten aneinander. Der Schwanz ist fast so lang als der Körper, raget aber um ein Vrittel aus der Schwanzhaut hervor, Die Farbe ist asche graus

granbraum und meliret. Das Baferland ift Westindien. Dallas.

Schrebes Saugthiere Tab. LIX,

#### 18. Der Großfopf. Vespertilio Cephalotes.

Der große Kopf zeichnet biese Flebermaus bor allen aus. Die Schnause ist sehr diet, und Große bat weit herunterhangende Lefzen. Im Maule Copha-sind oben nur zwen unten aber gar keine Borders lotes. jahne. Die Masenlocher find schneckenformig. Ober : und unterhalb jedem Auge befinder fich eine haarige Barge mit einigen Borften. Die Ohren find flein, oval, und haben teinen Deckel. Die Karbe ift oben grau, unten weißlich. Die Ringe haut dunkelbrann rothlich. Die Lange ift brithale be Bell. Diese Art wohnet auf den moluccischen Inidn. Dallas.

Schreber Caugthiere Tab. LXI.

#### 19. Der Beuteltrager. Vespertilio marsupialis.

Die Schnauge ist maßig lang, vorne etwas - 19. breit, und mit Vorsten besett. Das Maul hat Beutele eben keine und unten vier Borderzähne. Das frager. Marsu-Rim ift durch eine Berticfung in zwen Theile ge pialis. theilet. Die Dafe gleichsam aus einer gedoppele ten Robre zusammen geseigt, so, daß die Dasens locher dichte bensammen fteben. Die Ohren find lang, ftumpf und abgerundet, die Ohrendeckel aber fury und ftumpf. Am Ellenbogen ift in der Sluge haut ein fleiner schiefer Beutel. Der Schwang ift fürzer als die Schwambaut. Die Karbe ift vben braunlichgrau, unten etwas blaffer. Die Often und Blughaut find dunkelbraun. Der Korper

#### 20 Erfte Cl. I. Ordn. Menschenahnliche.

per ift anderthalbe Zoll lang. Das Vaterfand ift Suriname. Schreber.

Schreber Caugthiere l'ab. LVII.

## 20. Die Sufeisennase. Vespertilio equinus.

Dufeit fennafe. Equinus. Die Rase siehet wie ein Pferdehuseisen aus, und giebt dieser Art die Namen: franzosisch Fer a Cheval; englisch Horie Shoedat. Die Schnause ist übrigens breit. Bende Leszen haben eine Kerbe. Im Maule besinden sich oben keine, aber unten vier Vörderzähne. Die Ohren sind so lang als der Kopf, weit und spissig, und ohne Ohrendeckel. Die Farbe ist oben röthlich aschgrau, und unten etwas blasser. Das Vaterland ist Frankreich. Zwen Spielarten aber werden in den Gebürgen des bayreurber Landes gefunden. Oaubenton. Schreber.

Schreber Caugthiere Tab. LXII.

# 21. Der Meujorfer. Vespertilio borealis.

21. Reujors ter. Borealis.

Der Kopf ist mauseartig, ohne Borderzähne. Die Mase ist klein und spisig, die Ohren kurz und rund, der Schwanz lang, und ganz bekleidet, die Farbe aber oben hellbraun, und unten blaß. An der Wurzel der Flügel besindet sich ein weisser Fleschen. Die Flughaut ist schwärzlich. Der Körper dritthalbe Zoll lang. Das Vaterland Vord, america. Pennant. Schreber.

Bwente

# 3mente Ordnung.

# Thiere ohne Schneidezähne.

Mammalia Bruta.

# 6. Geschlecht. Die Seefuh.

Bruta: Trichecus.

2. a. Der Dugung. Trichecus Dugon.

wischen dem Wallruß und der Seekuh stele let fich noch ber Dugung ein. Er ift nicht Durecht bekannt; die Berichte aber des Lequars und gung. Moncoy, vorzüglich aber des Barchewitz, geben zu erfennen, daß es ein großes über fechs Ellen langes Ungeheuer fen, deffen Ropf einem Dofentopf abnlich fabe, und im Maule zwen groffe, eine Spann lange, etwas frumme Saugabne habe, die so weiß wie Elfenbein find. Die Saut ift so Dicke wie eine Buffelhaut. Das Weibchen hat zwen Brufte, und das Mannchen die Zeugungs. theile nach Art ber Mannspersonen. Das Einges weide fiehet wie Rindseingeweide aus, und das Fleifch fcmeckt, nach den Nachrichten der Scefah. rer, eben fo. Man trift biefes große Meergeschopfe an dem Borgeburge der guten Sofnung an, bis an die philippinischen Inseln, und noch

### 22 Erfte Cl. II. Ord. Ohne Schneibezähne.

weiter gegen Morgen, nach dem Süder Pol zu, und in der magellanischen Straße. Sollte das Bild dieses Thieres vielleicht der Dagon der Phislister, 1. Sam. V. 3. gewesen sepn? Daubens von beschreibet eine Kirnschale: Bon ein und anderem aber ist ein Bericht in des herrn hofrath Schrebers Abhandlung von den Säugthieren in der Kürze zu lesen.

# 11. Beschlicht. Der Armadill.

Bruta: Dafypus.

#### 5, a. Der Achtgurtelige. Dasypus octocincus.

Fs wird dieser Armadiss in Mexico gefunden Adi und daselbst Aiotochtli genannt. Der Kopf gurtette flanger und spitiger als an den andern, den ge-Die Octoumgurteligen Armadill ausgenommen. homartigen Schildlein find ungleichseitig. Man Macht Burtel, die aus abwechselnden viercdis 19, hinterwarts breitern und schmalen drepecti-In in ber Mitte vertieften Studen, beren viele m bie Quere getheilet find, beftehen. Borderfuffen find vier, und an den hintern feche Mauen befindlich. Die Schuppen der Ohren find lantenformig. Der Kopf ift vier Boll, ber Rus den aber über einen Schuh lang, und in ber Die it über einen Schuh breit.

Schreber Caugthiere Tab. LXXIV.

#### 7. Der Zwolfgürtelige. Dasypus duodecim cinclus.

Er ift von dem oben beschriebenen am meiften in der Angahl der Gurtel verschieden. Der Ropf 3molf. if breit, platt, und mit ungleichen Schuppen bes gurtelb bat. Die Ohren sind furz und voneinander ente Duodesemt, der Rucken mäßig erhaben, die Beine kurz eim mb did und an jedem Juße funf braune Rlauen. cinchus.

#### 24 Erfte Cl. II. Ordn. Ohne Schneibezähne.

Das vordere Adcenschild hat sieben, das hintere aber neun Reihen ungleicher Knocherstücke. Um ersten sind sie sechseckig, und an diesem mehr vierseckig. Die benden Reihen, welche an die Gürtel stossen, sind den Gürteln ähnlich. Die zwolf Gürztel bestehen aus lauter viereckigen Sücken, welche in der Mitte Risse und am vordern Rande entwerder in dren Abschnitte getheilet, oder ausgeschnitzten sind. Zwischen den Schuppen stehen kurze Haare. Der Rücken ist über einen Schup lang, und an den Seiten einen Schuh und zwen Zoll.

Schreber Saugthiere Tab. LXXV.

# 8. Der Achtzehngurtelige. Dasypus 18 - cinctus.

Napr girtek girtek ge. 13-cinétus. Der Kopf siehet einem Wiesel gleich, die Stirn ist platt, und die Ohren sind kurz. Der Kopf und die Beine sind mit rundlichen Schuppen bedeckt, die achtzehn Gurtel aber sind durch einen häutigen Zwischenraum von einander getrennet. Jeder Fuß hat funf lange Klauen.' Die Brust, der Bauch und die Ohren haben keine knochige Beschung, und das ganze Thier ist ohngesehr einen Kuß lang. Herr Hofrath Schreber zweiselt, ob diese Art nicht etwa ein Naturspiel des viergurtes ligen Armadills sep.

Dritte

# Dritte Ordnung. Raubthiere.

Mammalia Ferae.

# 11. Geschlecht. Das Seekalb.

Ferae: Phoca.

24. Der Seelowe. Phoca leonina.

ls eine Verschiedenheit des Unsonischen Seelowens, muß ber Stellerische Geca Geelor line, welcher zotig ist, indem das Mannchen we. trufe haare im Nacken hat, vorzüglich bemerket na. mon; zumal da er noch einmal so schwer und of if: denn er halt in der Lange funf und zwans in, and im Umfange erwa zwanzig Schub. Die Ihm brullen wie Ochsen, und die Jungen blocken wie Schafe. Das Baterland ift Ramticharta. Schreber.

Schreber Saugebiere Tab. LXXXIII. B.

#### 3. a. Der Robbe. Phoca vitulina.

hierzu gehoren als Werschiedenheiten: A Der grave Seehund mit breiter Rase und Vitulilangeren Rlauen, aus ber Office.

**23** τ

B. Der

- 26 Erste Cl. III. Ordn. Raubthiere.
- B. Der Sibirische Seehund, mit einfarbigen filberweissen haaren.
- C. Der Caspische Seehund aus dem caspischen Meere.
- D. Der schwarzseitige Seehund mit spisigem Kopfe und dickem Leibe, aus Istand, Schreber,

4. Kleiner Gees bund. Palilla, 4. Der fleine Seehund. Phoca Pasilla.

Der herr Buffon gebenket dieses Seehundes, und scheinet berfelbe eine eigene Art auszumachen, Schreber Saugthiere Tab. LXXXV.

5. Der rauße Seehund. Phoca Hispida.

Rauber Geehund. Hilpida.

Er ift lang, schmal und gestreckt. Die haare stehen wie Schweinsborsten gerade in die hohe. Die Farbe ist fahl weiß, und fällt ins braunliche, um die Augen aber ins schwärzliche. Er wohnet in Gronland. Schreber.

Schreber Saugthiere Tab. LXXXVI.

# 12. Beschlecht. Der Hund.

Ferae: Canis.

#### 1. a. Der Gesellige. Canis familiaris.

b wir gleich in dem ersten Theile pag. 207. 1. a. und folgende, von den Unterarten der Haus ge. hunde gehandelt haben, so wollen wir doch zu Famiwiterer Erlauterung auch anzeigen, wie wir ihre liaris. Bestimmungen ben herrn Boddaert gefunden.

L Da Saushund mit gerade in die Sohe stehens ben Ohren. Buffon Tom. IV. Tab. 28.

- b. Der Sund mit hangenden Ohren, und einem Bastardnagel an den Hinterfussen. Braque de Bengale. Busson ibid. Tab. 34.
- c. Der Bluthund mit hangenden Backen, und einem dicken Körper. Dogue de forte race. Buffon Tab. 45.
- d Der Wasserbund mit frausen Daaren wie ein Schaf. Barbet. Buffon Tab. 37. 38.
- e. Der Schooßbund, gleich einem Eichhorn. Bichon. Buffon Tab. 44.
- f. Der Duchsbund, mit einem langen Körper, frummen Fussen und hangenden Ohren. Basset. Buffon Tab. 35.
- g. Der Spubthund, mit einem geftugten Schwange. Chien Courant. Buffon Tab. 32.
- L Der türkische gund, nackt ohne Haare. Boddaert.

2. a. Det

#### 28 Erste Cl. III. Ordn. Raubthiere.

#### 2 a. Der Wolf. Canis Lupus.

Ben diefer Gelegenheit ermahnet vorgemelde. ter herr Boddaert zwener Berfchiedenheiten. Lupus.

- a. Der schwarze Wolf aus Canada. Buffon Hist. Nat. Tom. IX.
- b. Der Wolf aug Merico, der in Neuspanien wohnet. Buffon Hist. Nat. Tom. XV. Boddgert.

#### 10. Der Wolfshund. Canis Corsac.

to.

hund.

Dieser hund unterscheidet fich durch einen Molfs. fuchsrothen Schwang, der an der Wurzel und an ber Spige ichmarg ift. Er fiehet einem Ruchs Cortac. fehr abnlich, bat weiche Saare, Die oben im Binter greis find, im Sommer aber eine hellbraunlich. gelbe Farbe annehmen. Eben fo find auch bie Ruffe gefarbet. Die Rehle ift weiß, die Ohren fichen gerade, und haben die Farbe des Ruckens. Die Augen find gelblichegrun. Er ftellet ben Boe geln nach, verscharret ben überflußigen Borrath, houlet, bellet, und giebt einen üblen Beruch. Er halt fich in Sibirien, vom Jaickfluße bis jum Ircis, auf, desgleichen in den Indien, und ist vom Herrn Vohmaer beschrieben. Boddaert. Linneus.

## II. Der Steilohr. Canis Lycaon.

Er ift fehr haarig, hochbeinig, hat einen haarigen Schwanz und ffeife in die Dobe ftebende Ctelle obr. gespitte Ohren. Buffon. Ly-Schreber Saugthtere Tab. LXXXIX. caon.

12. Der

29

#### 12. Der Gilberhund. Canis cinereo argenteus:

12. *Cilbers* 

Er ift afchgrau filberfarbig, bat aber viel Cinechaliches mit einem Fuchs, und wird vom Bris reo fon angeführet.

argenteus.

Schreber Saugthiere Tab. XCII.



# 13. Geschlecht. Die Kabe.

Ferae: Felis.

#### 8. Der kleine Panther. Felis uncia.

Shese Art wohnet in Dersten, hat einen lans en Schwang, und einen weißgrauen Ror. Reiner per, det mit ungleichen runden schwarzen Ringeln Panbefest ift. Buffon Tom. IX. tab. 13. Schreber Saugthiere Tab. C.

tber. Uncia

## 9. Der guineische Leopardus. Felis Leopardus.

Er führet einen langen Schwang, ift rothlich icher gib, und am Rorper mit ringelformigen ectigen Leopard Akden besett. Boddaert.

Guincis pardus.

#### 10 Der Margay. Felis Margay.

Der Schwanz ift lang, der Körper graus Margelb, und braun geftreift, bandiret und geflectt, gap. Suffen Hist. Nat. tom. XIII. Tab. 38.

IO.

II. Die

# 30 Erste Cl. Al Ordn. Raubthiere.

#### 11. Die Bisamfage. Felis moschata.

Bisame fage. Moichata.

Am Vorgebürge der guten Sofnung wird eine grausgelbe Art mit braunen Fleden gefunden, welche Herr Vosmack Bisamkat nennet. Sie hat auch einen langen Schwanz.

Vosmaer Beschryv. der Viervoet. Dieren Tab.

VIII.

#### 12. Die brasilianische Rage. Felis Concolor.

Brasilio anische Bauch sind weiß. Sie ist in Brasilien zu Hause, Conco- und wird Cuguacu arana genennet. Linneus. lor.

## 13. Der Bolfstieger. Felis Guepard,

Bolfs, tieger. Guepard. Er ist langgeschwänzt, und hat auf einem gelblich rostfärbigem Grunde kleine schwarze, dicht bensammenstehende Fleden. Der Aufenthalt ist am Vorgeburge der guten Sosnung. Buf. son. Boddaert.

# 14. Der Gerval. Felis Serval.

14. Er hat einen kurzen Schwanz, ist gelbliche Serval. roth und schwarz gesteckt. Der Aufenthalt ist in Serval. Indien. Buffon. Beddaert.

#### 15. Der Caracal. Felis Caracal.

Der Schwanz ist kurz, der Körper braunroth, Caracal, Baterland ist Arabien. Buffon Tom. IX. tab. 24. Boddaert.

14.000

# 14. Geschlecht. Das Frett.

Ferae: Viverra.

## 4 a. Das Stinkthiet. Viverra putorius.

Der Ritter giebt in seinem Unbange eine andere Beschreibung von einem americanie Stinte dem Stinfthiere, welches so groß wie eine Rage, thier. wo gang schwarz ift, aber von ber Schnauge bis Putounhilfte des Ricteus eine weiffe linie hat. Der rius. liff ift rund, und hat eine gestrecte Schnause. Da Mase ist fahl. Der Schnurbart stehet in kom Reihen, der Rachen ist furz, die Zunge Hat, die Augen flein, und etwas nabe benfamma. Der hals ift fehr furz, und man fiehet fast im Ohrlapplein. Die obern Borderzähne find Chimeing gedruckt und gleich groß, die untern fifth dichte an einander. Die obern Hundsjahn schen etwas weit, aber die untern find dichter briammen. Man gahlet fünf Badengahne. Die Borberfuffe fired fürzer als die hintern, und baben linger, tragen sich auf den Knorren, und führent mutger Ragel. Der Schwanz liegt horizontal, mb hat fehr lange Daare mit weiffen Spiken, die mas steif stehen. Die Nuthe des Thieres ist wirpelig. Es grabt Hohlen, schläft des Tages, ich von Würmern und Insecten, und vertreibt de feine Feinde durch die Feuchtigkeit der Stink. Linneus.

7. Das

#### 32 Erste Cl. III. Ordn. Raubthiere.

#### 7. Das Braunfrett. Viverra fusca.

Fraud Der Körper ist braun, das Maul dinne, die frett. Fusse, schwarze Mägel, und der Schwanz Fusca. ist glatt. Er ist der Coase des Zussons, (Butt. Hist. Nat. Tom. XIII. tab. 39.) und wohnet in America. Boddaert.

#### 8 Der Chunk. Viverra Cinche.

R. Der Rucken ist hockerig, ber Korper weiß, bund. und mit dren schwarzen Bandern besetzt, derSchwanz aber ist sehr breit. Das Baterland ist Südame ricd. Der Cinche des Buffons, Tom. XIII. Tab. 40. Boddaert.

#### 9. Der Mapurit. Viverra Mapurita.

Mapu. Er hat einen lockeren haarigen Schwanz, rit. und ist am Körper weiß und schwarz gesteckt. Mapu- Zorille des Buffons. Boodaert. rita.

#### 40. Das melirte Frett. Viverra Fossana.

Melie, tes lirt, und an der Vorderseite mit vier schwarzen Krett. Banden gezieret. Zuffon Tom. XIII. Tab. 21. Fossana Boddaert.

# 15. Geschlecht. Die Wiesel.

Ferae: Mustela.

#### 12. Der Botto. Mustela Potto.

er hat weisse zusammengebruckte Magel, und 12. ber Körper ist gelblich greis. Das Vaters potto. land ift America. Man findet diese Art ben Potto. bern Dosmaer in seiner Beschreibung ber vierfiffigen Thiere Tab. IX. abgebilbet, Boddgert.

#### f. 13. Der Sarmatier. Multela Sarmatica.

Er ift ein wenig kleiner als des Iltis No. 7. 13. bie Zufe und der Unterleib find sehr schwatz, der tier. Baden aber, nebst dem obern Theile des Korpers, tien. find braunlich Schwarz. Der Kreiß um den Mund ift weiß. Beber jedem Ange gehet eine weisse Binde schief bis an die Ohrendrusen, welche Bind ben ofters auf der Stirn jusammen laufen. Die Ohrlapplein find halb freisformig, mit langen weiß fen Daaren umfaumt. Im Nacken zeiget fich auf beiben Seiten eine gelbe lange Binde, welche nur einen geflecten Zwischenraum übrig laßt. liche unformliche Binden fteigen auf benden Gels ten fdief am Schulterbande hinunter, und zuweis len laufen auch andere por den Suften von benden Beiden bis nach bem Schwanze ju gusammen. Ranchesmal ift auch der ganze Raum des Ruckens Linne Gupl. 23.

#### 34 Erste El III Ordn Raubthiere.

blaß gelb gesteckt, so daß etliche daher mehr gelb als braun aussehen. Der Schwanz ist schwärzlich, und hat andere langere weisse Haare, doch ist die Schwanzspise ganz und gar schwarz. Die Füße, die Nägel, und der Schnurbart sind eben so, wie am oberwähnten Itis beschaffen. Die Weibchen haben am Bauche zehen Brustwarzen. Der Ausenthalt ist in den südlichen Gegenden Rußelands, ostwärts dem Wolgastrohm. Pallas Reis.

# † 14. Die Sibirische Biesel. Mustela Sibirica.

Siberio fche Wiefel. Sibirica.

Diese Art ift auch fast so groß als der Ilris, hat aber mehr die Bestalt des Bermelins, wies wohl die guße und der Schwanz langer find. Die Schnause ift bis an die Augen fchwarz, und nur um die Masenlocher herum weiß, aber bis an Die Augen gesprenkelt. Sonft ift ber gange Rorper hoch braungelb, ziemlich einfarbig, wies wohl untenher und nach dem Kopfe zu etwas hel-Die Reble ift oft mit weissen Bleden gesprens Die Vorder: und hinterfuße find an den Solen greißesilberfarbig rauh. Der Schwang ift halb fo lang ale das Thierchen, febr rauh, und dunkeler als der Rucken gefarbet. Der Pely figet allenthalben geraumlich, und ift langhaariger als am Iltis ober Raninchenwiesel, No. 7. und 8. Die größten unter ihnen find zwolf Boll lang, und die Lange des Schwanzes ist sechs Zoll. Der Aufs enthalt ift in ben bicfften Balbern und Geburgen Es frift alles, was ihm vor das Sibiriens. Maul kommt, und im Binter laffet es fich nicht Telten in den Dörfern sehen. Dallas Reise

17. 90

# 17. Geschlecht. Der Philander.

Ferae: Didelphis.

#### 6. Der Cajopolin Didelphis Cajopolin.

Fr hat dunne durchsichtige Ohren, eine stumpfe lin. Schnauge, einen weissen Bauch, und wohnet Cajo. in America. Buffon Tom. X. tab. 55. Bode polin. baert.

#### 7. Der Amboineser. Didelphis indica.

Der Schwanz ist an der Wurzel haarig, ber Rorper am Mannchen gelblich weiß, am Weibchen aber hafenfarbig grau, mit einem ichwarzen Strich Indica. über ben Rucken. Der Aufenthalt ift in Umbois na. Buffon Tom. XIII. tab. 11. 12. Boddaert.

# 18. Geschlecht. Der Maulwurf.

Ferae: Talpa.

2. Der Burpurmaulmurf. Talva virginea.

r ift dunkel purpurfarbig, und halt fich, nach dem Seba, in Virginien auf. 2000

Durpur murf. . Virginea.

**6** 2

4. Det

36 Erste Cl. 111 Orbn. Raubthiere.

Mother Mould wurf.
Americanus.

4. Der rothe Maulwurf. Talpa americana.

Er ift roth, und wohner, nach dem Seba, in Umerica. Boddaert.

Seflect. ter Manb wurf. Fribus. 5. Der geflecte Maulmurf. Talpa frifius.

Er ift, nach dem Seba, schwarz gefleckt, und wohnet in Offriefland. Boddaert.

# 

# 19. Geschlecht. Die Spismaus.

Ferae: Sorex.

6. Waffer, pit, maus. Aquati6. Die Bafferspigmaus. Sorex aquaticus.

ie ist schwarz, untenher gelblicheaschgrau, und wohnet in Frankreich. Buffon Tom. VIII. Tab. 11. Boddaert.

Frasilie anische Spite mans. Ameri-

7. Die brafilianische Spihmaus. Sorex americanus.

Sie hat einen kurzen Schwanz, einen braus nen Körper mit dren schwarzen Bandern, und wohs net in Brasilien. Buffon. Boddaerr.

Bierte

# Vierte Ordnung.

# Nagende Thiere.

Mammalia Glires.

# 22. Geschlecht. Der Haafe.

Glires: Lepus.

#### 3. Der Zwerghause. Lepus pusillus.

r hat gar keinen Schwanz. Die Ohren find 3werge abgerundet. Das Thier ift nicht größer haafe. als eine Rage, und obenher wie der ges Pulillus mine hase gefärbet, das Maul aber, die Kehle mid die Bruft sind weiß. Die obern Borderzähne mb doppelt, die Worderfüße haben fünf, und die hinterfuße nur vier Zaben. Das Baterland ift Sibirien, wo er des Tages in seinen Sohlen fett, und nur des Nachts hervor gehet. Linneus.

# † 6. Der Berghaase. Lepus alpinus.

Er hat die Große eines Meerschweinchens, Berge bo fommt er in der Geftalt und dem ganzen In haufe. ichen bem obigen Zwerghaasen gleich. Der Kopf Alpi-ft länglich, und hat ein Haasenmaul. Die obern nus. Borbergahne haben eine tiefe Furche, und einen smeinschaftlichen brengahnigen scharfen Schnitt. € 3

#### 38 Erfte Cl. IV. Orbn. Magenbe Thiere.

Die Gaumengahnchen find abgestutt. Die Ohren find groß, etwas rund, inwendig zwenblatterig, und mit dem pordern Rande gleichsam trichter. maßig gefochert. Der Korper ift bid, und bie Bliedmaffen find furz wie an ber porigen Art. Die Vorderfüße haben fünf Finger, wovon der Daumen sehr furz ist, die hinterfüße aber find viersingerig, und ihre Flachen sind alle mit dicken ichwarzen Saaren befest. Statt eines Schmanges nimmt man einen Klumpen Bett, etwa einer Muß groß, mahr. Die Farbe ist gelblich, oben etwas braun meliret. In der Gegend ber Ohren ift an benden Seiten ber Pelz gleichsam abgeschabt, und hat nur fehr furje Raare. Das gange Bewicht bes Safen macht etwa funfzehen Ungen. In ber Bruft befinden fich vier, und an den Beichen amen Biken. Die Eingeweide find, wie an ber vos rigen Art, von einer gang besondern Structur, und die Larven der Biebbramen friechen gerne in feine haut. Der Aufenthalt ift in den klippigen Beburgen Sibiriens. Im August aber sammlet er fich Deu, und trodne Rrauter, welche er gwis ichen ben Relfen aufbebt. Pallas.

# 24. Geschlecht. Die Maus.

Glires: Mus.

## 22. Die Sumpfmaus. Mus paludosus.

ie führet einen mittelmäßigen haarigen Schwang, wodurch fie von der Feldmaus Cumpf, verfchieden ift, und berfelbe bat die Lange des Rorpers, ohne den Ropf gerechnet. Der Korper hat die Große, dofis. Beftalt und bas Unfehen ber Feldmaus, ift aber gam fchwarg. Die Ohrlapplein find haarig, und nicht wie an der Feldmaus fahl, aber furger als ber Delg. Die Bufe find alle weißhaarig, die borbere Sand ift fast vierfingerig, indem ein Sin: ger febr flein ift, bie bintere aber funffingerig. Der Aufenthalt dieser Maus ift in Schweden, mo fie in Gruben wohnet, Die ihren Gingang fo gar unter dem Baffer haben. Linneus.

## 23. Die Bifelrage. Mus citellus.

Es ift ichon im erften Theile G. 339. eine Mus Citellus unter dem Mamen polnische Maus beschrieben worden; jest aber beschreibet der Rierer in seinem Anhange eine fibirische Art, mit der Anfrage, ob fie etwa auch die Mus Citellus fenn fonnte? Wir wollen fie alfo beichreiben, wie die Anzeige des Bitters aus den Nachrichten bes herrn Prof. Lapmanns in Des tersburg fauten:

Sifelras

€ 4

Det

#### 40 Erfte Cl. IV. Ordn. Magende Thiere.

Der Schwanz ift mittelmäßig, fo lang namlich wie die Sufe, und mit langen Saaren befest, Die an der Wurzel schwarz, und an der Spige weiß find. Die Bufe find gespalten, und raube haarig. Die Borderfuße haben funf Ringer, movon die bren mittleren am langften find, und ber Daumen einen fleinen Magel hat. Die hinters fuße haben auch funf Singer aber fleimre Ragel. Am Kopfo find faum einige Spuhren von Dhra lapplein zu bemerken. Det Rorper ift eine Spanne lang, oben afchgrau, unten blaß ziegelfarbig. Einziegelfarbiger Blecken zeiget fich auch auf ben Bas chen unter jedem Auge, und an benben Seiten ber Mafe ift ein Schnurbart vorhanden.

Diese Art wohner in Sibirien, und lebt

nach Art der Maulwurfe. Linneus.

Braff. lianifche Maus. Aperca

24. Die brasslanische Maus. Mus aperen Sle hat keinen Schwang, aber runde Ohren, und wohnet in Brafilien. Buffon. Boddaert.

25. Die americanische Maus. Mus Cabiai.

25. Mmert. Maus. Cabiai.

Gie hat ebenfalls feinen Schwanz, aber furze canische runde Often, und einen biden Ropf. Die Fuße haben vorne und hinten dren Finger. Tom. XII. tab. LU. Boddaert.

#### 26. Die polnische Maus. Mus Bobak.

26. Sie hat an den Borderfüßen fünf, und an Belni. ben hinterfußen vier Singer. Der Schwang ift **fate** furz und haarig. Der Aufenthalt ift in Polen. Maus. Buffon Tom. XIII tab. XIX. Boddaert.

† 27. Die

#### +27. Die Actermaus. Mus agrarius.

Gle ift ein menig fleiner und garter als die Acer-Sapsmaus No. 13. und hat eine fpisigere Schnau, maus. te, fparsamere Schnurbartshaare, einen langli. Agroom Ropf, und fleinere inwendig zotige Ohren. Der Rorper ift gelb, untenher aber, und an ben Cliebern grausweiß. Die Glieber find febr fchlant. Der Magel an den Daumen der Borderfüße ift mgemein flein. Der Schwanz ist ohngefehr halb b lang als ber Rorper, bunner und etwas haaris ger als an ber hausmaus, fast fabenformig und mit ohngefehr zwanzig Ringen bezeichnet, oben wanlich, und unten weißlich, wiegt in allen m bis vier Drachmen. Wohnet an der Wolga. Pallas Reis.

## 128. Die Zwergmaus. Mus minutus,

Diese Art ist ist dem ganzen Mansegeschlechte 3werge maus No. 13. Der Kopf und die Nase sind ets Minubas tauber als an der vorigen Art, die Schnure tus. bartshaare find bunner, die Ohrlapplein kleiner, halb im Delz versteckt, rund, und etwas zotig. De Karbe des Korpers ift grausgelb, auf dem Anden mit braun meliret, und unten gran weiß. Die Fußsohlen find mit einem Kranze von Haaren umgeben. Der Magel am Daumen ber Borders fife ift fehr stumpf. Der Schwanz ist langer als an der vorigen Art, doch dunner und fürzer als an der Hausmaus, ganz haarig, und mit hmbert und breifig Ringeln geringelt. gingig megt biefe Art nur anderthalbe Drachmen, flen aber zwen. Die Eingeweide diefer und ber wigen Art kommon mehrentheils mit der Was Make No. 11. und der ABaldmaus No. 17. übere E 1 ein.

## 42 Erfte El. IV. Ordn. Magende Thiere.

Sie haben bende feine Ballenblase. Der Aufenthalt diefer Art ift eben fo, wie der poris gen, am Wolgastrobin, und in den benachbare fen Gegenden, wo fie von herrn Pallas bende haufig unter ben Getraidhaufen angetroffen murs den. Dallas Reis.

#### † 29. Die Camarisfenmaus, Mus tamariscinus.

Tama risten maus. Tama-

Sie ift größer als eine Rate, und fast wie Die Bichelmaus No. 15. geftaltet. dergabne find braungelb, und die obern davon mit einer Furche verfeben. Die Schnurbarthaare find rifcinus lang, die Augen ziemlich groß, besgleichen auch Die Ohrlapplein, welche oval und etwas nacht find. Die Borberfuße haben fast vier Baben, boch der Daumen bestehet in einer großen incruftirten Die hinterfuße aber find funfgabig. Warze. Der Schwang ift fo lang als ber Rorper, haarig, an der Spige einigermaffen bufchelartig, und übrigens mit breiten, braunlichen Ringeln bunt. Oben ift die Farbe des Korpers greisgelb, unten Die Augenwimpern und bas Feld um bie Augen find auch weiß. Das Baterland ift in ber Begend des caspischen Meeres, wo es unter die Burgeln der Tamaristen und saftigen Galgfrauter. Geftrauche grabet, und vielleicht auch von beren Bruchten lebet. Dallas Reif.

# + 30. Der Langfuß. Mus meridianus.

30. Lange fuß. Meridianus.

Sie ift ein wenig größer als die Waldmaus, hat aber einen langeren Ropf, und eim langere Schnauge. Gine nactte hockerige Dafe, die jum graben ober Bublen stangt, febr lange Schnur. barthaare, gelbe Babne, bavon die obern eine Burche

furche baben, und eingekerhet find, große nackte spale Ohren, und hinten einen diceren Korver mit Scischigen Springschenkeln. Die hintern Ruffe find lang, groß und funfjahig. Daher ber herr Pallas zweifelt, ob sie nicht ber Langfuß des Line ne, No. 19. senn konnte. Sie wohnet in der sandigen Bufte nach dem caspischen Meere ju, mischen bem Jait und der Wolga, und grabet Ellen tiefe Bange mit bren Ausgangen. Dallas Keil

#### +31. Die Zugmaus. Mus migratorius.

Sie ist größer als die Keldmaus No. 10. und fichet gang anders aus. Die Schnauge ift bich, Bug: ficitig und stumpf. Die Tafchenface behnen fich maus. bis en Die Schulter, wie am Samfter No. 9. Migra-Die Borderjahne find flein und gelb. Die Schnurbuthaare gart. Die Ohrlaplein gurnickgebogen, und faft nacht. Der Rorper ift fury und bict. Die Borderfuße find vierfingerig, mit einer fcmce den Spur eines Daumens. Der Schwang ift fur, colindrisch, und etwas haarig. Oben ift bie Farbe greiß aschgrau, unten weiß. Auch ift bie Epige ber Schnauge und der Fufe meiß. Der Anfenthalt ift in ben Wiesen am Jait in Rufe land, und man fagt, daß fie in gewiffen Jahren in großer Menge aus ben Buften herben ziehen, worauf hernach insgemein viele Suchfe fommen, und eine portheilhafte Jagd veranlassen. Dallas Reil

+ 32. Die Pamstermaus. Mus sungorus.

Sie sichet eben so wie ein hamster aus, ist ster, ster kleiner als die Feldmaus. Der Kopf ist furz, maus, die Backen sind aufgetrieben. Am Maule sigen rus. piele

Digitized by Google

#### 44 Erfte El. IV. Ordn, Ragende Thiere.

viele Schnurbarthaare, Die Borderzähne find gelb. Die Maultaschen find groß, und geben bis au ben Schultern, die Ohren find oval und tabl. Die Borberfuße vierfingerig, mit einer Spur eis nes Daumens. Der Korper und die Gliedmassen find ziemlich furg, besgleichen auch der Schwang. Die Karbe auf bem Wirbel und Ruden ift afche grau, boch gehet vom Nacken bis zum Schwanz ein schwarzer Strich, und die Seiten find braun und weißbunt. Untenber ift alles, nebft ben Ruffen und ber Schwanzspite, weiß. Der Aufent. balt ift auf hohen sublichen Zelbern am Jetisfluß in Rufland. Gie grabet Bange mit verschiebe. nen Sohlen, bie fury unter ber Erde weglaufen. und ziemlich lang find. Sie bringt im Sommer feche bis fieben Junge auf einmal zur Welt, die gesthwinde erwachsen find, und ftreicht ben Tage berum. Dallas Reis.

#### + 33. Die Sandmaus. Mus arenarius.

Sandr maus. Arenarius. Sie ist etwas kleiner, hurtiger und zierlicher als die vorige Art, hat eine spisigere Schnause, langeren Schwanz, größere und ovale Ohren, gelbe Vorderzähne, weite und lange Maultaschen, und ist oben braunlich greiß, nuten schneeweiß, auch sind der Schwanz und die Füße weiß. Sie wohnet ebenfalls in den südlichen Gegenden am Jetis, lebt vom Tragantsamen, den es in den Vacken zum Neste trägt, gebieret früher, bringt weniger Junge, und lässet sich nur ben der Nacht sehen. Pallas Reis.

Dhy. maus. Barabenfis. † 34. Die Obymaus. Mus barabensis.

In den Sandfeldern am Obyfluß ift einmal eine der vorigen Art fast abnliche, und kaum etwas größere

profere Maus gefunden worden, welche einen weiß kn Gaum um die Ohren, vierfingerige Bufe, faft obne Daumen, und einen etwas langeren Schmans hme. Gie mar obenher greisgelb, unten fchmus big meiß, und hatte breite braune Ringe um die Bufe an den Knorren, desgleichen einen schwarzen Errich vom Macken bis jum Schwanze. fricht ben Tage berum. Dallas Beisen.

## †35. Der Rauhschwanz. Mus lagurus.

Diese Maus ist fast so groß wie die Sandmus, aber allenthalben etwas fürzer, hat gang Raub, fime Dhren, fast vierfingerige Borberfuße, und schwans ben Daumen bestehet nur in einer hornartigen Lagu-Bage. Der Schwanz ist sehr furz und rauf. Den ift die Farbe aschgrau mit einem schwarzen Etid von den Augen bis jum Schwanze, unten beffic. Man findet sie in den ratarischen Bufm und am Ircis haufig, weniger aber in den Wichen Segenden am Jaik. Sie ift von beife het Art. Dallas Reis.

# + 36. Die gesellige Maus. Mus socialis.

Sie ist einer kleinen Feldmaus No. 10. sehr inlich, weicht aber beständig in menig Debens Gesellt umfanden ab, ift namlich etwas furger, und hat ge tuen rauheren, und mehr abgefürzten Schwanz, Maus. let in der Muffe am Toile, ma noch die meisten Socialet in der Bufte am Jait, wo noch die meisten lis. Rauter find, grabt eine Spanne tief, macht feche bis acht Gange, und lebt fomohl mit ihrer zwen bis bregen in einer Sohle gesellig, als allein. Herr Pallas meifelt, ob fie nicht des Ritters Mus gre-grius, oder Erdmans, No. 16. sepn konnte. Pallas Reisen.

+ 37. Der

## 46 Erfte El. IV. Orbn. Ragenbe Thiere.

## + 37. Der Zärtling. Mus subtilis.

Sie ist sehr klein, und siehet wie die Zwerce Rartlina Subtilis maus No. 28. aus, hat aber großere Ohren, und rinen viel langeren Schwang, ber nicht fo rauh ift. Sie ift oben braunlich aschgrau, mit einem breis ten ichwarzen Strich über bem Rucken, und etwas über eine Drachme schwer. Es giebt auch eine Berschiedenheit. Gie kommt haufig in den Bus ften oftwarts am Jait, Jris und Oby vor, fann aber die Ralte nicht vertragen, lebt daber in diesem falten Lande nur fehr furg. Gie feigt an den Stengeln der Pflanzen hinauf, und sucht fich bie Saamenkerne zur Nahrung. Dallas Reif.

# + 38. Die Pfeilmaus. Mus sagitta.

Pfeil:

mans.

Sie ist viel kleiner als die große Art des Springers No. 20. doch größer als die kleine Art, und mag etwa die Brofe einer hausrage bas Sagitta. ben, ift aber bem erwähnten Springer in viclen Studen gleich, doch ift der Ropf runder. Ohren find viel furger als der Roof, und oval. Die obern Borbergahne find gelb, und mit einem Striche tief gefurcht, welches am Springer nicht ftatt hat. Godann find die hintern Gliedmaffen und der Schwang fürzer, und endiget fich nicht fo flocfig. Der größte Unterschied aber ift, daß fle nur dren Finger und gar feinen Daumen an den Borderfüßen hat. Diese bren Finger find febr haarig, und ber mittlere bat einen fleineren Dagel. Auch ist der hintere Theil des Korpers nicht fo fleischig.

> Sie grabt im trockenen Sande am Jetisfluß erft tief hinein zum Defte, und bann wieder in die Sobe, aber nicht gang bis zur Oberflache hinaus, wenn aber Gefahr vorhanden ift, fo bobret fie

das übrige gleich durch, und entwischt. Dallas Reisen.

# 29. Die wilde Maus. Mus barbarus.

In Africa, und besonders in der Barbas rer halt sich eine Mauseart auf, die etwas fleiner Bilbe ds die Sausmaus No. 13. und oben braun ist. Barba-Der Rucken hat zehen blaffe Striche, und zuweis rie. la wischen den Seitenstrichen noch eine verloschene line. Der Bauch ift blaß. Die Borberfusse leben bren mit Rageln befette Finger, und einen Stundpf statt eines Daumens, doch die Juffohle selbst giebt noch die Spuhr eines funften Fingers. In den Hinterfüßen hingegen zeigen sich alle fünf Amaer deutlich. Der Schwanz ift etwas fahl, tingermaffen webelformig, und fo lang als ber Siper. Berr Brander bat diese Art auf seinen Reifen entbeckt. Linneus.

# 24. a. Geschlecht. Der Cavia.

Glires: Cavia.

Gefchl. Benene nung. avia oder Savia ist eine ausländische Benens nung, worunter man gewisse Thiere verstes het, welche allerdings razenartig sind, jedoch vom Rlein als ein eigenes Geschlecht betrachtet, und auch vom Herrn Pallas darinne bestättiget worden. Nur hatte es dem Ritter nicht gefallen, sie als ein besonderes Geschlecht anzumerken, das her er sie theils unter das Geschlecht der Zaasen, theils aber unter die Mause gedordnet hat. Jes doch ist derselbe in soweit von seiner Mennung abz gegangen, daß er in seinem Anhange nunmehro ein besonderes Geschlecht unter diesen Namen ges macht, dessen Kennzeichen solgende sind.

Gefchl. Benem nung. Oben befinden sich im Kiefer zwen von einander getrennete Borderzähne, unten aber vier, die aneinander stehen. Allein der Ritter zählet hiedher nur die folgende einzige Art; wiewohl hier von Rechtswegen noch einige aus andern Geschleche tern genommen werden mußten.

## 1. Der caapsche Savia. Cavia capensis.

Eaaps fate Cavia Capenfis. Er ist so groß wie ein Murmelthierchen, lebt von Grasern, und grabt in die Erde. Die obere tefze ist einigermassen gespalten. Die Ohrlapplein sind am Rande kahl. Die Borberfuße sind vierssingerig, unbewasnet, und die Finger sind aneins ander gewachsen. Die Hintersuße hingegen sind einis

tingermassen den innern Finger, welcher einen Magel hat. Uebrigens sind gar keine Hundszähne T. III. mhanden, auch hat das Thirt keinen Schwanz. fig. 1. Die lebensart dieser Thierchen, die sich am Vorgebürge der guten Hosnung aushalten, kommt mit dem Meerschweinchen, (Mus porcellus) wels des die americanischen Cavia sind, überein. Siehe Tab. III. sig. 1. Linneus.

NB. Wir überlassen es andern, mehrere Arten aus den vorigen Geschlechtern auszumustern, und sie in dieses neue Geschlecht zu fegen.

Linne Supl. 23.

D

Sänfte

# 27. Geschlecht. Das Kameel.

Pecora: Camelus.

5. Der Schafdromedar. Camelus guanicoe.

Schafe brontes bar. Guanicoe. Sestalt und Farbe einem Rehe ahnlich bet, es hat aber einen Hoder auf dem Ru und keine Hörner oder Geweiße, und wurde dem Klaurte S. Wallis auf seiner Reise die Welt, erst vor wenig Jahren ohnweit Pagonien entdeckt. Aus Mangel einer auss lichen Beschreibung, können wir kaum be men, ob wir ihm hier die rechte Stelle geben. Felle werden von den dasigen Einwohnern zu dungsstücken gebraucht. Vielleicht ist es Paca oder Glama nicht viel verschieden, wenigstens damit verwandt. Engl. Reisen

# Künfte Ordnuna. Wiederkauende Thiere.

Mammalia Pecora.

29. Geschlecht. Der Hirsch.

Pecora: Cervus.

& Det wilde Birich. Cervus Pygargus.

Er ift etwas größer als eine Gemfe, hat die Farbe wie ein Reh, drengabeliche Geweihe wie die Rehborte, welche unten voller Rno. Dirfch im von allerhand Große und Geftalt figen: Die Pygars Mem find inwendig weiß und fehr zotig. Um die Bus-Angen figen lange ichwarze haare. Statt bes Samanzes ist über dem After nur eine bide hammarze vorhanden. Die Afterbacken haben tuen großen weissen Flecken, ber bis zum Ruckett huan steiget. Der Pelz ist untenher bick, und m den Gliedmassen gelblich. Die Gegend um die Mase herum, und die Seiten der Unterlesze find ihmarz, doch die Spine der Lippe selbst ist weißt Am trift ihn auf den strauchigen Feldern und Bebirgen hinter dem Wolgastrobm in Rußland u Dallas Reisi

29. â. 3

# 29. a. Geschlicht. Der Hirschbon

Pecora: Antilope.

Gefchl. Benene nung.

s ist dieses ein neues Geschlecht, welches v züglich von Herrn Pallas in Anregi gebrächt worden, ob gleich die Antilopen vor ters unter diesen besondern Namen nicht un kannt waren. Man verstehet nämlich ein wich käuendes Thier darunter, welches sowohl v Bock als Hiesch etwas an sich hat.

Gefcl. Renn. zeichen.

Die Kennzeichen sind: gerade in die Hiftehende, beinige runde Horner ohne Aeste, bicht abfallen, und in einer Scheide stecken. I hufen dieser Thiere sind knotig, und der Schwist kurz.

Mach diesen Merkmalen gehören verschied Thiere hieher, welche der Ritter unter andere schliechter gesetzt hatte. Wir wollen also nur Arten hier kurzlich hersenen, so wie wir sie Boddaert sinden:

### 1. Der blaue Bod. Antilope capensis

1. Blauer Bod. Capenis.

Die Hörner find etwas nach vorne zu ge gen, der Körper ist aschgrau, der Rücken schwe Am Auge besindet sich ein weisser Flecken. T Bauch und die Fusse sind weiß. Er wohnet Vorgebürge der guten Sosnung. Pallas.

### 2. Die Gemse. Antilope europea.

Sie hat gerade horner, die oben umgefrums Gemfe. mit find, und hinter ben Hornern einen aschgrauen Euro. Bleden, ift an den Anien voller Loden, der Rore peaper aber ist braun. Sie wohnet in Buropa. NB. Diese ift des Ritters Capra rupicapra. Cithe den I. Theil pag. 409. No. 4. und des Bufo fons Bouquettin, Tom. XII. Tab. 15.

### 3 Die africanische Bemfe. Antilope Dama.

Sie ift braunroth, und die Borner fichen Africa-14h vorne zu umgefrummet. Das Baterland ift Africa. Des Buffons Nanguer. Pallas.

### 4 Das Krummhorn. Antilope redunca.

Die Hörner sind fast glatt, nach vorne zu 4. Adminmet, und der Körper ist blaß rostfärbig. Krunund In Aufenthalt ift in Senegall. Des Buffons horn. Ngar. Tom. XII. tab. 48. Dallas.

#### 5. Der Rameelbod. Antilope Trago camelus.

Er hat einen Höcker vorne auf dem Rücken, bod. men langen hals, und einen Schwang. Das Trago Baterland ist Indien. Pallas.

lus

### 6 Der Cartar. Antilope scytica.

Er hat gelbe geringelte burchfichtige horner. Bartar. Der Körper ist braun rostfarbig, und der Bauch Saytica wis. Man findet ihn in der Cartarey und in Mokau. NB. Diefe ift des Ritters Capra tarurica. Siehe I. Theil pag. 417. No. 11. Buf. m Tom. XII. tab. 24. fig. 2. Pallas.

7. Der ,

54 Erfte Cl. V. Ord. Wieberfauende Eb.

7. Der Beifarsch. Antilope Pygargus.

gus. Pygargus. Die Hörner sind einigermassen platt und gerunzelt, rostfärbig schwarz. Der After, der Bauch, und ein Strich über der Stirn sind weiß. Das Baterland ist Arabien. Buffons Tzeiran, Tom. XII. tab. 23. NB. Dieses Thier ist des Ritters Capra gazella, I. Theil, pag. 412. n. 7.

### 8. Die Gaselle, Antilope Dorcas,

A. Gajelle. Dorcas

Die hörner sind ganz und halb geringelt, die kange herab gestreift, und der Bauch nebst den After sind weiß. An den Knien besinden sich Haars buschel. Das Baterland ist Sprien. Pallas, Bussons Gazelle Tom. XII. tab. 25. Sie ist des Ritters Capra decoras. Siehe I. Theit pag, 416, No. 10.

### 9. Das Plathorn. Antilopo Kevella.

fa Kevef-Plak Tiak Die Hörner sind geringelt, und an den Seisten platt. Der Körper ist rostfärbig braum, und an den Seiten mit einem schwarzen Striche besetzt. Der Schwanz ist schwarz. Der Aufenthalt ist am Senegal. Pallas. Buffons Kevel, Tom. XII. tab. 38.

### 10. Die Blasengazeste. Antilope bubalis.

Sinime Anime Bubalis Die hörner sind die und gewunden, der Körsper grau rostfärbig, der Hals ganz wstfärbig. Das Baterland ist die Barbarey. Pallas. Buffons Bubale, Tom. XII. tab. 37. 38. NB. Sie ist des Kitters Capra bezogrtica. Siebe L. Theil, pag. 415. No. 9.

11. Der

### 29. a. Befdlecht. Pirfcbod. 55

#### 11. Der Bezoarbod. Antilope bezoartica.

ıı. Die horner find gerade, über die Belfte ger Bezoges rungelt, hernach knotig, und an der Spige glatt. bod. Das Baterland ift die Levante. Pallas. Des Bezo. Buffons Pafan. Tom. XII.

### 12 Der Jungfernbock. Antilope grimmia.

Die horner fteben gerade. Siehe hievon gung white Beschreibung im ersten Theil pag. 376, fernbock No. 2. denn es ist des Ritters Moschus grim-Grimmia Dallas. Buffon.

### 13. Der Creusbock. Antilope scripta.

Die horner liegen hinter fich, find platt, Greute big, und einigermassen kielformig. Der Kor. boct. mif braunlich s fuchsfarbig, und mit weissen Scripta Strichen gezeichnet, Die einander freugen. Der Ansenthalt ist am Senegal. Pallas. Buffons Gub. Tom. XII. tab. 42. 43. fig. 3.

### 13. Der Cubu. Antilope Oryx.

Man nennet diese Art auch caapscbes Cubu. Elendthier. Die Borner geben in einer Schlam Oryx. sellmie gerade in die Sohe, und haben einen Riel. Das Baterland ift bas Vorgeburge ber guten bofnung. NB. Dieses Thier ist des Riccers Oxis strepsiceros. Siehe ben I. Theil pag. 429. No. 3. und Capra cervicapra, pag. 414. n. 8.

### 15. Der Condoma. Antilope strepsiceros.

Condes Die Hörner sind rund, gewunden, und ha ma. In einen Kiel. An benden Augen besindet sich Stropsi-D 4

Digitized by Google

### 56 Erfte Cl. V. Ordn. Biebertäuende Eh.

ein weisser Fleden, der von benden Seiten mitten vor dem Kopfe zusammen lauft. Der Condoma des Buffons Tom. XII. tab. 41.

# 16. Die bengalische Antilope rupicapra.

16. Bengas lifche Untilos Pe. Die Hörner find groß, nackt, gerunzelt, und geben weit auseinander. Der Körper ist braun, und der Hals schwarz. Pallas, Des Buffons Antilope. Das Vaterland ist Bengalen.

### 32. Geschlecht. Der Ochse.

Pecora: Bos.

### 1. A. Der Mastochse. Bos taurus.

Ad pag. 433, bes ersten Theils,

Meit man es in Dautschland mit der Mastung des Biches bringen könne, zeis ochse, stim neuerliches Bepspiel eines in Nurnberg Bos. mim Metgermeister Schwammeis den zwölfe in Ipril 1775 geschlachteten setten Ochsen. Derssilk war vom Schwanze dis an den Kopf neun Ein und acht Joll lang, und sechs Schuh soch. In Umsang des Körpers hielte zehen Schuh und sch Joll. Die Schwere des lebendigen Thieres 2740 Pfund, so daß er noch 640 Pfund schwerer war, als ein in eden gemeldeter Stadt im Jahr 1691 geschlachteter Ochse, welcher nur neunzehn Emmitdig, hier eingeschaltet zu werden.

Sechste

# Sechste Ordnung. Thiere mit Pferdegebi

Mammalia Belluae.

### 35. Geschlecht. Das Schwein

Belluae: Sus.

### 1. B. Das Mastschwein. Sus scroph:

Ad pag. 464. des ersten Theils.

r. B. Maft: fchwein. Scrapha. en Meggermeister Start in Ludwischung schlachtete den 22sten Merz 1 ein Schwein von zwen und einem Bie jahre, welches lebendig 884 Pfund, geschlat aber aber 834 Pfund wog. Es war neun Svier Zoll lang, und vier Schuh und fünf hoch. Die Hohe des Specks auf dem Rücken sieben Zoll, und in den Seiten neun Zoll. Inwendige Fett beltef sich auf sieben und ach Pfund. Man siehet aus diesem Benspiel, weit man es durch gute Wartung, Pslege und terung ben einem gesunden Vieh bringen to und ist zugleich ein Beweis, daß man eben besondern Größen nicht allezeit auf besondere ten schließen könne.

### 35. Wefchlecht, Das Schwein. 59

# I, C. Das athiopische Schwein. Sus aethiopicus.

Wir haben in dem ersten Theil pag. 464, 1.C. lit. c. dieses Schweins schon gedacht, da aber der Acthiopkinger auch dieses Thieres in seinen Addendis Schw. gedenkt, so wollen wir hier die Abbildung aus dem Acthiopking hinzusügen, (Siehe Tab. III. sig. 2.) und picus. wu noch einen Umstand erwehnen, daß nämlich T. III. diese Schweim unterhalb den Augen eine Thränens sig. 2. wie und weichen Sack habe. Ausser den Haus jähnen sind keinen Vorbanden, und der Schwanz ist nacht. Linneus.

Siebende

# Siebende Ordnung. Säugende Seethiere.

Mammalia Cetae.

38. Geschlecht. Der Wallfisch.

Cete: Balaena.

4. b. Der Knotenfisch. Balaena musculus,

4. b. Anotens fifth. Musculus. n Meu. Engelland ist eine Art mit zwenen Blaslochern entdeckt worden, welche statt seche, nur einen Knoten auf dem Rucken führet. Boddgert.

#### areare

### 40. Geschlecht. Der Delphin.

Cete: Delphinus.

### 3. d. Der Buttfopf. Delphinus orca.

Da der Ritter in seinem Anhange von diesem Butte Fische noch eine andere Beschreibung giebet, fopf. bwollen wir sie hier zur Erganzung mittheilen: Orca

Die Ruckenfinne ift schwerdformig, sehr hoch weichs Schuh lang, mit einer Saut überzogen, wan der Burzel breiter, daher er auch Schwerd. Mogenennet wird.

Die Zahne find einigermaffen kegelformig, wim wenig gebogen.

"In benden Riefern stecken Zähne.

Das Sprugloch ift flach, und bestehet in wenn Rochern.

Der Aufenthalt dieses Fisches ist im norwes sischen Ocean, und in der Srass Davids. Er tödet und frist die Wallsische, und die größten Platisische. Mit den Seehunden sühret er einen nomtlichen Krieg, und stößt sie mit seinem Schwerdte von den Klippen herunter. Ja en ist im solcher Enrainne unter den Wallsischen und Sees hmden, daß er sie truppweise anpacte.

Zugabe

### Zugabe zum 24. Gefchl. die Maus

### 40. Das Känguruh. Mus Canguru.

46. Ranguruth. Canguru,

T. III.

fig. 4.

Der Lieutenant Coot entbeckte auf sein Reise um die Welt am Endeavour Rivier Sudamerica ein hochst seltenes und sehr viel n dem Springer Mus Jaculus No. 20. überei kommendes Thier, welches aber, wenn es ausc machsen ift, die Große eines Schaafes hat. 20 wohl dassenige Eremplar, welches Berr Gore legte, jung, lange nicht erwachsen, und nur ac und drenfig Pfund schwer war. Der Kopf, t Bale, und die Schultern waren im Berhaltr der andern Theile fehr flein. Der Schwang w ohngefehr fo lang als ber Leib, am Mumpfe bi und gegen das Ende bunner. Die Borberfu bienen nur jum Scharren, find furg, nur a Boll lang, und wurden von dem Thiere, bas n ein Kaninchen immer in die Bobe aufgebaun faß, bichte an ber Bruft angehalten. terfüße hingegen batten eine Lange von wen u zwanzia Zoll. Die Saut hat dunkel = maufefar ge Baare. Ropf und Ohren sehen ber Farbe ni ben hafen gleich. Siehe Tab. III. fig. 4. D Reifch schmecke ben Engellandern ungemi lederhaft. Engl. Reif.

3wey

# Zwente Classe.

# Die Bögel. AVES.

Erfte

### Erste Ordnung.

# Sabichte.

Aves Accipitres.

34. Geschlecht. Der Falke.

Accipitres: Falco.

### 4 Mit dunkeler Wachshaut,

13). Der rußische Abler. Falco (s. Aquila) Rasenleucorypha.

Mit dunk em Nasenwachs.

err Pallas nennet diese Falkenart einen 33. Adler, und sagt, daß et kann größer sen, Rußis sale der Fischadler No. 26. aber das name Moler. iche Anfehen habe, auffer daß die Gliedmaffen Leucolinger find. Der Schnabel ist an der Warzel ger rypha. latembganz. Das Wachs blaulich z aschgrau und fat. Die Rasensöcher sind oval und weit, die Junge rund und ganz. Die Augenkreiße find braum Mis, und mit einem schwarzen Ring eingefasser. de Körper ist braun und erwas gewölft, untens in mehr verloschen. Der Kopf braunsgreis mit mem weissen dreneckigen Flecken auf dem Wirbel, h Achle ganz weiß, an den Seiten des Ropfs, bie an dem Fischadler, etwas schwärzlicher. fingel find verloschen schwarz, und die Schroung den inwendig weiß und gleichsam gepubert Die Deckfebern ber zwenten Debnung haben am tibe einen greisen Saum, find aber von unten Linne Guppl. 23. weiß,

### 66 Zwente Cl. I. Orbn. Habichte.

B. Mit dunflem Rafenmachs.

weiß, mit einer schwarzen Spike. Der Schwanzist etwas lang, steif, gleich abgeschnitten, und an etlichen Seiten Ruberfebern nach innen zu blaß gestreift. Die Füße sind blaß weiß, doch die Klaven, welche groß sind, haben eine schwarze Farbe. Die Schienbeine sind bis auf ein Drittel sederig. Zwischen den Zahen besinden sich keine Falten. Wenn der Wogel seine Flügel ausbreitet, ist der Flug fast sechs Schuh breit. Das Gewicht des ganzen Wogels hingegen ist ohngefehr sechs Pfund. Der Herr Pallas hat diesen Abler in den südlichen Gegenden am Jaik angetroffen. Pallas Reis.

### + 34. Der fleine Ronig. Falco regulus.

34. Kleiner Konig. Regulus.

Er ift noch fleiner als der Mvergfalte No. 32. und wiege faum ein halb Pfund. Geine gange Bestalt kommt mit den Thurmfalten No. 16. übers ein, und hat auch einen zwenzahnigen Schnabel. Der Wirbel ift braunlich greiß, und mit fchmary lichen Strichen befett. Der Nacken bat braune gebrehete Striemen. Der Rucken ift blenfarbig Der Macken bat braune weißgrau, und braun gestreift, und wird nach dem Schwanze zu allmählig bellfarbig. Die Reble ift welß, und die übrigen untern Theile find weißlich, und mit fehr vielen braun roftfarbigen Bleitchen gesprenkelt. Die Flugel find unten bunt, und haben einen weissen Rand. Die Ruderfedern find siemlich gleich, und blenfarbig weißgrau, untenher wolfig bandirt, am Ende aber alle schwarzlich mit meiffer Spige. Das Masenwache ift grunlich, die Suffe find hochgelb, der Augenfreis aber braun, fo wie foldes ben allen edlen Falten ftatt bat. Diefer Bogel ftellet ben Lerchen nach, und wird nur selten in den sibirischen Gefilden angetroffen. Dallas Reif.

43 Str



Accipitres: Strix.

### A. Gebornte Eulen.

† Der fleine Schuhu. Strix deminuta,

Prist noch kleiner als die Baumeule No. 5. und wiegt nicht einmal ein Pfund. Uebrie Rleiner me aber ift er in Geftalt, Farbe, ja auch im ges Demimin Umftande, dem großen Schuhu No. 1. fo nuta. th, daß nicht der geringfte Unterschied obs Mitt, als daß er etwa nicht so schon in der Zeiche ausfiehet, indem bas melirte Colorit nicht fatt gegeneinander absticht. Dahingegen weicht "von der Baumeule No. 5. ganglich ab. Man tift ihn auf den Relbern, und in den Geburgen m Jait an. Pallas Reisen.

B. Ungehörnte Eulen.

Unec bornte.

†13. Die Sabichteule. Strix accipitrina.

Sie ift ungefehr so groß als bas Rauglein No. 10. fiehet aber anders aus. Der Kopf ift Dabichte Methalituis fleiner als ben allen, und ohne Accipi-Ofren. (Mamlich) ohne hervorftehende Federn, trina, wiche sonst wie Ohren aussehen.) Der Schna kl ift schwarz, die Augenkreise eitronengelb. Der Rotper ift oben gelblich, unten aber gelblichweiß, mallenthalben der Lange nach mit schwarzlichen Œ 2 Otrice

### 68 , Zwente Cl. I. Orbn. Habichte.

Striemen besetzt. Die Flügel und der Steiß find untenher weiß; die Schwungfedern auswendig gelblich, inwendig weiß, und daben schwarz gerwürfelt, und die aussersten allein gezähnelt. Der Schwanz ist kurzer als die Flügel, schwach abgerundet, an den Seiten weiß, übrigens aber in die Quere schwarz bandiret. Die Füsse sind gelblich, weiß, ungesteckt, und bis an die Klauen sederig. Der Aufenthalt ist am caspischen Meere. Palstas Reis.

### + 14. Die uralische Gule. Strix uralensis.

14. Uralis fase Eule. Uralenfis.

In den uralischen Steinflippen halt sich haufig eine Gulenart auf, welche die Große der gewöhnlichen Machteule No. 7. hat, und selbis ger fo abnlich fiebet, baß man fie vor die nams liche halten follte. Allein fie ift doch von derfelben verschieden. Der Schnabel ift hochgelb, die Aus genringe und ber innere Theil ber Augenlicber find ichwarz. Bon ber Stirn bis um die Rehle herum gehet ein Ring von dichten guruckgebogenen Kedern, die weiß und schwarz gesteckt sind. Die Farbe ift mehr weiß als an der gemeinen Eule, fast ohne wellenformige Zeichnung, und unter gang weiß, etliche Striemen ausgenommen. Steiß oder Burgel ist weiß. Die Rlugel haben eine wurfelartige Zeichnung. Die dren aussert Schwungfedern haben einen gezähnelten Umfang. Der Schwang ift langer, feilformig, weich und Die Ruge find fcmutigweiß, ungeflect und feberig, und überhaupt ift bet gange Bogel febr federig, aber nur im Winter nicht. Dallas Reisen.

† 15. Die

+ 15. Die Mignatureule. Strix pulchella. Unge-

Sie ift noch fleiner und viel schöner ale bie If. Ivergeule. Der Ropf ist nicht so aufgetrieben, Wignas aber sehr start gehörnt, oder mit Zederohren ver, fureule. feben. (NB. Kraft dieses gehöret sie zur vorigen cholls. Abtheilung. Da wir aber des herrn Dallas neus entbectte Gegenstande gerne in jedem Geschlechte benfammen ftehen taffen, fo behalten wir bier feine rigene Ordnung ben.) Der Ring um bas Geficht if afchgrau, verliehret fich aber oberhalb den Au-Begen die Dasc zu gehet ein weisser Stries Die Augenfreise find citrongelb. Der meu. Schnabel ift braun. Der Korper ift oben afchgrau, und gleichfam gart bestäubet, und mit Wellen bes fest. Die Schafte der Redern find braun. Unten if der Bogel weiß, und die Bederschafte find imary, ubrigens aber mit wenigen Wellen fehr sierlich in die Quere bandiret. Die Flügel sind bandirt und auch als bestäubet. Der Schwanz ift den Flügeln gleich, abgerundet, von Farbe wie der Rucken, und kaunt weißlich bandiret. Die Schlenbeine find federig, und, wie der Rors per, wellenformig banbiret. Die Zahen find nactt, blaß, und haben braune Ragel. Der gange Bos gel wieget etwas mehr als zwen Unzen. Diese Art ist am Wolga, Samara und Jait sehr baufig ben den Wohnungen und in den Walbern enzutreffen. Pallas Reisen.

### 16. Der Beigbaden. Strix caparoch.

Diese Eule ist ungehörnt, oben braun mit Beißs weissen Puncten, am Bauche weiß mit braunen backen. Die Backen sind weiß und schwarz eins Capascfasset. Das Vaterland ist Europa. Edwards rock. Sparrow Hawk. Buffon.

**E** 3

17. Die

70 Zwente Cl. I. Ordn. Habichte.

17. Die cajennische Eule. Strix cajennensie

17. Cajeno nische Eule. Cajennensis.

B. Unger

bornte

Der Schnabel ist rostgelb, und der gang Körper gelblich, rostfarbig, aber mit kleinen schwatzen Wellen bezeichnet; wohnet in Cajenne. De Bussons Chathuant de Cajenne.

18. Die bemingische Eule. Strix domin gensis.

Domine gifche Eule. Domingenlis.

Der Schnabel ist sehr groß, der Körper rost farbig gesteckt. Die Brust ist nur wenig gezeich net, und der Bauch ganz weiß. Sie wohnet au der Insel St. Domingo. Des Busson Chouette de St. Domingue.

### 44. Geschlecht. Neuntöbter.

Accipitres: Lanius.

### 27. Der Meisburgel. Lanius leucorinus.

Fr ift schwarz, aber ber Schnabel, Die Bruft, der Bauch und der Burgel find weiß. Der Beise Schwanz ist hinten gerade abgeschnitten. Er halt Leucofich in Manilla in Sudamerica auf. Linneus, rinus.

### 28. Der Imenfärbige. Lanius bicolor.

Er ift oben blau, und unten weiß. Die 3men Edwartfebern find fast von gleicher Lange, Das Baterland ist Madagascar, Linneus,

### 29. Der weisse Meuntobter. Lanius albus,

Man bringe aus den Westindien einen gang weissen Neuntobter, welcher nur allein schwarze Schwungfedern hat, und von Herrn Boddgert mit angemerket worden.

### 30. Der Schwarzohrige. auriculatus...

Die Benennung ift nur daber genommen, Gomary weil diefer Bogel hinter ben Augen einen langen obrigerimarzen Fleden an jeber Seite fichret, welcher ihm das Ansehen giebet, als ob er schwarze Ohren hatte. Uebrigens aber ift der Rucken weißgrau. Er ift des Buffons Piegrieche rousse, denn

Auricu-

72 Zwente El. I. Orbn. Sabicte.

eine gewisse Berschledenheit hat eine rothe Bruft. Das Baterland ist Buropa.

### 31. Der Schwarzfopf. Lanius cajennensis.

31. Edwarp fopf. Cajennensis. Er ift stahlblan, hat einen schwarzen Kopf und schwarze Ruberschern, auch sind die Schwungs sedern schwarz, doch die aussern sind weiß, wies wohl es noch eine Berschiedenheit giebt, die an den Flügeln keine weissen Jedern hat. Das Waters land ist Cajenne. Bufton.

32. Der grune Meuntobter. Lanius viridis.

72. Grüner Neum tödter. Viridis Der Körper ist grun, der Kopf aber, der Hals, die Brust und der Bauch sind weiß. Die Seitenruderschern aber sind schwarz- Des Bufs sons Theha-Chert-be.

Blauer Reuns tödter. Coeruleus. 33. Der blaue Meuntobter. Lanius coeruleus.

tödter. Er ist oben blau und unten weiß, und woh-

34. Edward

Meun iddier.

Angra-

ich.

34. Det schwarze Neuntobter. Lanius Angrajen.

Er ist ganz schwarz, hat aber einen weissen Bauch, und wohnet in Madagascar. Zuffons Angraien.

Manib lischer Reuntödter. Cha-

bert.

35. Der manissische Meuntobter. Lanius Cha-bert.

Er ift bunfelblau, und unten weiß. Das Baterland ist Manilla. Buffons Chabert.

Zwepte

## 3wente Ordnung.

# Spechtartige.

Aves Picae.

### 45. Geschlecht. Papagene.

Pica: Pfittacus.

4 Langschwänze, mit keilformigem fcman Sowanze.

6. a. Der lineirte Papagen. Psittacus lincarus.

t ift grun, so groß wie eine Turteltaube, Lineire und fällt untenher etwas ins Gelbliche, ter Padie Schwungfedern find von unten braun, pagen-mb ber innere Manb ift blaß, daher die Flügel Lincawu unten aussehen, als ob fie mit zarten blaffen linien besetzt maren. Der Schwanz ift keilformig, und etwas langer als der Körper. tobte Baterland ift nicht bekannt. Linneus.

6. b. Der Blutpapagen. Psittacus haematodus.

Auf ber Insel Amboina zeiget sich noch ein pagen. beraus schöner langgeschwänzter Papagen mit todus. bluts

Blutvas

### 74 3mente Cl. II. Ordn. Spechtartige.

Pana. fchroan: ic.

blutrother Bruft, grunem Ruden, blauem Rovfe und gelben Rragen. Er ift von mittlerer Große. Linneus.

### . 6. c. Der geflecte Parfit. Pfittacus maculatus.

6. 2. Geffect: ter Bare fit. Macu-

latus.

Der Rucken und die Flügel find mit grunen Rleden befegt. Die Dedfedern find gang grun, die Schwungfedern violetfarbig, der Schwang gleichfalls grun, und an ben aufferen Bebern vios Das Baterland ift Cajenne. Buffon.

#### 6. d Der Purpurfopf. Plittacus purpureus,

6. d. Duerure topf. reus.

Der Ropf ift purpurfarbig, die Stirn und die Backen find roth, die Rehle ift schwarz, ber Purpu- Ruden grun, und die untern Theile find gelb. Muf ben Blugeln befindet fich ein Bleden, Das Anterland ist Gingi. Buffon.

### 6. e. Der Gelbkopf. Phittacus carolinensis.

6. e. Belb, forf. Carolinenfis.

Er ift grun und hat einen gelben Ropf; eine rothe Stirn und Baden, und an ben Rlugeln einen gelben Rand. Das Baterland ift Carolina. Buffon,

### 6. f. Der Weißforf. Plittacus fasciatus.

6. f. Weif. forf. Fasciatus.

Die Sauptfarbe ift oben grun, unten rofen. roth, der Ropf aber ift weiß, und hat eine schwarze Binde vor der Stirn. In der Reble zeigen fich gleichfalls ziven schwarze Fleden, und über die Blugel gehet ein gelbes Band. Diefe Art tommt von Dontichery. Buffon.

6. g. Det

6.g. Der Rostbauch. Psittacus ferrngineus. fcman.

Er ift obenher grun, hat aber einen roftfars hien Bauch und Schwang. Seine heimat ift Roll. m ber magellanischen Strafe. Buffon.

bauch. Ferrugineus.

6.h. Das Weisauge. Psittacus leucoph-

thalmus.

6. h.

Er ift grun, hat carmofinrothe Schultern, auge. mbie Augen find mit einem weissen Ringe um, Leuim. Das Vaterland ist Guajana. Buffon. coph-

6. i. Der Buntschwanz. Psittacus verficolurus.

Er ift grun, hat aber einen Schwanz von Bunt kom Farben, denn die innern Ruderfedern find schwanz th, bie mittlern weiß, und die auffern blau. colurus Am brinat sie von Casenne. Buffon.

### 6.k. Der Corallenhals. Psittacus notatus.

Die Farbe ift obenher grun, die Flugel find Corate aber untern Seite roth, und ber hals ift mit lenhals. when Flecken gezieret. Das Waterland ist Guas Notalana. Buffon.

### 6. L Der gemablte Parfit. Plittacus pictus.

Die Hauptfarbe ist grun, der Hals braun, 6. L. mb der Rand der Halsfedern pomerangenfarbig. ter Pars Unter ben Augen zeiget fich gleichfals ein pomes tit. temenfarbiger Bleden. Die Stirn und Baden Pictus. ind dunkelviolet, die Ruderfedern find blau, ibigens aber der Bauch und der Schwanz roths raun. Das Baterland ist Cajenne. Buffon.

6. m. Der

76 Zwente Cl. II Ordn. Spechtartige.

Zana. fdman:

6. m. Der Arlequin. Psittacus histrio.

anin.

Er ift roth, aber der hintertopf, der obere G. m. Theil des Rudens, ein Band unter den Augen nach dem Ruden gu, der Bauch und die Ruder Hiftria federn find blau, die Schwungfedern aber gelb. Das Baterland ift Oftindien. Buffon.

B. Rura fdpmans

E. Kurzgeschwanzte.

48. Der Gluthpapagen. Pfittacus Aurora.

Er ift furgichwanzig, gang gelb, aber an den Glutpa Achfeln, und an ben Seiten ber Flügel und des Aurora Schwanges, gleichsam mit einer rothen Glut ubers goffen. Das Baterland ift Sudamerica. Line neus.

### 49. Die Mascarin. Psittacus mascarinus.

40. Mafca rinus.

Er ift gleichfalls fursichwanzig, hat einen inprafta, carnatfarbigen Schnabel, ein schwarzes Geficht, Maica- blaulichen Ropf, braunen Rucken, und einen weiße lichen Schwanz. Sein Name zeiget zugleich bas Baterland an. Linneus.

### 50. Der weiffe Rafatu. Psittacus albus.

Er ist schneeweiß, und führet auf dem Ropf Rafain. einen schönen weissen Busch. Dieser kommt aus Abus. den moluctischen Inseln. Man hat aber noch eine Berfchiebenheit, welche ebenfalls gang weiß ift, beffen Saube aber, oder Buich, untenber roth ist. Buffon.

15. Der

### 51. Der Rotharschfafatu. Pfittacus haematuropygius.

Rurt fcmant. že.

Er ift ebenfalls weiß, hat aber einen rothen Roths Echnabel, und einen rothen Burgel. Gein Da fafatu. triand ift in den philippinischen Inseln, und Haeaffer ihm giebt es noch eine namliche fleine Urt. matu-Buffon.

51. ropygius.

### 12. Der Thaufafatu. Psittacus roratus.

Er ift roth, aber die Schulter und Schwung: Thaus idem find blau. Der Rucken aber und ber Bauch fatatu. o gleichsam nur mit einem blauen Dunft be Rorahauet. Er hat einen langern Schwang. Baterland ift Amboina. Dosmaer.

### 3. Der dinesische Rafatu. Pfittacus chinensis.

In China trift man noch einen Kakatu mit Chinefe imm langern Schwanze an, der roth ift, aber scher imm blauen Burgel führet, und auch auf den Kafatu. fligeln einen blauen Flecken hat. Geine Ruder, Chifedern find schwarz. Buffon.

### 54. Der Gelbrandpapagen. Pfittacus marginatus.

Er ift grun, hat einen blauen Birbel, und Gelbe Maue Glügel, die Redern derfelben aber haben einen gelben Rand. Er mohnet auf der Infel Lucon. Margi-Buffon.

randpa, natus.

### 78 Zwente Cl. II. Ordn. Spechtartige.

B. Rucie schwan.

55. Der braune Papagen. Pfittacus fuscus.

55. Brau. ner Papagen.

Er ist oben braun und unten violet. Die Schwing: und Ruberfedern find blau, und bet Burgel ift scharlachroth. Das Baterland ift Ca-Fuscus, jenne. Buffon. Lowards.

### 56. Der bunte Papagen, Psittacus versicolor.

56. Bunter Papagen Versicolor.

Der Ruden ift grun, bas Ungeficht blace, bie Schwungfedern blau mit einem rothen Blecken. Die Bruft blagroth, und grun gewolft. Der Schwanz aber ist gelb. Man trift ihn in ber Savana an. Buffon.

#### 57. Der cajennische Papagen. Pfittacus cajenneus.

57. Cajens nifcher Papu gen Caienneus.

Der Ruden ift grun, der obere Theil der Blugel roth, die Schwungfebern find vorne blau, in der Mitte roth, am Ende gelb, und an der Spike grun. Das Baterland ift Cajenne. Buffon.

#### 58. Der scheckige Papagen. Pfittacus pectoralis.

5%. Soe diace Papar സേ. Pectoralis.

Er ift grung hat aber auf der Bruft blane und rothe Fleden. Der Rand ber Flügel ift gleichfalls blau, die Ruder, und Schwungfedern aber find untenber fdmarz. Er wohnet in China. Buffon.

45. Beidlectt. Pavagene.

fd wan

59. Der Rothkehlpapagen. Plittacus gutturalis.

Guttu-

ralis.

Bon ber Infel Martinique bringer man els Roth, men gruner Papagen, der eine rothe Reble, eine teblpa. weiffe Stirn, und blane Ruberfebern bat. Buffon. pagen.

60. Der Rothbauch Psittacus ventralis.

Der Ruden ift grun, Ropf und Baden find Man, ber Bauch roth, die Schwungfedern blau, der die Ruderfedern oben roth, und unten gelb. Er wohnet auch in Martinique. Buffon.

50. Roth. tralis.

61. Der bunte Parfit. Pfittacus varius.

51. Bunter Parfit.

Er ist roth und schwarz melirt. Lowards.

62. Der ichmutige Parfit. Pfittacus inquinatus.

Die Stirn ift blau, ber hinterfopf roth, Schmue hinter ben Angen befindet fich ein blauer Fleden, Biger Die Bruft ift roth, aber die übrige Farbe iff grun Partit. and gelbschmusig. Lowards.

#### 63. Der Pomeranzenparkit. Plittacus arauliacus.

Er ift grun, Die Stirn, Reble und Bacten pomes find blau, die Schwungfedern find gleichfalls blau, rangen und nur die dren innern obenher roth, aber der partit. hals ift vorneher orangefärbig. Lowards. fiacus.

64. Der

80 Zwente Cl. II. Ordn. Specktartige. Rurt. **fdman** 

64. Der Pomerangenschnabel Darfit. Plittacus aurantius.

51. Pomer rangene Parkit. Aurantius.

Er ift grun, aber die Schwungfebern, u schnabel der Rand der Flügel find blau. Die Seiren fi roth, und der obere Riefer ift pomerangenfarbi Edwards.

65. Der Gelbfehlparfit. Psittacus jugulari 65. Gclb. teble Er ist gang grun, hat aber eine gelbe Kehl Jugula. und kommt aus America. Buffon. ris.

66. Der Blaurandparkit. Plittacus capensis.

66. Blaue rands parfit. Capenfis.

۱:. .

Am Vorgebürge der guten Sofnung ha fich ein fleiner Papagen, ober Parfit auf, welch oben grun ift, aber blaue Schwungfedern ba davon die aussern grun find. Buffon.

67. Der Langschwanzparkit. Pfittacus peruvianus.

67. Er hat einen langern Schwanz als die ai Pang. schwanz dern, ist obenher schon blau, und unten weig Partit. Sein Baterland ist Peru. Buffon. Peruvianus.

> 68. Der Graurandparkit. Pfittacus philippensis.

68. Grau ranb. parfit. Philippenfis.

Er ift grun, an ber Stirn und am Burg roth, führet unter den Augen einen blauen Si den, und weil die auffern Schwungfebern gra find, scheinen die Flügel mit einem Rande eing fasset zu senn. Er halt sich in ben philippinische Inseln auf. Buffon.

69. D

45. Befdlecht. Papagenen.

81

69 Der St. Thomas Varfit. Plittacus St. Thomae.

Rurg.

Er ift grun und hat einen gelben Wirbel. E. Thou Das Baterland ift die Insel St. Thomas. mas-Buffon.

parfit.

70. Der cajennische Parfit. Psittacus cajenneus.

Cajen nifchet Vartit. Caienneus.

Er ift grun, bat weisse Augen, einen gelben Ingel, und auf den Flügeln einen gelben Flesten. Er ist auf der Insel Casenne zu Hause. Buffon.

71. Der guineische Parfit. Pfittacus guinëensis.

Der obere Theil des Ruckens ift dunkelgrun, it mitere feegrun, der Kopf aber, und die Bas Partit. in find roth. Man trift ibn an der Rufte von Guine. Guinea an. Buffon.

Guineh Enlik.

### 46. Geschlecht. Der Taufan.

Picae: Ramphastos.

9 Der Toco. Ramphastos Toco.

g. Toco. Toco. r ist schwarz, hat einen blauen Ring um bi Augen, welche in einem rothen Felde stehen Die Kehle ist gelblichweiß; und die Ockfederi des Schwanzes sind gleichfalls weiß. Buffon.

### 10. Der Byron. Ramphastos Byron.

Byron. Byron.

Der Commodore Byron traf ben feine Reise um die Belt auf seinem Laufe bon Tiniai nach Dulo Timoan in der Sudfee einen Boge an, ben er als abweichend von allen Taufans de Lowards angiebt, und der mithin der Ordnun nach unter Die Cautans gehoren follte. Derfelb war fo groß wie eine Bang, am gangen Leib schneeweiß, ausgenommen an den Sugen und ber Schnabel, welche Schwarz waren. Gein Schne bel war frumm, und baben so lang und dick, da man taum begreifen fonnte, wie die Musculn de Salfes, ber ohngefehr einen Schuh lang, und f bunn, wie ber hals eines Kranichs war, benfe ben tragen konnten. (Bielleicht hat man nich bedacht, daß die Cautansschnabel ihrer Groß ungeachtet, bennoch feberleicht find.) tere ihn vier Monathe lang mit Zwieback un Baffer, er ftarb aber fehr vermagert. Bir fete ihn hier auf gerathe wohl unter die Tautans. See teisen.

#### 12. Der Schwarzhals. Ramphastos atricollis.

Er ift oben grun, aber ber Ropf, ber gange Schwaris bels, und die Reble find schwarz. Der Bauch Atricolfigelb, fonft aber ift er mit einem rothen Bande lis. mieret, und die Deckfedern des Schwanzes find uch toth. Er wohnet in Brasilien. Buffon.

### 12. Der Weißhals. Ramphastos monilis.

Der hals ift weiß und mit einem rothen Bande umgeben; die Augen find mit einem dreps Beiß. ome umgeven, vie Augen find der schwarz, balk. cham Flecken eingefaßt, der Körper ist schwarz, balk. Monis an Burzel roth, und die Deckfedern des Schwan: lis. ist find gelb: Das Baterland ift Cajenne. duffort.

### 13. Der Gelbhale. Ramphaltos flavicollis.

In Brafilien wird ein Taukan gefunden, Belb. welcher oben schwarz, an den Flügeln grun, an bale. in Kehle gelb; an der Bruft roth; und an den Flavi-Didfebern bes Schwanzes gelb ist; doch sind die collisi wim Kedern des Schwanzes roth. Buffon.

### 14 Der Rothbauch. Ramphastos discolor.

Er ift oben ichwarz, unten grun, an der Robbifdle gelb, fuhret ein rothes Halbband, rothe bauch. Mellen und schwarze Bander an der Roble, und Discofach am ganzen Bauche roth. Er wohnet in lor. kin mericanischen Reiche, und wird vom Brise on angeführet:

15. Det

84 3mente Cl. II. Orbn. Spechtartige.

15. Der Scheck. Ramphastos pulcher.

15. Sched. Pulcher.

Eben berfelbe Berfaffer ermahnet eines ans bern americanischen Caufans, welcher gruns roths und blaubunt ift. Briffon.

16. Der gelbe Taufan. Ramphastos flavus.

16. Gelber Saufan

Er ift gelb, hat aber an benben Seiten bes Schnabels ein schwarzes Band, bas bis zur Bruft Die Schwanzfedern find schwart - Flavus. fortläuft. und weiß meliret. Umerica ift das Baterland. Brisson.

> 17. Der blaue Taufan. Ramphastos glaucus.

17. Rlauer Taufan Glaucus.

Er ift blau und aschgrau meliret, ber obere Riefer ift gelb, und ber untere ichwarzlichpurpurs farbig. Sein Aufenthalt ift in Merico. Briff fon.

# 50. Geschlecht. Raben.

Pica: Corvus.

### 20. Der Weißhals. Corvus albus.

fr ist zwar oben schwarz, hat aber einen weis Beiß, seiß, sei in Africa am Senegal. Buffon. Albus.

### 21. Der braune Rabe. Corvus fuscus.

Er ist braun, hat untenher eine weisse Kehle, Braus ber Wirbel des Kopfs ist gelb, und über den Aus ner gen zeiget sich ein weisser Strich statt der Augen Rabe. kraunen. Das Vaterland ist Cajenne. Buffon. Fuscus.

#### 22. Die Rothfeder. Corvus ruber.

Dieser sonst sehr schwarze Rabe ist merkwurz Rould big, weil er rothe Schwungs und Ruberfedern feber. hat. Er wohnet am Senegal. Buffon. Ruber.

### 23. Der grune Rabe. Corvus tricolor.

Die Hauptfarbe ist grun, aber untenher ist Gruner biefer Bogel schmusig pomeranzenfarbig. Die Rabe. Ruber, und Schwungfedern aber sind schwarz. Trico-Die Stirn ist weißgrau, und mit schwarzen Har, lor. den besetzt. Er halt sich in Cajenne auf. Dusson.

₹ 3

24. Det

### 86 Erfte Cl. II Ordn. Spechtartige.

24. Der Purpurkopf. Corvus cinereus, Purpur, Er ist dunkel aschgrau, hat aber einen purpur, Cine. färbigen Kopf und Flingel. Die Ruderfedern reus, sind purpurfarbig grun. Busson.

### 51. Geschlecht. Rackervogel.

Pica: Coracias.

### 7. Der Beißfopf. Coracias leucocephalus

Beillifopf. leucocephalus. Fr ist oben rostsarbig, unten blau, an der Stirn, an den Backen und an der Kehle weiß. Die mittlern Rudersedern sind grun, die aussern aber sind schwarz, und daben sehr lang. Die Füße sind gelb, und weiß gesteckt. Dieser Bogel halt sich am Senegal auf. Buffon.

### 8. Der Blauschwanz. Coracias glaucurus.

Plan Der Vogel ist oben roth, der Schmanz blau, schwanz und an der Spise purpurfarbig schwarz. Man vurus, sindet ihn in Madagascar. Zusson.



### 52. Geschlecht. Drossel,

Pica: Oriolus.

# 21. Die brenfärbige Drossel. Oriolus tricolor.

Die Brust und der Bauch sind gelb, der Kopf Dren, ist gelb gesprenkelt, und über die Flügel farbige lauft ein weisses Band. Er wohnet in Canada, Tricodor.

### 22. Die Rappenbrossel. Ofsolus cucullatus.

Da dieser Bogel an der Stirn, auf dem Wir: Rappen bel und vorne am Halse schwarz ist, so siehet er drossel. aus, als ob er eine Kappe trüge. Der Hinter: Cuculfopf ist castanienbraun, und die Deckfedern, wels latus, de schwarz sind, haben einen gelben Rand. Er wohnet am Senegal. Busson.

### 23. Die grune Droffel. Oriolus viridis,

Sie ist obenher grun, unten rostfarbig braun, Frune. m den Ruberfedern unten gelb, aber der Schnas Viridis bel ist roth. Das Waterland ist Cajenne, Buffon,

# 24 Die eitronfärbige Drossel. Oriotus citrius.

Diese Art ist durch den kleinen herunterwärts fallen hangenden Kopfbusch bald zu kennen. Der Körz Circia. F 4 per

### 88 Zwente Cl. II. Orbn. Spechtartige.

per ist schwarz, ber untere Theil bes Ruckens zimmetfarbig, ber Schwanz gelb, auch sind die zwen mittlern Ruberfedern gelb. Auch diese Art wird in Cajenne gefunden. Buffon.

Pallas Spicil. fasc. VI. Tab. 1.



### 56. Geschlecht. Großmaul.

Pica: Bucco.

#### 2. Der Scheck. Bucco versicolor.

edice. Verlicolor, ie Hauptfarbe ift grun, Ropf und Kehle find roth, die Wangen blau, der Hals goldgelb, und mit einem blauen Halsbande gezieret. Die Brust ist rosenroth, der Bauch pomeranzenfärbig, die Seiten sind grun und braun gesteckt, der Schnabel ist blau, und hat einen gelben Rand. Das Vaterland ist Maynas. Buffon.

### 3. Der Bluttopf. Bucco haemacephalus.

3. Sluts topf. Haema-cepha-lus.

Er ist grun, hat einen rothen Kopf, gelbe Wangen, und eine gelbe Kehle mit einem rosens färbigen Halsbande. Der Sauch ist grau und schwarz gesteckt. Er wohnet in den philippinisschen Inseln. Buffon.

4. Der

## 56. Geschlecht. Großmaul. 89

4. Der Schwarze. Bucco niger.

Ausser daß der Wirbel und die Kehle roth, Schar. de Bruft gelblich weiß, und die Deckfedern der Rus ie. derfedern gesteckt sind, hat der Wogel eine schwarze Niger. Juffon.

### 5. Die Fleckenbruft. Bucco maculatus.

Der Wirbel und die Kehle sind roth. Der Flecken. Imper braun, die Brust aber gelb, und mit brust. Hwarzen Flecken besetzt. Zuffon.

Macu-latus.

8 5

57. Oca

## 57. Geschlecht. Der Guckguck.

Pica: Cuculus.

## 23. Der caapsche Guguet. Cuculus capensis.

23. Caaps Scher Gucks guck. Er ist rostfarbig und ziehet auf Pomeranzenfarbe der Rucken ist olivengrun, und der Bauc weiß. Die Schwungfedern sind dunkelbraun, un die Ruderschern haben eine weisse Spize. Da Baterland ist das Porgeburge der guten sof nung. Zusson.

### 24. Der schwarze Suchgud. Culculus niger

24. Schward ger Guctguct-Niger.

Scinc Farbe ist oben schwarz, unten grau Die Schulter und der Nand der Deckfedern sini weiß, der Schnabel aber ist roth. Man sinde ihn in Cajenne. Buffon,

### 25. Der Loulau. Cuculus Toulou.

25. Toulau. Toulou

Der Rucken ist rostfärbig, die Brust blaß roth, der Bauch aber und die Rudersedern sint schwarz. Er halt sich in Madagascar auf Zusson.

59, Gt

### 59. Geschlicht. Der Specht.

Pica: Picus.

### 14 Der Gelbrucken. Picus senegallensis,

den ist gelb, die Flügel sind roth, der Ru. Gelb, den ist gelb, die Flügel sind grün, und gelb rücken. mairet, der Bauch weiß, und mit schwarzen Sene-Belen besetzt. Die Rudersedern sind schwarz, gallende Baken aber, samt der Stirn, sind braun, iss.
Das Bakerland ist Senegal. Buffon,

#### 23. Der Goertan, Picus Goertac,

Diese Art halt sich gleichfals am Senenal Goers Sie ist olivenfarbig grun, hat einen rothen tan, Bitbel, und ber hintere Theil des Ruckens ist Goerstrafalls roth, der Bauch aber weiß. Zuston, tae,

### 24 Der gestreifte Specht. Picas striatus.

Er ist schwarz, und hat gelbe und grune Geschiche, der Wirbel und hintere Theil des Rus streifter tas sind blutroth, der Bauch aber ist gelb. Er Specht, what in St. Domingo. Buffon.

#### 25. Der Gelbspecht. Picus flavus,

Er ist gelb, führet einen Federbusch, und am Gelb, Schnabel einen rothen Strich. Die Decksebern specke, in Schwungsebern sind schwarz. Die Schwungs Flavus, kem selbst aber haben eine braune Farbe, wo hingegen

### 92 Zwepte Cl. II. Ordn. Spechtartige.

hingegen die Ruderfebern schwarz sind. Der A: enthalt ist in Cajenne. Buffon.

26. Der Zierliche. Picus elegans.

26. Bierliv Oc. Elegans. Er ist braunroth, hat einen gelben Jede busch, und ist auch am hintertheile des Ruckergelb. Sonst ist der Rucken, so wie auch die Fl gel, mit weissen halbmondsörmigen Flecken geziet. Die Wangen sind roth, und die Ruders dern schward. Man bringt diese Art ebenfal aus Casenne. Zusson.

## 62. Geschlecht. Eißvogel.

Piça: Alcedo.

## 16. Der Drenfingerige. Alcedo tridactylae.

Dieser Bogel, den der Herr Vostmaer bes Drep, schreibt, und ihn Oostindisch Ysvogeltje singerts wemet, hat einen kurzen Schwanz, ist obenher ge. und am Schwanze roth, unten hintenher gelb, Tridamo die Füße sind drenzahig. Inzwischen ist noch eine Berschiedenheit vorhanden, die einen blauen Rusen hat, und unten ganz und gar gelb ist, die Kehle ist übrigens weiß, die Backen sind gelb, mod die Schwungsedern sind schwarz. Vielleicht ist eins des andern Weibchen. Das Vaterland ist Ostindien. Linneus.

Vosmaer Beschryv. der Vogelen Tab. IV.

### 17. Der rothe Engrogel. Alcedo rubra.

Er hat ebenfalls einen kurzen Schwanz, Rother der Kötper aber ist oben roth, unten gelblichbraun. Ensweiter Kopf und die Schwungfedern sind grun, die gel. Kehle aber ist weiß. Der Aufenthalt ist in Ame. Rubratica. Er wird ebenfals vom Herrn Vosmaer beschrieben, und hat zwen Zähen vorne, und zwen hinten. Boddaert.

Volmaer Beschryv. Tab. III.

18. Der

### 94 Amente Cl. II. Orbn. Spechtartige.

## 18. Der Saubenenfrogel. Alcedo galeri

18. Er gehöret gleichfalls unter die Rurzgeschwe Danben ten, ist am Körper blau, und führet eine griensvo. Daube. Der Bauch ist pomeranzenfärbig, gel. Kehle weiß, und die Schwungfedern sind schwita, Das Baterland ist Senegal. Buffon.

### 19. Der Weißfopf. Alcedo leucocepha

Dieser hat einen langen Schwanz, der K Weiß, ist weiß, und hat einen blauen Gegenschein. A Leuco- Bauch ist pomeranzenfärbig; der Körper dun tephala blau, und die Deckfern sind schwarz. Das L terland ist Senegal. Buffon.

### 20. Det Goldbogel. Alcedo aurea.

Der Kopf ist grun mit einem Commanze verseh vogel. Autea. Kinn schwarz, die Kehle weiß, Brust und Ba ocherfärbig, der Körper hochroth mit einem sten Goldglanze, die Flügel grun mit Gold. Lerste. Schwungfeder ist schwarz, und die Rut sedern haben grun, roth, blau und schwarzsich. Der Ausenthalt ist in den Verdieen

America. Doßmaer.

63.6

## 63. Geschlecht Bienenfresser.

Pica: Merops.

### 8. Der Blaubauch. Merops americanus.

er Rucken ist braun, der Bauch blau, die Blaus Flügel find seegrun, und der Schwanz hat bauch. iven sehr lange Rudersedern. Der Aufenthalt Amerisit in Isle de France. Buffon.

### 9. Der Zwergbienenfresser. Merops pufillus.

Er ist grun, hat eine gelbe Rehle, einen hell 3wergi braumen Bauch, und führet rothe Schwung, und bienen Auderfedern, die an ber Spike schwarz sind. Das fresser. Baterland ift Senegal. Buffon.

#### 10. Der große Bienenfresser. Merops giganteus.

Der Körper ist olivengrun, und die Flügel, Bienen wie auch der Schwanz haben einige rothe Schwung fresser. was Nubersedern. Das Waterland ist Casenne. Gigan-Buffon.

### 11. Der Persianer. Merops persica.

Diese lette Art kommt in Gestalt und Größe persiasehr mit dem Immenwolf No. 1. überein, und ner.
herr Pallas zweifelt auch, ob sie nicht des Bris Persica,
sons Apiaster madagascariensis senn könnte?
Der Schnabel ist schwarz, der obere Kiefer langer

### 96 Zwente Cl. II. Orbn. Spechtartige.

als der untere. Die Stirn ist weit herunter blat, doch am Schnabel weiß. Die Zügel sind schwarz, doch von den Augen bis zu den Ohren gehet eine dunkolgrüne Binde, worunter wieder die blaue Farbe folget. Die Kehle ist behm Anfange gelh, und unter dem Halse zeiget sich ein großer blute rother Flecken. Der übrige Körper ist schön Paspagenen grün. Die Flügel sind sehr lang, und untenher an der Wurzel rostsärbig. Die Schwungs und Rudersedern sind auswendig gelblichegrün, inwendig braun, aber die ersten Schwungsedern sind auswendig an der Spisse blau. Der Schwanzbestehet aus Federn von gleicher Länge, aber die mittlern Federn sind noch einmal so lang, und zusgespist, davon eine die über der andern liegt, glanzblau ist. Man sindet diese Art an den steilen Usern des caspischen Meeres nisten. Pallas Reisen.

### 65. Geschlecht. Baumläufer.

Pica: Certhia.

### b. Der caapsche braune Baumlaufet. Certhia capensis.

Frist braun, ohngesehr so groß wie ein Kram Gant metsvogel, hat aber einen schwarzen Schnas schie bi, der wohl zwenmal langer, als an den Kram, braunet metsvogeln, etwas gedruckt, und ein wenig gestümmet ist. Die Nasenlöcher sind langlich. Die Capenstum ist blaßfärbig, desgleichen auch der Bauch, sis. welcher mit scharfen zugespitzen Federn besteckt ist. Die Jedern am Kopfe sind weißgrau gestreist, der Birzel ist gelblichgrun, der Schwanz schwarz, keissonig, und so lang als der Körper; doch die insern sein kohn der mittlern. Die Schwungsedern sind schwarz, die Kehle ist blaßfärbig, und mit schwarz, die Kehle ist blaßfärbig, und mit schwarzen Haaren besest. Das Waterland ist das Vorgebürge der guten Sosnung. Linneus.

## 27. Der violette Baumlaufer. Certhia violacea.

Er ist fast dem cetsonneischen No. 6. abn. 22. lich, hat aber einen langeren Schnabel. Der Bolet. Langer ist grun und glanzt wie Seide, desgleichen Baumt, auch der Hals, aber die Kehle ist himmelblatt laufer. plangend. Der Rucken ist olivenfarbig grun, Viola-Bruft und Bauch sind saffrangelb, und Flügel und Linne Supl. 25.

### 98 Zwente Cl. II. Orbn. Spechtartige.

Schwanz braun. Die mittlern Ruderfedern werden ftuffenweise langer, daher der Schwanz eine keilformige Gestalt bekommt. Doch es ift noch eine Nebenart vorhanden, welche einen geraden Schwanz hat, davon aber die mittlern Federn noch einmal so lang sind. Linneus.

## 28. Der Bastardbaumkaufer. Certhia intermedia,

28. Baftard baum Iaufer. Intermedia. Diese seltene Art ist olivenfarbig grun, und ten weiß, an der Brust mit schwarzen Flecken, wie mauche Amsel oder Drossel, gesteckt. Die Ruders federn laufen, wie an den Spechten, spisig aus, der Schnabel aber, und die übrige Gestalt kommt mit den Baumläufern vollkommen überein. Das Baterland ist Europa. Boddaert.

### 29. Die Blautehle. Certhia jugularis.

29. Blauftehle. Jugularis.

Der Ruden ist grun, die Rehle glanzende blau, mit Purpur vermengt, die Brust farmosine roth, der Bauch gelb, und die Ruderfedern sind hellbraun. Diese Art halt sich in den philippinie schen Inseln auf. Buffon.

## 30. Der aschgraue Baumlaufer. Certhia cinerea.

30. Afch grauer Baum Idufer. Cinerea.

In den nämlichen philippinischen Inseln findet man noch einen Baumläufer, der obenher aschgrau, unten gelb, an der Kehle violet, an den Deckfedern bläulich, und an den Schwungses dern braun ist. Buffon.

31. Der

## 65. Gefchlecht. Baumlaufer. 99

#### 31. Der Drenfärbige. Certhia tricolor.

Er ist oben grun, unten gelb, an der Kehle Dredsten und an der Brust violetsärbig. Er wohnet farbige. glichfalls in den philippinischen Inseln. lor. duffon.

### 32. Der Bibletfled. Certhia notatus.

**5** 2 66,**5**66

Digitized by Google

### 100 Zwente El. II. Ordn. Spechtartige.

### 66. Geschlecht. Colibri.

Pica: Trochilus.

1. Caapscher Colibri. Trochilus capensi

Gaate

fder

fis,

Linneus.

Diefer frummschnabelige grune Colibri hat d mittelfte Ruberfeder am langften, Colibri. führet blaue Decfebern auf ben Blugeln. Capen-Korper ift so groß wie eine Bauernschmalbe, ut glanget wie gruner Atlas. Die Schwungfeder find fcmary, und berfelben nachfte Decfedern be ben einen blauen Rand, und glanzen. Die Ri berfebern, die auch schwarz find, und gleiche tai ge haben, fcblieffen bie mittlern ein, welche brei mal langer find, und fuhren an der Wurgel eine grunen Geidenglang. Der Burgel ift fcmar und hat blaue glanzende Flecken. Das Baterlan

### 2. Der Blauhale. Trochilus iugularis.

ift das Vorgeburge ber guten Sofnung

Der Schnabel ist an dieser Art gerade, de Rlaus Rorper grun, Sals und Bauch blau, die Bluge Jugulaund der Schwanz find braun. Das Baterland if Cajenne. Buffon.

Dritte

## Dritte Ordnung. Schwimm vogel.

Aves: Anseres.

### 67. Geschlecht. Ente.

Anser: Anas.

### 39. a. Die aftracanische Ente. Anas casarca.

iese Ente halt sich im astracanischen Reis Aftras the auf, wird jahm, und hat einen anges camifche nehmen Zon. Gie ift größer als unfere Ente. gemeine Ente, in der hauptfarbe rothlich, mit Cafarhwarzen Schwung . und Ruderfedern, und einem weissen Spiegel auf den Flügeln. Der Ropf ift kil braungelb, der Steiß braun, und mit braungeben Linien wellenformig bezeichnet. sa, der Schnabel und die Fuße find auch fcmars, wie die Schwung, und Anderfedern, doch die Dedfebern ber Schwungfebern, und Die untere der innere Seiten ber Rlugel find weiß. Limeus.

39, b. Die nordische Sans, Anas hyperborea.

Sie ift weiß, hat eine gelbe Stirn, und bie Gans. Schwungfedern find bis jur helfte fchwarz. Der Hyper-Auf:

fde

102 Zwente El. III. Ordn. Schwimmvogel.

Aufenthalt ist in Rußland. Dallas Spicil. fasc. VI.

### 29. c. Die Stellersente. Anas Stelleri.

39. C. Stel

Diefe Ente ift weiß, an ber Bruft ein wenig rothlich, führet am hintertopf einen fleinen Bufch, Stelleri und in dem Dacken einen grunen Rlecken. Flügel sind weiß und schwarz. Der Aufenthalt ift in Ramtschatta. Pallas Spicil, fasc. VI. Tab. V.

### + 46. Die einsame Ente. Anas rufina.

Einfame Entc. Rufina.

Sie hat fast die Große der Enten, und wies get über dren Pfund. Der Schnabel ift ginnober, roth, die Augenfreiffe find braun, desgleichen auch Die Ruge, nur daß fie vorneher ine Rothliche fals len. Der Korver ift fcmarg, untenher aber etwas fahler, ber Ropf mit einem Theile des Salfes ift boch riegelroth, auf dem Birbel bellroth, und mit einem dicken runden Bufche befest. In den Beis chen unter den Flügeln ift die Farbe weiß, vornes ber mit Bellen gezeichnet. Zwischen ben Schal tern ift der Rucken grau braun. Die Flugel find auswendig braunlicheschwarz, und haben einen fdmarz eingefaßten weiffen Spiegel. Der Schwanz ist furz, braun, und an dem Rande der Ruderfedern weiß. Das Weibchen ift braun, mißfarbig und hat keinen Federbusch. Der Aufenthalt ist am caspischen Meer und an den großen Seen der tartarifchen Bufte, aber fie lebt einfam. Briffon. Marfigli. Dallas Reif.

47. Die Ruberente. Anas mersa.

37. Ruders Sie ist so groß wie eine Tauchente. Der ente. Morfa. Schnabel ift groß, breit und blau, oberhalb den Masen:

Mafenlochern fehr aufgetrieben. Der Ropf ift bis jum halfe weiß, doch auf dem Wirbel mit mem Schwarzen Bleden bis an die Augen verfeben. Da Sals ift in der Mitte schwarz, der Korper weneher braunlichegelb, über dem Rucken afcharau mb gelb gewolft, untenber mit famt bem Burgel ham, mit einem afchgrau glanzenden Begenfchein. Der Schwang ift lang und feilformig wie benm Pelecan, und hat achtzehn schwarze schmale Rus Der Aufenthalt ift in ben uralischen Bourgen zwischen den Oby und Irtis, doch rus-Mie nicht im Erockenen, weil fie nicht gelernet bu ju gehen, dahingegen kann fie fehr geschwinde himmen, indem fie den Burgel und Schmanz mierhalb bem Baffer taucht, und fich damit forts rubert. Ihr Deft bauet fie auf Schilf, so baß s schwimmt. Dallas Reisen.

69. Ott

## 69. Geschliecht. Papagentaucher

Anferes: Alca.

### 6, Der Manenpapagen. Alca cirrata;

Wanens grapas und hat daselbst ein paar herabhangende gelb und hat daselbst ein paar herabhangende gelb Lucata liche Manen von seinen sparsamen Federn, welch dieser Art eine besondere Zierde und Ansehen ge den. Der Ausenthalt dieser seltenen Art ist ir Ramtschatka. Pallas Spiell. fascie. V. Tab. I.

#### 7. Der Seeparfit, Alca pfittacula,

See partit, Plittacula. Dieser Vogel ist schwarz, und hat an den Augen einen weissen Strich. Der Schnabel ist blutfärbig, platt enrund, mit einem aufgeworfer nen Unterkieser, und röhrenförmigen Nasenlöchern. Der Aufenthalt ist zwischen Ramtschatz ka und America. Pallas Spicil. fasc. V. Tab. II.

#### 8. Der Seefafatu. Alca cristata.

Ceer Fafaty. Cristar 12. Er ist gleichfalls schwarz, und auf dem Rideten mit dunklen rostfärbigen Flecken besogt. Die Stirn führet einen in die Hohe gerichteten Federe busch. Der Schnabel ist roth, ausgerandet, kes gelformig, und an der Spise weiß. Die Nasensteher sind gleichfals köcherartig. Der Aufenthalt ist

69. Geschlecht. Papagentaucher. 105 if m den Inseln ben Japan. Pallas Spicit. fic. V. Tab, III.

## 9. Der vierfärbige Papagepentaucher. Alca tetracula.

Die Farbe ist obenher schwarz, und rostsars sachen ig gesteckt, unten braunlich aschgrau. Vor den Papa, Ingen besindet sich ein weisser Flecken, und der genens Echnabel ist braunlich gelb. Das Vaterland ist Tetrakantschatka. Pallas Spicil. fasc. V. Tab. IV. cula.

### 

## 72. Geschlecht. Der Pelecan.

Anserus: Pelecanus,

B. Såger Ichnabel B. Sägeschnäbel.

4. a. Der Zwergpelecon, Pelecanus pygmaeus.

4. a. Swerge pelecan, Pygmacus,

Fr ist kaum so groß als eine Tauchente, und siehet, der Gestalt nach, besonders in Absicht auf den Schnabel und auf die Füße, wie der Wasserrade No. 4. aus. Das Männchen ist schwarz mit etwas grünem Halse und an der Brust, und hin und wieder weißgesprenkelt, weil weisse seine Bürstchen zwischen den Federn hervor ragen. Das Weischen aber ist verloschen schwarz oder braun, ohne weisse Sprenkeln. Der Schwanzist lang, keulförmig, und hat zwölf Rudersedern. Das Vaterland ist im caspischen Meere, wo er sich unter andern gemeinern Arten aushält. Pale las Reisen.

## 75. Geschlecht. \_ Taucher.

Anseres: Colymbus.

## 12. Der Doppeltaucher. Colymbus duplicatus,

Fr hat einen doppelten Federbusch, ist oben braun Doppels und unten weiß, und der Hals ist untenher taucher, mit kastanienbraunen Flecken besetzt. Das Vater: Dupliland ist America. Brisson.

## 13. Der St. Thomastaucher. Colymbus St. Thomas.

Auf der Insel Sr. Thomas sindet man eis S. Thomas braunen Taucher, der untenher weiß ist, aber mas, inen schwarzen Flecken auf der Brust führet, taucher, Inschen dem Schnabel und den Augen zeiget sich S. Thom weisser Flecken, übrigens aber ist der Körper mac, hin und wieder greiß gesteckt. Brisson.

### 76. Geschlecht. Mewen

Anseres: Larus.

### + 12. Der Fischjäger, Ichthyaetus.

fifch. Jager. Ichthypetus.

fußgans, No. 11. des Entengeschlechts. Der Schnabel ist sehr stark, und an der Wurzel bläulichgelb, am Ende aber scharlachroth, und an der dussersten Spise gelb, mit einem braunen Querstriche. Das Maul ist inwendig roth. Die Augenringe sind braun, die Juse braunroth. Der ganze Kopf ist bis zur Mitte des Halses dunkelsschwarz, aber die Augenlieder sind weiß. Der Körper ist schneweiß, die ersten suns Schwanz welcher auch weiß ist, hat gleichlange Nudersedern. Der Ausenthalt ist am caspischen Mecre. Die Stimme unter dem Fliegen klinget, nach Art des Nabengeschrenes, grob. Das Weibchen legt die Eper, welche länglich sind, und häusige braung Sprenkel suhren, im blossen Sande. Pallas Reisen,

#### 13. Die weisse Meme. Larus albus.

13. Beisse Rewe. Albus.

Sie ist welß, und hat braune eckige Flecken, Das Vaterland ist Buropa. Buffon,

Dierte.

## Vierte Ordnung. Stelzenläufer.

Aves: Grallae.

84. Geschlecht. Reiher.

Grallae: Ardea.

B. Rraniche. Grues.

tha Der weisse Rranich. Ardea (grus) leucogerana.

rist der größte seines Geschlechts, und 6. 2. übertrift noch den Ostindischen No. 6. Meisser denn wenn er aufgerichtet stehet, ist er Leuco-lusthalbe Schuh hoch. Der Schnabel ist gerana. war wie ein Kranichschnabel gestaltet, aber groß fr, toth, und am Rande gezahnelt. Das Ges fot ift bis hinter ben Augen fahl, roth, und mit fleinen rothen Burfteben befegt. Der Korper ift in weiß, und ben zwehjahrigen Rranichen nut m Benice einen langen Strich hinunter braun. ichigelb. Die zehn vorderften Schwungfebern mb mit ihren Decfebern nur allein ichwarz. Der Schwang hat zwolf breite ziemlich gleiche Rulufebern. Die Füße find wie an den Kranichen lana

### 110 Zwente Cl. III. Ordn. Stelzenläufer

B. Kraniv He. lang, und von rother Farbe. Die Alten fi
vbenher gelblich, und haben grunlichbraune Juf
Der Aufenthalt ist in den großen Wüstenenen a
Jrtis und Oby. Sie machen ihr Nest im Schi
über wasigte Hausen, von gesammleten Kräuter legen zwen Ener wie Gänseener, welche aschgr find, und braune Striemen haben, und leben v Froschen, Eidechsen und Lischlein. Pallas Reise

## 6. b. Der mericanische Rranich. Ardea (grus) mexicana.

6. b. Meriv caniv foer. Mexicana.

Er ist aschgrau, obenher am Kopf roth, what schwarze Rubersedern. Das Vaterland Merico. Zoddaert.

# 6. c. Der japanische Kranich. Ardea (grus Japonensis.

6. c. Tapani fder. Japononlis.

Er ist weiß, oben am Kopfe roth, am Hal und den Schwungfedern schwarz, aber an di Ruderfedern weiß. Das Vaterland ist Japai Boddaert.

## 6. d. Der Trompeter. Ardea (grus) Buccinator.

6. d. Erom, peter. Buccinator.

Er ist schwarz, am Halse und an der Bru blau mit Gold, über dem Rucken schmutig weis an den Ruderfedern schwarz, und wohnet in Amrica. Buffon. Boddaert. C. Storche. Ciconiae.

C. Storche

La. Der braune Storch. Ardea (ciconia) fusca.

Er ist braun, der Hals weiß gesprenkelt, die Brau Bruft auf einem braunen Grunde mit weisen ner Bellen besetzt, die Schwungfedern sind violet, die Storch. Auberfedern grun, und der Schnabel hochgrun. Fulca. Dufon.

D. Reiher. Ardeae.

D. Reiber.

27. Der Zwergreiher. Ardea pusilla.

Die Farbe ist aschgrau, der Hals und die 3werge Bruft aber sind weiß und schwarz gesteckt. Der rether. Ausmenhalt ist in Italien. Boddaert.

28. Der Saubenreiher. Ardea cristata.

Der Hinterkopf führet einen Feberbusch, der Saubent körper ist blau, aber der Hals rostfärbig. Das reiher. Beterland ist America. Buffon.

Crista-

29 Der brenfarbige Reiher. Ardeatricolor.

Er ist schwärzlichblau, unten weiß, und füh Dren, tet auf dem Schwanze blaue Deckfedern. Der färbiger Tricolor.

† 30. Der Manenreiher. Ardea comata.

Er ist etwas größer als der kleinste Reiher. Manen Der Schnabel ist blaulichroth, an der Spige braun, reiher. Maigel grunlich. Die Füße sind lang und gelbliche Comata pin. Der Wirbel ist mit einem verlängerten Feders busch

## 112 3mente Cl. IV. Debn. Stelzenlaufer

bufch befett. Der Bals roftfarbig, mit Man hintenher gegleret, und vorne weiß. Die Bri pcherfarbig, das übrige schmeeweiß. Der Aufer halt ift am caspischen Meere. Briffon. bropandus. Dallas Reisen.



## 85. Geschlecht. Brachvogel.

Grallae: Tantalus.

8. Der Courly. Tantalus Courly.

Courly. Grift braun, unten weiß, an der Bruft und Courly. Den Geiten roftfarbig, und mit großen fcma gen Flecken befett. Das Baterland ift Made nascar. Brisson.

9. Der Donauer. Tantalus castaneus.

Or Donaus neus.

Er ift glangend raftanienbraun, hat ein grune Bruft, und braune Ruberfedern. Er wo net an der Donau. Marfigli.

87. 3

### 32. Geschlecht. Drossel.

Pica: Oriolus.

#### 24. Der Iglander. Tringa Islandica.

Ser Schnabel und die Juße sind braun, der Rorper obenher schwarz und rostfärdig, dicht ber gesteckt, unten einfärdig rothlich tostfärdig. Die Islandeckfedern der Flügel sind am äusseren Rande dica. weiß, untenher aber weiß mit schwarzen Becken. Der Sreiß ist mit weiß; und schwarzen Wellen bezeichnet. Alle Schwungfedern sind schwarz, has ben aber einen weissen Riel, und die kleineren sühren auch einen weissen Rand von aussen. Die Ruderfedern hingegen sind aschgrau, und haben auch einen weissen siel, sind aber nicht zugespisst. Das Vaterland ist Island. Linneus.

### 25. Der Senegaller. Tringa Senegallensis.

Er hat sehr lange Füße, desgleichen einen Eenes langen Schnabel, bende von gelbet Farbe. An galler, der Stirn hängt eine gelbe Haut herunter. Der Iene-Körper ist grau, die Deckschern sind weiß, die gallen-Schwungsedern schwarz und die Rudersedern weiß, listetere aber haben ein breites schwarzes Band. Die Schultern sind mit einem Dorn gewasnet. Das Baterland ist Senegal. Buffon.

Linne Suppl. 23.

¢

26. De

### 114 Zwente El. IV. Orbn. Stelzenlaufer.

26. Der Subsonier. Tringa Hudsonica.

26. Dudfor nier. Hudfonica.

Die Farbe ist suchsroth, und schwarz gesteckt der Ropf und der Hals sind weiß und schwarz Die Schwungfedern aber sind braun. Der Aus enthalt ist im Sudsonsbep. Edwards.

## 27. Der braune Stranblaufer. Tringa fusce

Braud den schwungfedern sind schwarz, und jede milaufer.
Fulca.

Taufer.

Er ist nur obenher braun; doch sind die Finder den schwungfedern sind schwarz, und jede milaufer.

Fulca.

Art in Europa an. Busson.

88. G

## 88. Geschlecht. Regenpfeifer.

Grallae: Charadrius.

### †13. Der Besellige. Charadrius gregarius.

mit einem Klebis, sogar der Schnabel und ger. die Jüße kommen damit überein. Der Wirbel ist Grege braun und weißbunt. Die Stirn weiß, und mit rius, einer breiten Binde über die Augen besetzt, die im Nacken zusammen läuft. An den Seiten des Kopfs gehet ein schwarzer Jügel dis hinter die Augen. Die Kehle ist weißlich, der Körper ist schagen. Die Kehle ist weißlich, der Körper ist schagen, und nur etwas mehr verloschen als an den Turrestauben. Die untere Bruft sühret vor den Schenkeln einen schwarzen halbmondsormigen kleden, der hintenher ziegelrorh ist. Der Bürzel ist weiß. Die vordern Schwanzsedern sind sauch weiß, von gleicher länge, und haben in die Quere ein breites schwarzes Feld, welches nicht ganz dies ein breites schwarzes Feld, welches nicht ganz dies en die Seitenfedern reichet. Der Aufenthalt ist am Wolga, besonders in der Gegend des Jailes und Samrastusses. Pallas Reisen.

### + 14. Der Mier. Charadrius Asiaticus.

Er ist etwas größer als der Strandpfeiser 14. No. 1. Der Wirbel, Rucken und auswendige Aster. Theil der Flügel sind graubraun, und fallen ins Asiatischfärbige, die Stien aber, wie auch die Seiten des Kopfs und die Kehle sind weiß, auch ist der Hauch

### 116 Zwente Cl. IV. Orbn. Stelzenläufer.

Bauch von der Mitte der Bruft die zum Schwanze weiß. Die Kehle ist von der Mitte des Halses an rostfärdig, und wird durch eine braune Quers dinde über der Brust abgesondert. Der Schwanz ist gleichfalls braun und abgerundet, an den Seisten aber weißlich, und an der Spisse schwärzlich. Schnabel und Juße kommen mit vordemels deter No. 1. überein. Der Aufenthalt ist in den Salzsümpsen der südlichen Steppen des asiafisschen Rustands, jedoch ist dieser Bogel selten, und wird nur einsam gefunden. Pallas Reisen.

+ 15. Der Cartar. Charadrius Tataricus.

Tartat. Tartazieus.

16.

Domin

Diese Art ift ber vorigen sehr vermandt, und hat etwa die Große einer Mifteldroffel. Det Birbel ift fcwary, ausgenommen, daß die Rebern hin und wieder weiß gerandet find. Augen erweitert fich eine Binde burch bie Schlafe bis in ben Nacken. Die Seiten des Ropfs und Die Rehle find weiß und braun punctiret. Der Dals bis jur Gurgel ift Schwarzlich grau; Dacken and Rucken aber etwas bunfler. Die Gurgel, nebft einem Ringe um felbige, find fchwarz, unten meiß, von ba aber folget auf ein ichwarzes Selb eine rofffarbige Bruft. Der Unterleib aber und Der Burgel find weiß. Die Flugel find braun, und ber Schwanz wie ben der vorigen Art. Der Aufenthalt ift in ben tartarischen Galgfteppen, Desgleichen am Irtis in Rufland. Dallas Reisen.

16. Der Dominger. Charadrius Dominicus. Er ift ben schwärzlich, mit gelben Blecken

Er ift eben schwärzlich, mit gelben Blecken beseit. Der hals und die Bruft sind greis, der Rand der Flügel ift gelb, die Ruderfedern sind braun,

Digitized by Google

### 88. Geschlecht. Regenpfeifer. 117

kan, und haben weißliche Flecken. Das Bas maind ift St. Domingo. Briffon.

### 17. Der Engellander. Charadrius Anglus.

Die Farbe ist obenher greißbraun, der Rand Engels der Federn gelb, der Bauch rostärdig weiß, der länder. Inf weiß, gelb und grau gesteckt, und mit einem Anglus. wissen Bande über die Argen besetzt. Das Bastwand ist Engelland. Brisson.

#### 18 Der Jamaifer. Charadrius Iamaicensis.

Dieser Bogel ist obenher dunkelbraun, uns Jamab im weiß, an der Brust mit schwarzen Flecken, und fer. am halse mit einem weissen Halsbande gezieret. Iamai-Die Ruderfedern sind weisslich, rostsärbig und consis, shwarz meliret. Der Aufenthalt ist Jamaica. Brawne.

## 19. Der Schneppenpfeiser. Charadrius Utopiensis.

Er ist braun, und hat violetfärbige Flecken, Schnessem Schnabel einen schwarzen Zügel, und unter penpfeis bin Augen einen weissen Flecken. Das Vaters fer. Utopiland ift nicht bekannt. Buffon.

### 20. Der Mepicaner. Charadrius Mexicanus.

Er ist weiß, an den Flitgeln weiß und schwarze Mexibunt, am Ropfe obenher schwarz. Das Vaterland caner. Uns Brissons Echasse de Mexique. Mexicanus.

\$ 3 21. Der

### 118 Zwente Cl. II. Orbn. Stelzenläufer.

#### 21. Der Bengaleser. Charadrius Bengalensis.

Benga' den, der oben glanzendbraun, und schwarz gesteckt ist, der Kopf, die Kehle und der Hals sie Backen aber sind blaß castanienbraun. Das Vaterland ist Bengalen. Brisson. Edwards.

## 22. Der Goldregenpfeifer. Charadrius

aurcus,
egen Er ist oben schwärzlich, und gelb gesteckt,
pfeiser unten weiß. Die Ruderfedern sind schwärzlich,
durcus am Rande aber weiß und gelbgesteckt. Brisson.

### •

91. Geschlecht. Wasserhuhn.

Grallae: Fulica.

& Das cajennische Wasserhuhn. Fulica Cajanea.

fe hat einen grauen Kopf, weisse Kehle, schwars Cajens jen Hals, grünen Rücken, pomeranzensärs nische sige Brust, Bauch und Schwungsedern, dann Wassers chen schwarzen Burzel und Rudersedern, und die buhn. Iche sind mit keiner Schwimmhaut versehen. Cajanea Der Aufenthalt ist in Cajenne. Buffon.

\$4 93.SH

### 93. Geschlecht. Ralle.

Grallae: Rallus.

### IF. Die caapsche Ralle. Rallus capensis.

Taap fac Ralle. Capenfie. Der Kopf, der Hals, der vordere Theil der Bruft, und der Rücken sind rostfärbig, aber der hintere Theil der Bruft, der Bauch, die Schenskel, der Bürzel, die Schwungfedern und die Rusderfedern des Schwanzes sind schwarz und weiß wellenförmig gezeichnet, ausgenommen die zwey mittlern Ruderfedern, welche rostfärbig sind. Der Schnabel ist schwarz, die Füße aber sind roth und vierzähig. Man hat diese Art an dem Vorgebürge der guten Sosnung angetrossen. Linskeus.

### 12. Die grune Ralle. Rallus viridis.

Sie ist oben grun, unten gelb, und hat ame Auge einen stahlformigen Flecken. Der Aufents halt ist in Cajenne. Buffon.

Bunfte

## Fünste Ordnung. Hühnerartige.

Aves: Gallinae.

98. Geschlecht Psauen.

Gallina: Pavo.

4. Der Chinquis. Pavo Chinquis.

brift grau, auf dem Rucken mit großen runs Shind den glanzenden blauen Fleden besetzt, und quis. ikigens mit schwarzen Strichen und weissen Puns Chindan gezieret. Man trift ihn in China an. quis. Duffon.

\$ 5

99. Ste

## 122 Zwepte Cl. V. Orbn. Duhnerartige.

## 99. Geschlecht. Truthahn.

Gallina: Meleagris.

2. a. Der brosilionische Truthofin. Meleagris cristata.

Brafilio anischer Truto bahn. Cristata

er in unserm zwepten Theile, pag. 464. bez beschriebene brasilianische Truthahn scheis net gar nicht zu diesem Geschlecht zu gehören, sond vern eine Mittelgattung zwischen den Pauwiser und gemeinen Zühnern, vielleicht also wohl eine eigenes Geschlecht zu senn.

## 101. Geschlecht. Phasan.

Gallina: Phasianus.

1. a. Der Daushahn. Phasianus gallus.

ir haben zwar nicht ermangelt in dem zwene ten Theile pag. 470. etliche ber hauptfach, Richften Berfchiedenheiten ber gemeinen und jedere babn. mann bekannten Huhnerart anzugeben, jedoch wole Gallus, len wir zu mehrerer Ergangung auch biejenigen Berfdiedenheiten angeben, welche von bem herrn von Buffon in seiner Hift. Nat. des Ois II. ju feiner Sauptart angeführet werden.

- 2. Das Saubenbuhn, p. 178. Tab. 49.
- b. Das wilde affatische, p. 179,
- c. Der Acobo, ibid.
- d. Das Kriechbuhn aus Java, ibid.
- e. Der Rragenfuß, mit einem Kranze von Bee dern um die Füße, aus der Landenge von Darien, p. 189.
- f. Das Kriechbubn von Cambogia, ibid.
- g. Der Raubfuß que Bandam, ibid.
- h. Das Sasanbubn aus Indien, p. 181.
- i. Der engellandische Sabn, ibid.
- k. Der turfische.
- 1. Der Samburger, p. 182.
- m. Mit umgekehrten gedern, ibid.
- n. Das Wollenbuhn mie feinen Daunfebern, aus Japan, p. 98. o. Ein

## 124 Zwente Cl. V. Orbn. Buhnerartige.

- o. Ein schwarzes mit einem Kamm aus Java und St. Jago, p. 83.
- p. Ohne Burgel aus Perfien, ibid.
- q. Mit funf Jaben, p. 184.
  - r. Von Sansevare, p. 185.
  - s, Bon Caup, ibid.
  - t. Ein Zasan obne Rinnlappen.

## 7. Der dinestiche Fason. Phasianus superbus.

Chines fischer Kasan. Superbus. Dieser prächtige Fasan, welcher eine große Seltenheit in den europäischen Kabinetten ist, aber in den chinesischen Mahlerenen, auf verlakter Arbeit, und auf dem chinesischen Porzellan desto häusiger vorkommt, und auch in dem chinesischen Buche von den Eigenschaften der Pstanzen, (und Caput oculus betitult,) abgebildet und besichrieben ist, verdienet mit Recht alhier auch einges schaltet zu werden.

Der Körper ist roth, und die Jüße sind gelb, haben aber keine Sporne. Der Schnabel ist gleichfalls roth, und an der Stirne sizet eine fast runde rothe Drüse, am Kinn hangen ebenfals, wie am Hahn, zwen schmale, spizige, rothe Drüsen. Der Wirbel ist grün, und lauft hinten in einen blauen gesaltenen Federbusch aus. Der Hals ist hintenher grün, und auf benden Seiten mit einem Kranze von längeren Federn umgeben, welche rückwerts hervorragen und bunt sind. Die Schultern sind grün und weiß gesteckt, die Flügel roth, auszenommen die vördersten Schwungsedern, welche blau sind. Der Schwanz ist lang und keulsörmig. Die Rudersedern sind blaus und rothsbunt, die Decksedern aber sind abhängig und bunt meliret. Des Baterland ist Chipa. Linneus.

8. Der

#### 8. Der gehörnte Phasan. Phasianus cornutus.

Er ift roth, mit weiffen Fleden, und wohnet Geborm Bengalen. Der Riccer hatte ihn zu No. 3, ter be 99. Beschlechts ber Cruthubner gezogen, Eiche den zwenten Theil pag. 464. Edwards.

Bhafant. Cornu-

#### 9. Der Sogin. Phasianus Hoazin.

Er führet einen toftfarbig gelben Jederbusch, wicher aus dunnen von einander weichenden Jes Boatin-bru beteher Den Ciman aben ist ellementint. Hoazin den besteher. Der Rorper aber ift olivenfarbig. mb weiß bandiret. Der Schwanz ift ichwarz, bed am Ende gelb. Der Aufenthalt ift in Umes ika. Buffon.

#### 10. Der Marail. Phasianus Marail.

Dieser Fasan hat keine haube. Der Körper Maruile f grun, die Rehle roth, und der Burgel roftfare Marail 4 Er balt fich in Cajenne auf. Buffon.

#### 11. Der Caracara. Phasianus Caracara.

Der Hals und die Bruft sind schon blau, der Caracae Niden ift greis's braun, die Flügel aber find nebst ra. im Schwanze schwarz. Man trift ihn in den Caraca-Antillen an. Buffon.

## 12. Der Charamel. Phasianus Charamel.

Er ift oben braun, unten weiß, an dem Chaca-Schabel und an den Suffen blau, und wohnet in Chaca-Merico. Buffon.

102. Øts

## 102. Geschlecht. Perlhühner.

Gallinae: Numida.

## 1. a. Das Perlhuhn. Numida Melcagrit

t.a. Peris buhn. Meleagris.

ir haben zwar pag. 477. des zwenten Theil eine Berschiedenheit aus Jamaica angege ben, mussen aber boch noch erinnern, daß man it den Menagerien größer Herren mehrere Abweichungen antresse, als zum Erempel, eine weisse und eine bunte africanische Art, wie auch schön persfärbige mit blauen Flecken am Körper.

## 2. Das Saubenperlhuhn. Numida cristata.

Daubens perlens bubn. Crifta-

Dieses Huhn hat am Kinn keine Brusen führet aber auf dem Kopfe einen schwarzen Feder busch, und kommt aus Oftindien. Pallas Mitcel, VI.

## 3. Das Kronenperlhuhn. Numida coronata.

Rronen perlew buhn. Coronata.

Es führet gleichsan eine kegelformige Bichofsmüße oder Pabsikrone auf dem Kopfe, un die Rehle hat eine Falte. Die Füse find schwar Diese Art kommt aus Africa. Pallas Miscell

103.5

## 103. Beschliecht. Berghuhn.

Gallina: Tetrão.

## A. Kederfüße.

La Das senegallische Berghuhn. Tetrao Senegallus.

ie Bufe find vorneher mit Federn befest. 9.2. Die Farbe des Korpers ift ziegelroth, boch Sener befindet fich am Ropfe gut Seiten eine blauliche gallie Binde. Die Sthwungfebern an den Seiten find Berge weiß, und die zwen mittlern Ruberfebern find noch hubn. einmahl so lang, als die übrigen. d'Aubenton Sene-beschreibt diesen Bogel unter dem Mamen Gelinote gallus. de Senegal, indem ber Aufenthalt deffelben am Benegal ift. Linneus.

#### + 9. b. Das Bastardhuhn. Tetrao paradoxa.

Dieses besondere Berghubn halt zwischen Baftard ben Schneehubnern No. 4. und den Crappnan bubn. fen in Absicht auf die Gestalt, gleichsam bas Dit, Para-tel, indem es ungemein viel Abweichendes bat. doxa. Der Schnabel ift bunne, wie ben den Berghuhe wern gewöhnlich, und ber obere Kicfer ift meder gewolbet, noch auch über ben untern hinfpringend. Die Fuße find gang ungewöhnlich, fast bis an bie Krallen feberig, fehr tury, nur drenfingerig, mit gang furgen Baben berfeben, Die aneinander gewate

## 128 3mente Cl. V. Orbn. Bubnerartiae.

wachsen find, fo daß eine ordentliche breite dreit sadige Ruffohle beraustommt, welche mit borns artigen Schuppen ziegelformig befett ift. Det Ropf und Sals find bis jur Reble weißgran, boch an der Gurgel gelblich, und an benden Geiten des Salfes mit einem pomeranzenfarbigen Rleden verfeben. Der Ruden ift groffchen ben Blugeln bis aum Schwange, wie ben ben Trappganfen, greiß und schwarzschuppig gezeichnet, und ber Rreiß, det Die Burget umgiebet, beftehet aus vielen ichwars gen Querlinien. Die Bruft ift rothlich afchgrau, blaffarbig, von da an aber ift ber Bauch bis sum Burgel, nebft dem Beibchen, fcmars, und blak geflectt.

Die Flügel find febr lang, zugespitt, unten meiß, oben an der Wurgel blaß aschgrau rothlich. und mit großen fcmargen Puncten befprenget. Die Baftarbflugel find fcwarz wellenformig ges ftreift, und haben an der Spige gleichsam blutige Striemen. Die erften Schwungfebern werden almablig größer, und find febr jugespitt. baben fie eine braune Farbe, auswendig am auffern Rande nach der Burgel ju greiß, inwendig bis sur Spige weiß. Diese Art balt fich in ber tatas

rischen Wuste auf. Dallas Reisen.

Pable füße.

## B. Kahlfüße.

#### 20. a. Die Bachtel. Tetrao cotutaix.

20. 4.

Won den Wachteln (fiehe den zwenten Theil, Wachtel pag. 492) ist noch zu merken, daß Kerr Buffon Cotu-einer polnischen, dann einer Art aus den malois nischen Infeln, besgleichen einer Art von Mas danascar, und einer andern von Java gedenke.

21. Das

193 Gefchlecht, Berghuhn.

129

21. Des europaische Berghuhn. Tetrao Rable

Europaeus.

21.

Diefes Berghubn ift roftfarbig, bat einen Mafen Ropf und Sala, aber die Ruderfedern find Berg. benn. Der Aufenthalt ist in Buropa. Buffon. buhn,

Curps paifches Euro-

22-Das africanische Berghuhn. Tetrao afer. paeus.

Er ift schwarzbraun, hat eine rothe Rehle Africa bergleichen guge, die mit doppelten Sporn nifches. boichen find. Der Aufenthalt ift in Africa. Afer. buffon.

#### 23. Das Persberghuhn. Tetrao Chinensis.

Die Karbe ift dunkelbraun, Bruft und Seis Berli im haben runde Blecken, und unter den Angen berg. sigen sich vier runde Bande. Das Vaterland bubn. # China. Buffon. nensis.

#### 24. Der Colin. Tetrao Colin.

Dieser Wogel ist fucheroth, am Ropfe weiß und schwarz melirt, der Schnabel aber und die Colin. Juße find schwarz. Man trift ihn in America Colin. M. Buffon.

## 25. Det Cojoleos. Tetrao Covoleos.

Er ift oben weiß und roftfarbig, unten gang Cojoe toffarbig mit zwen schwarzen Banbern, welche leos. der lange nach am Halfe herunter laufen. Mepis Coyowif feine Benmath. Buffon.

Linne Supl. 23.

26. Der

130 Zwente El. V. Oton. Buhnerartige.

B. Rable fuße.

26. Der Colenicui. Tetrao Colenicui.

26. Er ist oben rostfärbig, unten weiß mit schwars Coleni- zen Wellen besetzt. An den Augen zeiget sich eine Coleni- weißliche schwarzer Flecken. Das Vaterland ist cui. Louisana. Buffon.

## Sechste Ordnung.

## Sverlingartige.

Aves: Passeres

104. Geschlecht. Tauben.

Pafferes: Columba

## A. Geradschwänze.

La. Der Remfer. Columba gutturola.

Wir haben diese Art im zwenten Theile p. 500. Kropfer beschrieben, aber keiner Verschiedenheiten Guttudaben gedacht. Wir wollen also einige namhaft machen.

- 2 Ein blaffer, ber wie ein blaffer rother Bein aussiebet, des Bussons Soupenvin.
- b. Ein gang weiffet.
- C. Gin weisfer mit gefeberten Jugen und langen Rlugeln
- d. Ein weißgrauer mit grauen Fletten.
- e. Ein fahlgrauer.
- f. Ein blau und weiß gefleckter ober auch gefprenfelter,
- g. Ein feuerfarbiger.

h. Ein

## 132 Amente Cl. VI. Orbn. Sperlingartige.

A. Gerade schwand it. h. Ein nußbaumfarbiger.

- i. Ein caftanienbrauner mit weissen Flügeln.
- k. Ein sammetschwarzer. Boddaert.

Dieses find lauter Bruthen, die durch frems de Begattungen noch mehr in Berschiedenheiten ausarten, darunter sich auch oft solche zeigen, welche auf dem Kopfe oder im Nacken einen Busch von verkehrt gerichteten Federn subren.

## 35. a. Die grune Laube. Columba viridis.

3¢.a. Gruae Laube. Viridis

Sie ist oben grun, unten gelblich; an bet Bruft himmelblau, und am aussern Rande der Flügel gelb. Der Schnabel aber und die Füße sind roth. Der Aufenthalt dieser schonen Taube ist in den philippinischen Inseln. Linneus.

## 35. b. Der Gelbichmang. Columba auftralis.

351 b. Gelb: fcwang Australis.

Diese Taube hat gesederte Füße, ist obenher grun, und an den Schultern violetsatbig, die Nubersedern sind grau, unten roth, und haben einen gelben Rund. Der Burzel ist gelb, die Ruderssedern sind schwarz, und haben gleichfals einem gelben Rand. Die Augen und Juße sind blutroth, der Schnadel ist blenfarbig. Der hintere Theil des Bauchs, und die Schenkel sind schwarz gessteckt. Das Vaterland ist Madagascar. Bussen.

## 35. c. Die amboinesische Columba Amboinensis.

35. c. Ambois nesische Taube. Amboinensis.

Sie ist grun, hat schwarze Flügel, die Decks febern aber und die Ruderfebern sind gelb. Der Aufenthalt ist auf der Insel Amboina. Buffon.

35. d. Die

#### 15. d. Die moluctische Laube. Columba Grade fchrodie Moluccenfis.

Sie ift blau, hat einen goldgrunen Rucken, Moln. fligel und Schwanz, und hale sich in ben molus Aischen Inseln auf. Buffon. Laube.

२**र. d.** Moluccenfis.

#### 35. c. Die batavische Taube. Columba Indica.

35. C.

Der Rucken ift grun, der Ropf blau, die Batavie Reble und der Burgel find gelb, die auffern Ru- Caube. berfebern aber find roth. Das Baterland ift Ba. Indica. lavia. Buffon.

#### 35. f. Die rothbäuchige Taube. Columba Senegallensis.

Sie ift obenher manfefarbig, unten ziegele Roth My und führet am Salfe einen mondformis bauchi. Es giebt auch noch eine Berfchies ge Taus gen flecfen. baheit, welche bren himmelblaue Bleden auf den be-Iligeln, und schwarze Ruder, und Schwungfedern gallen-tel. Bepte wohnen in Senegall. Buffon. fis.

## 35.g. Der Grunrucken. Columba Iavanensis.

Der Ropf, Bale und Bruft find tupferfarbig, Grun. bit Ruden und die Fligel find grun, die Ruder, raden. mb Comungfebern aber braun. Der Aufenthalt lavaift auf der Jusel Java. Busson.

## 35. h. Der Rothhols. Columba Asiatica.

Diese Laube ift grun, bat aber eine blaue Rothe Biele Laube ist grun, put noet eine bals. Siten, rothe Kehle und Hals, und porncher an Alatica den

134 Zwente El. VI. Orbn. Sperlingartige.

den Deckfedern einen weissen Rand. Man trift sie auf der Insel Amboina an. Buffon.

B. Keil: fchwair

je.

B. Keilschwänze.

41. Der Sched. Columba histrio.

Eched. Die meiste Farbe ist obenher braun, doch Histrio, der Kopf, der hintere Theil des Rudeus, nebst den zwen Reihen Auderfedern sind himmelblau, der Hals ist ziegelroth, und der Bauch weiß. Der Aufenthalt ist in Canada. Buffon.

42. Die braune Laube. Columba fusca.

Braune Laube. Fulcs.

Sie ift auch braun, aber unten gelb, und hat ftahlblaue Schwung und Ruderfedern. Das Baterland ist Carolina. Zuffon.

43. Der Langschwanz. Columba macerona.

43. Pangs Achwang Maccrona.

Diese Taube hat einen langen Schwanz, ift oben rostfärbig, unten braungelb, und führet an den Ruderfedern einen weissen Mand und weisse Spite. Sie wohnet in Senegal. Zuffon.

44. Der Beigbauch. Columba ventralis.

Weiffe Bauch. Ventralis. Der Hals ist hintenher blau, besgleichen der hintere Theil des Rudens, und der Rand der ersten Rubersedern, der Schnabel und die Juste sind roth, aber der Bauch ist weiß. Das Vatersland ist Canada. Zusson.

and the second of the first terms of the second of the sec

45. Det

104. Geschlecht. Lauhen. 135
B. Orr Schwarzhals. Culumba atricollis. Reil.

Am Vorgebürge der guten Sofnung ie.
ablich wird noch eine Taube gefunden, die grau Schwarzif, aber den Hals von vorne schwarz hat, so hols.
vie auch die Schwungfedern schwarz find. Die Atricolsflügel sind übrigens bläulich, und die hintern lis.
Schwungfedern sind zinnober 2 roth. Am Schwanz
k sind die mittlern Rudersedern sehr lang.

3 4 105. Bei

## 105. Geschlecht. Lerchen.

Passeres: Alauda,

## + 12. Die Cartarlerche. Alauda Tatarica.

Tatarica.

cie ist so groß wie ein Staar, hat einen die dern und mehr gewölbten Schnabel als andere Lerchen. Dieser Schnabel ist hornartiga gelb, und an der Spize braun. Die Nasenlöcher und Winfel der Schnabelspalte sind sehr die mit Jedern besetzt. Die Alten sind kohlschwarz, aber die jungern und die Weibchen sind, wie die Lerchen, braun, und haben einen weißgrauen Rand um den Federn, der sie bunt macht. Die Schwungsedern sind herzsörmig ausgerander. Der Schwungsedern sind herzsörmig ausgerander. Der Schwanz ist mittelmäßig, und ein wenig gabelsörmig. Die Rüße sind schwarz, und die hintern Klauen vorzüglich lang. Man trift diese Art in den dürresten Salzsteppen zwischen dem Jait und der Wolga au. Pallas Reisen.

## 13. Der Roststügel. Alauda cochevis.

Noft, flugel. Cache, vis. Sie ist grau, und hat eine blasse haube mit einem braunen Striche. Der obere Theil der Flügel ist blasroth, die Kehle ist weiß, und mit einem schwarzen Striche versehen. Die obern Schwungsedern sind weiß. Das Vaterland ist Europa. Zusson.

V 6

14. Der

137

#### 14. Der Beigbauch. Alauda plumata.

Ste ist grau, und hat eine braune haube. Beiße Die Federn sind schwarz gesprenkelt. Der Bauch bauch. Plumaift weiß. Sie wohnet ebenfalls in Europa, und ta. ift vom Buffon angeführet.

15. Die senegallische Berche. Alauda senegallensis.

Sie ift gleichfalls braun, hat auch einen Senes weiffen Bauch, und herunterhangenden Federbusch gerche. euf dem Kopfe. Die auffern Ruderfedern sind Sengen weiß, die mittlern schwarz, und die übrigen sind gallen-braun. Der Aufenthalt ift am Senegal. Bus. is. fon.

#### 16. Die Rragenlerche. Alauda collaris.

Alle Ruberfebern find braun, Die Augenbraue Rragen nen weiß, und der Sals ift mit einem schwarzen Colla-Bande, als mit einem Kragen umgeben. Des ris. Edwards Glean.

#### 17. Die Braunbrust. Alauda calandre.

Sie ift gang braun, und unten nur etwas Braum blaffer. Die Bruft aber hat doch einen dunkele Calanbraunen Flecken. Das Baterland ist Buropa, dre Buffon.

#### 18. Die Amsellerche. Alauda calandrotte.

Sie ift auch braun, unten aber weiß. Bruft Amsele und Reble find gelb, und haben halbmondformige lerche. Flecken. Die Ruderfedern haben hervorragende drotts. Spigen der Schafte. Buffon.

シベム 103. Ou

## 106. Geschlecht. Staare.

Passeres: Sturnus.

## 6. Der magellanische Staar. Sturnus militaris.

Magel, Iantsche Staar, Militaris. Fr ift obenher braun, der Hals ist vorneher blutroth, desgleichen die Brust, nebst den Augenringen und Schultern. Bor und hinter den Augen zeiget sich ein weisser Flecken. Die Seisten, der Bauch und die Rudersedern sind schwarz, desgleichen ein unter den Augen besindlicher Strick. Man hat ihn an der magellanischen Straße aus getrossen. Zuston. Linneus.

107.00

## 107. Geschlecht. Krammetsvögel.

Passeres: Turdus.

## 29. Der Goldgrune. Turdus pulcher.

Frist obenher schon goldgrün, und unten pomer Sostoranzenfärbig. Der Aufenthalt ist am Ses grüner.
Polecher.

## 30. Der Beiffled. Turdus merle.

Der Ruden ist olivenfarbig, Brust und Beis Bauch find weiß, und auf den Flügeln besindet fied. sich gleichfals ein weisser Flecken, der Schwanz Merle. bet eine vorzügliche känge. Man trift ihn auf St. Domingo an. Buffon.

## 31. Die cojennische Merle. Turdus Cajancus.

Obenher ist sie grunlichbram, untenher aber Cajengelblichmeiß. Das Vaterland ist Cajenne. Buf. Merle, sen. Caja-

# 32. Die Rappenmerle. Turdus Madagascariensis.

Die Farbe ist dunkelgrau am Körper, aber 322der Kopf ist obenher schwarz, und hat das Anse, Lappenschen, als ob der Bogel eine Kappe trüge. Der Madk-Bürzel hingegen ist weiß. Man sindet diese Art gasca-in Madagascar. Buffon.

33. Der

## 140 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige

33. Der Golbflügel. Turdus auratus.

33. Gold. flugel. Auraţuş,

Der Ruden ift braun, die Bruft roftfarbig ber Bauch weiß, die Schwungfebern find violet und haben einen Goldglang. Er wohnet gleich falls auf Madagastar. Buffon.

## 34. Der Caroliner. Turdus Carolinus.

34. Caroe liner. Carolinus.

Er ift caftanienbraun, hintenfer am Salfe schwarz, und auf den Flügeln purpurfarbig fcmarz. Das Baterland ift Carolina. Buffon.

## 35. Der Canadier. Turdus Canadensis.

Cana. dier. Canadenfis:

Er ift braun, hat eine pomerangenfarbige Bruft mit weissen halbmondformigen Blecken. Die Reble ift weiß, und hat ichwarze Flecken. Er wohnet in Canada. Buffon,-

## 36. Der Graue. Tardus einereus.

36. Graue, Cine-T443.

Er ift bunkelgrau, untenher weiß, und fo ift auch der Rand der Febern und der Flügel weiß. Die Schwungfedern felbft aber find braun, und bie Spigen berfelben Schwarz. Der Aufenthalt bieses Bogels ift in Cajenne, Buffon,

## 37. Der Americaner. Turdus Americanus,

37. Amerie caner.

. . .

S' ... ...

Die Federn find brufelgrau, und haben einen blaulichweissen Rand. Untenher ift ber Bogel Ameri- fcmutigweiß, am Butjel gang weiß, aber bie canus, Schwungfebern find fcmarglich, und mit einem braunen Rande umgeben. Buffon erhielt ihn aus Cajenne.

38. Det

## 108. Gefdiecht. Rrammereogel, 141

## & Der Pomerangenfopf. Turdus citreus.

Der Wirbel und ber Macken biefes Wogels ind pomerangenfärbig, der übrige obere Theil des lopers ift grun, der untere weiß, und mit schwarz in fleden befest. Es giebt auch die namliche In obne Pomeranzenfarbe am Ropfe. Erstere Art fin St. Domingo, und lettere in Guajana phanse Button.

38. Nomes topf.

## 19. Der Mauvis. Turdus mauvis.

Ein brauner Ruden, eine ichwarze Bruft, Dans m finnusiameiffer Bauch, pomeranzenfarbig ges vis. lette Seiten, bann ein weiffer Strich über ben Mau-Imm, zeichnet diesen europäischen Krammetei Wgel vor andern seiner kandsleute aus. Buffon.

#### 40 Der Schwarzschnabel. Turdus maculatus.

Obenher ift biefer Bogel braun. Am fcmars Shwarp m Schnabel zeiger fich ein pomeranzenfärbiger Zugd. Die Reble und Bruft find gleichfalls schward, latus, mb mit einem pomerangenfarbigen Bande gezieret. Der Bauch ift grunlichgelb, und hat schwarze Fles den. Die Schwungfebern find bunfelbraun, und den Ruderfedern sind die zwente und dritte hour. Er ist in St. Domingo zu Hause, und Photet unter die Merlen. Buffon.

## 41. Der Roftfarbige. Turdus ferrugineus.

Der gange Rucken ift roftfarbig, ber Sals Roftwil borne und an den Geiten, nebst der Bruft, farbige. hwarz, lettere führet einen weissen Rand. Die Dedfebern ber Flügel find ichwarz, und haben weisse

## 142 Zwente El. VI. Orbn. Sperlingartige.

weisse Fleden, und zwen gelbe Bante. Sie ift des Buffons Merle a-cravate, und wohnet in Cajenne.

## 42. Die angolische Merle. Turdus superbus.

Angoli, Sie ist oben grun, an der Kehle glanzend schre feegrun, am Bauche violet, die Deckfedern des Merle. Schwanzes, und ein Flecken am Auge, sind glandens. Super- zendblau. Sie halt sich in Angola auf. Buffon.

## 43. Der Muscheltrager. Turdus fuscus-

Muschel Da der Rand der braunen Federn weiß ist, erager. so siehet dieses aus, als ob der Wogel mit Miss Fuscus. schelchen beseigt ware. Der Wirbel ist mit einem Busche gezieret, und nebst dem Kopse braunroth, der Bauch aber ist weiß. Man bringt ihn vom Vorgebürge der guten Sosnung. Zuffon.

#### 44. Der Senegaller. Turdus Senegalius.

Sener galler. Senegallus.

Er ist braungrau, und hat einen weissen Bauch. Das Vaterland dieser Art, so unter die Werlen gehöret, ist Senegal. Buffon.

## 45. Die grune Droffel. Turdus viridis.

Stune Sie ist oben ganz grün, und unten nur erwas Drossel. blasser. Man bringet sie aus Ostindien. Zuse Viridis son.

## 46. Die Cinsieblerin. Turdus solitarius.

46. Einsiede lerin. Solitatius.

Sie ift braun mit einem grunen Gegenschein, der Bauch ift roftfarbig mit grunen Flecken. Sie tommt aus den manillichen Gegenden. Buffon,

47. Der

## 107. Gefdlecht. Rrammetevegel. 142

## 47. Der Purpurvogel. Turdus purpureus.

Er ift purpur svioletfarbig, doch auf dem gurpur Anden und an den Flügeln grun. Der Schwang bogel. dein ist blau. Er ist ein Einwohner des Reichs Purpu-Juda.

#### 48. Der Palmvogel. Turtus palmista.

Der Ropf und Maden find fcmary, bet Rus Balme dm ift gelblichbraun, die Stirn aber, wie auch vogel. der hals, Bruft und Bauch find weiß. Er wird Palmie in Cajenne gefunden. Buffon.

## 49. Der Caftanienvogel. Turdus castaneus.

Die Karbe ist dunkelbraun, doch haben die Castafedern einen gelben Rand. Die Reble aber ift mienvos immers. Er wohnet in Madagascar. Buffon. Casta-

## 50. Der Randflügel. Turdus Europaeus.

Er ift grau, und die Schwungfedern, des Rande ileichen auch die Deckfedern, find mit einem weif flugel. kn Rande umgeben. Er halt fich in Luropa Euroduf, und ist vom Buffon beschrieben.

## 51. Der Schmutet. Turdus fordidus.

Dben ift er grun, am Ropf und Salle fchivary, Schnie der Bauch und Burgel find roth, die Schultern, wie auch die Deckfedern bes Schwanzes find blau. Sordi-Die bren erften Schwungfebern find gelb, und dus ber Schwang schwarg. Man hat ihn an den phis lippinischen Inseln gefunden. Buffon.

52. Det

## 144 Zwente El. VI. Orbn. Sperlingartige.

## 52. Der Langschwanz. Turdus caudatus.

52. Lang. **fcbroatt** Caudatus.

Sein Schwanz ift langer als an den übrigen, fonst aber ift er auch daran zu kennen, baß feine dunkelblauen Febern einen Goldglang haben. Se. negall ift der Ort seines Aufenthalts. Buffon.

## 53. Der Blutflügel. Turdus Moluccenfis.

Plut flügel. Moluccensis.

In ben moluccischen Inseln fiehet man auch eine grune Merle mit einem blauen Ropfe, beren Bruft caftanienbraun ift. Die breh mittlern Rus berfedern find blau gerandet, die übrigen aber gang schwarz. Die Dedfedern find blau, und die bren ersten Schwungfebern weiß. Buffon.

## 54. Die Kronenbrossel. Turdus coronatus.

Aconem droffel. Coronatus.

In Bengalen zeiget fich eine Art, welche oben grun, unten aber am Bauche pomerangens farbig ift. Der Kopf und der hals find ichwatg, und am Ropfe befindet fich noch ein vomerangen. farbiges Band. Die Deckfebern find blau, die Ruderfedern schwarg, und haben einen grunen Mand. Buffon.

## 55. Das Gelbfehlden. Turdus gutturalis.

550 Gelbe Gutturalis.

Die Rehle und der Bauch find gelb, ber tebichen Rutten grun. Ein Strich an ben Mugen, nebft ber Bruft find schwarz, Die Augenbraunen aber gelb. Er ift ein Landsmann der vorigen Art. Buffon.

56. Die

## 107. Geschlecht. Rrammetevogel. 145

16. Die bunte Droffel. Turdus Dominicus.

Bunte Bon St. Domingo kommt eine Art, die Droffel von St. Vomingo comme eine act, die Domischen schwarz und weißebunt, unten aber weiß ist. Dominicus. Suffon.

#### 57. Der Braunschnabel. Turdus Indicus.

Et ift grun, unten grau, und hat einen bran schnabel Oftindien ift seine Heimath. Indicus Buffon.

#### 58. Der dunkelfarbige. Turdus triftis.

ξQ, Et ift braun, am Ropfe und an der Reble Dunfeb bwarz, der Burgel aber ift gelb. Das Baters farbige. Triftis, ind ift Senegal. Buffon.

## 59. Der Grunfopf. Turdus Philippensis.

Nichts als der Kopf ift grun, denn der Rus Grun da ift braun, die Reble weiß, und die untern topf. Mile find blagbraun. Diefer Bogel lebt einfam, Philip-mb balt fich an den philippinischen Infeln auf. Penus. Buffon.

#### 60. Der Dodobe. Turdus Podobe.

In Senegal trift man noch eine Merle an, Co. wiche schwarz ist, aber rostfarbige Flügel hat. Podob€ Der Schwanz ift dunkelbraun, und etliche Rudersedern sind bis zur helfte weiß. Buffon.

#### 61. Der Blaufopf. Turdus cyaneus.

Der Ropf ift dunkelblau, desgleichen auch der fopf. Edwanz nebst den Ruderfedern, aber der Rucken Linne Guppl. B.

61. Blaus Cyand 146 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige. ift hellbraun. Man trift diese Art am Vorges burge der guten Sosnung an. Buffon.

## 62. Die Blaubruft. Turdus Guajanus.

62. Blaubruft. Guajanus.

Aus Guajana hat man eine Droffel gebracht, welche einen rostfärbigsbraunen Rucken, schwarz zen Wirbel und Nacken, über den Augen ein breistes gelbes Band bis zum Halfe, unter den Augen ein schwarzes Band bis zu den Flügeln, eine blaßsgelbe Rehle, einen gelben schwarzgestreiften Bauch, schwarze Schwungsebern, und endlich eine blaue Brust, und dergleichen Schwanz hat. Buffon.

## 63. Der Rousserolle. Turdus Rousserolle.

63. Rouffes rolle. Roufferolle.

Schläßlich wird noch vom Buffon eine Art angeführt, welche oben gelblichebraun, und unten etwas blaffer ift.

108. Ses

## 108. Geschlecht. Seidenschwänze.

Passeres: Ampelis.

## 4 a. Der Fünffled. Ampelis maculatus.

In dem zwenten Theile pag. 542. fam eine Art Gunf. aus Brafilien vor, von welcher gegenwars fick. tige brasilianische Art unserer Mennung nach nur Macueine Berichiedenheit ift, benn wir find nicht ges latus. neigt, jeden anders gefarbten oder anders gezeich, neten Bogel des namlichen Geschlechts fur eine besondere Art auszugeben, und haben davon ichon in dem zwenten Theile bin und wieder unfere Gebanken geaussert. Um aber auch die merkwurdigften Berschiedenheiten, so viel uns moglich ift, nicht m überhupfen, so schalten wir gegenwartige Bat-tung aus Brafilien billig mit ein. Gie ift oben blau und unten purpurfarbig, zeichnet fich aber eben dadurch aus, daß fie funf pomerangenfars bige Flecken hat. Much gehet über die Bruft ein blaues Band. Der Schwanz aber, und die Rus derfedern sind schwarz. Buffon und Lowards tun bende diefer Art Erwehnung.

109. 90

# 148 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige.

## 109. Geschlecht. Kernbeisser.

Passeres: Loxia.

## 49. Der Grenadier. Loxia orix.

Srende dier. Orix.

In Africa wohnet ein Kernbeisser, welcher einen blutrothen Körper hat. Der Kopf ist bis über die Ohren schwarz, desgleichen auch die ganze Brust. Die Schwungsedern sind braun, die Rusdersedern gleichfalls, und sind alle von einer kange. Die Federn des Bauchs sind kohlschwarz und gleichsam abgeschnitten. Ben Kowards sühret er den Namen Grenadier. Linneus.

## + 50. Der Sibirier. Loxia Sibirica.

Sibirica.

Dieser Kernbeisser ist unter allen Bögeln der südlichen Gegenden Sibiriens, wo er sich aufhält, der schönste. In der Größe kommt er mit No. 37. überein, ob er gleich wegen seines langen Schwanzes etwas größer scheinet, und er steckt auch etwas dicker in seinen Federn. Der Schnabel ist wie am Chumpfassen No. 4. beschaffen, oder etwas langer. Der Kreiß um den Schnabel ist hoch purpurfärbig. Der Kopf und Rücken ist vortressich zinnoberroth, doch in den kaltern Sesgenden Sibiriens blaß rosenoth, und mit braunen Striemen. Unten ist er nur etwas blasser gefärsbet, und ohne Flecken. Um den Kopf herum has ben die Federn silberfärbige Spiken, welche im Schwänken glänzen. Die Schwungsedern der dweinen

menten Ordnung find an benden Sciten, die aber bon ber erften Ordnung am auffern Rande weiß. Die Burgel der Flügel ift gleichfalls weiß, und tie Deckfedern find auch weiß, haben aber schwars je Spigen, daher fich eine gedoppelte weisse und ibiefe Querbinde über die Flügel zeiget, wenn fie jusammen geleget find. Die Ruderfedern find langer als der ganze Bogel, ziemlich gleich, und bie zwen aussern find weiß, die übrigen schmarz, haben aber einen weissen Rand. Das Beibchen und die Jungen sind wie No. 37. gefärbet, und haben zuweilen einen rothlichen Bauch und Bure sel. Diefer Bogel liebet die Begenden ber Rluffe, und lebt vom Benfuße und ahnlicher Krauter Sas Die Stimme ift rauh, und der Rlug uns rubia. Dallas Reisen.

## 51. Der Cacatufinf. Loxia cristata.

Er ist schwarz, und hat einen feuerrothen in Cacatu, bie hohe gerichteten Federbusch. Der Kopf, die fint. Reble und die Bruft find untenher weiß. Das Crifta-Baterland ift Louisiana. Buffon.

#### 52 Der Saubencoliou. Loxia caudata.

Wir haben im zwenten Theile pag. 549. uns ter No. 12. einen Coliou, oder Regelschnabel bes Dauben. forieben, diefem mochten wir auch gegenwartigen Cauda-Jugefellen. Er ift blaulich, und hat einen blauen ta-Feberbufch. Die Deckfebern find braun, und der Schwanz ift drenmal fo lang als der Rorper. Der Schnabel hat eine umgefrummte Spige, und ans dem Grunde murde diefer Bogel vom Briffon unter ein anderes Geschlecht gerechnet. Der Auf. mthalt iff am Vorgeburge der guten Sofnung. Duffon.

53. Der

**R** 3

150 Zwente Cl. VI. Ordn. Sperlingartige.

53. Der Schwarzsopf. Loxia melanocephala.

Der Kopf, der Schnabel und der Bauch sind Mela alle schwarz, die Schwung und Ruderfedern noce- aber sind braun. Das Vaterland ist Casenne. Phala. Buffon.

## 54. Der Blaßschnabel. Loxia maja.

Blag, Auf der Insel Cuba halt sich ein brauner schnabel Kernbeisser mit einem weissen Bauche auf, dessen Maja. Schnabel blagroth ist. Buffon.

## 55. Der Weißburgel. Loxia leucura.

Beiß. Der Vogel ist roth, die Schwung: und Rus burzel. derfedern sind schwarz, der Burzel aber ist weiß. Leucu- Man trift ihn in Canada an. Busson.

#### 56. Der Gesteckte. Loxia maculata.

Spieckte Macu-lata. Er ist gelb, hat aber schwarze Flecken und eine schwarze Kehle. Die Flügel sind braun, und haben einen weissen Rand, der Schwarz ist auch braun, führet aber einen gelben Rand. Der Aufsenthalt ist in den philippinischen Inseln. Zufe fon.

## 57. Der Schwarzwirbel. Loxia Moineau.

Er ist roth, aber der Wirbel, die Backen mirbel. und die Flügel sind schwarz, doch haben die Moine-Schwungsedern einen rothen Rand. Sein Vas u. terland ist das Vorgebürge der guten Sofnung. Busson.

58. Der

#### 109. Befdlecht. Rernbeisser. ISI

#### ca. Der Gelbruden. Loxia Coromandela.

In der Rufte von Coromandel ift ein ichwar: Gelb. jer Kernbeiffer befindlich, welcher aber einen gel: ruden. ben Ruden, und gelbe Schultern hat. Buffon. mande-

## 59. Der Sacobin. Loxia Jacobin.

Muf ber Infel Java trift man eine Art an, melde oben braun, am Salfe aber und am Bauche fdwarz ift. Die Bruft ift weiß. Buffon.

Macobin Jaco-bin.

#### 60. Der Bewolfte. Loxia undulata.

Er ift auch braun, ber Bauch aber ift weiß, und mit ichwarzen Wolfen gezieret. Er wohnet Unduin den moluckischen Infeln. Buffon.

60. Gewolk lata.

## 61. Der Breitschmanz. Loxia laticauda.

Der Rucken ift roftfarbig braun, der Bauch weiß, und ber Schwang fecherformig ausgebreitet. Man befommt ihn aus Dirginien. Buffon.

61. Breite fchwanz Laticauta.

#### 62. Der Rothhale. Loxia rubricollis.

Der Bogel ift ichwarg, führet aber auf den Dedfedern einen weissen Strich, und ift vorne am Salfe roth. Die Ruberfedern find untenher bis jur helfte weiß, besgleichen ift auch der Bauch weiß. Seine Beimath ift Louisiana. Buffon.

62. Roths. bals. Rubricollis.

#### 63. Die Monne. Loxia Nonette.

Diefer Kernbeiffer ift oben blaulich, der Sals Ronne. aber, und die Bacten, desgleichen auch die Bruft Nonetund der Bauch find weiß, doch gehet um die Bruft

63.

cine

152 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige,

eine gedoppelte schwarze Dinde. Die Flügel find weiße schwarz und blaßebraun. Buffon.

64 Der Goldfopf. Loxia aurata.

64. Golde Fopf. Aurata.

Der Körper ift braun, der Wirdel goldgelb, der Bauch, so wie auch die Backen, find weiß, und blaß gesteckt. Das Vaterland ist Indien. Buffon.

#### 65. Der Pabst. Loxia Papa.

Papa. Er ist oben grun, der Kopf und der hintere Thell des Halses sind blau, unten roth; der Ruschen den und Schwanz aber sind grun. Sein Aufents halt ist Louisiana. Buffon.

66. Der Rappentrager. Loxia cucullata.

Rappene Kehle sind schwarz, welches ihm das Ansehen gies Cuculbet, als ob ihm eine schwarze Kappe aufgesett mare. Uebrigens ist der Kopf, die Brust und der Bauch pomeranzensarbig. Er wohnet in Senegal. Buffon.

57. 67 Der Erauervogel. Loxia nigra. Erauervogel. Er ist ganz schwarz, und wohnet in Casenne. Nigra. Busson.

63. Der Weißband. Loxia notata.

Weiß. Er ist ebenfalls ganz schwarz, führet aber um land. Die Brust ein weisses Band, und kommt aus Java. Busson.

69 Da

## 109. Beschlicht. Rernbeiffer.

#### 69. Der Gelbrand. Loxia fimbriata.

Diese Art ist schwarz, aber die Schwung, rand mb Ruderfedern find mit einem gelben Saum eine Fim gefaßt. Duffon.

60. Gelbe briata.

#### 70. Der Schwarzschwanz. Loxia melanura.

Der Ropf ist schwarz, und hat einen frummen 70. Bogen, melder um die Augen und an den Seiten ichman. ber Reble herunter lauft. Der Schwang ift famary. Mela-Uebrigens ift die rothe Farbe obenher die haupt, nura, farbe. Er ift am Vorgeburge der guten gof pung zu hause. Buffon.

#### 71. Das Rothauge Loxia erythropthalms.

An den Augen befindet fich ein blutrother Roth-Bleden. Der Ropf ift hintenher blau, der Rus auge den und die Rlugel find oben braun, und lettere Erytromtenber blau und rothlicheweiß. Buffon.

pthal ma.

#### 72. Die Rothfeder. Loxia haemorhoidalis.

Die Deckfedern des Schwanzes find blutroth, fonft ift dieser Bogel oben braun, und unten ctwas Hae-Heffer. Buffon.

72. Roth. feber. morhoidalis.

## 73. Der Reichspogel. Loxia Verdier.

Er ist oben schwarz, und unten, wie auch an den Augen gelb. Man trift ihn am Vorgebürge der guten Sofnung an. Buffon.

73• Reiche. vogel, Verdier.

#### 74. Die Streifbruft. Loxia liturata,

Die Farbe ift obenher grun, die Bruft aber bruft tofffarbig, und mit schmarzen Strichen befest. Der

74. Streis Litura154 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige.

Der Bauch und der Burgel sind weiß. Sein Aufsenthalt ist in St. Domingo. Buffon.

75. Sours bonner. Bourbonnensis. 75. Der Bourbonner. Loxia Bourbonnen sis.

In Bourbon trift man einen rostfärbigen Kernbeisser mit einem schwarzen Kopfe und schwarzen Flügeln an, dessen Bauch weiß ist. Buffon.

## 76. Der Caper. Loxia Bouvreuil,

67. Caper. Bouvrcuil.

Sofnung ist ganz rostfärbig, und hat nur einen schwarzen Wirbel, Flügel und Schwanz. Buffon.

## 77. Der Muschelvogel. Loxia conchata.

77. Muschel vogel, Conchata.

Es haben die Febern, welche auf dem Rücken am Kopfe und Flügeln schwarz, übrigens aber rofts färbig sind, alle einen weissen Bogenrand, welcher ihnen eine muschelartige Gestalt giebt. Das Bas terland ist Casenne. Zusson,

## 78. Der Krausbauch, Loxia crispa.

73. Araus bauch. Crilpa.

Er ist oben schwarz, unten aber, und an den Seiten der Kehle weiß, der besondere Umstand aber ist dieser, daß die Jedern am Bauche sehr lang und umgekrauset sind. Er kommt aus Brasilien, Buffon.



## 110. Geschlecht. Ammer.

Passeres. Emberiza.

+ 25. Der Sperlingsammer. Emberiza passerina.

Diese Art wird im Herbst am Jast in Ruß. Spers land gefunden. Sie ist so groß, und sie; linges het auch so aus, wie der Robrsperling No. 17. passer-und hat auch eine Sperlingsfarbe. Der Kopf ist na. fcmutig roftfarbig grau, auf bem Wirbel ift ein blaffer Strich. Der Sals ift unten ber Lange nach fcmarz, doch haben die Sebern einen blaffen Rand, und zur Seiten gehet von ber Rehle eine weiffe linie herab. Der Rucken ift grau roftfarbig, ber mittlere Theil ber Febern ichwarz, untenber ift der Korper weißlich safchgrau, doch in den Sciten mit roftfarbigen Striemen befest. Schwung : und Deckfedern find roftfarbig : gelb. Der Schwang ift einigermaffen gabelformig, und die mittlern Ruderfedern haben einen roftfarbigen Rand. Die auffern find an der Burgel, Die fols genden aber in der Mitte Schief weiß geflectt, bat ben aber ichwarze Schafte. Die Bufe find horns artig : braun. Das Weibchen ift dem Mannchen gleich, bat aber feinen ichwarzen Bleden auf bem Birbel noch an ber Reble. Dallas Reisen.

+26. Der

## 156 Zwente Cl. VI. Ordn. Sperlingartige.

# † 26. Der Rostburgel. Emberiza pithyornus.

26. Reft burgel. Pichyornus.

In der Große kommt diefer Bogel mit ber Goldammer No. 5. überein. Der Wirbel ift braunlich schwarz, und führet in der Mitte einen ovalen weissen Bleden. Der Naden ift einiger: maffen weiß bunt, von den Augen bis jum Da chen, bann unter ber Reble und am Balfe ift eine siegelfarbig rothe Gegend, unterhalb felbiger gebet über bem halfe ein weisses Querfeld, meldes zuweilen mit braunen brenedigen Blecken befest ift. Die Bruft ift rostfarbig grau gewölft. Weibchen hat auf dem Rucken eine Sperlings farbe, und führet einen roftfarbigen Burget. Schwang ift etwas lang, und einigermaffen gabel formig, zwen Ruberfedern an jeder Seite führer einen weissen fellformigen Fleden, welcher vor ber Spige an aufsteiget. Der Aufenthalt ift it sibirischen Dannenwaldern. Gie fommen in Frühjahr zum Vorschein, und haben eine Stimm wie die Robrsverlinge. Dallas Reisen.

## + 27. Der Gelbhale. Emberiza aureola

27. Gelb: kals. Aureola.

Diese Art ist so groß, und pfeift auch so wie der Rohrsperling No. 17. Der Wirbel Nacken und Rucken sind braun roth, die Federi um den Schnabel, Ropf und Kehle sind schwarz aber ferner den Hals hinunter schon eitrongelb doch ziehet sich vom Nacken ein schönes brauner Band quer über den Hals herum. In den Weithen zeigen sich braune Stricklein. Der Bürze ist weiß. Die Flügel sind tief an der Wurze braun, und von da weiter in die Breite weiß welches ben zusammengelegten Flügeln ein großer weises Feld ausmacht. Die Schwungsedern abe

und die Deckfedern sind schwärzlich, und haben einen braunen Rand. Der Schwanz ist einigers massen gabelformig, und an jeder Seite haben die zwo äussern Ruderfedern einen schiefen weissen Flecken. Die Juße sind blaßgrau, und die Weibs den stecken nicht so hoch in Farben. Der Aufsenthalt ist in den Pappelnwäldern und Weideninsseln am Irtis und andern sibirischen Flüssen. Dallas Reisen.

#### 28. Der Beißbauch. Emberiza notata.

Er ift braun und schwarz gesteckt, unten weiß. Weiß, Die dren ersten Schwungfedern sind schwarz, und bauch. haben einen weissen Rand. Die vier folgenden Notata. find ganz weiß.

Eine Verschiedenheit davon ist auf dem Rusten roftfarbig und schwarz gesteckt, unten aber weiß mit rostfarbigen Puncten. Buffon.

#### 29. Det Gelbband. Emberiza Moineau.

Dieser Ammer ist schwarz, und hat über den Gelb. Rücken und über die Flügel ein gelbes Band. Moint-Das Vaterland ist Juda. Busson.

111. Be

## 158 Amente El. VI. Ordn. Sperlingartige.

## 111. Geschlecht. Merlen.

Passeres: Tanagra.

## 25. Die bunte Merle. Tanagra varia.

Merle. Varia.

ie ift vorzüglich grun, boch find ber Rucken und die Blugel, besonders die Schwungs und Ruderfedern ichwarg, und mit blauen Bane bern befest. Der Aufenthalt ift in Cajenne. Buffon.

## 26. Der Grunfopf. Tanagra viridis.

26. Grun. topf.

Der Bogel ift obenher etwas schwarz, hat aber einen grunen Ropf, und bergleichen Schuls tern. Der Ruden ift jum Theil roth, der Burs gel gelb, die Ruberfedern find grun, die vier auffern aber rofenroth und mit einen blauen Rand eingefaßt. An der Rehle, und auch auf den Flüsgeln befindet sich ein blauer Flecken. Brust und Bauch aber sind seegrun. Buffon.

## 27. Der Selebonfopf. Tanagra Seledon.

don.

Seles Bucken, die Rehle und der Burgel find gelb, die Seles Flügel blau, die Schwung, und Ruderfedern grun, boch find die auffern Schwungfebern Blau. Das Baterland ift Cajenne, wo auch vermuthlich die vorige Art berstammt. Buffon.

28. Der

#### 111. Weschlecht. Merlen. 159

## 28. Der Blautopf. Tanagra cyanocephala.

Der Kopf allein ist blau, die Kehle und der 28. hals find hintenher roth, der Rucken fdmarz, und fopf. bes übrige grun. Cajenne ift bas Baterland. Cyano-Buffon. cephala

## 29. Die schwarze Merle. Tanagra nigra.

Diese Merle ist schwarz, den Ropf, Sals Sowar. mb Bauch ausgenommen, welche blau find. Sie Merle. fommt aus America. Buffon.

29. Nigra.

## 30. Die große Merle. Tanagra maxima.

Sie ift braun, unten roftfarbig, an der Reh- Grofe le weiß, unten pomerangenfarbig, und in den Geis Merle. in mit einem schwarzen Striche verseben. Der Maxi-Aufenthalt ist in Cajenne. Buffon.

## Il. Die Daubenmerle. Tanagra mitrata.

Sie ift blaggrun, am Bauche rofffarbiggelb, Sauben mb auf dem Wirbel pomerangenfarbig. Man trift merle. kin Cajenne an. Butson.

31. Mitra-

## 32. Die Dompadure. Tanagra pompadura.

Dompa. Sie ift dunkels purburfarbig, und hat daber bure Men Mamen, wird ebenfals in Cajenne gefunden. dura

## 33. Die braune Merle. Tanagra fusca.

Ropf und Rehle find roth, ber Bauch weiß, Merle. bas übrige aber ist braun. America ist ihr Bas Fuscas irrland. Butfon.

34. Die

160 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige.

34. 34. Die Kaifersmerle. Tanagra elegans. Raifers, Bie ift schwarz, hat aber einen gelben Wirbel und gelben Strich. Ihre heimath ist Cajenne.

#### 35. Das Weibchen. Tanagra foemina.

35. Weib, chent. Foemina,

Sie ist blaßgrun, auf dem Rucken braun; hat einen schwefelgelben Flecken auf den Flügeln, und führet schwarze Schwung: und Rudersedern. Nach Bussons Mennung ist sie das Weibchen von dem Sajacu, oder der grauen Merle No. 20. (Siehe den zwenten Theil pag. 177.) und wohnet soe wohl in Cajenne als in Brastlien.

## 112. Geschlecht. Finken.

Passeres: Fringilla.

#### † 40. Spornfinf. Fringilla calcarata.

ir haben im zwenten Theile pag. 579. einen Cporm Lapplandischen Finken beschrieben, und fink bert Pallav zweiselt, ob dieser etwa der namliche Calcafem fonnte? Er ift am meiften durch feine große rata. Realle an der hintern Bahe merfwurdig, welche fer lang, gleich einem Sporn; und etwas ges kammet ift. In bet Große ift er bem Bergfins im No. 4. gleich, und der Schnabel hat mit einem Schnabel der Ammeren viele Achnlichkeit. Der Birbel ift Schwarz, der Macken weißbunt. ben Augen bis in die Mitte des Dlackens gehet ein geblich weisser Bug, welcher hernach weiß wird, und fich mit einen Bogen wieder in die weiffe Bruft emfentt. Die Geiten des Ropfe, die Reble, und ein Strich am Salfe hinunter find schwarz, auss genommen daß bin und wieder etliche weiffe Federn mit untermischt find. Im Benicke fiehet man ein beites hochrothes Querfeld. Der Rucken bat Sperlingsfarbe. Mur ift ber Rand ber inneren Schwungfedern, nebst den Dettfedern des Schwane ics mehr ruthlich. Bruft und Bauth find weiß, in den Seiten befinden fich schwarze Stries wen. Der Schwanz ift ein wenig gabelformige und Die Ruberfebern haben an benben Geiten einen weiffen Rand. Besonders aber haben die zweis inffern einen hinansteigenden feilformigen Blegfen. Linne Gupl. 23.

#### 162 Zwente El. VI. Ordn. Eperlingartige.

Das Weibchen ift etwas miffarbig. Der Aufents halt ift in dem nordlichen Glbirien, woselbst fie niften, von ba aber, gleich nach der Bluthe bes fleinen Fruhlingsvogelfraut, die Aeder berdens weise besuchen. Ihr Rlug ift febr boch und lange wierig. Sie singen wie die Flachsfinken No. 29. und auf dem Felde laufen sie wie die Lerchen. Dallas Reisen.

#### + 41. Der Gelbschnabel. Fringilla flavirostris.

Tostris.

Db fich gleich bie gelben Schnabel oft gufale schnabel lig an gewissen Arten zeigen, so ist boch biefe, Flavi- nach herrn Dallas Bericht, eine folche beständige Art, und kommt in ben nordlichen Theilen Sie biriens, die etwas offlich liegen, fo haufig vor, baß man nicht baran zweifeln fann, fie mache eine besondere Art aus. Der Schnabel nämlich ist wachsgelb, und nur an der aussern Spige braun. Die Mannchen haben einen dunflen roftfarbigen Rorper, nur daß manchesmal die Spigen ber Bruftfedern faftanienfarbig find. Die Schwunge und berfelben Decfebern find ichmarglich, und aufferlich etwas weißlich, und gleichsam mit einem Reif angelauffen. Der Schwanz, ber die namliche Farbe hat, ift etwas gabelformig. Das Beibchen hingegen fallt etwas mehr ins Graue, und hat auch abnliche Blugel und Schwang. Wenn es im Winter heftig falt wird, ziehen fie aus den nord-lichen Theilen in das südliche Sibirien, und halten fich um die Scheunen und Dorfer auf, find aber eben fo dumm wie die Schneeammern. Dallas Reisen.

## 42. Der mosambiquische Finf. Fringilla Mozambica.

Er ist grun, unten gelb, und hat auch einen scher gelben Rand an-ben Schwung, und Ruderfedern. Bint. Der Aufenthalt ist im Mozambique. Buffon. Mo-

42. Desfame biquis fcer Fint. Mozambi-

#### 43. Der braune Finf. Fringilla fusca.

Er ift braun, und hat schwarze Ruberfedern, Braus mur sind die zwen ausseru, an den Seiten, weiß. Der Bauch ist schwefelgelb. Er halt sich ben uns Fulca. in Luropa auf. Busson.

#### 44. Der Weinfinf. Fringilla vitis.

Seine Farbe ist gleichfalls braun, aber die Beim Schwung, und Ruderfedern find schwarz, die fink. Bruft ist roth, die Kehle aber und der Bauch sind Vitis. gelb. Er wohnet in Frankreich. Buffon.

#### 45. Der Scharlachfinf. Fringilla Cardinalis.

Dben ist er scharlachroth. Brust, Bauch, Schare Flügel und Seiten sind schwarz, die Decksebern lachsink. aber sind braun, und die Schwungsebern haben Cardicinen weissen Rand. Er wohnet am Vorgebürs nalis. ge der guren Sosnung, und wird der Cardinal geneunet. Buffon.

#### 46. Der Neujorfer. Fringilla Taria.

Diese Art ist grun, hat eine schwarze Stirn Menjoe, und dergleichen Wirbel, der Hinterkopf aber, des ter. gleichen die Kehle und der Hals, sind gelb; Bauch Taria. und Burzel weiß, Flugel und Schwanz schwarz, aber

164 Zwente El. VI. Orbn. Sperlingartige. aber mit einem fchneeweiffen Ranbe gezieret. Der Aufenthalt ift in Meuiort. Buffon.

## 47. Der melirte Fint. Fringilla projer.

Die Farbe ift braun mit fcmargen Bleden, terfint und der Rand ber Dedfedern, desgleichen ber Projer. Schwung: und Ruderfedern, ift weiß. Er ift ein Europäer. Buffon.

## 48. Der Braumuden. Fringilla cerata.

48. Er ift roth, wie Siegelwachs, jeboch am Braun Rucken, Flügeln und Schwanze braun. Der Schnabel aber ift weiß. Man trift ihn am Seructen. Cerata. negall an. Buffon.

## 49. Der Buschfinf. Fringilla diadema.

∡Ż. In der Stirn diefes Bogels befindet fich über Bulde ben Augen eine blagerothe und fchmarge Binde, fint. sonst ift er braun, und wohnet in Buropa. Diadems. Buffon.

## 50. Der Rothfuß. Fringilla flava.

Er ift gelb, auf dem Rucken und an ben Glus 504 geln grun, und mit buntlen Bleden befest. Die Roth fuß. Bufe find roth. Gein Baterland ift Brafilien. Flava. 23uffon.

51.

Pour bonni.

fcet.

Fringilla 51. Der bourbonnische Finf. bruante.

Auf ber Infel Bourbon zeiget fich auch ein Bruan- rother Binte mit einem braunen Schwange und bets bergleichen Flügeln, die einen blaffen Rand has ben, Buffan.

## 52. Der caapfche ginf. Fringilla Capensis.

Er ist rostfarbigsbraun, hat einen schwarzen Caaps Sopf, einen weissen Strick über den Augen, und scher ift auch am Bauche weiß, doch sind die Muderses Kink. dem untenher blau. Seine Wohnung ist am Vors Caponsphürge der guten Sofnung. Buffon.

#### 53. Der mepicanische Sink. Fringilla Moxicana.

In Mexico wohnet ein braumer Jink, dessen Mexico Kopf und Kehle gelb ift, der Bauch aber hat blasse Mexistratze Flecken auf einen blassen Grunde. Buf cana. son,

#### 54. Die Rothbruft. Fringilla linotte.

Der Rucken ist braun, die Brust roth, die Roth. Shwung, und Ruderfedern sind schwarz. Er Linotte wohnet in Europa. Busson.

#### 55. Der Rothfopf. Fringilla Cabaret.

Die Stirn ist an diesen braunen Bogel roth, Roth. die Brust zwar auch, aber viel blasser, der Bauch topf. if weiß. Lucopa ist sein Baterland. Zuffon. Cabarret.

#### 56. Der gelbbandirte Sint. Fringilla fasciata.

Der Hals vorneher, die Rehle und Brust Gelbe stad sand, der Bauch ist, wie an der vorigen fer. Fascise

### 166 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige.

Art, weiß, both bas ibrige ift grun. Sein Auf. enthalt ift ben den Buropaern. Buffon.

#### 57. Der stahlfarbige Kint. Fringilla chalybeata.

Ctable Der Schnabel und die Jufie find blafferothe farbiger sonst ift der gange Wogel duntel stahlfarbig blau. und wohnet in Brasilien. Buffon. Heata.

> 58. Der Domingische Cardinal. Fringilla Dominicana.

58. Domine gifcher Cardi nal. nicana.

Aus St. Domingo kommt ein schwarze und weißbunter Finte, der einen icharlachrothen Kopf Domi- und Rehle bat. Buffon.

#### 59. Der Saubenfint. Fringilla cucullata.

Dbenher ift er braun, unten icharlachroth, Sauben ber Schnabel aber, sodann die niederliegende Saufint. be auf dem Kopfe und der Burgel find carmofinroth. Cucul-Die auffern zwen Ruderfebern find fcmarz. Man lata. findet ihn in Cajenne. Buffon.

#### 60. Der Rothhals. Fringilla rubricollis.

60. Der Kopf und die Ruberfedern find Schwarz Roth Bals und Burgel roth, die Bruft gelb, und mit einem schwarzen Bande gezleret. Das übrige ift bals. Rubricollis. braun. Gein Baterland ift Carolina. Buffon.

### 61. Der Muschelfünf. Fringilla conchata.

Br. Drufchel Er ift grun, Ropf und Sals find hinten grau, fint. vorne aber gluend roth. Die Bruft hat ein gela Conbes Band, der Bauch und die Sciten find fchmarte chata. lide

lichzgrun mit weissen Flecken. Die Ruberfebern find roth. Man muß ihn an den africanischen Luften Juchen. Buffon.

#### 62. Der Blaufint. Fringilla coerulea.

Er ist ganz himmelblau, nur find die Schwung: Blaw sind Ruderfedern etwas dunkler: und haben einen Coern-hellern Rand. Er wohnet in Cajenne. Buffon. lex.

24

X13. WU

#### 168 Zwepte El. VI. Orbn. Sperlingartige,

## 113. Beschlecht. Fliegenfanger.

Passeres: Muscicapa.

#### 23. Der Langschwanz. Muscicapa caudata.

Pang. Tang. Tauda: Cauda: ta. Die ser Fliegenfänger führet einen dunkelgride nen Federbusch. Sein Körper ist roth. Die dren ersten Schwungfedern sind schwarz, die übrigen aber weiß, und in dem Schwanze sind die nittlern Ruderfedern sehr lang. Man trift ihn in Madagascar an. Duffon.

## 23. Der gefronte Fliegenfanger. Muscicapa coronata.

33. Galton ht: Coro-Bala Sein Federbusch ift pomeranzenfärbigroth, und gerade in die Hohe gerichtet. Die Spigen der Kedern find blau, der Korper ist blaulich-grun, die Flügel find braun, der Bauch und Schwanz gelb, und die Schwanzsebern besonders vomeranzenfärbig. Er wohnet in Cajenne, und ist vom Zusson beschrieben.

### 24. Der Birginische. Muscicapa Virgines.

In Virginien halt sich ein Fliegenfänger auf, Pirsinis besten Feberbusch, Sals und Rucken grun, Flus Gel und Schwanz zimmerfarbig, Brust und Kehle Virgi- grau, und ber Bauch gluend gelb ist. Buffon.

25. Der

## 113. Defchlecht. Bliegenfanger. 169

35. Der Beißfopf. Muscicapa leucocephala.

Der Kopf ist weiß, der Wirbel schwarz, und Beist geste gesteckt, Brust und Bauch sind auch gelb, Leucaaber die Kehle ist weiß. Er wohnet in Casenne. cophala

#### 26. Der Geffecte. Mufcicapa maculata.

Er ist braun, der Schwanz ist gesteckt, der Gestecke Wirbel gelb, Stirn und Kehle sind weiß, Bauch te. und Brust aber gelb und schwarz gesteckt. Ca. Maeujenne ist das Vaterland. Busson. lata.

#### 27. Der Schwarze. Muscicapa atra.

Er ist ganz schwarz, und hat nur allein einen Schwargelben Burzel. Man trift ihn auf der Insel ie. Bourbon an. Buffon. Atra.

## 28. Der fleine Eprann. Muscicapa Tyrannulus.

Er hat eine braune Farbe, doch ift der Rand 28. Rleiner Deckfedern weiß. Die Kehle und der Hals Inrann find grau, der Bauch gelb, und die dren mittlern Tyranschwungfedern, nebst der mittlern Ruderfeder nulus, sind roth. Er wohnet in Cajenne. Buffon.

## 29. Die Purpurfehle. Muscicapa

Der ganze Bogel hat eine schwarze Farbe, Purpum ter die Kehle ist purpurfarbig. Er ist in Cajens, teble. Purpunte ju Hause, und vom Buffon beschrieben.

& 5 30. Der

170 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige 30. Der braune Fliegenfanger. Muscicapa fusca.

30. Pranne Kliegen fanger. Fulca.

Aus Martinique wird ein Fliegenfänge gebracht, der oben braun, und unten blaffarbig ist. Buffon.

#### 31. Der Schwarzbaden. Muscicapa spurca

Spurca.

Schnabel und Baden sind schwarz, der Wir bel zimmetfarbig und weiß eingefast, der Rucker blaß schwarz, die Flügel schwarz und mit einer weissen Binde versehen, die Ruderfedern gan schwarz, die Kehle und der Bauch weiß, aber die Brust braun. Senegal ist seine Deimat. Brisson

#### 32. Der Schone. Muscicapa nitida.

32. Schöne. Nitida.

Noch wohnet am Senegal ein anderer Flic genfänger, welcher obenher schwarz ist, aber un ben Ropf ein schönes weisses Band sahret, ber gleichen sich auch auf ben Flügeln befindet. Bruf und Bauch sind weiß. Buffon.

#### 33. Der Blauruden. Muscicapa cyanca

33. Bland rhæen. Cyanea

Er ist obenher blau, die Rehle ist brauti und mit einem schwarzen Rande umgeben. Di Flügel sind schwarz, und auch weiß bandiret. Die Ruderfedern sind alle schwarz, die zwen ausserommen, welche weiß sind. Der Bauck ist auch weiß. Er wohnet mit den zwen voriger gleichfalls am Senegal, und ist vom Zusson be schrieben.

34. De1

### 113 Offclecht. Fliegenfanger. 171

#### 14 Der Flügelflick. Muscicapa maculata.

Er ift oben braun, unten weiß, und führet fleit. afden Flügeln einen weiffen Flecken. Man trift Macuwin Europa an. Buffon.

Kluack

#### 15. Der Blaubauch. Muscicapa cinerea.

Er ift obenher aschgrau, bat aber einen blauen bauch. Buth, und der Ropf ist schwarz. Er kommt von Cine-Madagascar. Boddaert.

#### 36. Das Grunfehlchen. Muscicapa viridis.

Der Federbusch, die Kehle, der Kropf und 36. Bruft sind alle grun, der Bauch aschgrau, tehlchen wie obern Theile sind rostfärbig braun, und Viridis in Schwanz ift febr lang. Er wohnet am Senes 34. Buffon.

#### 37. Der Bourbonner. Muscicapa Bourbonnensis.

Er ift obenher roftfarbigebraun, hat einen Bourwinen Federbufch, und auch eine grune Rehle, bonner. Brust aber ist aschgrau. Sein Aufenthalt ist Bour-w der Insel Bourbon. Buffon. nensis.

### Ber Oranier. Muscicapa arausiaca.

Die Farbe ift oben, und über dem Rucken Amfelbraun, an der Bruft aber pomeranzenfärbig, Prante mam Bauche aschgrau. Er ift in Cajenne zu Arautaufe. Buffon.

39. Der

172 Zweyte Cl. VI. Orbn. Sperlingartige 39. Der banbirte Fliegenfanger. Muscicaps

fasciata.
39. Sandir, Er ist auch braun, und führet einen pome ter Kilo ranzenfarbigen Federbusch, aber die Flügel sind genfan mit zwen ockergelben Banden belegt. Er wird fec. auch in Casenne gefunden. Busson.

40 Der Schwarzwirbel. Muscicapa pileata.

40. Schwarzwirbel. Pileata

Endlich wird noch in Cajenne ein gruner Flies genfanger gefunden, welcher einen schwarzen Wirbel, eine braune Bruft, und einen gelben Bauch hat. Buffon.

## 114. Geschlecht. Bachstelzen.

Passeres: Motacilla.

50. Die Rinberstelle. Motacilla Boarula

Siese europäische Art hast sich besonders in Sablun und Schweden auf. Sablun und Schweden auf. Sie ift ftelich wenher aschgrau, unten gelb. Dberhalb und um Board ferhalb ben Augen zeiget fich ein weiffer Strich. la. Bon den Ruderfedern ift die auffere gang weiß, die zwente aber nur am innern Rande, und an ber Spise, die britte hat in ber Mitte ein weifles Keld. Diese Bogel ziehen ben ganzen Flugen ber um, und verfolgen im Gommer den gangen Lac das Rindvieh, um die Stechfliegen, (namlich den Babenftether, Conops calcitrans, und ben Rus denftecher, Conops irritans, fiehe ben funften Theil pag. 997.) ju fangen, welches in felbigen Begenbeit eine große Bohlthat fur das geplagte Bieb ift. herr Scopoli, Briffon, Willoundy und Edwards hatten alle biefen Bogel ichon bemers tet, und er ift nun auch vom Linneus in feinem Ans hange mit angeführet.

#### 51. Der hottentot. Motacilla caffra.

Am Vorgeburge der guten Sofnung, Sotten, und überhaupt an der africanischen Spige ift tot. anch noch eine Bachstelse in der Große der weissen Caffra, Bachftelse No. 11. vorhanden, welche im Macken, mb über bem Rucken olivenfarbigegrun ift. Die Gurgel

#### 174 Zwente Cl. VI. Orbn. Sperlingartige.

Burgel aber und ber Burgel find roftfarbig, Bruft und Bauch weißlich, Die Schwungfebern braun, Die Ruderfedern roftfarbig, haben aber boch braus ne Svisen, und find von gleicher lange, und die zwen mittlern find gang braun. Am Schnabel bei finden fich schwarze Zugelriemen, und über ben Am gen find weisse Striche vorbanden. Linneus.

#### + 52. Das Mohrenfopfchen. Motacilla maura.

Mohe den. Maura.

Diese Art ist so groß und so gestaltet wie bas rentopf Braunkehlchen No. 16. Die erwachsenen Manns den haben einen schwarzen Ropf und Sals. Rucken und die Burgel der Flugel find fohlichwary, und die Rlugel haben einen weifigrauen Rand. Die Seiten des Salfes und die untern Theile, als Bruft und Bauch, find gang weiß. Die Gurgel ift dunteleroftfarbia. Die Schwungfedern find braun, und haben einen verloschenen Rand. wendig find fie weiß. Auf den Deckfedern seiget sich ein schiefes weisses Feld. Der Schwang hat gleich lange Febern, und ift fcmarg. Die Seitens ruderfebern aber find von der Burgel an, bis gur helfte weiß. Der Burgel ift gleichfalls weiß. Die Beibchen und jungern Bogel find auf bem Ropfe braun und greiß gewolft. Ihr Aufenthalt ist in den Virkenwäldern zwischen dem Tobolsk und Jreis in Rußland. Gie fliegen insgemein paarmeife, leben von Insecten, und wohnen unter ben Stammen der Baume, in tochern alter Maus ern, und in verlassenen Mestern. Pallas Reisen.

+ 53. Der

#### 114. Sefchlecht. Bachftelgen. 175

## † 53. Der Blauschwanz. Motacilla cyanurus.

Sie hat die Größe des Rothkehlchens No.45. Blaus is obenher aschgrauzgelb, und fällt etwas ins Grüs schwanz Die Rehle und der untere Theil des Körpers Cyanumod gelblicheweiß. Die Seiten nach den Flügeln rus. in, sind gelblich pomeranzenfärbig. Der Bürzel is blaulich. Die Rudersedern haben gleiche Länge, sind erwas zugespist, und bräunlicheblau, auswens dig blaßblau. Die Flügel sind braun, der äussere Kand der Schwungsedern ist gelblich grün, der innere aber ganz gelb. Der Aufenthalt ist in den siellichen bergigen und büschigen Gegenden kleiner und großer Flüße Rußlands, wo sie sich die zu Insang des Winters aushalten. Pallas Reisen.

#### 54 Die greise Bachstelze. Motacilla grisea.

Sie ist obenher greiß, an der Rehle schwarz, Grise Bruft und Bauch find gelb, die Flügel sind braun, Bach, wo die aussersten Rudersedern weiß. Sie woh, stelze, met in America, und wird von den Engellan, Grisea, dern the grey Water-Wagtail genennet. Ed, wards.

#### 55. Der Flügelsted. Motacilla fusca.

Sie ist oben braun, hat einen gelben Wirbel, 55.
mb gelbe Augenringe. Die Brust ist roth, der Flügel Bauch gelb, und die Flügel sind mit einem weissen Fuscaflecken gezeichnet. Buffon.

56. Die Drenfarbige. Motacilla tricolora. 56.

Oben ist sie schwarz, unten weiß, in den farbige. Seiten und an der Wurzel der Ruderfedern gelb, Tricoauch lora.

176 Zwente El. VI. Ordn. Sperlingartige. auch haben die Flügel fünf gelbe Flecken. Das Baterland ift Cajenne. Buffon.

57. Det Banduct. Motacilla criftata.

57. Days buct. Criftsta.

Diefer Bogel ist oben grun, unten gelb, und mit einem aufgerichteten Jederbusch gezieret, wels der aus weissen und braunen Jedern zusamment gefeset ist. Er wohnet ebenfalls in Cajenne, und ist vom Buffon beschrieben.

115.000

## 115. Geschlecht. Zeifige.

Passeres: Pipra.

#### 14. Der rothe Beifig. Pipra rubra.

S der Roofs bie Bruft und der Bauch find rothe Roiber Kehle und Schulter gelb, und ber Rucken Brisis ichwarz. America ift das Baterland. Buffons Rubra Manakin.

15. Der Schwarzkopf. Pipra melano. cephala.

Der Ropf, der Rutten, Flugel und Schwang alle miteinander schwarz, und der Aufenthalt if in America. Buffon.

2٣٠ Schwatz phalk

#### 16. Die Rothfeber. Pipra plumata,

Der Bogel ift grun, bat aber auf bem Ropf Roche einen herabhangenden blutrothen Rederbusch, und feber. wohnet in America. Buffon.

Linne Gupl. 26

W

1 16 Bes

#### 178 Zwente El. VI. Orbn. Sperlingartige.

## 116. Geschlecht. Meisen.

Passeres: Parus.

#### 15. Der Blaubufch. Parus crectus.

Blau busch. Erectus

Dieschläfe führet einen blauen Federbusch. Die Schläfe sind weiß, die Kehle ift schwarz, der Körper grun, der Bauch gelb, und die Flugel blau. Sie wird in Luropa gefunden. Buffon.

117. 000

## 117. Geschlecht. Schwalben.

Passeres: Hirundo.

#### 13. Die rußische Schwalbe. Hirundo daurica.

der Herr Professor Larmann hat in Sibie Ruft tien eine Schwalbe angetroffen, welche sche. then blau, unten weiß, und an dem Schläfen, Dauriwie auch am Burzel tofffarbig ift. Der Korper ca. namlich, ift oben glanzend stahlfarbig, unten blaß greiß. Der roftfarbige Bleden in den Schlafen ift rothlich, und ziehet fich im Maden gusammen. Die ersten Schwungfedern find schwarzlich, haben frumpfe Spigen, und einen braunen Strich, und Die erfte ift die langfte. Bon ben Ruberfebern ift die auffere an jeder Seite noch einmal fo land als die übrige. Der Burgel ift etwas afchfarbig, und Die Redern haben ichwarze Spigen. Linneus.

+ 14. Die sibirische Bergschwalbe. Hirundo alpestris.

Sie ist größer als die hausschwalbe, und hat einen etwas breitern Schnabel, der Wirbel, Sibirts bie Gegend zwischen den Flügeln, und die Deck: Bergs sebern des Schwanzes sind kohlschwarz mit einem schwals Scapsablglanze. Von den Augen bis zum Nacken be. gehet ein dreneckiges rostfärbiges Feld, welches da Alpeoft zusammen fließet. Der Burzel ist bis zur Mitte stris.
des Ruckens rostfärbig. Unten ist der Vogel ichmusics

#### 180 Zwepte El. VI. Orbn. Sperlingartige.

schwunzigweiß, und weil die Schäfte der Federn schwarz sind, linienartig gestreift. Die Federn unter dem Schwanze aber haben schwarze Spinen. Der Schwanz selbst ist schwarz, glauzend und sehr gabelformig. Die vier mittlern Ruderstockt sind so ziemlich von gleicher tänge, die äussern aber sind sehr lang, und mehrentheils nach innen zu mit einem weissen Flecken bezeichnet. Die Füße sind braun, und etwas größer als an andern Schwalben. Diese Art nistet in den stillischen und ferneren nordischen Felsen, erscheinet selten in den verfallenen Sausern, macht ein halbrundes großes Nest von lauter zusammengedruckten Erst sein aus teimen, ohne Verbindung mit Strok oder Gras, und bauet noch dazu einen etliche Zoll langen Kanal zum Eingange. Pallas Reisen.

Dritte

## Dritte Classe.

# Amphibien.

Animalia Amphibia.

W 3

Erfte

Digitized by Google

Thomas offening.

### Erste Ordnung.

## Kriechende Umphibien.

Amphibia: Reptilis.

### 120. Geschlecht. Frosche.

Amphibia: Rana,

† 18. Der Lachfrosch. Rana ridibunda.

get nicht felten ein halb Pfund. Er giebt frosch. Abends einen Laut von sich, als ob man Ridiin weitem einen Menschen stark lachen hörte, und bundne biet jiemlich häufig in der Wolga und im Jaik morroffen, kommt aber niemahlen auf das Tros dene. Desgleichen halt er fich im cafpischen Meere auf. In ber Bestalt tommt er dem braus un landfrosche No. 14. nahe, ift aber etwas breis ter und furger, besonders ift der Ropf fehr breit. Das obere Augensted ift erhabenrund und mit Pos is befest, fatt bes untern Augenliedes befindet ich ein breiter eingebrucktes Feld, melches bas Ange umglebt. Die Trommelhaute liegen flach, ber Racten ift mit Ports, und die Seiten find mit verloschenen Bargen befett, untenher aber ift die haut glatt. Die Borderfuße haben vier Bins ger, und ber Daumen ift an ber Wurzel bico und M A

#### 184 Dritte Cf. I. Ordn. Rriechende Amph.

abacsondert, der nächste Ringer aber ift fürger ats Die übrigen. Die hinterfuße haben zwischen den Baben Lappen, und weil fich inwendig eine Saut ober Schwiele zwischen ben Fingern legt, Scheinen einigermaffen feche Baben vorhanden ju fenn. Alle Ringer find an den Spiken etwas rund aufgetries ben, und haben teine Ragel, find aber unten an ben Gelenken mit Warzen verfeben. Dben ift die Farbe afdygrau, und mit viclen großen braunen Bloden befegt, zwischen welchen wieder fleinere Reben. Die Ruckgrablinie ift ofters gelb ober Die hintern Gliedmaffen find einigers arunlich. maffen bandirt. Unten ift der Rorper weißliche und bin und wieder mit braunen Striemen bezeiche net. Die Afterbacken find braun, und haben fleine mildige Fleden. Dallas Reisen.

#### † 19. Der Abendfrosch. Rana vospertina.

19. Zibenda Proida Vefiper Lina.

Er hat die Größe einer Krote, aber die Ge falt eines Frosches; jedoch find die hinterfife furg, baber er beschwerlich hupfen fann. Ropf ift fury, der Korper von oben mit Warzen befest, afchgrau, und mit langlichen, zumeilen ine einander fliessenden Bleden von gruner Farbe bes geichnet. Unten ift ber Korper weißlich, ober fcmungig afchgrau. Zwischen ben Augen befindet fich allezeit ein zwenschenkeliger Querflecken, ber mit ber Breite gwischen den Augen, und mit den Schenkeln nach den Masenlochern zu ftebet. Borberfuße find vierfingerig. In den hinterfuse fen find funf mit einer Saut vermachsene Zaben. wegn noch eine dicke Schwiele kommt, welche der lange nach gerichtet ift, und den Daumen vorftele let. Der Aufenthalt ist in Rußland. Pallas. Reisen.

+20, Die

+ 20. Die Durstfrote. Rana sitibunda.

Sie hat die Bestalt einer Krote, ift aber Durft, größer. Der Kopf ist furz, zuruckgebogen, und frote. binter den Augenkreisen gleichsam mit einer Schnur Sitimammen gezogen. Die Augenlieder find einigere bunda. maffen fleischig. Die obern find breit, und nickend, die untern eng, und mit einer Michaut verfeben, Der Korper ift furg, aufgetrieben, und mit braus nen erhabenen Puncten, fo wie der Ruden in den Seiten mit etwas großeren Bargchen befest, wels de in den Beichen am haufigften vorhanden find, Die Fuffohlen find untenber warzig. Die Borberfuße haben vier Singer mit einen getrenneten Daumen. Die hinterfuße find halb gefpalten. und einigermaffen fiebenfingerig, indem an benben Seiten der Bufmurgel eine Schwiele hervorraget. Die Farbe ift untenher ichmutig-weiß, oben blaus lich afchgrau, mit vielen theils runden, theils uns formlichen fdmarglich grunen Bleden haufig befest. Man trift diefe Art in durren Buften am Jait wemlich baufig an, und zuweilen erfcheinet fie ben fleinen Stadten und Schanzen, liegt ben Tage in allerhand Sohlen, und fpringt Abends berum. Dallas Reifen.

William H. Brilling

122. ON

### 122. Geschlecht. Eidechsen.

Reptiles: Lacerta.

## † 9 a. Der Sonnenschauer. Lacerta helioscopa.

9. 2. Sonnen Schauer, Heljo-Scopa.

Diese Endechse hat die Gestalt der Barbars eydechse No. 11. ist einen Finger lange und hat die Bewohnheit, mit aufgerichtetem Ropfe, und eingezogenem Dacken, bas Beficht mehrentheils ber Sonne juguwenden. Der Kopf ist gang mit Schwieligen Warzen befest, hat kaum hervorragens De Lippen, und die Masentocher an der Stirn. Die Augenlieder schuppig granuliret, der hals gleichsam enge zugeschnurt, unten mit einer Quers rungel verfchen. Der Maden bat zwischen ben Schultern eine rauhe schiefe Erhöhung, und ein baran fossendes oft scharlachrothes Feld. Rorper ift fury, in den Sciten aufgetrieben, und ten mit icharfen fleinen Schuppen befest, welche gleiche Grofe haben, oben aber noch fleiner find und hervorragen, wo fich noch besonders in ben Seiten häufige Wargen zeigen. Der Schmang ift allenthalben gleich fchuppigg an der Burgel bide, und lauft fadenformig aus. Die garbe oben ift afchgrausweiß, und oft mit blauen und braunen Eropfen befprenget, unten mennig, und icharlactroth, selten blaßfarbig. Gie balt fich in ben sublichen burreften Sandhugeln Ruflands auf, lauft fehr gefcwind, aber nicht fo schlangenartig, wie ber Springer No. 15. Dallas Reisen.

B. Wit-

#### B. Wirbelichwänze.

**B**irbeli famáns

19.3

† 19. a. Die Pfeileibechfe. Lacerta velox. ic.

Sie ist viel fleiner und:schmachtiger ale une fer gemeine Cidechfo, flebet ihr aber fonft febr eibechfe malien. Der Ropf, bas fepuppige Salsband, die Velon. Ringel um bie Schenbell, und ber wirbelige Somang forumen mit jenup: pollforumen übereine beber fie bein and jud gemten Abtheilung , name lich ber Wirbelfchmangelgeheret. Die Farbeiff sten alchgran mit funf ber bange nach geftrecten Seichen bie etwas blaffer find, und von einer Renge feiner brauner Dupken beglettet werben. Die Schien And mit langen schwarzen Plecken bes fet, zwischen welchen glanzende blave Buncte fter Der Aufenthalt iff in den durven Buften Reflection, insol fie hebuntiftreffe, und fichtellen de ein Pfeil fortscheuft. Pallas Reisen.

#### †19. b. Der Blutschwanz. Lacerta cruenta.

Sie hat die Gestalt ber porigen Art, ift aber Blute wehl brenmal fleiner, und hat einen fpigigen Ropf, fcmang tin ben Sals ift feine Binbe, ausgenommen eine ta. Mmzel, und so mangelt auch die Schenkelschnur. Der Korper ift oben braun, unten weiß, über in Maden geben sieben weisse Striche, bavon wer über ben Ruden bis jum Schwange fortgeben. Die Glieder haben runde Milchflecken, Cowang ift oben afchgrau, unten icharlachroth, wird aber nach ber Spige zu weiß. Gie gehöret it die zwente Abtheilung unter die Birbelichmange. wit balt fich in ben rußischen Galgfteppen auf. if aber selten. Dallas Reisen.

19. b. Cruen-

D. Lange

#### 188 Dritte Cl. I. Orbn. Rriechenbe Ampl

D. Lana febroar D. Langschwänze. Leguanartige.

+ 41. a. Die Rehlfalte. Lacerta arguta

41. 2.

Sie ift furger und bauchiger als die gemein Reblfale Eidechse, und hat eine spisigere Schnause. Ur te Arguta, ter dem Halse befindet sich eine große doppelt Kalte. Die Schenkel find sparfam mit verlosche nen schwieligen Puncten befest. Der Schmang if an der Burgel dick, und lauft fchnell fehr bun und fadenformig aus. Die Farbe ift oben blau und mit vielen schwarzen Querbandern befest, wel the oft jusammen fließen, unten weiß. Querbande find an der Burgel bes Schmanges ge nau abgefondert, und jedes ift mit vier ober fun augigen Puncten befest. Der Aufenthalt ift is ben sublichen sandigen Begenden am Artis, fette per aber am caspischen Meere. Dallas Reifen.

> والمؤرقين بالمتوادي 1 arginstal ere el dun Albert drean, it men in the real receives that and the The first to be the second of the second second काक मञ्चूपतिहर्भन एक । १००१ एवं कार्र होती ए

mer prior of the factor of the

D. Paris

**Bwente** 

## 3wente Ordnung.

## Schleichende Amphibien.

Amphibia: Serpentes.

## 125. Geschlecht. Natter.

Serventes: Coluber.

#### 98. Die Klappernatter. Coluber crotalinus.

befindet sich eine große Matter, welche das natter. Anschen einer Klapperschlange, hervorstes Crotainde Augenticher, und einen herzformigen Kopf linus.

Let Korper ift groß, aschgrau, und mit goffen blaffen, eins ums andere geordneten, bodigen Flecken besetzt. Unten ift ber Rorper Alblich und braun überloffen. Man gabler 154 Shilbe, und 43 Schuppen, denn der Schwanz ist und fat feine Schilbe, sondern lauter Schuppen. Eine abnlibe bekannen wir aus Suriname. Beh dem sowedischen Eremplar ist von dem Ritter das Buerland nicht angemerkt. Linneus.

+99. Die

### 190 Dritte El. II. Orbn. Schleichende Amph.

+99. Die Schilbnatter. Coluber scutatus.

Edilbe natter. Scutatus.

Sie ift oft vier Schuh lang, und fiehet wie bie Ringelnatter No. 41. que: Ste hat im Maule feine giftige Berkzeuge, aber in benben Riefern, auf benben Seiten, eine Reihe fpitiger auswerts. ftebender ziemlich großer Bahne, und am Gaumen, ber lange nach, einen geboppelten Ramm. Die Augenringe find braun. Obenher ift ber Korpet fcmary, ohne Glang, unten find die Schilbe glatt, und glanzend schwarz, und die Paare feben eins ums andere, find an den Enden gelblich-weiß, und machen, daß der Bauch gewürfelt erfcheinet. Der Schwang hat faum ein und andere weisse Schupe Die Bauchschilde becfen den Bauch febr breit, und fast bis zu zwen Drittel des gangen Umfangs, fo daß fie in den Seiten eine lange Ralte machen. Die Anzahl der Schilde belauft fich auf 190, ohne das große gedoppelte Gdill ju rechnen, welches den After bedt. Der Schwary ift leicht breneckig gedruftt, und führet ohngefebt funfzig paar Schuppen. Der Aufenthalt if im Jait, benn es ift eine Wafferschlange, both geffet fie heraus aufs land. Pallas Reisen.

### † 100. Die Flufinatter. Coluber Hydrus.

Flug, matter. Hydrus. Sie ist aalformig gestaltet, etwa bren Schub sung, und hat auch keine giftigen Werkzeuge, subret aber im Gaumen einen gedoppesten Kamm mit zurückgebogenen scharfen Zahnchen. Die Zunge ist lang und schwarz. Der Kopf klein, und ohne aufgetriebene Backen. Die Augen sind klein, und mit einem gelben Kreiß umgeben. Oben ist die Farbe olivenfarbig aschgrau. Im Nacken ist auf benden Seiten eine schwarze Binde, die am hinz terkopse zusammen lausen, und zwen längliche schwarze

fowarze Bleden einfaffen. Ferner ift ber Rotper in vier Reihen mit runden fcmarzen Fleden befent. Die Schilde find gelblich fcmary gewürfelt, nach hintenzu am schwarzesten. Am Bauche befinden fich 180 Schilde, ohne das einfache Afterschild zu rechnen. Die Schuppenpaare unter bem Schwans ze belaufen sich auf 66, und die Schwanzspisse ist gedoppelt. Man trift diese Art in den rußischen Kiksen, (oder im Wolga) dis zum caspischen Meere an, niemahls aber auf dem kande. Pal las Reisen.

#### †\* 101. Die Teufelssthlange. Coluber Melanis.

Sie ist wie die europäische Tatter No. 15. Teufeld gestaltet, und auch so groß, im Maule mit Gift, schlange, wertzeugen verschen, hat braune Augenringe, und Mela-fenkrecht spießformige Augapfel mit einem filber: nis. farbigen Rande. Der Korper ift buntel fchwarz, shne Glanz, am Bauche etwas blasser mit dunklen Flecken und glanzend. Die Sciten nach der Kehle ju find blaulich gewölft. Man zählet 148 Bauche schwanzschuppen. Der Schwanz ift kegelformig und kurz. Gie wird in Miftgruben und in verschutteten und bewachsenen Gegenben am Wolga und Samara angetroffen. Dallas Reisen.

#### + \* 102. Die Balbschlange. Coluber Scytha.

Sie ift anderthalbe Schuh und barüber lang, Balbe und der Schwanz hat nur den zehnten Theil der folange lange. Der Kopf ift etwas herzformig, und mit Seytha. einfachen Wertzeugen versehen. Die Augenringe ziehen ins Goldgelbe. Der Korper ift so bick wie

#### 192 Dritte El. II. Orbn. Schleichenbe Amph

ein Jinger, oben dunkel schwarz ohne Glanz, un inischigeweiß und glanzend. Man zählet 153 Sauch schilde, und 31 Paar Schwanzschuppen. De Aufenthalt ist den bergigen Wäldern Sibiriens auch sogar ziemlich weit nach Norden, jedoch if diese Art nicht so sehr giftig wie andere. Pallas Reisen.

#### + 103. Die Galsschlange. Coluber Dione,

163. Salge folange Dione.

Der Rorver ift ichmachtig, bren Schuh lang, wovon der Schwang ohngefehr den sechsten Theil einnimmt. Im Baumen ift ein vierfacher Ramm porhanden, aber weiter feine Biftwerkzeuge. Ropf ift flein, vierectig und mehrentheils mit brau! nen Nathen gewürfelt. Die Farbe ift oben schott afchgrau, ober weißlich, und mit bren weiseren Strichen ber lange nach gezieret, zwischen welchen eins ums andere braune Striemen oder Burfel, Die oft zusammenlaufen, stehen. Unten ift Die Sarbe weiß, und mit gang fleinen blaulichbraunen Striemen befest, zwiften welche fich zuweilen gang feine rothe Puncte mifthen, man zahler 190 bis 206 Bauchichilbe, und 58 bis 66 Paar Schwang. Schuppen. Diefes zierliche Thierchen ift gang uns Schablich, und halt fich in ben Galgfteppen am cafpischen Meere, und in durren Galifelbern am Brits auf. Dallas Reifen.

## 126. Geschlecht. Aalschlangen.

Contract Server

Serpentes: Anguis.

+ 17. Die caspische Aalschlange. Anguis miliaris.

te ift fo did wie der fleinste Finger, nur viers Cafpi zehn Zoll lang, wovon zwen auf den sche Schwanze gehen. In der Gestalt kommt sie dem Mal, Zwenkopf No. 13. nahe. Der Kopf ist greiß, schlange und schwarz gesprenkelt. Der Schwanz ist etwas Milia-dimer als der Körper, chlindrisch, stumps, und weißbunt, der Körper selbst aber ist schwarz, in ben Seiten mit vielen blaffen, und nach bem Rus den ju afchgrauen Schuppen ober Sprenkeln befet. Unter dem Bauche gablet man 170, und. witer bem Schwanze 32 Schuppen. Man trift diese Art in ber Gegend des caspischen Meeres m Dallas Reisen.

## Dritte Ordnung.

## Schwimmende Amphibien.

Amphibia: Nantes.

### 134. Geschlecht. Store

Nantes: Accipensef.

44. Der Sternstor. Accipenser stellatus

Sterni Abr. Stellatus.

Fr hat die gewöhnliche Größe von vier Schuf. wiegt etwa dreisig Pfund, ist etwas schmathitiget als der gemeine Stor und Sterlet No. 1. 2. und ber Umfang bes Korpers ist vollkommen funfe ectig. Der Ropf ift Scharf mit fbigigen Sockern und gezähnelten Sternchen befest. Die Genause gehet in fpannenlange, fnochige, gedructe, faft dreneckige Riefer aus, ift unten schleimig glatt, am obern Theile aber burch viele fageformige Striche rauh. Vor dem Maule figen vier Barts flossen wie ben allen Storen. Das Maul ift robe renformig, und laffet fich weiter als an ahbern Arten hervorftoffen. Die Behorlocher find febr groß, und halbmondformig. Bon ben Schultern an verdunnet fich der Körper allmählig in eine funfectige lange. Der Schwanz ift rund, und unmerflich fechsectig, bie Knochelchen auf bem 3 . . . . . . . . . . . .

Rudenfiel find fpisig, mitten auf bem Ruden begen brengehn bergleichen Knochelchen ben Riel, m den edigen Geftenteihen aber gablet man ders felben jedesmal funf und drenfig fleinere auf jedem Kiele, die zwey Bauchtiele aber haben bis zum After jedesmal nur zwolf Knochelchen. Hinter bem After ftehen noch bren Knochel. Ueberdies if der Rucken bin und her noch mit weiffen fferne formigen Schwielen von unterschiedener Große befest, und der gange Korper durch unordentliche febende Schuppentrummer raub. Die Ffoffen find langer als an andern Arten, befondere ift ber Somang am Ende halbmondformig, und mit den dern Rloffenlappen lang hervorftechend. Berbe ift obenher ichmarglich, unterhalb ben Geistenfnochein tropfenweise bunt, unten weiß. Diese Art fleiget ju Anfang des Menmonats in uniale lider Menge aus dem caspischen Meere die Rluffe Die Welbihen find in allen Studen größer als die Mannchen, aber nicht langer. Der Epers fod wiegt etwa geben Pfund, und enthalt bem links drenmal hundert taufend Eper. Reser.

Bierte.

### Vierte Ordnung.

# Gehende Amphibien.

Amphibia: Meantes.

Benem nung der Ordi nung. a wir die Amphibien im dritten Theile bes
schen Anleitung nur dren Ordnungen angezeiget,

1. Kriechende. Reptiles.

II. Schleichende. Serpentes. III. Schimmende. Nantes.

so wie sich auch hievor die Zusäke bazu besinden; allein in der Zugabe hat der Ritter noch eine neue Ordnung, welche D. Garden entdeckte, eingesschaltet, wovon wir auch in besagtem dritten Theile pag. 3. Erwähnung gethan haben. Diese Ordnung führet nun ben ihm den Namen Meantes, und sollte seiner Anweisung nach, zwischen den Schleischenden und Schwimmenden stehen. Wir nennen also selbige auch gebende Amphibien, und stellen es übrigens fren, diese Ordnung den schwimmenden nach Gefallen vor, oder nach zu sesen.

Renne geichen der Orde nung.

Die Kennzeichen dieser neuen und vierten Ordsnung sind, daß sie nicht nur ausserliche Luftwerkszeuge, sondern auch Lungen (Branchiae et Pulmones simul) haben, sodann aber auch mit Jussen als mit Armen versehen sind, an welchen Nagel sigen. Es ist disher nur folgendes einziges Seesthlecht entdeckt worden:

142,a. Øes

### 142. a. Geschlecht. Die Sirene.

Meantes: Siren.

Siren, oder Sirene foll, nach der Mennung der Gefcht. Alten, ein Wunderthier des Meeres senn, Benew welches halb Fisch und halb Mensch ift, davon es nung. mancherlen Sabeln giebt. Ingwischen hat man boch auf dem anatomischen Theater in Leyden ein fols des Gesthöpfe aus Brasilien einmal gehabt, welches aber von dem Ritter nicht fur acht erkannt werden wollen, weil es Ohren und einen engen Sals hatte, und man weiter von den Reisenden feine nabere Bestättigung solcher Geschöpfe ver-Woron wir im ersten Theile pag. 203. fcon Ermehnung gethan haben, und hier aus dem Bartholin Tab. III, fig. 4. einen Umriß mite T. III. theilen.

Mun ift es zwar hier unsere Absicht nicht, um ju untersuchen, ob die Syrenen bloge Fabels thiere, oder wirkliche Creaturen find, das aber moffen wir doch berichten, daß man fich nicht nur in Solland damit trage, wie im Jahre 1403. ben Edam ein folder Fisch gefangen und nach Sar-lem gebracht worden fen, sondern daß auch wirk fich jeto im September 1775 zu Amfterdam im Baffhofe Nieuu Maltha, oder la Ville de Paris, in de Nest, ein solches Geschöpfe vorgezeiget wor. den, welches oben eine Weibsperson, und unten einen Sifch vorftellet, und über dren Schuh lang ift. Diefes Gefchopf ift im Archipelago gefangen worden, und ba einige es für ein Artefactum balten wollen, fo hat der Befiger offentlich zwen M a

#### 198 Dritte El. IV. Ordn. Gehenbe Amph.

hundert Ducaten demjenigen gebothen, ber burch Runft ein foldhes Geschopfe herstellen konnte.

Ingwischen hat der Riccer diesen befannten Mamen nicht ohne Grund dem gegenwärtigen Ges schlecht bengelegt, weil die Merkmale desselben in folgenden bestehen.

Gefchl. KenngeichenDer Körper ist zwenfüßig, geschwänzt und nackt. Die Füße dienen statt der Arme, und haben Ragel. Wären nun auch Brüste vorhanden, so müßte es, gleich den Swenen der Alten, um ter die Säugthiere, und vielleicht ben den Scekalbern stehen, allein da dieses nicht ist, da es ausserdem einen nackten Körper und einen Schwanz hat, auch in Sümpfen wohnet, so macht die Classe der Amphibien wohl den nächsten Anspruch darauf. Man hat sedoch die dahin nur folgende einzige Art entdeckt:

#### 1. Die Eibechsenstrene. Siren lacertina.

r. Eibech fensirene Lacertina.

Dieses Geschöpfe, welches in den sumpsigen Gegenden von Carolina zu House ist, wurde vom D. Garden entdeckt, und von dem Riccer Linne lange in Zweifel gezogen, ob es nicht vielmehr eine karve von einer Eidechse senn mochte, da es selbigen so ähnlich siehet. Allein die Klauen an den Borderfüßen, und die Stimme, welche die ses Thier von sich glebet, bewogen ihn doch endlich, es für ein vollfommenes Thier zu halten. Dazu kam, as D. Harden um deswillen auch auf leke terer Mennung bestund, weil er anderthalb Schuh lange Eremplare antraf, da es doch in ganz Carolina, ausser dem Erocodill, keine einzige Stechse giebet, welche eine Spanne lang ist.

Um sich nun aber einen Begrif von der mahe ren Beschaffenheit dieses Thieres ju machen, so wird

with foldes Tab. III. fig. 5. in naturlicher Große vorgestellet. Der Korper ist aalformig ohne T.III. Schuppen, und über eine Spanne, jedoch kaum fig. 5einen Schuh lang. An den Seiten zählet man wischen dem Ropfe und After auf jeder Seite vierpg Runzeln. Der Ropf siehet einem Eidechsen: topfe gleich, ist oval, nicht dicker als der Korper, and nur mit einer nackten haut bedeckt. Die zwen Angent find fehr flein, und wie an den Malen, mit ber gemeinschaftlichen Saut gebeckt. In ben Geis ten ber Schnause befinden fich zwen Masenlocher. Die Oberlippen find bunn und flein, die Riefer, devon der untere fleiner ift, werden durch die Lipe ven bedeckt. Bende Riefer, und fast ber gange Saumen, find mit einer fehr großen Anzahl fpigie ge ftharfer Zahnchen befest, die alle, wie die Spiten auf den Katenjungen, gebogen stehen, und Querreihen machen. An den Seiten des Salfes zeigen fich die Luftwertzenge, an jeder Seite namlien breng und zwar mit einer Bervorragung, welche fonft in feinem andern vollständigen Thiere fatt hat, und sich in saserie Voustanoigen Enter Defnungen dieser Werkzeuge gehen jede in die Brust hinein, Die Junge ist rund und glatt. Sleich hinter dem Kopfe, oder hinter besagten Werkzeugen, treten zwen kleine Vorderfüsse hervor, die fürzer als ber Ropf, mit fleischigen Sanddevon der auffere der furgefte ift. Jeder Finger hat feinen turgen fcharfen Dagel. Sinterfuße find gar nicht vorhanden. 3men Drittel ber Lange vom Ropfe an, zeiget fich ber After. Der Schwanz aber ift faft fo boch als ber Rorper, bod) an den Beiten gebrudt, unten und oben mit einer fiels formigen geferbten Schneibe verschen, und gehet binten nicht recht fbigig, fondern abgerundet aus.

#### 200 Dritte Cl. IV. Orbn, Gehende Amph.

Die Farbe ift braunlichblau, das Ansehen heßlich, der gedruckte Schlangenkopf gesteckt, das Maul weit, die obere Lippe schlägt über die untere hin. Die Nasenlöcher sind weit, die Augen blau-lich, die dren Angehänge der Lustwerkzeuge sehen einigermassen wie rauhe Hundsohren aus, und das Thier halt sich in Sumpfen auf. Man kann also diesem Geschöpfe mit Recht einen eigenen Plat einraumen, die sich mehrere sinden, die ihm im Naturspstem Gesellschaft leisten können.

Vierte

# Vierte Classe.

# Die Fische.

Animalia Pisces,

N 5

Dritte

### Dritte Ordnung.

## Brustbåucher.

Pisces: Thoracici.

### 158. Geschlecht. Stußköpse.

Thoracici: Coriphaena,

#### 13. Der Buntfopf. Coriphaena lineata.

er Kopf ist an diesem Fistibe gebruckt, nackt, abhängig, und mit bunten Querlinien Sund schön gezeichnet. Die Riemendeckel sind Lingalatt. Oben und unten sind zwen von einander ta. absehende, scharfe, längere, und hervorstossende Zähne vorhanden. Die Rückenstosse hat ein und wanzig Jinnen, wovon vier scharf find, die Brufts fosse eilf, die Bauchflosse sechs, und am Afrer befinden fich funfzehn. Die Schuppen find fehr groß, die Flossen, welche der Lange nach fteben, mit fleinen linien bezeichnet, und der Schwang ift abgerundet. Das Baterland ift Carolina. Line neus.

168. Dei

# 168.Geschlecht. Barschinge.

Thoracici: Perca,

A. Mit zwen unterschiedenen Ruden.

+1. a. Der Stachelbarich. Perca afper.

T.2. Stackel barfc. Afper.

En ber Beftalt balt diefer Fifch gerade das Mite No. 1. und 2. gerade als ob er aus dieser benden Begattung entstanden mare, und macht doch eine beständige Art aus. Er ist etwas bicker als der Sandbarsch, hat auch größere Augen, und file berfarbige Augenringe, welche hintenber ctmas breiter find. Die Babne find fleiner, boch vornes ber, und im untern Riefer an der Spige, find zwen größere. Der Korper ift mit etwas großen und rauben Schuppen befest. Die Farbe fommt mit dem gemeinen Barfching überein, und es zeis gen fich in die Quere feche unterbrochene Bander. Die Riemenhaut hat sieben Strahlen. Die Flose fen haben faft eben fo viel Strahlen als am Sands barfth. Damlich brengehn und bren und zwanzig in der Rudenfloffe, vierzehn in der Brufffoffe, fechs in der Bauchflosse, und funfzehn in der Schwanzfloffe. Die Rudenfloffen nehmen funf Bander auf, und haben ftarfere und dicere Strab. Er wird in der Wolga und andern benach. barten Fluffen gefangen, ftirbt aber, fo bald er nur aus dem Waffer fommt, wie der Sandbarfch. Dallas Reisen.

172. Oss

### 172. Geschlecht. Seehahne.

Thoracici: Trigla.

#### 10. Der fleine Seehahn. Trigla minuta.

liefer Rifch führer an den Bruftfloffen dren Rleiner fingerformige Fortsätze. Er war in dem Geer Linneischen Eremplar so groß als besagte Finger, Minuta und hat einen Ruden mit zwen Rielen, zwischen welchen die Ruckenfloffe verborgen liegt. Ropf ift hart, vorne ausgerandet, und gezähnelt. Bwen Spigen ragen hinter den Augen, zwen am hintertopfe, und zwen ftarte oben an ben bintern Theilen des Ropfs hervor. Die Riemendeckel bas ben bintenber einen ftarten Dorn. Die Ruckens floffen fuhren acht icharfe Finnen, die Bauchfloffen figen unter der Bruft, und find mit feche Rinnen verfeben. Die Afterfloffe zahlet bergleichen viersebn, und in der abgerundeten Schwangfloffe fter den geben, ohne diejenigen zu rechnen, die zur Seiten figen. Das Baterland ift Oftindien. Linneus.

#### 11. Der carolinische Seehahn. Trigla Carolina.

Das Eremplar des Aitters war mehr als Caroli-Finger lang, mit sehr feinen Schuppen besetzt, See-und hatte ebenfalls dren singerformige Fortsätze. bahn. Die erste Ruckenslosse hat zehen stachlige, die Carolizwente na.

#### 206 Zwente Cl. III. Orbn. Bruftbaucher.

zwente brenzehn weiche, die Bruftsosse funfzehn, die Bauchstosse sechn, die Afterstosse zwolf, und die Schwanzstosse zehn Finnen. Der Kopf ist mit sternartigen Charactern gezieret. Die Seitensinie ist einfach, und fast glatt. Der Schwanz ist ausgerandet, und die erste Ruckensinne der Länge nach mit Stacheln besetzt. Der Aufenthalt ist im Meere ben Carolina. Linneus.

*<u>Wierte</u>* 

### Bierte Ordnung.

# Bauchflosser.

Pisces: Abdominales.

### 178. Geschlecht. Salme.

Abdominales: Salmo.

A. Truttae, Buntfarbige Lacheforellen. Lache

+ 12. a. Der Melma. Salmo Nelma.

Fr wird ben ben Russen so genennet, ist der Relma. größte seiner Art, oft über zwen Ellen lang, Relma. Nelma. siberfärbig, und mit großen Schuppen besett. Der Ropf ist unter allen Salmen am meisten verseil längert, niedergedruckt, und der untere Kiefer viel länger. Das Maul ist ziemlich groß, die Schnurbartsfasern sind groß und breit. Der Augsassel ist länglich, nicht eetin, und liegt in einem siberfärbigen Ringe. Die Kiemenhaut hat zehn, die Rückenstosse Ringe Aftersosse vierzehn Stuckensteln, und der Schwanz ist gabelformig. Er wohnet in den großen Flüssen Sibtriens. Pallas Reisen.

十 12 b.

#### 208 Vierte Cl. IV. Orbn. Bauchfloffer.

#### +12. b. Der Laimen. Salmo Taimen.

22. b. Taimen.

Der Rorper ift gestreckt, fehr fett, wie die Taimen Lachsforelle No. 3. und hat eine niedergedruckte Schnaube. Der untere Riefer ift etwas langer, fie find bende mit Sactchen gegahnelt, fo wie die Bunge und ber Gaumen. Der Korper ift rund, nach bem Schwanze zu etwas gedruckt, und mit fleinen Schuppen besett. Die Seitenlinie gebet gerade, gichet fich mitten burch ben Schwang, llegt aber etwas nabe nach dem Rucken gu. Ruckenflossen find braun. Die erfte hat zwolf, Die andere brengehn, die Bruftfloffe funfzehn bis achtzehn, die Bauchflosse zehn weisse Strahlen, nebst etlichen drepectigen Angehangen. Die Afe terflosse ift fehr roth, und hat, ausser etlichen Angehangen, gehn Sinnen. Der Schwang ift gabele formig und bunfelroth. Der Rucken ift braunlich, und an den Seiten etwas filberfarbig. Der Bauch ift weiß. Ueber bem Rucken find viele braune Eropfen. Er ift hochftens anderthalbe Glen lang, wiegt zehn bis funfzehn Pfund. Er fteigt alle Riffe Sibiriens hinan, welche fich in bas Eife meer ergieffen, und liebt die fteilen Felfengegenben, wo ber Rlug am schnellften gehet. Das Rleisch ift weiß. Pallas Reisen.

#### + 12. c. Der Lenock. Salmo Lenok.

32. c. Lenoct. Lenok.

Bende Riefer, Junge und Gaumen find ges gannelt. Der obere Riefer ift etwas langer. Die Augenringe find gelblich filberfarbig, die Pupillen porneher ecfiq. Der Korper breit, bick, und mit großen Schuppen besetzt. Die Seitenlinic gehet gerade. Die Ruckenfloffen find, besonders ben ben Mannchen, geflectt. Die erfte hat zwolf, Die andere drengehn Finnen. Die Bruftfloffen find gelblich,

#### 185. Beschlicht. Bliegenbe Bische. 209

geblich, und haben fechschn; die Bauchfloffen wihlich, und führen zehn Finnen, ohne die fpieß, formig breiten Angehange zu rechnen. Die Af. teffosse ift hochroth, und mit gwolf ginnen verses hen. Der Schwang braunrothlich und gabelfore mig. Die Farbe des Fisches zichet auf einen Goldglanz, auf dem Rucken fällt diefelbe ins brauwe, und hat daselbst braune Flecken, am Bauche wer ist sie gelblich. Man trift sie häusig in den bergigen und steinigen schnellschiessenden Flüssen bes östlichen Sibirrens, insonderheit im Jenischessus an, und fängt sie vornämlich an den Wasserssällen. Sie sind höchstens eine Elle lang, und haben einweisses schmackhaftes Fleisch. Pallas Reisen.

### 185. Geschlecht. Fliegende Fische.

Abdominales: Exocoethus.

3. Der Springfisch. Exocoethus exsiliens.

In Carolina wird ein Fisch dieses Geschlechts Springs gefunden, dessen Bauchstosse bis an den fisch. Schwanz hinan reicht. Er ist der fliegenden Exkil-Wachtel No. 1. fehr abnlich, aber das Eremplar, welches ber Ritter befam, war faum langer als ein Singer. Der Körper ist nicht filberfarbig. Die Hoffen find blag, und haben ein und andere fchware kBinde. Die Ruckenfloffe halt zehn, die Brufts floffe funfzehn, die Bauchfloffe, welche, (wie an der uften angeführten Urt) mitten zwischen bem Ropfe und After anfängt, und nur ein Viertel der lange vom Schwanze entfernet ift, mit dem Ende aber m die Schwanzflosse stößt, (bergleichen nicht eine Linne Supl. 2. Q mal mal

#### 210 Vierte Cl. IV. Orbn. Bauchfloffer.

mal an der ersten Art statt findet) hat seche, die Afterstosse eilf, und die Schwanzstosse, die am unstern Lappen am langsten ist, hat zwanzig Finnen oder Strahlen. Linneus.



189. Geschlecht. Karpfen.

Abdominales: Cyprinus.

D. Gabeli Ichwani ic.

- D. Mit gabelformigem Schwanze.
- † 32. Der Bachkarpfe. Cyprinus rivularis.

32. Bach tarpfe. Rivula ris.

Ch ben fleinsten Gluffen bes entlegenen Ruß lands halt fich ein Fifch in ber Große bes Spirlings No. 11. auf, ber nicht nicht über zwen Roll lang ift, und in Ermangelung anderer Fifche, mit einem Gieb gefangen wird. Der Ropf ift ftumpf, einigermaffen vierectig, und auf bem Birbel mit zerftreueten großen tochern ausgeboblet. Der Korper ift rund, ein wenig gebruckt, und die Schuppen find taum fichtbar. Die Seis tenlinie gehet gerude, auffer daß fie nach bem Ropfe zu ein wenig in die Bobe steigt. Die Ruckenfloffe ftebet hinter dem Gleichgewichte, und bat acht Finnen. Die Bruftfloffen find abgerundet, die Bauch, und Afterfloffen haben, auf fer ben Debenfinnen, jede acht Finnen. Der Schwanz ift gabelformig, und alle Bloffen find blaffarbig, die übrige Farbe ift etwas filberartig, und mit braunen Striemen geflectt. Die Augens ringe find filberfarbig. Pallas Reisen.

Fünfte

# Fünfte Classe.

# Insecten.

Animalia Insecta.

**D** 2

Erfte

### Erste Ordnung.

### Mit ganzen Deckschilden, oder Rlügeldeden.

Insecta: Coleoptera.

189. b. Geschlecht. Rafer.

Coleoptera: Scarabaeus.

A. Das Bruftstud gehörnt.

11. a. Das Doppelhorn. Scarabaeus dichotomus.

er Korper ift mittelmäßig groß und schwarz, Doppele die Flugelbecken und das Schildlein find born. mth. Am Ropfe fist ein gerades verlangertes und fich in zwen Spigen endigendes horn, welches noch von einander getrennete gabelformige Baden hat. Das Brufffud hat oben ein furzes, zwens johniges, zuruckgebogenes scharfes Horn, welches gleichsam aus zwepen aneinander gewachsenen fpis sigen Hornern ju bestehen Scheinet. Das Batere land ift Indien. Linneus.

> D 3 11.b.Der

aebornt

#### 214 Funfte Cl. I. Orb. Mit gangen Decffd

A. Bruft gebornt

# 11. b. Der Schlüsseltrager. Scarabaeus claviger.

11.b.
Schlüß
feltres
ger.
Claviger.

Dieser indianische Käfer ist gleichfalls m telmäßig groß und roth, der Kopf ist schwar hat ein einfaches, spikiges und gerade aufsteige des Horn, welches so lang als das Bruststück i Das Bruststück aber führet ein etwas ovales ei faches zurückgebogenes Horn, welches auch t Länge des Bruststücks hat, selten aber findet ma daß dieses Horn sich in Zacken ausbreitet. T Schenkel sind gezähnelt. Linneus.

# † 11. c. Das Nielhorn. Scarabaeus polyceros.

Biele Biele born. Polyceros.

Er ist so groß, und siehet auch so aus, n ein großer Dungkafer, ist kohlschwarz, hat ab einigermassen ziegelkärbige Plügelbecken, das Za gengebiß ist breit; drenstachelich und hervorragen wie den den Zeuerschrötern, der Helm ist dre zackig, und der vördere Lappen weit vorgedehm die Spike aber, und ein kleines kegelkörmig Horn auf der Fläche, steigen in die Höhe. Duruststuck ist erhabenrund, zurückgebogen, un am Nacken zwenzahnig gehörnt. Diese Art wi im Salzsee in den Inderischen Salzsteppen Rulands gesunden. Pallas Reisen.

B. Ropf gebornt

#### B. Der Kopf gehörnt.

† 35. a. Der Ohrenfäser. Scarabaeus cephalotes.

35. a. Obrew fafer. Cepha-

Er ist etwas größer als das größte Gol hahnchen, über und über kohlschwarz, und sel glatt, doch ohne Glanz. Der Bauch ist fur D

Die Rlugeldecken fury und aneinander gewachsen, le daß fie den Sinterforper einschließen, etwas Ropf blaß gestreift. Das Bruftstud ift erhaben rund, gebornt und eben fo groß als der hinterforper, ja felbst breiter, und vorneher ausgeschnitten. Der Kopf ift febr groß, und hat vor den Augen auf benden Seiten ein horizontales Blatchen, welches ausfiebet, als ob Diefer Rafer Ohren hatte. Das Bangengebiß ift anschnlich groß, und raget fart bervor, Die rechte Scheere bavon gebet einigermaffen in imen Spiken aus, boch die linke ift bis jur Burgel gespalten. Die Fuße find sehr groß, die vordern davon start gezähnelt. Der Aufenthalt ift in ben Galgfumpfen oder Geen ber Rußischen Buften, wo sich auch das Vielborn No. 11, C. befand. Dallas Reisen.

#### +35. b. Der Schulterfafer. Scarabaeys humerofus.

Er ist so groß wie der Firteltopf No. 10. 35. b. Gauls ganz sammetartigigrun; und violetfarbig. Der helm tertafer hat hervorragende Linien, welche ein vierectiges Hume-geld einschließen, deffen Mittelpunct gehornt ift, rolus. Das Bruftfluck sticht auf benden Seiten am Ropfe bervor, und macht gleichsam breite Schultern, an ben Seiten und in ber Begend des Schildleins hat cs eingebruckte Merkmale, die Flügelbecken find greiß, und haben die Nath, desgleichen ein paar Rippen grun : violetfarbig. Er wohnet in ben asiatischen Rußland ben ber vorigen Art. Dale las Reisen.

D 4 C. Un216 Fünfte Cl. I. Orbn. Mit gangen Dedic.

C. Unge, bornte.

3

C. Ungehörnte.

88. Der Rupferfafer. Scarabaeus orichalcus.

88. Rupfer, Täfer. Orichalcus

Er ist mit einem Schilde bedeckt, hat aber feine Hervorragungen, sondern ist ganz glatt, von oben kupferglanzend, und unten rostfarbigsbunt. Das Baterland ist Ostindien. Linneus.

89. Der Goliatsfafer. Scarabaeus goliatus.

89. Soliats Fafer. Goliatus.

Unter der Linie sindet man in Africa einen Käfer von beträchtlicher Größe. Der Kopf ist schwarz, obenher incarnatfärdig, an der Spisse gabelförmig: stumpf, und an benden Seiten der Schnause mit einem stumpfen Zahn versehen. Das Bruststuck ist schwarz, und hat fünf bis sieben incarnatfärdige Linien. Das Schildlein ist auch schwarz, aber mit einer weisen Linie gezieret. Die Flügeldecken sind rostfärdig und stumpf. Die vördern Schienbeine glatt, die übrige aber unters her haarig. Linneus.

# 90. Der vierfingerige Kafer. Scarabaeus tetradactylus.

90. Bierfim geriger. Tetradactylus.

Der Körper ist schwarz, glatt und glanzend, und etwa so groß als unser gewöhnlicher Mistlasser. Das Schildlein ist halb so lang als die Flüsgelöcken, diese aber erreichen den After nicht. Die Füße haben vier Klauen, davon die aussere ein kestsissender Dorn ist, der gerade stehet, und sich nicht beweget. Die übrigen aber stehen krumm und bewegen sich. Das Baterland ist Jamaica. Linneus.

491.Der

+91. Der Rurzfuß. Scarabaeus oxypterus.

Unaes

Er ift etwas größer als ber St. Johannise \_91. der Gartenkafer. Das Bruftstuck ift langer Aurifuß oxyals an andern Baumkafern, und kaum schmaler als pterus. der hinterforper, erhaben rund und violetfarbig und grunsbunt. Die Blugelbeden find greiß mollig, und fcmaler als ber hinterlelb, am Ende gus gespitet, und flaffen. Die Striche auf felbigen, laufen in der Spige gusammen. Die Borberfuße find ungemein furg, und die Schienbeine find femmartig tief gezacht. Dallas Reisen.

#### + 92 Der Weißlingfafer. Scarabaeus albellus.

Er hat die mittlere Grofie zwischen den Puncts Beig. fåfer No. 54. und den Goldkafer No. 78. Auch ling. hat das Bruftfiud, wie ben jenen, an benden Seis Albelten einen angedruckten Dorn. Der Korper ift lus. fcmary, und die Seiten des helms haben einen breiten weissen Saum. Die Flugeldecken haben hin und wieder weiffe Querflecten. Dallas Reisen.

#### + 93. Der Frühlingefafer. Scarabaeus Vertumnus.

Große und Geffalt fommt mit bem Junius- Frab kafer No. 61. überein. Der Korper ift braun, linge. gelb-ziegelfarbig. Das Bruftftud mit einer braun, tofer. gelben Bolle befest. Das Schildlein roftfarbig, trompus wollig, ber Belm braungelberanh, und auf benden Eciten mit einem braunen eingedruckten Puncte verfeben. Ropf und Flügeldecken find dunkel zies gelfarbig. Die Glichmaffen fuhren ordentliche Biegelfarbe. Die Guhlhorner find drenblatterig, DS

#### 218 Fünfte El. I. Orb, Mit ganzen Decffc.

C. Unges hornte. und die Mannchen haben eine sechsmal größere Keule. Er ist der erste, der unter den Frühlings, insecten im April in den Gegenden, wo er zu Hause ist, zum Vorschein kommt. Sein Vater, land nämlich ist in den offenen buschigten Feldern am Samrafluß in Rußland. Pallas Reisen.

Eine etwas spätere, doch übrigens ganz ahnliche Verschiedenheit, zeiget sich oftwarts am Wolga, der aber unten und an allen Glicdmassen blaßfärbiger ist, auch ist das zotige Wesen oder die Wolle am Bruststuck und am Schildlein blasser, desgleichen auch der Helm, hat aber einen ziegelfärbigen dreneckigen Flecken, und die einges druckten Puncte sind auch ziegelfärbig. Pallas Reisen.

94. Weiffe

Rafer.

Albus.

#### + 94. Der weisse Rafer. Scarabaeus albus.

Er halt die Mittelgroße zwischen ben Juliuse kafer No. 57. und ben Maykafer No. 60. hat aber bie Beftalt bes erfteren, nur mochte er etwas langer fenn. Die Mannchen haben auch an ihren Bublhörnern fieben große Blatter. Der gange Korper, das Bruftstuck, die Plugeldecken und die Rufe find alle miteinander mit den allerfleinften weissen Schieferchen befest, als ob sie mit Debl bestreuet maren, und wenn man biefe Schieferchen herunterreibet, fo fommt eine Pechfarbe jum Borschein, die auch auf Ziegelfarbe ziehet. Borzüge lich ift der Bauch weiß, und das Bruftftud, wie auch die vordern Schenkel, find mit einer weissen Wolle besetzt. Diese Art streift des Rachts herum, und kommt nach der Mitte des Junius in den südlichen Gegenden am Irris und Jait jung Borschein. Dallas Reisen.

+95. Der

189. b. Geschlecht, Kafer. 219 C. † 95. Der Spierlingskafer. Scarabaeus Unger Spireae.

Er ist der kleinste unter den Baumkäfern, Spier, mot kaum so groß als ein mittelmäßiges Gold, lings hähnchen, hat aber die Geskalt des Sr. Johan, kafer. niskäfers No. 79. Der Körper und das Brust, Spiresklick sind schwarz, und etwas welßwollig. Die Flügeldecken sind greiß, an der Nath und am Nande braun, zartwollig, und ein wenig kürzer als der Unterleib. Die Füße sind pechigsschwarz, Man bekommt ihn im Man und Junio in verschies denen Blumen und besonders in den Thierpslanzen, selten am Wolga, aber mehr in den sibirischen zeldern zu sehen. Pallas Reisen.

### 

### 196. Geschlecht. Tobtengraber.

Coleoptera: Sylpha.

36. Carolinischer Tobtengraber. Silpha Carolina.

36. Carolis nifcher Tobtens graber. Carolina.

Trope, Gestalt und Farbe kommt ganzlich mie ben Bisamkafern No. 2. überein, denn er ist schwarz, der Kopf ist gleichfalls schwarz, oben auf benden Seiten mit einer ausgegrabenen Linie versehen, die Fühlhörner aber haben rostfärbige Keulen. Das Bruststuck ist etwas zirkelformig und erhaben rund, sonsten glatt, und hat einen sehr dunnen Rand. Die Flügeldecken sind nur halb so lang als der Körper, abgestust, und an der Wurzel und ben der Spise mit einer rostsärzbigen halbmondsörmigen Linie bezeichnet. Der Bauch und die Füße sind auch schwarz. Das Waterland ist Carolina. Linneus.

### 198. Geschlecht. Sonnenkafer.

Coleoptera: Coccinella.

A. Die Flügeldeden roth oder gelb mit schwarzen Pumeten.

+ 31. a. Der Augenfäser. Coccinella ocellata.

Tr ist der größte unter den europäischen. Das Augen, Schild ist schwarz, und hat einen gedoppels ten Schildslecken, und jede mit fünf weissen Punschen Diese werden durch den vördern lata. weissen Rand miteinander verbunden. Der Wirsbel des Kopfs ist schwarz, und hat zwen weisse Puncte. Die Flügeldecken sind roch mit schwarzen Puncten, welche mit einem blassen Kreiß umges ben sind. Der erste davon, an den Achseln, ist der größte, von da folgen auf jeder Flügeldecke zwen Reihen mit sechs Puncten, und der achte Punct ist an der Spize verloschen.

Es giebt auch eine kleinere Verschiedenheit, mit blassen Fleden statt der Augen, das einzige Auge an der Schulter ausgenommen. Der Aufenthalt ist in den Tannenwäldern Sibiriens, wo ein gemäßigtes Elima besindlich ist. Pallas Reisen.

十31.b.

A. 222 Fünfte El. I. Ord. Mit ganzen Ded A. Banzenfrautkäfer. Coccin cimicifugae.

21. b. Er ist etwas größer als der Zwehpunct Now Wanzen Der Wirbel hat ein weisses Feld. Das Stafer. ist schwarz, und an den Vörderecken weiß. Cimici- Flügelbecken sind roth, und haben an der Wisses. Plügelbecken sind roth, und haben an der Wisses eine gemeinschaftliche Vinde, die nicht bis an Nand gehet. Jede Decke hat zweh langliche Officken die schwarz sind, und einen weissen Paben. Man sindet diese Art häusig in den pseln des Wanzenkrauts. Pallas Reisen.

C. Rothge C. Die Flügeldecken schwarz mit rotifiedie. Klecken.

+ 47. a. Der Mengelfäser. Coccinel axyridis.

47. 2. Mengel Káfer. Axyri-

Er ist größer als der Siebenpunct No. und ist schwarz. Der Rand des hinterkörpere roth. Der Ropf führet auf dem Wirbel ei halbmondförmigen weissen Flecken. Das Schift an den Seiten weiß. Die Flügeldecken ha sechs etwas große scharlachfärbige Flecken, die Fünfeck stehen, und wovon der letzte der geöist. Die Flügel sind braun. Diese Art halt in dem sibirischen Mengelkraut um Jeni häusig auf. Pallas Reisen.

### 199. Geschlecht. Goldhähnchen.

Coleoptera: Chrysomela.

E. Langgedehnte.

Langges debnte.

123. Das Enlinderhähnen. Chrysomela paracenthesis.

In Portugall wird eine nicht fehr große Art Enlin gefunden, welche obenher über den Glügels berbeeten gang gelb ift. Das Bruftftuct ift fcmarge babm bunt, uber die Glugelbecken lauft ein fcmarger chen. Strich, der gleichweitig mit der Ruckennath fort Paralaufe, boch etwas furger als die Flugeldecken ift, fis. und ausserhalb dieser Linie stehen dren schwarze Puncte in die Lange. Die Füße sind ziegelfärbig, und auf jeder Hufte besindet sich auch ein schwarzer Rlecken. Linneus.

#### 124. Das Ziegelhähnchen. Chrysomela lusitanica.

Nach zeiget fich in Portugall ein langliches Biegele gang ziegelfarbiges Sahnchen, dessen Kopf, Bruft, bahn find und Fuße schwarz find, der aber übrigens Lusitaviele Achnlichkeit mit bem Drenzahn No. 73. hat. nion. Linneus.

224 Funfte El. I. Orb. Mit ganzen Dedich.

.F Ber fichieber nt.

F. Berschiedene Rugische.

#### + 125. Der Langarm. Chrysomela longimana.

125. Lang. arm. Longimana.

Diefes Goldhahnchen ift größer und langlie ther als der Schwarzpunct No. 76. und das Bruftfind ift auch breiter. Ropf, Bruft, Bauch und Das fleine Schildlein find schwarz. Bruftftuct- ift ziegelfarbig greiß, und hat einen verloschenen braunen Strich. Die Blugelbeden find blaggreiß, und haben mitten auf der Rlache einen großen Punct, und an den Achseln einen fleineren, bende von schwarzer Farbe. Dic Fuhle borner find turg, und das Gelente am Grunditud ift hockeria, und ziegelfarbig, die übrigen find schwarz und niedergedruckt, so daß das Fuhlhorn sageformig erscheinet. Die Fuße find ziegelfars big, haben schwarze Gelenke, doch find die Fuße fohlen braun. Die Borderfuße find wohl um die Helfte langer als die übrigen. Diese Art ist in ben füblichen Gegenden am Wolga, und am Jait gefunden worden. Dallas Reisen.

#### + 126. Das Strauchmelbenhahnchen. Chrysomela atraphaxidis.

126. Strand melden bábn den. Atraphaxidis.

Dieses Sahnchen hat viele Aehulichkeit mit dem Blaufleck No. 77. Der Körper, wie auch ber Ropf und bie Schenkel find schwarz. Schienbeine und Jufmurgel find ziegelfarbig. Der Bauch ift wollig-grau. Das Bruftftuck scharlache roth, und hat einen großen ichwarzen Bleden, welcher mit bem Schildlein ein Dreneck macht, an jedem Ect aber befindet fich noch ein schwarzer Punct. Die Flügeldecken find auch scharlachroth, und haben an den Schultern einen langlichen fchwar:

#### 199 Beidlecht. Golbhanden. 225

Moarzen Dunct, übrigens befindet fich noch auf ber flache und hintenber ein Schwarzer Querpunct. Ber-Eilichen mangelt der Bleden am Bruftfiud, oder ichiebes die dren fleimen Puncte. Dan trift diefe Art bau-Mim Julio an der Gerauchmelde, oder dem ftrauch migen Begetritt in den sublichen Sandfelbern m Irtis an. Dallas Reifen.

#### †127. Das Mesculaphahnchen. Chrysomela Asclepiadea.

Es kommt mit dem Quertengrashahnchen Meftus No. 24. in der Größe überein, nur ist es in den laphahn ifflichen Gegenden fleiner. Es ift über und über chen. ganzendeduntelblau. Die Fühlhorner find schwarz. Alcle-Das Brufffud bat gerftreuete Poren, und bie Piades Blugelbecken find reihenweise durchstochen, so bag, benn man bas Infect nur ein wenig angreift, gleich aus jedem Punct ein Tropflein des reinften Debls bervordringt, welches einen Scharfen Beshmad hat, und die Oberfläche gleichsam mit Perls den befest. Man hat sie am Wolga an ber Schwalbenwurz klein, aber am Jetis zu Ende des Junii sehr häufig an der Aesculappflanze ger funden. Dallas Reisen.

#### † 128. Das Wermuthhahnchen. Chrylomela Asinthii.

Es ist dem Reinfarrenbahnchen No. f. 250 for abnlich, aber nur fleiner. Der Ropf ift greiß, muth hoch find die Augen, der Wirbet und die Fühlhors babme forwarz. Die Bruft ift braun, der Bauch chen. liegelfarb und wollig weißgrau. Die Buße find Alinthit liegelfarbig, aber die Knie und Fußwurzel braun. Das Schild ift etwas flach, blag greiß, und hat einen schwarzen fast zwenmal unterbrochenen Quers Linne Guol. 2. ftrid.

#### 226 Funfte Cl. I. Ord. Mit gangen Dedich.

F. Berichteber He. strich. Die Flügelbecken sind gleichfals blaßgreißetwas flach, gerandet, und mit dren schwarzen Abern bezeichnet, welche hinten in der Spise zusamment laufen. Die Weibchen haben einen sehr aufgetriesbenen schwarz geringelten Bauch, und viel turzere Flügeldecken, doch sind die Mannchen viel häustiger, und werden im Julio in den südlichen, bers gigen, und trockenen Gegenden am Irtis in dem gemeinen Wermuth häusig gefunden. Pallis Retsen.

# +129. Das Abonishahnchen. Chrysomela Adonidis.

t29. Moonis háhn chen. Adonidis.

Es halt sich in der Frühlings-Adonispstanze auf, und lebt davon, wird also im Monat Man sehr häusig am Wolga gesunden. Gestalt und Größe kommt mit dem Rragentrager No. 37. überein. Der Kopf ist blaßroth, das Maul aber und die Augen, desgleichen ein Punct auf dem Wirbel sind schwarz. Das Schild ist in der Mitte schwarz, an den Seiten blaßroth, mit einem schwarz zen Punct. Die Flügeldecken sind gleichfalls blaßzroth, aber die Nathe sind alle schwarz. Biele has den auch eine schafte läuft, jedoch die Spille nicht erreicht. Die Flügel sind braum. Pallas Reissen.

#### † 130. Das assatische Sahnchen. Chrysomela assatica.

130. Afiatis fches. Aliatis

Dieses Bahnchen ist so groß als ber Juniusse kafer, (Geschl. 189. b. No. 61.) etwas oval, und mit einem etwas kugelformigen Brufistucke vers seben.

### 199. Sefcilicht. Goldhahnchen, 227

sehen. Der Korper und die Juße sind grun verguldet, das Bruststuck ist etwas dunkler, der Kopf kupferfarbig. Die Flügeldecken sind ein wenig poliret, und violetartig schwarz. Die Juhls hörner sind fadenformig. Die Borderfuße ein wenig langer als die übrigen. Diese Art ist in der Indersee gefunden worden. Pallas Reisen.

P 2

200, **G**ti

## 200. Geschlecht. Dornkafer.

nicht in Coleoptera: Hispa.

### 5. Der Bluthals. Hispa sanguinicollis.

Slute fchlechts, hat aber keine Dornen, und ist und Sangui- bewasnet. Die Gestalt ist länglich, und die Farbe nicollis. schwarz. Die Juhlhorner sind fadenförmig, länd ger als das Bruststuck, und vorwerts gestreckt. Das Bruststuck selbst ist ganz blutfärdig roth. Die Flügeldeden haben der Länge nach dren die vier Rippen, und zwischen selgen seigen sich ausgehöhlte Puncte. Die Spize ist rauh. Die Wurgel aber, so wie die Brust, jedoch ungleich roth. Das Vaterland ist Indien. Linneus.

### 202, Beschlicht. Rustelkäfer.

Coleoptera: Curculio,

#### A. Langidnabel mit einfachen oder dun gang fanábel. nen Schenkeln.

#### 40. a. Der Colonfafer. Curculio Colon.

Der Körper ist mittlerer Größe, länglich, mäus 40.2. Colon sefarbig. Das Bruftstut hat an benden täfer. Seiten eine weisse Linie. Jede Flügeldecke führet Colon, in der Mitte einen weissen Punct. Die Borber. fchentel find unter ber Spine taum mertlich gejahnelt. Das Baterland ift Europa. Linneus. Schafer Icones Tab. 155. fig. 2.

#### 40. b. Der Pflüger. Curculio arator.

Er ift fo groß wie eine Bange, hat einen Pfliger. brannen Rugel, feulformige Rublhorner mit zwen Arator. fnotigen Belenten, und braune ungegahnelte gufe. Ein brannes Bruftftuck mit bren ziegelfarbigen Lis nien, und ziegelfarbige Rlugeldecken, welche eine gemeinschaftliche ichwarze gezähnelte Math, und men bis bren unterbrochene Striche haben. Aufenthalt ift ben uns in den Kornabren. neus.

40. c. Der **D** 3

230 Fünfte Cl. I. Orb. Mit ganzen Dedic.

A. Zang. fcbnábel

40, c. Der Rleefafer. Curculio Trifolii.

40. C. Rice.

Er ift oben toblichwarz, hat blaffe Schenkel, einen fcneeweiffen Bauch, geftreifte Blugelbeden, Trifolii ein grubig punctirtes Bruftstud, und einen Rus fel, ber fast langer als bas Bruftftud ift, ieboch ift der ganze Kafer nicht größer als ein Blob. Der Aufenthalt ift im Bergelee, wo fich das Infect in ben Aehren entwickelt. Linneus.

#### + 40. d. Der Momas. Curculio Nomas.

40. d. Momas. Nomas

Er ift von ben größten feines Geschlechts, langlich und geflügelt. Der Rugel ift lang, dich, und cplindrifch, an der Spige aber dunner. ganze Bruftftuct ift stachelicherauh, und hat sowohl in ber Mitte, als an benden Seiten der Lange nach einen weissen Strich. Die Blugelbecken find gleichsam weiß bethauet, und mit Punctftrichen gefurcht. Untenber ift ber Korper wollig weiß, und am Bauche schimmern schwarze Puncte von unterschiedener Große, reihenweise, mit einem Glanze hervor. Die Juge find weiß, aber unger gahnelt. Er halt sich hausig in der Buften ohne weit dem Indersee auf. Dallas Reisen.

#### Babn. schentel.

C. Langschnäbel mit gezähnelten Schenfeln.

### 67. a. Schwertelfäfer. Curculio Ireos.

Er hat die Geftalt des Braunmurileders Schwer No. 61. ift aber mohl brenmal großer. Der gange teltafer. Korper ift meiß. Der Rufel, ber Wirbel und lreos. ein großer weißpunctirter zwenlappiger Flecken find fcmarglich, das übrige ift alles braunlichgelb. Rlugelbecken find von nämlicher Farbe, in die Quere

Quere weiß bandiret, an benden Seiten gegahnelt, m ber Burgel mit zwen fleinen, und an der Spige Babn.
mit großeren Puncten befest. Die Knie an ben ichenkel. Rufen haben einen schwarzen Ring, und bas auf fere ber Schienbeine, wie auch ber untere Ruf find schwärzlich. Diese Art halt sich auf ber falgi-gen Jris auf, und naget die Sproffen an, welche bon den Larven ausgefressen werden. Dallas Reisen.

#### +67. b. Der Rreuttrager, Curculio crucifer.

Er ist den Braunwurzleder No. 1. sehr abn. Rreut. lich, und nur etwas mehr oval, unten gelbliche trager. afchgrau, und mit einer glanzenden Wolle befest; Crucioben braun, nad auf den Rlugeldecken, die an der fer-Spite braun find, in die Quere mit einem gemein, fcaftlichen weiffen Rreut bezeichnet. Die Schentel find alle gezähnelt. Man hat fie häufig in bem entlegenen Aufland an der blubenden Bundezuns ge angetroffen. Dallas Reisen.

#### F. Rurzichnabel mit ungezähnelten Schen E. feln.

fchnäbel

#### +96.a. Der Candidat. Curculio candidatus.

Er ist einer mit von den größten und geflus Candis gelt. Sein Rufel ift furz und oval. Das Bruft, bat. fruct hat ber lange nach einen weissen freißformis Candigen Fleden. Die Blugelbeden find fo mit Bleden datus. befprenge, bag fie bavon gang weiß aussehen, und Die Brifchenraumchen find braunsgestreift. Untens ber ift er nebft ben Buffen weiß. Die Schenfel find ungezähnelt. Man findet diesen sehr häufig an dem Indersee. Pallas Reisen.

P 4 于96.b. 232 Funfte Cl. I. Orb. Mit gamen Dedfc.

Rury + 96, b. Der gemahlte Käfer. Curculio pictus.

oc. b. Er ist gestügelt, kleiner als der vorige, schön, mablter weiß, und kommt selten vor. Der Schnabel isk Rafer. kurz. Das Bruststuck hat der känge nach drem braune kinien, und auf den Flügelbecken liegt eine hrauner gemeinschaftlicher Bogen. Pallas Reis.

+96. c. Der Pedrugel. Curculio piceus.

Bechrå, Er siehet dem Palmbohrer No. 1. schr Bel. gleich, ift aber viermal kleiner und kohlschwarz. Piceus. Die Flügeldecken sind so lang als der Körper. Dallas Reisen.

† 96. d. Der weisse Rüßelfäser. Curculio Inderiensis.

Beisser und ist untenher braun gestreift. Die Flügeldes Küsel tafer. Inderientis. Das Bruststud rauh, und auf benden Seiten mix einer Spige gewasnet. Die Flügeldecken haben tiefpunctirte Striche, und braune sandige Sprenskel. Dallas Reisen.

96. e. Der Bargenfafer. Curculio singularis.

Warzen von mittlerer Größe, hat keulformige Schenkel, tafer. und kommt aus Portugall. Das sonderbare an laris. demselben bestehet in den Wärzchen, womit die Flügeldecken besetzt sind. Sie sind nämlich sehr glatt gestreift, und die Streisen bestehen aus lauster Reihen ausgehöhler Puncte, die aber in der Mitte

#### 202. Gefdiecht. Ruftelfafer. 233

Mitte wiederum einen aschgrauen erhabenen Punet fibren, und baber undenflich fleinen Bargchen Rurg ibnlich feben. Linneus.

#### 96. f. Der Rielfafer. Curculio carinatus.

Er ift ichwarz, einigermassen furzschnäbelich, Rieltas bat ein etwas fielformiges Bruftftuct, ift dem Carinse Scanzofen No. 88. ziemlich ahnlich, nur daß er tus. viermal fleiner ift, und fommt auch aus Porrus gall. Das Bruftftud ift abgerundet, und mit ensgehöhlten Puncten ungleich punctiret. Mugelbecten find bichte mit hervorragungen befett und machen'smen bis bren Eden. Linneus.

#### 96. g. Der Stachelkafer. Curculio scabriculus.

Der Korper ift nicht größer als eine laus, Stacheb efchgrau, und hat einen runden hinterforper. tafer. Die Flügelbeden find mit fehr furgen, wie Stachel Beabriin die Sohe ftehenden Burften befest, welche rei, culus. benweise auf erhabenen linien fteben. Der Rus fel ift fury, und die Schenkel glatt ohne Bahnchen. Das Baterland ift Danemart. Linneus.

Meane Me

## 203. Geschlecht. Bastardrüßelkäser.

Coleoptera: Attelabus.

+14. Der Altvater. Attelabus senex.

Mitvas ter. Senex. Fr ist kleiner als der Jäger No. 8. über und über kohlschwarz, diet doch slüchtig mit Wolle besetzt, welche auch schwarz ist, und nur am Kopf und an der Brust weißgrau aussiehet. Das Weibe chen hat die Hinterfüße groß und gekrümmet. Die Fühlhörner sind nach aussen zu kaum etwas dieter, das Bruststück aber ist kugelformig. Pallas Reisen.

# † 15. Der Unbestand. Attelabus polymorphus.

Unbes stand. Polymorphus.

Er ist kaum so groß als der Bienenfresser No. 10. ganz und gar schwarz, und mit einer schwarzen Wolle besetzt. Die Flügelbecken sind etwas gedruckt, abgerundet und biegsam, haben an der Wurzel einen ovalen Flecken, an der Nath zwen wellenformige Querbinden, die ben einigen zusammen sließen. Eine gewisse Verschiedenheit hat greise Flügeldecken, an deren Wurzel ein langer Flecken, sedann am aussern Rande sich erst ein, dann zwen, und nach der Spisse zu dren schwarze Puncte besinden, der Rand der Flügeldecken ist schwarz. Dieses Naturspiel aussert sich beständig, und man sindet sie in verschiedenen Blumen am Wolga. Pallas Reisen.

+ 16. Der

## 203 Beidecht. Befrarbrüßellafer. 235

#### † 16. Der Zwepfled. Attelabus bimaculatus.

Er ist länglicher als der vorige, doch nur halb 3mep, b größ, über und über schwarz blau, glänzend sieck. mb mit einem braunen wolligen Wesen besetzt. Bimaide Flügeldecke hat einen unformlichen Flecken, culatus. der braunzgelb, etwas länglich, und inwendig nach der Spike zu besindlich ist. Diese Art wird oft in der Lupbordienblürde angetrossen. Pallas Reisen.

204. Ott

## 204. Geschlecht. Bockfafer.

Coleoptera: Cerambyx.

Mit bes weglis chen Dornen

#### A. Die Bruft zur Seiten mit beweglichen Dornen besetzt.

2, a. Der Ziegelbock. Cerambyx Lusitanus.

2. 3. Biegel bod. Lufitznus.

Sas Bruststuck hat au benden Seiten einen sehr kleinen Stachel. Die Fühlhörner sind roststädig, und ein wenig länger als der Körper. Der game Körper ist, nebst den Füßen, ziegelfärbig, und die Flügeldeden haben in der Mitte eine blasse linienartige abweichende verloschene Binde. Er kommt aus Portugall, und ist nicht größer als eine Mücke. Linneus.

#### 2. b. Der Rostbock. Cerambyx balteus.

2. b. Rost.
Rost.
bod.

Ein anderer Bocklafer, der auch aus Porsbod.

Rugall kommt, und ebenfalls nicht größer als eine Balteus Mücke ist, unterscheidet sich von der vorigen Art dadusch, daß er ganz rostfärbig ist. An jeder Seite des Bruststücks besindet sich auch ein ganz kleiner Darm, und das Bruststück selbst ist etwas dunkelfärbiger. Der hinterkörper ist höckerigsoval und stumpf, und die rostfärbigen Flügeldecken has ben in der Mitte eine weite schwarze Binde, dessen hinterster Rand weiß und abgebogen ist. Die Fühlhörner sind kaum etwas långer als der Körper.

Linneus.

2, c. Der

## 204 Befchicht. Bodfafet. 237 A.

## 2, c. Der Riefenbod, Cerambyx gigentens, megte

Das Bruftftud ift glatt, niedergebruckt, und an den Seiten mir dren scharfen Dornen verfeben. Diefe Der Rorper ift fchmary, eine Sandbreit lang, und bott. wen Boll breit. Die Riefer find halbmonbformig, Gigantagen lang hervor, und haben an der innern Geis teus. te jeber einen Bahn. Die Bublhorner find fdwary, web nur halb fo lang als ber Korper. Die Fluerbecten find roftfarbig und frumpf. Die Buf. fohlen find untenher gleichfalls roftfarbig. Man but Diefe Art in Cajenne augetroffen. Linneus.

#### B, Die Bruft jur Geiten mit einem gezähnelten Rande.

B. Dit ges 1abnel tem Manbe.

## 17. a. Det Pirfchgeweißbod. Cerambyk damicornis.

Er tann als eine Betfchiedenhelt bon bem Dirfiche Sirfchhod No. 3. hetrachtet merben. Der Kor: gewentige eine Dandbreit lang und braun. Die Fuhle bort. porner find bon mittelmäßiger Lange, Die Gill, Dami-gelbecten ftumpf, das Bruftftud ungleich, geran cornis. belt, und gekerbet, und hintenher mit Ecken juges friet. Der Ropf ift vorwarts gefreckte Die bervorragenden Riefer find langer als der Ropf, fes gelformig, jugespitt, an der innern Geite aber ber Burgel, und ber andere an der Spine befinds Bic ift, übrigens aber glatt. Man trift diefe Art Mamaica an, und die Edrve wird von den Gins wohnern als Wurft jum Zugemuße gegeffen, und fell febr fimachaft fenn.

C. Mit

238 Fünfte Cl. I. Deb. Mit gangen Dedich.

Mit' Filibent dornie Bruft febilde.

C. Mit runden, an den Seiten dornt aem Bruftschilde.

51. a. Das Muscusbodlein. fuaveoleus.

51.2. lein. Suaveoleus.

Das Brufffuct ift bornig, und blaulich feuers cusbod, roth, ober gologlangend. Der Korper ift blau, und gestaltet wie bas Biefambocflein No. 34. Der Unterleib und die Schenkel find roftfarbige roth, bie hinterschenkel langer als bie porbern, gedruckt, und zwenschneidig. Die Füße schwarz, Die Rlugelbeden himmelblau, und Die Bublhorner so lang ets ber Korper und schwang. Das Baters land ift Jamaica und Carolina. Linneus.

#### 51 b Derafricanifche Bock. Ceramby xafer.

51. b. Mirica nifeber Bod. Afer.

री कारण

Der Körper ift etwa einen Boll lang, grun, und glanzend. Die enge Nath der Flugesbecken ift gelb, die Bacten am Bruftfchilbe find flein, die Rublhorner ziemlich lang, und, nebft bent Ruffen braungelb. Der Aufenthalt ift in 2 Linneus.

#### Cerambyx + 51. c. Der Sugholzbock. Glicyrrhizae. In members me

51, C. **CILL** boliboct Glicyrrhizae.

Er hat die Gestalt des Zußtnechts No. gr. ist aber ofters größer. Die Fühlhörner, und ben etlichen auch ber gange Ropf find pechichmars. Die Buffe ziegelfarbig, und weiß bethauet. Der Kor-per untenher fchwarz, und weiß bestänbet. Der Wirbel und bas Bruftftud führen benbe ein fohls schwarzes weißeingefaßtes Feld, und mitten durch gebet eine schneeweiffe tinie, die über die Math ber Rlugel Augelbecken durchsett. Sonft find die Rlugels C. becken fehr schwarz ohne Glanz, auswendig fielfor. Die rundem mig, und jede mit zwen weisen Binden und einer bornis time ber Lange nach gezieret. Ben etlichen ift bie gem meife Barbe etwas matt, und die Blugelbeden von Bruft bem fcwarzen Ruden als mit Fliegendreck ber foilber fcmutt. Er hat feine Flugel. Der Aufenthalt ik in den heissesten Sandwusten zwischen dem Jaik und Ireis, wo er fich im Suffholz erhalt, von deffen Wurzeln vielleicht seine Larve lebt. Dallas Reiten

#### +51. d. Der Robinbod. Cerambyx halodendri.

Auf ber Robinia halodendri am Jrtis hate gi.d. fich noch eine Art Bodtafer auf, welche mit bem Robins Roblersbock No. 50, nahe verwandt, aber nur Halofleiner ift. Er ift gang schwarz, und mit ausges dendri. boblten Puncten befest. Das Bruftftud ift mit einem weiffen wolligen Befen belegt, und führet auf benden Seiten eine verloschene spigige Ede. Die Flügeldeden find ichwarz, und haben den duß fern Rand roth, besgleichen befindet fich noch an der Burgel ben ber Math ein ovaler rother Gleden. Dallas Reisen.

#### +51.e. Der Rielbod. Ceramby x carinatus.

Er siehet aus wie der Schlotseger No. 43. 51.e. ift aber drenmal größer, langlicher, ganz schwarz, Rielbeck glat und glanzend. Die Buhlhorner find bict, tus. und kurzer ale der Korper. Der Kopf hat eine Spalte oder Furche, welche der Lange nach bis über das Bruftftud unvermerkt ausläuft. Bruftftuck ift auf jeder Seite mit einem fegelfor, migen Soder besetzt. Die Flügeldecken fiten an cinander

#### 240 Funfte El. I. Orb. Mit gamen Detfic.

einander feft, find etwas rauh, ftumpf, und auss mendig burch einen Riel der Lange nach frumpfrectig. Rlugel find nicht vorhanden. Man trift ihn au Anfang bes Fruhlings in ben Gebuichen an bane Wolga an, und lieget mehrentheils auf ber Erbe unbeweglich. Dallas Reifen.

·D. Mit co. lindrifc mnaer Dorntem Pruft. fcbilde.

#### D. Das Bruftschild eplindrisch und ohne Dornen.

## 63, a. Der Punttbod. Cerambyx pundatus.

63. 2. Dunct Bod. tus.

. 10.

Er fiehet faft aus wie der Stiegenbott No. 57. ift aber gang grun, und mit fchmargen Puncten bes Pande fest, bavon auf bem Bruftftud acht, und auf jeder Bligeldede fechs fteben, auch hat der Sinters leib an benden Seiten seine Schwarzen Puncte. Die Fuhlhorner find fo lang als der Korper, und bas Brufiftud ift unbewafnet. Er fommt aus Portugall. Linneus.

#### 63. b. Der drenlienige Bod. Cerambyn trilineatus.

63. b. Drene Trilineatus.

Der Rorper ift einigermaffen enlindrisch und Das Bruftschild vollkommen cylirts lieniger. roftfarbig. brifd, glatt, und ber lange nach mit bren weiffen Linien gezieret. Die Flugelbeden find am Ende Bugefpist. und die Dath ift gleichsam mit einer weissen Linie gezähnelt Der Seitenrand hat ebens falls eine solche meiffe Linie, die nach innen zu gleichsam geferbet ift. Die Bublhorner find lans ger als ber Korper, und die Belenke haben gwen Dornen. Das Baterland ift Jamaica. Line nells.

+63.c.

#### 204. Weldleckt. Bockfafer.

+ 63. c. Der Bilberbock. : Cerambyx hieroglyphicus.

Et hat die Beftalt bes Stelegenbocks Na. 55. fdilbe. und ift nur größer. Unten ift die garbe blauliche weißgrau. Die Sufe find mit einem blauen Stanbe Bilber. befest, auch find die Bublhorner blau, und mit Amarzen Ringeln gezieret. Ropf und Bruft find febr wollig, und führen jede ein langliches fchwar cus. jes Beld, wogu noch auf bem Bruffftud an feber Seite ein schwarzer Punct kommt. Die Flügels decken sind glatt und schwarz, die Rath blauliche weiß, und giebt auf benden Seiten funf stumpfe Aestchen ab, davon die ersten zwen, und der lette quer laufen, ber britte mit geboppelter Burgel vorwerts gebogen, ber vierte aber guruckgebogen ift. Auffen herum fiehen noch funf Duncte vertheilt, und diefes jafammen macht gleichfam eine biero. glyphische Bilberzeichnung aus. Man trift bice fen Bockfafer in den Waldern des nordlichen Sibiriens an. Dallas Reisen.

#### + 63. d. Der burchbohrte Bockfafer. Cerambyx perforatus.

Er hat die Große und Gestalt ber vorigen Art, t oben weißlich bestänbe, untet wolligegelb. Die bobrter Rublborner find blaulich, und fcmary geringelt. Boctice Das Bruftftud ift fchwarz punctirt, und hat auf ferberben Seiten einen schwarzen Bug. Die Flügelbeden find weiß bepudert, und haben von der Schulter bis zur Mitte chenfalls oinen schwarzen Bug ober linie, von bem Rucken aber an, ber lange nach, funf fehr schwarze Puncte, welche wie tocher erscheinen. Ein einziger Punct fieher ensserhalb der Schulterlinic. Man trife ihn da Linne Gupl. 23.

241 Miten lindrifc unger borntem Bruft

> 61. C. boct. Hiero-

242 Fünfte El. I. Orb. Mit gangen Dedich. an, wo ber vorige ber ift, aber nur feltener. Pallas Reisen.

E. Mit rundem Bruft Schilde.

E. Das Bruffdildungebornt und rund.

+84. DerBlumenbod. Cerambyx floralis.

84. Blumen bock. Floralis

Er ist größer als der Bogenstrich unter den weichen solzböcken. (Siehe sten Theil pag. 289.) Untenher ist der ganze Körder schön citrons färdig. Die Juhlhörner und Juße sind ziegelfärzig, und mit einem weißgräuen Graube bereift, Der Kopf ist gelb geringelt. Das Brusssuch hat einen breiten gelben Gurtel. Die Flügeldecken sind sthwarz, und haben schöne gelbe Querbinden, Die erste ist bogig, die dren andern sind auf verschiedene Art wellenformig gekrummet. Die Spike der Flügeldecken ist auch gelb. Das Bruststuck giebt einen knifternden kaut. Man trift ihn in den Blumen, besonders in den Berg keukojen, und zwar sehr häusig in dem stüdlicken Gegenden am Jaik und Irtis an. Pallas Reisen.

SA A SA P

g 😉 - 🖫 Hopel & Hillion of the Co. Coleoptera: Leptura.

A. Die Brust enformig, die Flügelde-.12 ... den abgeftugt.

Mit en. formigem Bruft

1. a. Der Rojenbott. Leptura violacea.

r ist so groß wie der Wasserschwimmer No. 1. Kopf und Brustskiel And etwas Basserglans end fcmary. Die Flügelbeden ziemlich breis und Viola. Bletebling der Umerleib blutrothyumb bie Sige can d filmligt. Er wird haufig in den Llocdroal. been Stilliens in ben Nofen und Blumenbolben actunden. Dattor Relien. 12 1 fil die

1. ä. Rolew

B. Die Bruft erhaben rund, die Flügel Das decten Aumofe-

Bruft HùŒ rund.

3. Der fleine Scheck. Leptura Massiliensis,

Aus Marfeille, besgleichen aus Portugal wird ein weicher Solzbott gebracht, welcher bem Riciner Scheck No. 18. fehr ahnlich, aber brenmal fleis Coed. ner als derfelbe, und gang schwarz ist. Das Maili-Brufffid ift einigermaffen rund, die Blügeldeden find mit bren an der Borderfeite gehrochenen linienartigen Querbinden bezeichnet, (fo wie ohne gefebr -(49) (2) [1]

## 244 Funfte Cl. I. Orbn. Mit gangen Dedich.

gefehr der Wioder No.23. Taber die Binden find weiß, und die lette davon, die sich an der Spige der Flügeldecken befindet, fast verloschen. Unter dem Soule find dem Borffftig seiget soll and eine weiser Flecken, desgleichen suhren auch die Eins schnitte des Sinterkorpers an den Seiten einen weisen Rand. Linneus.

## 209. Geschlecht. Springkafer.

Coleoptera: Klater.

39. Der Desellschafter. Eigter gesallt.
Grift benuty so gress wie dese Roperassisses Gesells Din Innaue sind die Fuhlheiner und der Socia- Vaterland ist Portugall Fluster. inschnie

## B. Die Bereft erhaben mande die Bilgebeden finnere-

3. Det flet : Sheff. Lego as Mellilo

dies Markille, versie der der eine der

#### 210. Geschlecht. Sandläufer.

Coleoptera: Cicindela.

## 7 15. Der Mildrand. Cicindela lacteolai

Gr hat die Große und ben Glaus wie ber Laue Milde fer No. 2. Die Flugelbecken aber fund mit rand. einem breiten milchig-weissen Mande umgeben. Das Lafteomittlere Reld ift etwas jurudgebogen, und braun: la. lichegrun vergoldet. Man hat ihn aus dem Inderfee befommen. Pallas Reisen.

#### + 16. Der Trauerrock. Gicindela atrata.

Er hat die Große und Gestalt des Post Trauer. Enechts No. 4. ist aber über und über schwarz ohne rock. Blang. Gein Aufenthalt ift ben ber vorigen Art. Atrata-Er wird aber baufiger gefunden. Dallas Reisen.

#### +17. Das Beigmaul. Cicindela coerulea.

Er hat die Größe des Waldjägers No. 8. Beiff, Das Maul ist (wie zwar ben den andern auch) maul. weiß. Uchrigens ist der ganze Körper mit samt Coeruden Gliedern ungesteckt dunkelblau, mit einem lea. Seibenglange, nur ift er unten und an den Sugen etwas wollig. Man hat auch Berschiedenheiten, von violetfarbig-fchwarzer, ober auch gang fchwar-zer Farbe. Man findet ihn in den fudlichen Sand. wuften am Jrtis fehr haufig, er ift fehr fluche tig, fo wie das gange Geschlecht, und lebt lediglich vem Raube. Pallas Reisen. + 18. Der 311.56  $\Omega$  3

Digitized by Google

# 246 Funfte Cl. I. Orb. Mit gangen Dedic. + 18. Der Schmalbauch. Cicindela gracilis.

18. Echmal bauch. Gracilis.

Er ist ein wenig kleiner, als der Postknecke No. 4. und schmächtiger als alle seine Brüder. Die Farbe ist braunschwarz, und etwas kupferig, besonders auf dem Rücken. Die Flügeldecken has ben zwen weisse Puncte am Rande, und ein grosses ovales gemeinschaftliches Feld, welches gegene den Asterzu röthlich ist. Die Füße sind sehr laug und dunn. Er wird auch in den Sandselberre Rußlands am Schulba gefunden. Pallas Reisen.

Land to the state of the Contract of the Contr

รู้ เกาะหา้าหลายได้กระการและ กรุ่งเลยการหาวการและ และกระการและ การการและ เพราะที่ (การการการการและ กระการที่ (การการการที่ (การการการที่ (การการการที่ (การการการที่ (การการก การการเลยการเลยการและ (การการการที่ (การที่ (การการการการที่ (การที่ (การที่ (การการที่ (การที่ (การที่ (การท

2011.201十二

At the Page Little mouth. Collected according to the following section of the collected section

Committee of the Commit

com Mante. Pallace test, ac-

ξ 🗘 211. Ste

#### 211. Geschlecht. Stinkkafer.

Coleoptera: Buprestis.

## A. Mit bauchigen Flugelbeden.

Car I was

2. a. Der Golbbauch. Buprestis aurata.

In Portugall halt sich ein kleiner langlicher Stinklafer auf, den untenher recht schon wie Gold glanget. Die Stirn ift grunlich, das Brufte find fatt goldglangend, aber nur mit zwen ichwara jen breiten Linfen bezeichnet. Die Flugelbecken find braun, und haben faur eine Spuhr von Gold. Die Bubliorner find fomary und etwas fageformic Linneus.

Bezáb.

B. Die Schilde an den Spipen gezähnelt.

& a. Der gedruckte Stinffafer. Bupreftis Ded. depressus.

Er hat die Große wie ber Marilander No.6. Ropf und Bruft find tupferfarbig, und lettere eingebruckt punctiret, und auf ber Blache platt gebrudt. Die Flügelbecken find an der Spige ein tafer. wenig fageformig gegahnelt, roftfarbig tupferglansend, und mit einigen erhabenen Strichen befest, swifchen welchen jebesmal noch zwen Reihen einges grabener Puncte ffehen: Die Bublhorner find fupferfarbig schwarz. Untenher ift der gange Rore per, famt ben Sufen, tupferglangend blau. Der Auf. Q 4

Erbab. ne Dects faibe.

Golde bauch.

bridter Gtint Depref-

schilde.

248 Funfte Cl. I. Ord. Mit ganzen Decffc. Aufenthalt diefes Rafers ift in America. Zirneus.

C. Glatt, ránde.

C. Glattrande.

+ 30. a. Der Bargenftinfer. Bupreftis variolaris.

30. 3. ftinfer. Variolaris.

Er hat die Größe eines gewöhnlichen Mare Barjen Pafers, und ift etwas größer als bas Bileften. schild No. 12. fiehet auch so aus, und ift gang und gar fcmary mit einem Rupferglange. Das Bruffftuct, welches vorzüglich schwarz ift, hat ber tange nach eine Rungel Der Glügelbedent find taufa punctirt, mit ungleichen Greisformigen Belberte befest, und wollig, nicht aber mit Burftenbuichelie wie No. 12. verschen. Die Borderfüße find lana ger als die übrigen. Er ift in bem Inderfee gestunden morden; Gerr Pallas aber hat ihn aus Indien und den füblichen Theilen von Africa britte gen feben. Dallas Reisen.

#### . +31. Der tartarifche Stinffafer Bupreftis tatarica.

**Satarl** fder Ctinf. fafer. Tatarica.

Er wird hochstens so groß als der Marilan-der No. 6. ist aber kurger, dicker und stumpfer als affe feine Bruder. Untenher ift er kupferig und glatt, chen schwärzer. Das Bruftstud ift. furzer, und mehr ungleicher als an andern. Die Flügelbeden find faum geftreift, glatt, auswena big mit einer Binde, und einem Striche, der mit. bem Rande parallel lauft, eingedruckt, und wollig ift, verfeben, fo bald man aber das wollige Befen berunter thut, kommt der Goldglang bervor. Pale las Reisen.

+ 32. Der

1. 1. 2x Ly Be fiftecht: Stinffafer. ? 249

† 32. Der Golbruden. Bapreftis aurata, Glatherinde.

Er hat die Größe der Jeuergluth No. 3. ist 32. wer breiter. Der Körper ist gologenn. glanzend. Golde Die Flügeldecken sind stumpf, haben einen glatten rucken. Rand, find kupfergrun und mit zehn Strichen be: Aurata fest. Die Fühlhorner sind kaum langer als das Bruffftud, und die Schlenbeine find edig. Er mobnet in den südlichen Gegenden am Jait und Wolga, und wird selten gefunden. Pallas Reisen

+33. Das Mahlerschild. Buprestis picte.

Er ift fast so groß als das Gleckenschild 33. No. 2. aber breiter, und hintenher etwas spissiger. Mablen Rerper und Bruft find glanzend tupferfarbig. Die Picia, Blageldeden violetfarbigeschwarz, und mie in Orde nung gesetten gelblichen Fleden bemahlet, Deme in der Burgel befinden fich dreh Puncte und ein Alecten, die faft meinander fließen, bann folget an der Rath ein fast vierediger Punct in der Mitte, und ein Meiner am Dande, endlich fioch zwen Puncie an der Spite, die halbmondformig zusammen-geflossen find. Mantsfinder ihn ben ben Blumen. in den fühlichen Gegenden am Jait. Pallas

 $\mathbb{R}_{p_{i}} = \mathbb{R}_{p_{i}} \otimes \mathbb{Q} \otimes \mathbb{R}_{p_{i}} \otimes \mathbb{Q} \otimes \mathbb{R}_{p_{i}} \otimes \mathbb{Q}$ 

## 213. Geschlecht. Erbfafer.

Coleoptera: Carabus,

## Rleine. B. Rleine.

44. Der Zwenfleck. Carabus bimaculatus.

44. Swep. Aect. Bimaculatus

.:1: '

Fr ift von mittlerer Größe und schwarz. Die Fühlhomer und Jüße sind ziegelfarbig. Der Ropf etwas gelblich, und auf dem Wirbel schwarz. Das Bruststuck ist an den Seiten gelblich, sonst aber schwarz. Die Flügeldecken sind schwarz, gestreift, und etwas spikig erhaben. In der Mitte haben sie eine gelbe, wellenformige Binde, welche die Nath nicht erreicht, und an der Wurzel sieher nach dem aussern Rande zu ein gelber, Flecken. Das Vaterland ist nicht bekannt. Linneus,

#### + 45. Der Randfafer. Carabus marginatus.

45. Sands Kafer Margi Natus.

Er ist unter ben mittelmäßigen noch ber größe te, unten schwarz mit ziegelfarbigen Jugen, oben buntelgrun, und wenig glanzend. Die Flügelbecken sind gestreift, und am Seitenrande greißs gelb. Er erscheinet nicht selten am Inderses, Pallas Reisen.

#### + 46. Der Edfled. Carabus pictus.

45. Edfleck, Pictus.

Er ist nur von mittelmäßiger Größe, und sehr platt gedruckt. Das Bruststuck ist viel schmäsler als der Körper, ziegelfärbigsroth. Der Kopf und

#### 251 Cangusifficht? Etfliftr. 251

und die Fühlhörner sind ziegestarbig. Der Bauch sehst den Füßen blaß, greiß. Die Flügelbecken sind breit und stumpf, sein gestreift, greiß, und an der Rath schwärzlich, so daß in der Micke ein ectiges Feld, das gleichsam ein Kreuß vorstellet, und auf verschiedene Art ben einzelnen Eremplaren szeichnet ist, übrig bleibt. Man sindet ihn nicht keten in den heisselsen Feldern unter ausgedörrten weten Körpern stecken. Pallas Reisen.

in the second of 
## Chimilate to Base Action

214 90

## 214. Geschlecht. Mehlkafer.

Coleoptera; Tenebrio.

A. Geftür gelte.

#### A. Geflügelte.

#### 13. a. Der Flüchtling. Tenebrio festinans.

13.2. Fluchts ling. Feltirians. In Schweden ist ein geflügelter Mehlkäfer in der Größe einer kaus bekannt worden, welscher ungemein schnell lauft, und darum obige Namen führet. Er ist kohlschwarz und glatt. Das Bruststuck ist wie an den Sandläufern des 210ten Geschlechts gestaltet und rostfärbig. Die Fühlhörner sind fadenförmig, an der Spise etwas die der und braun rostfärbig. Die Schenkel sind keulformig, und die Schienbeine rostfärbig. Lindneus.

#### 13. b. Der Wollfuß Tenebrio lanipes.

13. b. South full. Lanipes.

Der Körper ist mittelmäßiger Größe, hat die Gestalt eines Erdkäfers, ist oben kupferfärbig, und unten pechig. Die Juhlhörner sind sadensörs mig, und um die Helfte kurzer als der Körper. Das Bruststuck ist gerändelt. Die Flügelbecken sind gestreift, und haben eine stumpse Spize. Unter dieser Spize ist der Nand nach innen zu erweitert, und hat gleichsam eine kleine Nebenspize. Es sind auch Flügel vorhanden. Alle Jußsohlen, besonders die mittlere, sind unten rauf.

### The Beldfedt C. Melitifen & 222

rich ... Er halt fich in verwachfenen Begenben in Carolina ans Linneus:

B. Ungeflügeite.

ton in harris Unger

+ 34. Die Weiffcrift. Tenebrio leucogrammus.

Er hat teine Blugel, ift schwarz und glans Beife send, evalformig, unten hockerig, und hat die schrift. Größe und Gestalt des Stachelschildes No. 17. gram-Das Bruftschild ist durch erhabene Puncte vor: mus. malich rauh, und ber Rand ber Schultern ift medergebogen. Die Flugeldecken find aneinander gewachfen, an benden Geiten fielformig, jede mit funf glatten Strichen verschen, welche an ber Burgel oder an der Spige nur mit einem faub. ober wolligen Wesen überzogen find, wo hingegen ber 3mifchenraum mit erhabenen Puncten befest ift. Die Borderschienbeine find etwas breit, und auswendig gezähnelt. In den sidlichen Gegens ben am Jrtis wird er haufig gefunden. Dallas Reifen.

#### + 35. Der Erdmehlfafer. Tenebrio buprestoides,

Er hat die Große des Rafers, welchen man Erd ben Graber nennet, und in feinem Befchlecht mebl. bie 31ste Art ausmacht, (siehe im fünften Theil tafer. pag. 67.) ist oval, niedergedruckt, ungefligelt, stoides. schwarz und glatt. Das Bruftschild ist erhaben: rund, etwas breiter als ber Korper, und an ben-ben Seiten, mit einem großen Rande verfchen, und faum merflich punctiret. Die Flugelbecken 13,712

#### 254 gunfte Cl. I. Orb. Mitgangur Detfic.

ind anxindider betwachsen, sehr glatt Aund hims ten etwas spissig. Die Schienbeiner sind nornehde etwas gedruckt, und am aussern Rande gezähnelt. Er halt sich im Flugsand am Jreis auf, und zwar in den Traganchausen, welche er burche grabt. Pallas Reisen.

្នានជាមានខ្លួនការ

# i 35. Der ell inchlager. Canebrio

That die Uniferde das des des first viel in 12 and des first viel in 12

## 215. Geschlecht. Mankafer.

Coleoptera: Meloe.

B. Geflügelte, mit Flügeldecken, so lang mit als der Körver.

Elügeln

17. Der Schwarzfafer. Meloe gouani.

In Grantreich zeiget fich ein fleiner ichwarzet Rafer diefes Geschlechts, welcher nicht größer faier las eine kaus ifte Die Jublhorner find kettenartig Gouent, eber wie eine Perlenschnur. Das Bruftfind gleiche fam gegliebert mit niebergebogenen Seiten, und fcmary blaulich. Die Glügelberfen find schwarz und haben in bet Mitte eine breite rothe Quers binde , besgleichen find auch die Spipen roth. Der Roof fenket fich ein wenig. Lingeus,

+ 18. Der Rothfopf. Meloe erythro. cephalus.

Ceine Große und Gestalt kommit mit ben bes lanuten spanischen Fliegen No. 3. überein. Er ift topf. sben schwarz, unten weißgrau. Der Ropf ift Eryroth, aber die Augen, ein Fleck auf dem Wirbel, throce-des Maul und die Fuhlhörner sind schwarz. Die phalus. Flügelbeden find gleichfalls fdwarz, aber Die Dath, der Seitenrand, und ein in der Mitte ber tange nach gestrecktes Band find blaulich weiß, Diese Art wird hin und wieder am Wolga in den Blumen angerroffen, Pallas Beisen. + 19. Der

256 Funfte El. L. Drd. Mit gangen Dedich.

+ 19 Der Senfterfafer. Meloe feneftrata.

Renfter. fafer. Fene. strata.

B.

Unges flugelle.

Er hat die Geffalt der St. Johannisflie. gen. Erin Rorber ift mittelmäßig groß, gans und gar glatt, und blaß-ziegelfarbig. Das Bruft. fluct ift niedergebruckt. Die Blugelberten find greiß, an der Spige ichwars, und jede hat zwen vierectige Blecken, welche gleichsam wie Benfter aussehen. Die Sublhorner find fabenfarmigebunn, and nebft ben Binterfugen braun, dus ben Rien ber Buße schwiget ihm. ein wohlischendes Del. Er wird mit ber vorigen Art am Wolga gefunden. De Comerce de Medice grant

+20, Der Dierfled, Meloe quadrimaculate

Rier. Rediic Quatrimaculata.

in der Brefe und Geffalt ferimt et ganglich mit ber vorigen ilberein. Er ift schwarz und glatte und nur an der Bruft wollig. Die Flügelderteis fint greifigelb, und jede mit zwen fchwarzen Fice efen verscheit. Etlide haben auch tleine vieredige Rieden', und Die andern erfcheinen utwas verlos fthen. Die Bufthorner fur fabenformig. , Deb Ropf ift niedergebogen, und aus bem Anten bot Bufe fcmiget ihm ein wohlriechendes Del wie am Der vorigen Art. Dallas Reifen.

121. Der Mayboch Melog necydalea.

Map Bra. Necvdalea.

Er ift der verigen Art so ziemlich afnitie ber Kopf aber, und die Bruft find schmaler! Die begen ausgenommen, melde hechroch, unb ermas fürger als ber Sintertorper find. 3hre Enben find etwas spisig, und welchen voneinander ab-Erliche haben an ber Spige nicht einen braument Punct. Diese Art hat mit den zwen vorigen eines len Eigenschaft, bag tot namlid die bett Rinfell auch ein

### 215. Befolect. Manfafer. 257

ein wohlriechendes Dehl beraus schwigt. Pallas B. Reisen.

Klügeln

#### + 22. Der Sibirier. Meloe Sibirica.

Er ift langlich und etwas rund, am ganzen Cibi. Rorper schwarz und glatt, aber ohne vielen Glanz, rier. ibrigens der sogenannten spanischen gliege Sibiri-Bruftftud ziemlich unterschieden, und roth, hat aber boch schwarze Augen und Juhlhorner. Die Blugelbecken find an der Spige abgerundet, und haben einen weissen Saum. Die Weibchen haben fabenformige Sublhorner. Ben den Mannchen aber find die mittlern Gelenke von bren bis fieben fach, und vorwerts in einem Bahnchen gedehnt, baber fie in der Mitte breiter find, und einer Gage chulich fehen. Sie halten fich haufenmeise in den fibirifden Relbern am Schotenflee und Tragant auf. Dallas Reisen.

#### + 23. Der Waldrebenfafer. Meloe Clematides.

Er siebet der spanischen Fliege No. 3. voll: 23. tommen abnisch. Es zweiselt aber Herr Pallas rebens der nicht etwasber Algierer No. 11. senn möchte. faser. Er ift gang und gar mit einem dunnen wolligen Clema-Wesen bedeckt. Kopf, Brust und Glieder sind tides. glanzend, stahlsarbig schwatz. Die Flügelbecken sind ungemein weich, blaß, oder greiß ziegelfarbig, und besonders ist an der Brust eine längere weisse Wolle besindlich. Die Fühlhorner sind fas benformig, nub ber Aufenthalt ift in ben offlichen Gegenden am Jrris, wo man ihn nur allein in ben Baldreben antrift. Pallas Reifen.

Linte Gupl. B.

R

+ 24. Det

## 258 Funfte Cl. I. Orb. Mit gangen Dedich.

B. Mit Klugeln

+ 24. Der Drenband. Meloe trifascis.

24. Drens band. Trifalcis. Er ist so groß wie der Kronenkafer No. 12. siehet aber so aus, wie der Cichorienkafer No. 5. Die Juhlhörner sind einigermassen keulförmig. Der Körper ist ganz grunlich stabsfarbig, mit einem Seidenglanze und weisprolligen Wesen besteckt. Die Flügelbeden sind blassgreiß, und der Länge nach jede mit einem grunlichsschwarzen Bande, und dergleichen gemeinschaftlichem Bande, wels wes über die Nath hinläuft, besett. Das mittles re Band hat gleichsam am Ende ein Köpschen, die Seitenbander aber laufen jede mitten über eine Flügelbecke hin, und erreichen die Spisse nicht, sliessen aber oft mit dem mittlern zusammen. Er wird in den sublichen Gegenden ohnweit dem caspis sehen Meere gefunden. Pallas Reisen.

#### + 25. Das Manauge. Meloe ocellata.

25. Mansauge. Ocellas ta.

Die Gestalt ist, wie ben der vorigen Art besschaffen, doch in der Größe übertrift er jenem zwens mal. Der Körper ist schwarz, und mit einer greis sen Wolle besett. Die Füße sind ziegelfärbig. Kopf und Bruststuck ziehen mit ihrer greisen Wolle etwas aufs gelbliche. Die Flügelbecken sind blaßsgreißigelblich, und haben schwarze, mit einem blaßen Hofe umzogene Puncte, zwischen diesen Augen aber ist die Farbe wolkigs braunlich. Auf jeder Plügelbecke besinden sich von den besagten Puncten dren Paare, wovon die aussern, am Ende, die größten sind. Man hat ihn mit der vorigen Art in den nämlichen Gegenden ohnweit dem caspischen Meere gefunden. Er ist aber seltener. Pallas Reisen.

+ 26. Det

#### + 26. Der Rosentafer. Meloe festiva.

B. Wit Flügeln

Er ist größer als der vorige, und länger als 26. der Cichorienkäser No. 3. auch viel glätter, und Rosen, weit schöner. Die Fühlhörner sind dunn, schoch käser. ein wenig verdickt. Kopf, Bruststück und Körper festivation glänzendblau, schwarz, aber mit einer braunen Bolle überzogen. Die Flügeldecken sind etwas gedruckt, bald ganz scharlacheroth, bald ziegelfärzbig, und mit blausschwarzen Flecken gezieret. Auf jeder Flügeldecke besindet sich ein dergleichen längslicher Flecken, an der Wurzel, auf der Schulter und auf der Nath ein runder, sodann lausen in der Mitte dren Flecken ineinander, und an der Spize, die mit einem schwarzen Rande eingefasset ist, stehen noch zwen dergleichen Flecken.

Es giebt von dieser Art noch eine Berschies benheit, die sich durch Begattung und sonst beständig erhält. Sie ist wohl um die helfte kleiner, und mehr rund. Die Farbe auf den Flügeldecken ist viel röther, und nur an der Nath etwas blaßsfärbiger. Sie hat größere Flecken, die aber mehrentheils ineinander fließen, und mit dem fast schwarzen Rande der Flügeldecken zusammen hängen.

Bende diese Berschiedenheiten werden durchseinander und häufig in den sublichen Gegenden am Jrtis, aber am meisten in der Robinpflanze gefunden, jedoch halten sie sich auch in den Rosens Tragant : und Sußholzbluthen auf. Pallas Reisen.

#### + 27. Der gelbe Manfafer. Meloe lutea.

Er ist oft fast so groß als der Sprier No. 4. Gelbes schwarz, und mit Wolle bedeckt. Die Flügelde: Man, den sind etwas gedruckt und bauchig, von hoch, tafer. gelber Farbe. Jeder sühret dren Paar schwarze Lutea. Ra

#### 260 Kunfte El. I. Ord. Mit ganzen Deckico.

В. Mit Klugeln

Duncte, die in der Mitte zuweilen in einen Querflecken zusammen fliessen. Go wenigstens ift er am freis beschaffen, die größten aber fommen aus ben Buften am Jait, und bie haben nur an bet Burgel zwen deutlich auseinander ftebende Puncte, die andern zwen Paare aber find ineinander geflossen. Dallas Reisen.

#### + 28. Der geschwärzte Mankafer. Meloe atrata.

Er ist fast fo groß als der obige Dreyband fcmary No. 24. fiehet aber wie die vorige Art aus, ift fehr schwarz, auch fogar mit ber Bolle, und glangend. Die Flugelbecken haben an ber Spige eine wellenformige gelbe Binde, und bergleichen Bles Die Bublhorner find ein wenig feulformig. Sie werden haufig im Onysfraut und Chrenpreiß. bluthen gefunden, besonders aber bor der Bluthe

in den Waldreben.

Merfmurdig ift es, daß auch diefe, nebft den vier vorhergehenden Arten, aus den Rnien ein wohlriechendes Dehl schwigen, so wie wir foldes von No. 19, 20. und 21. auch angezeiget baben. Dallas Reisen.

#### + 29. Der uralische Mankafer. Meloc Uralentis.

29. Mralb fcber. ſis.

Er ift oft nicht größer als eine Saussliege, Uralen- gang schwarg, wenig glangend, jeboch glatt, und hat die Gestalt des Zwitterkafers No. 1. aber mit langeren, glatten, auswendig fielformigen Blugelbeden, und einem breitern Ropfe verfeben. Die Fuhlhorner find ben den Beibehen somobl als Mannchen fadenformig, boch haben lettere großes re Suße als die erstern. Er zeiget fich gleich im

### 217. Sefdlect. Raubfafer. 261

Anfange des Frublings noch vor den 3wittertafer, und ift mit letterem ben gangen Aprill durch baufig in den uralischen Geburgen. Pallas Reifen.



## 217. Geschlecht. Raubkafer.

Coleoptera: Staphylinus.

A. Große.

Broffe.

47.a Der tartarifche Rauber. Staphylinus tataricus.

Fr ift unter ben europäischen ber größte, aber Larta slatt. Der Kopf ist oval, und breiter als das Tatari-Bruftftud. Das Zangengebiß ift febr groß und cus. einfach. Das Bruftftud ift chlindrift rund, bie Flügeldecken find fein punetiret, die Farbe ift über und über schwarz und glanzend, die Flügel aber find weißlich. Es wird diese Art an dem salzigen Inderfee in ber tartarifchen Bufte gefunden. Dallas Reisen.

218. Ses R 3

## 218. Geschlecht. Ohrwurmer.

Coleoptera: Forficula.

+3. Der Ufer Ohrwurm, Forficula riparia.

3. Ufer Obre wurm. RipaGrift noch einmal so groß, als der Große No.1. blaßgreiß, und etwas weich. Das Brustsind ist gerändelt, und hat der Länge nach zwen braune Binden, welche über die Flügeldecken, und die unter selbigen hervorragende Flügelspissen durch seinen. Der Kopf hat braune Augen, und ist auf dem Wirbel ziegelfärdig. Der hinterförper ist in der Mitte braun. Der leste King desselben ist groß, hart, blaß greiß, und am hintern Rande zwischen den Scheren zwenzahnig. Diese Scheren sind ziemlich gerade, spisig, an der Spise brauns lich, und haben nach der Mitte zu ein einziges Zähnchen. Die Füße und Fühlhörner sind sehr blaß. Man trift ihn an jähen Sandusern an, und wird er besonders am Irtis häusig gefunden, wo er is Horizontalgängen steckt. Pallas Reisen.

Ivente

## Zwente Ordnung. Mit halben Klügeldecken.

Insecta: Hemiptera.

219. Geschlecht. Rackerlacken.

Hemiptera: Blatta.

#### +11. Der affatifche Raderlad. Blatta Asiatica.

r ist größer als der Deutsche No. 9. und Milatte langlich. Die Blugelbecken, famt ben Blus fcher geln, sind langer als der Unterleib, und Kaders am Ende schmal. Die Farbe ist über und über lack. Greiß. Das Bruftschild führet der kange nach ca. gren fcmarge gleden. Das En ift plattgebruckt, an benden Seiten abgestußt, und hat zwen fielformige Rathe. Diese Art ift aus dem stidlichen Aften nach Sibirien gekommen, und halt fich in den Saufern auf. Dallas Reifen.

R 4

220, 90%

## 220. Geschlecht. Gespenstfafer.

Hemiptera: Mantis,

## † 15. Das Federhorn. Mantis pennicornis.

Hebers Born. Penniearnis. lein No. 4. sehr überein. Der Wirbel ist auch mit einem kegelsörmigen, aber kleineren Dorn, der so lang wie der Kopf ist, bewasnet. Die Fühlhörner sind enge gesedert, linienartig, und blaßigreiß. Die Füße sind gelblicht grun, und daben braun geringelt. Die Schenkel des zwenten und dritten Paares sind mit einem hervorstechenden tappen, so wie das Zipperlein No. 4. versehen. Er kommt, wiewohl selten, in den südlichen Wiesen, nach dem caspischen Meere zu, vor. Pale las Reisen.

#### † 16. Der Kurzslügel, Mantis brachyptera,

Turi: Ruri: Rugel. Brashypte Ta Er ift in allen Stücken größer, bieter und stärfer als das Bethpfäschen No. 6. doch wohnet er mit selbigem zusammen. Das Bruststück ist am ganzen Rande sehr gezähnelt. Der ganze Körper ist aschgrau. Die Fisse und Plugel braun gewölft, und lettere an den Erwachsenen dennoch mehr als die Helfte kürzer, als der hinterkörper, aber doch nicht, wie ben den karven, unvolltommen, som bern

#### 220. Befdlecht. Gefpenftfafer. 265

dem ganz entwickelt, welches sowohl ben den Mannchen als Weibchen statt hat. Der hins terforper ist der lange nach mit kleinen weiße lichen Linien zierlich gestreift. Man trift ihn in den heissesten Salz, und Sandsteppen am Jutis sehr häusig an, wo er über der Erde auf den Rauh berum läuft. Am Jaik aber ist er schon seltener. Dallas Reisen.

97 5

221. Se

## 221. Seschlecht. Graßhüpfer.

Hemyptera: Gryllus.

A. Spite Topfe.

2. 2. Spadels topf.
Oxce-phalus.

A. Spissopfe. Acridæ.

†. 2. a. Der Spadelfopf. Gryllus oxycephalus.

r ist der Langnase No. 1. sehr ähnlich. Det Ropf ift vor ben Augen mit einer fpabelformis gen Spite verfeben, und binter ben Augen befindet fich ber lange nach ein greifgelber Strich. Die Rublhorner find linienartig, Diefformig-flach. Die Karbe bes Korpers und ber Flugelbeden giebet aus Lettere find einem mattegrunen in bas blaggreiße. langer als ber hinterforper, und haben zuweilen einen ftriemenartig unterbrochenen braunen Strich. Die Blugel felbft find langlich, schwachgelb und an dem Umfange gang glafartig. ift viel groffer ale das Mannchen. Das Weibchen Man findet ibn in den füdlichen'Steppen, besonders im Aus guft, zwischen bem Guffolz haufig herumstreifen. Pallas Reisen.

C. Mit green Schwang barften. 15. a. Land: ftreicher

C. Mit zwen Schwanzbursten. Achetæ.

† 15. a. Der Landstreicher. Gryllus desertus.

Er ist der Saußgrolle No. 12. sehr abnlich, aber schmächtiger und gang schwarz, ausgenome men,

men, baf bie Schenkel etwas ziegelformig ausses ben. Die Blugelbeden find fo lang, als ber Sinteforper, negartig geabert, und ein wenig burch. fichtig. Die Flugel felbst find glafartig, langer als der Dinterleib, und spisig. Das Schwerb am Beibeben ift fo lang als das gange Infect, dunn, linienartig , und an ber Spite ein wenig feulfore Die Schwanzburften und hinterschenkel mia. find verhaltnismäßig ziemlich groß. Er halt fich in ben sublichen Buften am Jaick, wo bie gelo. grylle mangelt, auf. Pallas Reisen.

#### D. Sabelheuschrecken. Tettigoniae.

† 34 a. Der Stengel. Gryllus pedo. fcpre.

Er ift vom Ropfe bis jur aufferften Spige des Sabels vierthalbe Boll lang, und nur einen Bes Stenach berfiel dic, wenn namlich das En nicht aufge Podo. schwollen ist. Der Kopf hat einen gedehnten Wir, bel, ist kegelformig, und an der Spise mit Fuhl. bienern, an den Seiten aber mit Augen verfes ben. Die Ruhlhörner sind burftenartig, und faft fo lang als der Korper. Die Bruft ift schmaler als der hinterleib, rund, und an jeder Seite mit einer weißen Falte gefaumet. Auch haben Die ers fien zwen Pangerringe des Hinterforpers an jeder Scite der Lange nach eine Rungel, als ob es Spus un von Flügeln maren, die jedoch ganglich maneln. Der hinterforper ift geschwollen colindrisch, an After zwenhörnig, und mit einem ziemlich gestaden Gabel verfehen, der fehr fpitig, und fast fo lang als ber hinterleib ift. Die hinterfuße find langer als die übrigen , fehr bunn , an den Schenfeln zwenfach , und an den Schienbeinen vierfach gezähnelt. Die vier Borberfüße find fürzer, aber farter, an ben Schenfeln und Schienbeinen uns tenher

Cábel

đen.

Digitized by Google

#### 268 Fünfte Cl. II. Orb. Mit halben Flügelb.

D. Sábel beu fchree cen. tenher doppelt gezackt, und an der Burzel mit zwen Spigen versehen. Zwischen allen Füssen sitzet an der Brust ein gedoppelter Stachel, der zwischen den Hinterfüßen am meisten klaft. hinter den Borz derfüßen befindet sich auch noch an jeder Seire ein sehr weites Luftloch. Das ganze Insect ist weich, ausgenommen den Sabel und die Füße. Die Farzbe ist oben blaßgrun, unten weißlich. Die Eper dieses Insects sind länglich, und so groß wie Das berkörner. Pallas Reisen.

# † 34. b. Die Laxmannigenste. Gryllus Laxmanni.

34. 2. Lar, manns, grolle. Laxmanni.

Dieses wunderbare Insect, welches das Mittel zwischen ben Spinkopfen, Sochnacken und Sabelbeuschrecken halt, ift zuerft vom Berrn Profefor Larmann am Samara und in Sibis rien gefunden. Die Suffe haben bas Berhaltnif wie an den Seldgryllen, ohnerachtet das Infect dicker und furger ift, und den Sochnacken mehr ähnlich fiehet. Das Bruftftud ift vieredig, febr rauh, oben flach, und hinten in ein halb ovales Schild gedehnet, am Rande gezähnelt. Auf dem Rucen des Bruftschildes find zwen halbmondfors mige Eindrucke, und hinten ein gedoppeltes gerandeltes Grubchen. Der hinterforper ift oval, Das Weibchen aber führet am Schmange einen geras ben , linienformigen vierflappigten Gabel, wie dies ienigen, die in der dritten Abtheilung fteben. Auch haben die Beibchen weber Flugel noch Flugeldecken. Die Mannchen hingegen haben ber lange nach am Schilde ovale, in der Mitte ftrichweise geaderte, und fnifternde Spuren von Glügeln, so wie an ber Seldgrylle. Die Farbe ift braun, doch an den Seiten bes Bruftschildes oft etwas afcharau, auf ben

## 221. Befchlecht. Grafbupfer. 269

bem Ruten aber befinden fich ichwärzlichere brens edige Felder. Die Mannchen sind mehrentheils gröffer als die Beibchen. Larmann. Pallas Reifen.

#### E. Benschrecken. Locustæ.

+ 62. Die rauhe Beuschrecke. Gryllus foremuricatus.

Er ift oft größer als der Africaner No. 50. aber auch dicker und fürzer als berfelbe. Das Raube Bruftftuc ift diet, funfectig, schwach gefielt, und Deugang grubigrauh, hintenher in ein rundes Schilb schrecke. ausgedehnt, und an der Wurzel auf benden Seiten Muri-burch einen Socker rauh, oben aber mit einem dren, catus. jadigen Ramme verfeben.

Der Kopf ist narbigrauh. Die Bruft breit und wollig. Die vier Borderfuße find einfach und Die Schenkel ber lange nach ausgekehlt, Die Schen. fel ber hinderfuße aber find ovalelangenformig mit einem Scharfen Rande, und von auffen mit Dornen verfeben, nach ber innern Geite zu aber glatt, aus bem violetfarbigen purpurartig gewolft. Die Flus geldeden find fo lang als ber hinterforper. Flügel haben eine blaßgelbe Farbe, einen braunen gefrummten Bogen, und braune Abern, find aber jenseit der bogenformigen Binde glafartig durche fichtig. Die Farbe des Insects ift verschieden, bald wolfig-bestäubt , bald aschgrau-braun, greiß, weißgrau, ja oft weiß und schwarz marmorirt. Die Bublhorner sind fadenformig und blaß. Man trift ihn nicht selten auf den trockenen hügeln in den groffen, besonders jenseit dem Jaick gelegenen Buften, an. Pallas Reisen.

† 63.Die

#### 270 Funfte El. II. Ord. Mit halben Blugeld.

E. † 63. Die sibirische Heuschrecke. Locuste sibiricus.

63. Sibirio fce Peus fcprece Sibiricus.

Diese Art wird hin und wieder in den grafiger Gegenden Sibiriens gefunden, und ist das Weib den der vorigen Art, aber etwas grösser als das Mannchen, hat die Borderfüsse einfach und nicht feulformig, siehet aber in Farbe und Gestalt den Mannchen ahnlich. Pallas Reisen.

#### † 64. Der Rothflugel. Locusta miniatus.

64. Roth: fiugel. Miniatus. Grösse und Gestalt komme mit dem Schwarzband No. 44. überein. Die Jatbe ist etwas blaf ser, die Fleden auf den Flügeln sind deutlicher, und die Flügel haben auch am Ende einen schwarzen Bogen, hinter welchen die glaßartigdurchsichtige Spise hervorsticht. Innerhalb den Bogen aber sind sie ganz Mennigroth. Man höret ihn im Fluge kaum knistern. Eine rare Berschiedenheit hat hinten auf dem Bruststud einen weissen herzsörmigen Fleden, und eine andere ist vorne am Bruststud braun, hinten aber blaßgreiß. Man sindet sie im August sehr häusig in den südlichen Salzsteppen am Jaick. Pallas Reisen.

# † 65. Der Buntflügel. Gryllus va-

65. Punt flügel. Variabilis. Es fommt seine Broße und Gestalt mit bem Rnirscher No. 47. überein, nur find seine Blügel und Flügeldecken fürzer. Erstere haben an bem die dern Rande der Lange nach ein schwaches Beld, und sodann eine braune, glaßartig durchsichtige Spite.

#### 221. Befchlecht. Grafthupfer. 271

Udrigens aber find sie schwarzenepartig geabert. Conften trift man fie auch mit glafartigeweiffen, Deu mb roth geaberten Glugeln, ober auch mit blaß, fchres farbigen und blaulichen Glugeln an. Der Wirbel den. figwischen den Augen etwas eckig. Man findet fe ben gangen Sommer über in den Relbern am Samara baufig. Dallas Reifen.

#### † 66. Die Salzbeufdrede. Gryllus falinus.

Er hat ohngefehr die Gestalt des Schwarze Salze bandes No.44 ist aber mehrentheils grosser. Die bew Farbe ist mehr greiß, doch die Sprenklung ist die Salinus. namliche. Die Schienbeine find blaß. Die Rlugel haben einen breiten Schwarzen Bogen, welcher von der Mitte des dickern Randes anfangt, bis jum After gehet. Innerhalb benfelben find die Blugel an der Burgel rosenfarbig; aufferhalb dens klben befindet fich die glaßartig durchsichtige Spis be, mit einem großen ichmarglichen Striemen. Man trift diese Art vorzüglich im Junio in den durresten Salzsteppen am Jaick und Jreis an. Pallas Reisen.

# † 67. Die braune Beuschrede. Gryllus fuscus.

In der Große kommt diese Art mit dem Jras Braune liener No. 46. überein. Das Weibchen aber ist Deuviel gröffer. Das Bruftstud ift oben brenedig ichrede. mb hat an den Seiten weiße fielformige Erhöhnn: Fuscus. gen. Die Flugeldecken find braunlich greiß, und am dunnsten Rande schwarz. Die Flügel find ganz mb gar braunlich schwarz. Die hintern Schenkel braungreiß geflect, die Schienbeine roth. Die Beibchen haben fleine Blugel, und die Decfchilde find

#### 272 Fünfte El. II. Ord. Mit halben lügeld.

B. find die Helfte kurger als der hinterkörper. Sie Deur find im Monath Julio und August in den Sie birischen Feldern häusig vorhanden, und machen unter dem Fliegen ein leichtes Getöse. Pallas Reisen.

#### + 68. Der Zahnschenfel. Gryllus tibialis.

Die Gestalt und Größe ist obiger Salzheusschenkel. schrecke No. 66. gleich, aber der vordere Abschnitt Tidiades Bruststucks steiget in einem runden Kamm in die Höhe, der hintere aber ist kaum kielsormig ers höhet, und auf benden Seiten zeiget sich eine braus ne Binde. Die Flügeldecken sind gewölkt. Die Flügel selbst hingegen bläulich, und netzscrmigs braun geadert. Das merkwürdigste aber ist, daß die Schienbeine, welche weißlich sind, viel längere Stackel als gewöhnlich haben, und damit kamms artig beset sind. Der Aufenthalt ist in den südslichen Gegenden am Jaik. Pallas Reisen.

#### + 69. Die barabische Heuschrecke. Gryllus Barabensis.

Barabi.

fáe.

Bara-

benfis.

In den sandigen Tannenwäldern der barabisschen Wildnisse, zeiget sich eine Seuschrecke von ähnlicher Größe, deren Bruststück vom Rücken an schwach dreneckig ist. Die Flügeldecken sind blaß, und mit braunen Puncten die bestreuet. Die Flügel sind gelblich durchsichtig, und haben am vordern Rande, desgleichen an der Spisse, braune Abern und Puncte. Die Schenkel sind bunt, und untenher roth. Die Schienbeine sind ganz roth. Sie suchen die Gegenden auf, wo der Bansesuß häusig wächst, sliegen ben Tage springend herum, und knistern mit den Flügeln. Dalas Keisen.

70 Det

221. Gefchlecht. Grafhupfer. 273

70. Der Schuppengrind. Gryllus Seusquarrosus.

Diese Art ist so groß wie die Rammbeuschupp schupe fedrecke No. 37. und ganz grun. Das Bruststück sein gleichsam dren Abschnitte, und jeder Abschnitt grind. ihret an jeder Seite einen kurzen drenzackigen SquarDorn. Die Flügeldecken sind sehr stumpf, und rolus. saft zurücke gebogen. Die Flügel selbst sind blute roth, und mit vielen schwarzen Puncten besetzt, welches einem schuppigen Grinde ahnlich siehet. Das Baterland ist Africa. Linneus.

Linne Suppl. 3.

0

222. St.

## 223. Geschlecht. Cicaden.

Hemiptera: Cicada.

C. Singer.

C Singer, die nicht hupfen.

† 21. a. Der Rlager. Cicada querula.

21.2. Rlager. Querula.

berwandt, aber größer. Kopf und Brust sind greiß, oder blaßziegelfärbig, mit schwarzen Charactern und Flecken, die oft ineinander sließen besett. Der Rüßel ist an der Wurzel schwarz, und hat zehn Querrunzeln. Die Deckel des Troms melhäutchens sind blaß, der Hinterkörper ziegels färbig, und mit Silberstaub bedeckt. Die Jüße sind blaßziegelroth, oder überhaupt blaßfärbig, und de Sange nach mit einem schwarzen Stricke bezeichnet. Alle Flügel sind glasartig durchsichtig, haben blasse Adern, und hintenher einen schwarzen Rand. Man sindet sie im Sommer häusig in den südlichen Gegenden am Jait. Pallas Reis.

#### † 21. b. Die Graficicate. Cicada brafine.

21. b. Gras, cicade, Brasina Sie ist kleiner als obige Art, ja noch kleiner als der Braunfaum No. 13. Ueber und über grasgrun, und an der Brust mit braunen Flecken, die verguldet sind, gezieret. Alle Flügel sind glasartig durchsichtig, grungcadert, und an der Spize braun. Die Dornen an den Füßen, und die Klauen sind braun. Es kommt diese Art im Monat Junio sehr häusig in den durren südlichen Gegenden am Jait und Irris vor. Pallas Reisen.

224. Ots

# 224. Geschlecht. Wasserwanzen.

Hemiptera: Notone Eta.

#### 4. Die Indianerin. Notonecta Indica.

Der Körper ist klein und blenfärbigeblau, und India-das Bruststuck vorneher gelblich. Die Flus nerin. gelbecken find auch blau, und an der Spige fcmarg. Indica. Das Baterland ift Indien. Linneus.

#### † 5. Die Zwergin. Notonecta atomaria.

Sie ift nicht größer als eine Laus. Unten em Korper weiß, oben aber und auf ben Flügel, 3mers beden blaßigreiß. Die Flügel find etwas milchig. Atoma-Die Augen und der Punct, welcher das Maul ria. vorstellet, find schwarz. Dben siehet man eine braune Sprenkelung von den feinsten Puncten. Diefe Art schwimmt und finkt wie ein Sandforns den im Baffer, und fetet fich übereinander haus ser Wolchowa ben Nan hat sie im Julio in der Wolchowa ben Novogrod entdeckt, wo sie bon dem Unrathe der Forellen leben. Pallas Reisen.

**S** 2 226. Ses

## 276 Fünfte Cl. II. Ord. Mit halben Blügelb.

# 226. Geschlecht. Wangen.

Hemiptera: Cimex.

B. Schilde tráget. B. Schildträger, das Schild so lang, als der Hinterleib.

12.a. Die Drurimanze. Cimex Drurael.

Drurt mange. Druraei. ben, zu erinnern, daß der Ricter diese und die folgende Art nach ihren Herren Entdeckern genennet habe; mithin berichten wir nur, daß der Körper oben blutroth, untenher aber schwarze blau ist. Das Bruststück hat zwen schwarze ovale Flecken. Das Schild ist an der Wurzel mit einer breiten Binde versehen, welche bogig und schwarz ist. In der Mitte ist ein gleichsam aus vier inselnander gestossenen Puncten bestehendes Band besindlich, und endlich stehen auch noch ein paar schwarze Puncte vor dem After. Das Batere land ist China. Linneus.

#### 12. b. Die Fabricia. Cimex Fabricii.

12.b. Fabris cia. Fabricii. Sie ist größer als alle Europäische, die in diese Abtheilung gehören. Oben ganz dunkelfars big, schattig, und mit Blutpuncten besprenget, unten aber ganz schwarzblau und glänzend. Das Bruststuck hat zehn Blutpuncte. Davon stehen drep

bren langfiche an dem Borderrande, und an den Seitenecken jedesmal ein fleiner Punct. Das Schild bedeckt den gangen hinterforper, und hat vierzehn Blutpuncte, Die einander gleich, von einander entfernt und in die Quere stehen. Die erfte Reihe an der Burgel hat funf, die mittles re vier, die hintere dren, und dann folgen end-lich noch zwen Puncte. Diese Art wohnet im mittagigen America. Linneus.

#### H. Längliche.

H. Láng, liche.

#### 110. a. Die Gurtelmanze. Cimex baiteatus.

Diese ift, in Absicht auf die Gestalt des roo.a. Rörpers, mit der Carmoisinwanze No. 116. sehr Gurtel verwandt. Sie hat eine langliche Gestalt, ist Balteatostfarbig, auch sind die Fuhlhörner rostfarbig. tus. Die Flügeldecken sind mit einer gelben Querlinie befest, haben aber feine ichmargen Puncte, und die hinterschenkel find mit vielen Bahnchen befest. Der Aufenthalt ift in Jamaica. Linneus.

#### + 100. b. Die Wollenwanze. Cimex lanatus.

Sie ist so groß wie ein großes Goldhahn, 100.b. den und langlich, über und über fupferglanzend, wange. schuld ift fehr er: tus. babenrund, und bedeckt den gangen Unterleib.

© 3 Das

# 278 Funfte Cl. II. Orb. Mit halben Blugelb.

Das Brussstück hat einen tiefen Einschnitt, und ist also gleichsam doppelt, oder getheilt. Man sindet sie häusig zu Anfang des Monats Julii, und zwar vorzüglich in den südlichen Gegenden am Jrtis an den Aehren des Heidekorns sigen. Pallas Reisen.

Dritte

Dritte Ordnung.

# Staubflügel oder Schmetterlinge.

Inseca: Lepidoptera.

231. Geschlecht. Tagvögel.

Lepidoptera: Papilio.

A. Griechische Ritter.

19. a. Die Becuba, Papilio Hecuba.

Der Körper ift von der erften Große. Die Bors becuba. derflügel find oben roth, am auffern Rande Hecufdmary, und mit gelben halbmondformigen Blecken ba. befest, unten weiß, schwarz, und gelb wellenfor, mig bunt, mit einem schwarzen Rande. Dach dem auffern Rande zu fteben unten dren Augen, davon das vorderfte am größten ift. Die hintern Flügel find oben schwarz, und am hintern Rande mit gelben halbmondformigen Flecken befest, uns ten ebenfalls weiß, schwarz, und gelb bunt, und mit funf Augen gezieret, bavon bas vorderfte abermals das größte ift, und etwas entfernt ftehet. Das Vaterland ift Cajenne. Linneus.

Griechi

19. b. Der **S** 4

#### 280 Fünfte Cl. III. Orbn. Staubflügel.

A. Griech. Ritter.

19 b Der Philenor. Papilio Philenor.

10. b. Philes nor. Philenor.

Der Korver ift von ber britten Grofe und schwarz. Der hinterkörper unten drenfach weiße Die Borberflügel find an benden Seis ten von gleicher Farbe, nämlich fchwarz; und por bem auffern Rande mit einer einfachen Reibe von fünf weissen und groffen Puncten besett, auch ift der Rand felbft mit einem weiß unterbrochenen Saum befest. Die hinterflugel find auch febrary, aber geschmangt, oben ichmach burch Die mitern Alecken gezeichnet, unten aber vorneher schmarz, übrigens blauglangend, und mit sieben safrangels ben Augen befest, welche einen meiffen Rern und Schwarzen Ring haben, und fettenweise in einem Bogen stehen. Der hintere Rand ift zwischen den Zähnchen weiß, und der Schwanz ift schwarz. Das Baterland ist America. Linneus.

# 19. c. Der Phorbanta. Papilio Phorbanta.

19. c. Phore banta. Phorbanta.

Der Körper ist von der zwenten Größe und schwarz. Die Flügel sind kurz geschwänzt, gezährnelt, oben schwarz, und unten braun. Die vor dern haben oben etsiche ungestaltete blaue Flecken, sind aber unten ungesteckt. Die hintern sühren oben blaue Flecken, davon der vordere am größten und und ungleich ist, sodann kertenförmige Binden, Davon die hintere blau ist, und aus zwölf unterbrochenen Puncten bestehet. Untenher aber ist nichts anders, als eine kettensörmige Binde, der obern gegen über zu sehen, die aber weiß ist, und dann stehen noch zwen weise Puncte am Winkel benm After. Der Ort des Ausenthalts ist Cajenene. Linneus.

19. d. Der

#### 19. d. Der fleine Dage. Papilio Phorcas, Griech.

Non Sierra Laona an der africanischen Rufte wird ein ziemlich großer Lagvogel gebracht, welcher wegen ber langen schwanzartigen Fortfane an den obern Glügeln auch ein Schleppentrager cas. oder Dage genennet wird. Er ift oben ringshes rum fchmarg, in der Mitte der Flügel aber mit einem groffen langlichen grunen Felbe, und bers gleichen Puncten und Flecken am auffern und uns tern Rande verfehen. Die untere Glache aber hat mar ohngefehr die namliche Zeichnung, mas aber oben schwarz war ift hier graubraun und der Rand ift mit mehrern aber weißen Bleden besett, doch ift bas innere Selb ber Flügel auch grun. Cramer. Cramer uytland Kapellen, Tab. II, fig. B. C.

A. a. Breitflügel mit rother Bruft. Equites Achivi.

Aŭael.

38. a. Der Zobelschmetterling. Papilio Pelias.

3u des Ritters Pyrrhus No. 25. Jasius 38. 2. No. 26. und Jason No. 38. mogte noch obiger Bobelschmetterling gerechnet werden, welcher vom terling. Vorgeburge der guten Sofnung gebracht Pelias. wird. Er führet obige Benennung, weil sich zu lenden Geiten des Rorpers ein rauher langhaariger Strich an den Rlugeln herunter giehet, welcher mit den Bobeln, fo ehedem von dem Frauengimmer um ben Sals getragen murden, einige Aehnlichkeit hat. Die Borberfuße find fehr furg. Der Ror. per und obere Theil der Borderfrügel ift von oben braunroth, dann folget eine gemeinschaftliche breis te, braungelbe Querbinde, Die am obern Rande

#### 282 Fünfte Cl. III. Orb. Staubflügel.

A. a. Breits flugel, ber Borberflügel einige schwarze Flecken hat. Der hintere Umfang der Flügel ist schwarzbraun einges fast, und mit einer Reihe gelber ovaler Flecken bes sest. Die untere Fläche hat obenher rothbraune und aschgraue mit weißen Linien eingefasste Zeichenungen, donn eine weiße Binde, und zulest eine graue breite Einfassung mit gelben Flecken, in einen weißen Rand. Eramer.

Cramer, uytland. Kapellen. Tab. III. Fig. C. D.

# 38. b. Der Halbmond. Papilio Am-

38. b. Dalbe monde Amphitrione

Die Borderfingel find auf der obern Rlache einfarbig schwarzbraun, und haben nur nach bem Ende zu vier übereinander ftebende, ovale, fcmefelgelbe Alceten. Die hinterflügel aber baben in ber Mitte ein langes blaggelbes Reld und am Umfange eine Ausschweifung von funf schwefelgelben In der untern Rlache find die halben Monden. Borderflügel fast eben so, wie an der oberniglas the beschaffen, aber die hinterflügel weichen ab. Denn erfelich find fie mehrentheils schwarzbraun ohne blafgelbem Relde, Dabingegen in der Mitte mit einer Reihe von sieben schwefelgelben, Pillen gestalteten runden Bleden gezieret, morauf eine Reihe von sieben himmelblauen, und weiße punctirten Monden folget, fo daß unter jedem gels ben Rleck ein halber Mond befindlich ift, der mit feinen Bornern berunterwerts bangt. Den lettern ausgenommen, welcher wie das erfte Mondviertel am auffern Rande gerade ftebet, am innern Rande aber gehet noch ein einzelner gelber Bleden fur ben blauen Salbenmonden ber. Der Umfang ift mit abnlichen schwefelgelben balben Monden, so wie an der Oberflache ausgeschweift. Die Breite Dies fee

ke ausehnlichen americanischen Zagvogele erreicht fechs bis fechs und einen halben Boll. Cramer. Cramers, uydland. Kapellen, Tab. VII. fig. A. B.

#### 38. c. Der Amboineser. Papilio Hy. -politus.

Dieser ansehnliche amboinesische Schmets 38. c. terling hat viele Achulichkeit mit des Ritters neser. Priamus No. 1. Er ist sieben Boll breit, bat Hypo-Bublhorner, die an der Spige dicker auslaufen, litus. jedech ohne Reule. Die Grundfarbe ift auf ber Oberflache schwarz mit grunlicher gezackter Zeiche nung auf den Borderflügeln, auf den hintern Flügeln aber am Rande schwefelgelb geflect, fo wie auch der Korper schwefelgelb und schwarz geflect ift. Die untere Rlache hat an den Borderflügeln eine blaue fatt ber grunen Zeichnung, an den hinterflügeln aber einen weißlichen Grund mit ähnlichen schwefelgelben Flecken. Das Weibchen ift überhaupt etwas blaffarbiger mit braungrauer und weißlicher Zeichnimg, die schwefelgelben Blee den aber find etwas fleiner. Cramer.

Cramer, uytland Kapellen. Tab. X. Fig. A. B. bas Weibchen Tab. XI. Fig. A. I.

#### 47. a. Das blane Band. Papilio Meander.

Man könnte gegenmartige Art als eine Bers 45.4. Wiedenheit von des Mirrers Demophon No. 47. Band. mfehen. Die obere Flache ift schwarzbraun, und Meanin der Mitte mit einem breiten blauen Querbande der. beset, davon sich ein Abschnitt am obern Rande der Borderflügel besonders zeiget. Die untere Hache hingegen ift nach bem Korper zu in einem Dreneck mit famt dem Rorper rothlich isabellens farbig, und führet einzeln zerftreute braune Bleden. Daun

Digitized by Google

#### 284 Kunfte El. III. Ordn. Staubflugel.

A. a. Breite flugel.

Dann folgt ein fehr breites durchlaufendes bui felbraunes, worinn an jedem hintern Flugel ein fle ner vierediger meißer Rleden ftebet, endlich folge ein hellbrauner, breiter Saum, in welchem fich a jedem hintern Blugel funf weiße Dunetchen zeiger Der Aufenthalt ift in Suriname. Lramer. Cramer, uytland Kapellen, Tab XII. fig. A. B

#### 49. a. Das gelbe Fledenband, Papilio Thoas,

49. 2. Gelbe Rledens band. Thoas.

Er ift von der zwenten Groffe, oben schwar mit zwenen gelben unterbrochenen Bandern unt unten gelb mit einem blauen Bande, und hat geschwänzte Flügel. Die obern Bander bestehen namlich aus lauter gelben Flecken. Ein Band lauft die Quere aus den Spiken der Borderflügel bis jur Burgel der hinterflugel. Das andere lauft frumm aus den Flügelspigen bis jum Winkel des Afters herunter, in welchem ein gelblich brauner und blauer Salbmond ftehet. Der Schwanz der Hinterfligel ift langlich, ftumpf, und hat ein gels bes Beld. Untenher find die Flügel alle gelb, und haben breite, schwarze, sich unter einander verglies bernte Abern. Auf den hintern Flügeln zeiget fich unten in der Mitte ein wellenformiges, blaues, frumm laufendes Band, welches aus lauter jus fammnien gesetzen halben Monden bestehet, braungelb untermengt geflectt, und mit einem schwarzen Rande verfehen ift. Man bringt diefe Art aus Guas dalupe und Suriname. Linneus.

49. b. Raifere fchmet. terling. Turnus.

#### 49. b. Der Kaiserschmetterling. Papilio Turnus.

Diefer Schmetterling ift von der zwenten Groß se, hat die Gesta't der Königinnen Pagen No. 33. und das Bruftftuck ift mit gelben Linien geftreift. Die

Die Borderflugel find auf benden Seiten gelb, und haben am auffern Rande funf ichwarze Bane ber. Das erfte fiehet in der Burgel, das andere lauft bis über die Binterflugel durch und der hintere Rand hat einen ichwarzen Saum, mit acht ecoppelten gelben halben Mondfleden. Die hinterflügel find rudwerts gebogen, geschwanzt, an benden Seiten fast von einerlen Farbe, nams lich vorneher gelb und hinten fcmarz. Der Schwang ift fpießformig und schwarz. Das Baterland ift America. Vinneus.

D. Langflügel, deren Flügel in die Brei- 2ang. te lang gestreckt, und mit einem flügel. glatten oder ungezähnelten Rande verschen sind. (Heliconii.)

#### 72. a. Der Antioch. Papilio Antiochus.

Die Flügel sind langlich, blaulich schwarz, 72. a. und nit einander fast einfarbig. Die vordern name Untioch. lich haben oben eine blaulich schwarze, unten aber Antioeine fohlschwarze Farbe. An benden Seiten führ ren fie oben gwen weiße Binden, davon eine in ber Mitte, die audere nahe an der Spige ftehet. Diche te an der Burgel aber fiehet man noch eine gelbli. Die hintern Flügel hingegen find an unden Seiten schwarz und ungefleckt, oben etwas Haulich, und unten an der Wurzel mit zwen ros then Puncten, und einer furgen blutrothen Linie verfeben. Der Rand aller Flugel fallt eimas ins weiße. Mach der Chretischen Figur zu urtheilen, fo ift Geftalt und Zeichnung dem Wunderpapillon No. 63. sehr abulich. Das Baterland ift Indien Linneus.

Chret. Tab. I.

72. b. Die

#### 286 Fünfte Cl. III. Ordn. Staubflügel.

B. Selicos nier 72. b. Doris. Doris.

72. b. Die Doris. Papilio Doris.

In der Sestalt kommt diese Art mit dem Wunderpapillon No. 70. ziemlich überein. Die Borderstügel sind oben schwarz, und haben zwen gelbe Binden, davon die innere aus dren, und die aussere aus zwen gelben Flecken bestehet. Unten haben sie eine gleiche aber braune Farbe. Die Hinterstügel sind oben gleichfalls schwarz, an der Warzel etwas blaustrahlich, und mit einem weißpunctirten Rande versehen, unten hingegen braun und sowohl in der Mitte als an der Wurzel mit rothen Strichen besetzt, am Nande aber weiß gestreift. Diese Art kommt aus Suriname. Linneus.

#### +72. c. Der Wolgaet. Papilio Sappho.

72. c. Wol gaer-Sappho

Db gleich dieser Wogel dem Schlerer No. 186. fehr ahnlich fichet, so kommt er doch in der Bestalt mit den Seliconiern überein. oben fcmarglich, und führet eine breite weiffe Binde, die quer durch alle Flugel gehet, und zwar auf den Borderflügeln frumm, und unterbrochen. auf den hinterflugeln aber gerade. hinter biefer Binde gehet über alle Flügel ein weisser Bogen, ber durch Abern unterbrochen ift, und auf den Hinterflügeln nur etwas mehr gerade läuft. ten auf ben Borderflügeln find zwen langliche, Scharfovale und mit ber Bafis gegeneinander gefehrte Flecken befindlich, und aufferdem zeiger fich noch in der Mitte des Felbes ein faum fichtbarer meifigrauer Salbmond. Untenher find die Flügel gelb, haben breitere Bleden und Binden mit amis ichen einfallenden Strichen. Uebrigens hat dieser Schmetterling vier Suge, und laffet fich im Man bäufig am Wolga im tatarischen Maßholder feben. Pallas Reifen.

C. Weisse

231. Geschlecht. Lagudgel. 287

C. Beisse Rundslügel. Danai candidi.

Rund flugeL

107. a. Der Batavier. Papilio Java.

Er fommt aus Oftindien, und hat weisse Bata Flugel, die hintenher schwarz, unten aber an der vier. Burgel gelblich braun geflectt, und am hintern Java. Rande weiß gefprenfelt find. Linneus.

107. 2.

#### C.c. Bunte Rundflügel.

Runte Runds

110. a. Der Machtschatten. Papilio Dedalus. flugel.

110. Q.

In America, besonders in der Colonie von Racht Barbice, wird ein überaus ichoner Tagvogel ges ichatten. funden, der von dem herrn Cramer in Amster. Dedadam zu des Ritters Papilio Danans festivus lus. gerechnet wird, und ben Ramen Dedalus erhals ten hat. Derfelbe ift mit ausgebreiteten Glugeln über fieben Boll breit, und hat zwenerlen Flügel, die obern nämlich find etwas zugespist, und die untern find ovalrund. Bon obenher find die obern Flügel schwarzgrau, und haben einen breiten braungrauen Rand, über der Mitte diefer obern Glügel lauft eine weisse ungleiche Binde gerade berab, desgleichen einen Zoll weit von den Enden. Ben der Scheidung des schwarzegrauen Beldes, fteben on braungrauen Rande einige weisse Slecken von mgleicher Gestalt in einer Reihe, die hintern Flugel aber find zwar obenher auch fcmarg grau, aber etwas weißlich bestäubet, und nach unten gu mit einer gedoppelten Reihe weiffer Flecken verfeben, Die eine ungleiche Große und Geftalt haben. Die uns terc Seite ber Borderflügel ift zwar eben fo gezeichnet wie die obere Seite, aber nur etwas blagfarbiger, bingegen die untere Seite der hinterflugel ift gang braun-afchgrau, statt schwarz, und die namlichen zwen

#### 288 Fünfte Cl. III. Ordn. Staubflügel.

C.c. Punte Rund, flugel. zwen Reihen schwarzer Flecken zeigen sich auch das selbst. Das besondere ist die Gestalt der Fühlt hörner, die darinnen von den andern Fühlhörnern der Tagvögel abweichen, daß sie, statt ordentlich keulformig zu senn, über einem verdickten Kropfe noch eine hervortretende Spisse haben. Ihr Aufenthalt ist in den Wildnissen und Wäldern, dieses nigen aber, die man von Suriname bringt, sind kleiner als die oben angegebene Größe. Cramer.

Kramer uytlandsche Kapellen, Tab. I. fig. A. B.

#### 110. b. Der Trauerrod. Papilio Liriope.

Traner, roct. Liriope.

Diefer Tagvogel ift klein, mit ausgestreckten Flügeln nicht über einen Zoll breit, oben braum roth, mit gedoppelter schwarzer Einfassung, um tenher braunlich: gelb, mit feiner Zickzackzeichnung. Er kommt von Suriname. Cramer.

Kramer uytland. Kapellen, Tab. I. fig. C. D.

### 110 c. Der Stahlflügel. Papilio Lucinda.

flügel. Lucinda.

Die Flügel sind obenher blau, wie polirter Stahl, mit schwarzen bogigen Linien in die Quere durch; zogen, und nach dem untern Rande zu mit schwarzen Puncten besetzt. Die untere Fläche der Flügel aber ist gleichfärbig roth; braun mit abnlichen schwarzen Strichen und Puncten. Das Vaters land ist Suriname. Cramer.

Cramer uytland, Kapellen, Tab. I. fig. E. F.

119.a. Zimmets flugel. Erippus. 119. a; Der Zimmetflügel. Papilio Erippus.

Die Zimmetflugel haben etliche Berschiedenheiten unter sich, wo die Gestalt und Große der weissen Flecken, wie auch ihre Stellung einigermassen

## 1231. Gefdlecht. Tagvogel. 289

maffen voneinander untersthieden ift. Die Abbil. C.c. dung eines surinamischen ift zu feben : Rhotr Delic, Tab. Cll. fig. 3.

flüget.

Eine Verschiedenheit aus Meujort zeiget fich ben Cramer.

Cramer uytland Kapellen, Tab. III. fig A. B.

#### 119. b. Der Umbervogel. Papilio Jairus.

Die Oberflache aller Flügel ift umberfarbig Umber, mit weissem Staube, die hinterflügel führen auf vogel. ber Oberflache ein sehr großes violetfarbiges Auge, Jairus. bas in einem dicken gelben Ringe ftehet, und in der Mitte einen weissen Punct führet. Die untere Blache aller hinterflügel ift hellgrau, und weiß bestäubt, aber da zeigen fich an dem Unterflügel oben am Rande ein großes, nach unten zu in der Mitte ebenfalls ein großes, und noch ein fleines, mithin gedoppeltes Aune. Alle diefe dren Augen auf jedem Unterflügel find eben fo gezeiche met, wie das vorbeschriebene Auge, daß die nam. lichen Flugell auf ber Oberflache jede in der Mitte führen. Die Borderfüße find gang furg ohne Ragel. Diefe anschnliche große Art fomint aus Offindien: Cramer.

Kramer uytland-Kapellen, Tab. VI. fig. A.B.

#### 119. c. Der ausländische Zwerg. Papilio Pygmaea.

Diefer surinamische Schmetterling ift etwas 110'c. über einen Boll breit, obenher dunkelgrau, mit Auslanschwarzen Querbogen und einem blutrothen Quer, bischer felbe, welches an jeder Seite über bende Flügel Brerg. gehet. Die Unterfläche aber ift nur allein duntels maea. Linne Guol. B. grau,

#### 290 Kunfte El. III. Ordn. Staubfluad.

.C. Bunte Rund flugel.

grau, und mit fcmargen Querbogen befest. Cras mer.

Cramer uytland, Kapellen, Tab. VII. ac. C. D.

#### 119. d. Der surinamische Beigling. Papilio Odites.

119. d. Guris nami: Beig. ling. Odites.

Aus Suriname bringt man auch einen braunen Lagvogel mit weissen breiten und auch fleinen fcmalen Bleden, beffen untere Blache gang weiß und nur am Rande, besgleichen bin und wieder ichwarz geffect und punctiret ift. Die Blugel find ben der Einsenfung an Diefer Seite feegrun. Cramèr.

Cramer uytland. Kapellen, Tab. XI. fig. E. F.

#### 119. e. Die Salome. Papilio Salomé.

Die Borderflugel find auf der Dbetflache braun, 119. C. haben am Rande fcmarge Blecken mit rothlichen Salome Ringeln, und in der Mitte ein blaues Auge mit Salome rothlicher Ginfassung, und einem weißen Punct. Die hintern Rlugel aber haben nach hinten ju ben ben Dannchen einen breiten aschgrauen , und ben bem Weibchen einen vomerangenfarbigen Randmit schwarzen, gelb eingefasseten Bleden. Die untere Blache ift blagbraun, am Rande durchaus mit bund felbraunen, weiß eingefaßten langlich runden Rles den gierlich besett. In der Mitte der hinterflus gel fiehet man eine weiße Zeichnung wie ein umgekehrtes m. doch einer gewißen Mebenart mangelt biefe Zeichnung. Der Aufenthalt ift in Surie name. Cramer.

Cramer, uytland. Kapellen, Tab.XII. fig. G. H.

130,2 Det

231. Befchlecht. Lagudgel. 291

130. a. Der Chineser. Papilio Acontius.

Bunde Rund Als flügel.

Er ift von mittlerer Grofe und ichmary. le Flügel find obenher kohlschwarz und haben eine Chine gemeinschaftliche braungelbe Binde, welche aber fer. ben außern Rand der Borderflugel nicht erreicht. Acon-An der untern Seite find die Flügel braun und ungeflect. Das Baterland ift China. Linneus.

## D. Mit augigten und gezähnelten Slu Mun. geln, Nymphales gemmati.

pben mit Au gen.

148 a. Die Doris. Papilio Doris.

Auf der abern Glache find alle Blugel einfare Doris. big braun, ausgenommen, daß die hintern Jlugel Doris. am untern Rande einen weißen Saum haben. Die untere Blache aber ift filberglangend himmelblau in die Quere mit braunen Binden bandiret, in beren breiteften Bande etliche Augen paarweise steben. Der Aufenthalt ift in Suriname. Cramer.

Cramer, uytland. Kapellen, Tab. VIII. fig. B.C.

#### 148. b. Der Violetvogel. Papilio Herse.

Oben ist dieser Lagvogel ben der Einsenkung 148. b. ber Flügel hells und ferner hinaus dunkel violet Biolets mit schwarzsbraunen Binden und dergleichen groß Herls. fen Augen am hinteren Rande, von unten aber wechselt ein helles Purpur mit violet ab. Binden find caftanienbraun, und die Augen der hinterflügel fieben in einem ziegelrothen gezacten Felbe. Der Aufenthalt ift in Guriname. Cras mer.

Cramer uytland. Kapellen, Tab. X. fig. C. D.

€ 2 148. c. Der 292 Kunfte Cl. III. Ordn. Staubflügel.

148. c. Der Braunflugel. Papilio Hesione.

D. Mnm. pben mit Augen. 148. C. Braun. flugel. Helione.

Die gange Oberfläche ift violetfarbig braun, und am Rande mit einer weissen Ginfassung gezies Die untere Blache hingegen hat zwen weiffe Querlinien, und hinter felbigen einen breiten Rand mit zierlichen Augen, die aus einem blauen, schwarzen und rothen Ringe bestehen, in deren Mitte fich ein weisser Punct befindet. Das Was terland ift Suriname. Cramer.

Cramer uytland Kapellen, Tab. XI. fig. C.D.

#### 157, a. Der neujorfische Distelvogel. Papilio lole.

157. 3. Meu iorfis íфе Difteb pogel. Tole.

Diefer Tagvogel wird in Meufort auf ben Difteln gefunden, und fann ale eine Berfcbiedens beit der Distelnympfe (Papilio Cardui No. 157.) angesehen werden. Jedoch ift der Unterschied sehr betrachlich. Die obere Blache namlich prablt mit weißlichbraunen, buchftabenahnlichen Charactern, auf einem ichwarzbraunen Grunde am obern Ranbe ber Borberflugel, weiter hinüber find die Rlus gel rothlichbraun, mit schwarzbrauner Zeichnung, und am hintern Rande zeigen fich in jedem hinters flugel zwen fleine blaue Augen. Die untere Rlas che hingegen ift zierlich weiß, braun, roth und achatartig geflectt, aufferdem aber haben die Borberflugel an ben Enben jede ein fleines, Die Sins terflugel aber jebe ein droßes und ein fleines Auge in einem dunkelgrauen Felde. Cramer. Cramer, uytland. Kapellen, Tab. XII. fig. E. F.

+ 162. Der sibirische Papilion. Papilio Janthe.

162. (Spbi rifche Wapile W lion. Janthe.

Er hat die Größe von dem europäischen Atlas No. 148. und ift dem deutschen Atlas No. 149.

No. 149. ungemein abnlich, jedoch beständig von Dselbigen verschieden. Die Flügel sind oben schwarz Apmi und mit Regenbogenfarben aufgeheitert, sodann mit weiß gesäumt. Die Borderslügel sind am dicken Augen: Rande greiß. Alle Flügel haben eine bogige weiße Binde, die auf ben hinterflugeln fehr breit ift, auf den Borderflugeln aber durch Adern uns terbrochen, und nicht einmal bis jum Rande forts geführet ift, mogegen fich zwen dunkle Augen-puncte, zeigen, davon fich einer hinter dem Bande Untenher find die Rlugel weiß gewolft, Die Hinterflügel aber find braun beftaubt. Auch ift ber Bleden, der Drened an der Burgel, und bie wellenformige Binde braun gewolft, fo baß man nichts als etwa einen fleinen weißen Pnnct darinnen fiehet. Dahingegen haben die Borbers flugel an der untern Seite am bicken Rande zwen Bleden, und deutlichere Angen, davon das erste einen schneeweißen Kern führet. Diese Art streift im Sommer in den durresten Feldern herum. Dallas Reisen.

#### 4 163. Die Milchflugel. Papilio Phryne.

Es find die Blugel fehr gart, oben namlich Milde weiß, ungeflect und kaum am Rande etwas afche flugel. grau, unten aschgrau geschwefelt, etwas fein ges Phrypulvert, und im Umfange mit einer augigen Bin. Mitten aber gehet eine gerade filbers de befett. farbige Linie und bergleichen breite Abern querfelb burch. Die Augen, welche in ber Binde fteben, find fcwary , und haben einen weißen Rern. ben Borberflügeln fteben funf bergleichen Augen, bie eine nach bem andern groffer werben. Die hinterflügel aber haben fechs Augen, die fleiner find, und bavon bas innere bas fleinfte ift. Das **2** 3 wollige

#### 294 Funfte El. III Ordn. Staubflügel.

D. wollige Wesen in der Gegend des Kopfs ist etwas Nyms aschgrau. Dieses feine und niedliche Insect ist phen mit Ausgen. Dieses feine und niedliche Insect ist phen mit Ausgen. Pallas Reisen.

# † 164. Der rußische Argus. Papilio Tarpeia.

164. Rugi, fche Ar, gus. Tarpoia. Er hat die Bröße und Gestalt des kleinen Argus No. 141. Die Flügel sind zart, oben gelb und mit bräunlichzaschgrauen Adern besetzt, so wie auch der äußere Rand gesärbet ist. Alle Flügel haben auf benden Seiten vier etwas große schwarze Puncte, davon allemal der zwente Punct der kleinste, und in etlichen Eremplaren sast vers loschen ist. Unten sind die Börderslügel von name licher Farbe, die Hintenstügel aber sind etwas asch grau, und haben anderthalbe Binde. Der hof um die Augenzeichnung ist gelblich. Die Brust dieses Thierchens ist schwarz. Man sindet basselbe im Monat May häusig in durren Feldern am Wolga. Pallas Reisen.

D. d. Myme phen ohne Mugen. D. d. Nomphen mit gezähnelten Flüsgeln ohne Augen. Nymphales Phalerati.

168. a. Die Zadenflügel. Papilio progne.

Im Jamaica und Teusork wird eine Bers gaken, schiedenheit von des Ritters No. 168. das weiße Laden, C. gefunden, melcher aber das besagte weiße C. Progne an der untern Seite der Flügel mangelt, sonst aber mit angeführter Art viele Uebereinstimmung hat. Die Flügel sind gezackt, oben hochroth mit

fleinen fibmargen Blecken, ferner mit einer gelben linie umzogen, und mit einen breiten schwarzen Rome Saum eingefaster. Die untere Flache ist hell asch phen grau mit abwechselnden grau, schwarz, Aepfelblus ohne the und weiß, zierlich, und unbeschreiblich scheckig. Ange Die Borderfüße sind kurz und raubhaarig. Eras mer.

Cramer, uytland. Kapellen. Tab. V. fig. E. F.

#### + 168. Die Laubicea. Papilio Laodice.

Sie ift größer als die Paphia ober gen, Laodica. fterscheibe aus dem Geschlecht der Machtvogel Laodi-No. 4. und fiehet demfelben obenher fo ziemlich abilid, nur find die Rleden etwas fvarfamer, und ber Rand hat eine doppelte Einfassung mit aneine ander bangenden Flecken, wovon die bintern fchicf. vierectig find. Unten find die Blugel fo ziemlich von einerlen garbe, ungeflecte, und nur am Rans be und an ber Spige etwas blaffer ; auch am bis dern Rande mit einem weißen Punct verseben. Die hinterflügel find von der Burgel bis gur Salfte bochaelb, und mit einem gedoppelten braungels ben Striemen gezeichnet, hintenher aber purpur : farbig und greiß gewolft. Diefe bende unterschies den gefärbte Felder aber werden durch einen breis ten filberfarbigsweißen Strich von einander getrens net. Es wird diefer Sommervogel in Rugtand icoch fehr felten gefunden, häufiger zeiget er fich in den fublichen Gegenden, aber fleiner, und bon jenem auch darinnen unterschieden, daß ihm die Striche und die weißen Puncte mangeln, Dallas Reisen.

> **Z** 4 E. Bau

296 Funfte Cl. III. Oran: Steubflügel.

E. Baus renvos gel. E. Baurenvogel. Plebeji rurales.

255. a. Der Affelreupenschmetterling. Pa-

255. 2. Affel raupent famet terling. Telemus.

Es giebt einige gemeine Tagvogel, welcher Raupen fast die Gestalt der Affelwurmer haben, und dahin gehöret dem auch diese Art, welche aus Berdice sommt. Die Oberstäche aller Flügel ist unvergleichlich himmelblau mit einiger dunklerer Schattirung, und auf der Mitte der Börberstügel mit einem graubrannen runden Flecken besetzt. Die untere Flache aller Flügel aber ist graßgrun, Cramer.

Cramer, uytland Kapellen, Tab. IV. fig. D. E.

255. b. Der Assilpage. Papilio Gab-

noch wird aus Berbice eine ungemeine hies her gehörige Art gebracht, die auf der Fläche oben ganz sammetartig himmelblau ist, und einen schmarziela. Die Unterstäche aber der Börderstügek ist blau und grun schattiret, an der Spise mit ein paax braunen Strichen von ungleicher kange gezieret. Die Unterstügel hingegen sind nach oben zu grundlichgrau, in der Mitte mit etlichen Wellenstrichen in die Queste bandiret, und am Ende mit einer grunen achatartigen Zeichnung, worinn zwen runde braune Fleschen steinen, gezieret. Der Rand dieser Klügel

de Schwange. Cramer.

Cramer, uytland. Kapellen, Tab. VI. fig. C. D.

führet nach Art ber Pagen jede bren bervorftechens

135. Der

255. c. Der Galdpage. Papilio Pelion. Bang

renvo--

Es find alle Flugel biefes Schmetterlings, geli... ber auch aus Derbice kommt, von ihrer Einsen, Goldstung an bis zur Halfte auf ihrer Oberstäche ichon page. himmelblau, ber übrige aussere Theil ber Flügel Pelion. aber ift gleichfarbigbraun. Go weit das himmelblong Beld gehete forweit find auch die Ringel mit glanzenden goldenen Duncten besett. Die untere Blache ift mehrentheile weiß, und in verschiedener Zeichnung braun schattiret, und jeder Flügel hat einen pomeranzenfarbigen Punct. Cramer. Cramer. uytland. Kapellen, Tab. VI. fig. E. F.

255 d Der Orign, Papilio Orion.

Er ist so groß wie der Leuerpapillon Orion. No. 253. Die Rhigel find oben braun, und auf Orion. bem mittlern Felbe Hau beftaubt, im Umfange find fienschwarzlichten Der Sann ift meiß gezähe nelt, und mit ancinander hangenden blaulichen Ringeln gezieret. Mitten auf dem Felde zeiget fich ein Schwarzer Salbmond. Untenfer find die Flügel weißlich, und mit haufigen großen Puncten befett, bavon die werbern Flugel auf der Flache dren fuhren, und mehrentheils dren punctirte Banbe haben. Die Bingerflügel haben im Felbe cilf Puncte und im Rande fieben, die an einer gelben Binde ftehen, welche gebogen ift, und an einen fomarzen Strich anftoft. Auffer diefen ift noch ein halber Mond vorhanden. Man findet ihn im Man in durren Reldern. Pallas Reifen.

† 255. c. Der Pallas. Papilio Archiades.

Er ift auf benden Seiten dem Streupunct Pallas. No. 234. vollkommen abnlich, aber um die Halfte Archia-

# 298 'Gunfte Cl. III. Orbn. Staubflugel.

E. 23au renvo: ael.

Eleiner und die Blugel find etwas geschwarst, wie in dem Sindbeervogel No. 237. Auch-ift ber Winkel am After braungelb, das Beibeben ift braun. Man trift ihn im wohlriethenben Sonig. graß an. Dallas Reifen.

#### 255, f. Der dinefische Bauer. Eryx.

255.f. Chine. fifche Bauer. Ęryx.

Der Korper ift bem Doppelichmans No. 223. vollkommen ahnlich. Alle Flügel sind oben braun und unten grünlich. Die Hinterstügel sind hintenher stumpf gezähnelt und geschwänzt. Der Schwanz ist linienformig, weiß, und fast so tang als der Flügel selbst. Bor dem him tern Rande ift noch eine weiße Bindey benebft noch funf schwarzen Puncten, befindlich. Baterland biefes Commervogels ift China. Line neus.

#### 255. g. Der bentsche Bauer. Tithonus.

Deute fde Bauer. nus.

Der Körper ist braun, und er hat die Ges Deuts ftalt und Größe des Zeupapillons No. 239. Die Borderflügel find oben und unten gleichfarbig, namlich braun, und haben ein braungelbes Belb. Innerhalb der Spige ftehet ein Auge, welches schwarz ift, und zwen weiße Puncte hat. Die hinterflügel find oben ebenfalls braun, und haben ein braungelbes Feld, find aber neben der gelben Farbe noch mit einem fehr fleinen weißen Punct gezieret. Unten find fie gwar auch braun, haben aber eine blaffe mellenformige Binde, und binter berfelben zwer weiße Duncte in einem schwarzen Rande

231. Geschliecht. Lagudgel 299

Rande. Man trift ihn in Deutschland an. Line neus.

E. c. Bürgervögel. Plebeji Urbicolæ. E. e. Bürgers

† 274. Der Palamon. Papilio Palamon.

Er hat die Größe und Gestalt des Rost.

flecks No. 245. Die Flügel sind oben braun, und Pale haben viele gelbe Flecken, die auf den Börderstür mon.

geln mehr, oder minder zusammen sließen. Die Dinterstügel hingegen suhren auf der Fläche dren große, und im Umfange ohngesehr sechs Flecken.

Unten ist die Farbe aus dem gelben aschgrau, wo die Flecken in den Börderstügeln ebenfalls mehr zusammen laufen. In den hinterslügeln aber sind die Flecken blaß, und in einer bräunlichen Linie eingeschlossen. Zwen davon stehen an der Wurzel, dann dren, und die Binde am Umfange ist ein wenig unterbrochen.

Eine Verschiedenheit dieser Art die ganz goldgelb ist und einen schwarzen Saum hat, ist an dem anssern Rande der hinterflugel gelb. Die Felder der Vorderflugel haben vier schwarze Fleden, welche an benden Seiten ungestaltet sind, und noch eine Reihe Puncte am Rande, übrigens aber ist sie wie die vorige hauptart beschaffen. Pallas Reisen.

† 275. Der Morpheus. Papilio Morpheus.

Er hat die Größe des Zeuerpapillons 279. No. 253. Doch ist der Kopf nicht so die, ob More er demfelben sonst wohl ahnlich sichet. Die Flu, pheus. gel sind oben braunlich schwarz und weiß gezähneste. Morpheus, Die

Digitized by Google

### 300 Fünfte Cl. III. Ord. Staubflugel.

Bur gervo. gel.

Die Borderflügel haben an ber Spite ein und andere fleine gelbe Rlecken, aber die Sinterflügel find an der untern Seite mit fehr vielen ovalen filberfarbigeweißen Bleden befest, Die mit einer fcmargen Linie, als ob es Renfter maren, eingebod faffet find. Die Borderflugel hingegen haben ei= nen blaffen halbmondformigen Rlecten auf bem mitlern Relbe, und nach ber Spige ju einen gelben fcmary eingefaffeten glecken, wie auch einen gel= ben Rand. Man findet biefen Schmetterling, ob mohl felten,in ben Gebufchen am Samara jedoch nur gur Abendzeit. Pallas Reifen. Surrennige Plingegen führen und ber Sieche berg

straight and their angle straight from the Statute finionity bie Rarbe and bent gellen againmen wa bie Rieden la den Berberffelgin ebenfalle niede e Commen for fro. "A come pulgela afer find ble Fleden bleft, and in class budnulichen tene eletgefcbiefitet. Gwen bewen geben an ber Bargel,

und die Binde am thutange in ein

232. 900

# 232. Geschlecht. Pfeilschwänze.

Lepidoptera: Sphinx.

A. Aechte, mit edigen Slügeln.

Edai gel.

5. a. Der Damerungsvogel. Sphinx Lugubris.

Der Körper hat die Größe des Elephantens Dames rußels No. 17. ist oben rostfärbigsbraun, rungs, und unten schwarz. Die Börderstügel sind eckig, vogel. und haben einen braunen Querstrich, in der Mitte Lugub-aber einen schwarzen Punct, und am aussern Kans be nach ber Spige zu einen fchwarzen Bleden. An der untern Flache find alle Plugel braun, und haben verloschene wellenformige Querstriche. Das Baterland dieser Art ist America, und besonders Antigoa. Linneus.

### 5. b. Der Biered. Sphinx Tetrio.

Er ist so groß wie der Codtenkopf No. 9. 5.8. won weißlich-aschgrauer Farbe. Der Hinterkörper Biered. ift untenber mit vier ichwarzen, ins Bevierte ftes benden, ziemlich großen Puncten befest. Die Borberflügel find hintenber gezähnelt, afchgraus und braunigewölft. Die Hinterflügel aber oben afchgrau, und unten mit zwen schwärzlichen, bos gigen Linien gezeichnet. Das Baterland ift America. Linneus,

A. a. Aechte

302 Fünfte CL III. Orbn. Staubflügel.

A. a. Aechte mit glattem Flügelrande.

24. a. Die Langlinie. Sphinx Tersa.

24 a. Lange linie. Terfa.

Augel.

A 2. Lechte

Der Körper hat die Gestalt der Schweinssschnause No. 18. ist oben greiß, unten aber, und an den Seiten gelblich. Das Bruststuck sühret oberhalb den Flügeln an jeder Seite eine weiste linie, welche bis an die Augen fortgehet. Die Vörderstügel sind obenher bläulich, und der kange nach mit braunen kinien besetz, davon die breittere und die schmälere miteinander parallel laufen. Mitten auf den Flügeln zeiget sich ein schwarzer Punct. Die hintersügel sind oben braun, und sühren sechs kleine gelbe Flecken, die unten auf ihrem Ruhepuncte weiß sind. Unten sind die Flügelziegelsärbig, und mit einer Reihe brauner Puncte der känge nach besetzt. Das Vaterland ist Martiland, Jamaica und Antigoa. Linneus,

B. Baftard unruben

B. Bastardunruhen.

48. Der Braunstrich. Sphinx ftrigilis.

48. Braun Arich. Strigilis, Der Körper ist mittlerer Größe, oben asch, grau, unten braungelb. Das Bruststück hat an den Seiten einen braunen Flecken. Der Hinters körper ist ungesteckt. Die Schenkel sind brauns gelb, und die Schienbeine aschgtau. Die Borders flugel sind obenher auf einer greisen Grundfarbe braunzgewölkt, und etwas gesteckt. Nach der Wurzel zu besindet sich ein etwas großer brauner Punct, der hintere Rand aber ist an benden Seiten braun. Untenher sind die Oberstügel an den Seiten mit dunklen abweichenden Querstrichen besetz, und der hintere Rand ist an benden Seiten Die Hinterstügel endlich sind an benden Seiten Seiten

## 232. Gefdlecht ... Pfeilfdmange. 202

ten fo beschaffen, wie die untere Seite ber Bor. B. berflügel. Es halt fich biefe Art in America auf. Baftard Linneus.

#### 49. Die Thetis. Sphynx Thetis.

Die Große des Rorpers übertrift eine Biebe Theits. breme. Ropf und Brufiftuct find oben fcmary, Thetis, und mit scharlachfarbigen Puncten befest. Der Binterleib ift oben blau, und lauft an ber Spite limal aus. Die Borderflügel find stimary, und haben glasartig burchfichtige Spigen. hinterflugel find gleichfalls fcmarz, und führen auf der Blade ein fplofformiges burchfichtiges Reld. Das Baterland ift Jamaica. Linneus.

#### 50. Der Hylas. Sphynx Hylas.

Er stehet dem Summelschmetterling No. 28. Sylas. dem Korper nach ahnlich. Der hinterleib ift oben Hylas. areisblan, und unten ichwary mit weiffer Zeichnung, ber vierte Ring aber ift purpurfarbig. Das Bruft. Ruck ift gleichfalls greißblau, und ber After bat einen ichmargen Bart, daher er benenjenigen, die in der britten Abtheilung A. \*\*\* fteben, und einen ranben After haben, abnlich ift. Alle Blugel find nam und gar fenfterartig durchfichtig, und haben nur einen ichwarzen Rand. Man befommt biefe Art dus China: Liftneus.

#### 51. Der Erabant. Sphynx fatellitia.

In Jamaica wohnet noch ein großer Pfelle Erabant schwant, der greiß und braun-bunt ift. Die Ringe Satollides hintertorpers haben auf dem Rucken zwen tia. fcmarge Fleden. Die Borberflugel find etwas greife, und nach der Spige ju braun gewolft. Mite

-: ,

# 304 Fünfte El. III. Orbn. Staubflügel.

B. Mitten auf der Glache fichen zwen schwarze Augen. Baffard puntte dithte benfammen; bavon der hintere an unruben fleinften ift. Die hinterflügel hingegen find braun, an der Burgel afdigrau, und am hintern Rande fcmarzeffectt. Luneus.

### 52. Die schwarzbraune Unruhe. Sphynx Helymus.

Unter ben Baftardunruhen findet man in Gue Edimart. . riname noch eine Art, beren Glugel an benben Geis braune Unrube. ten fcmargbraun find, und einen grunen Gegens fchein geben. Der Korper ift mit grunen goldglans Helyjenden Strichen geftreift. Die Große und Geftalt mus. aber hat mit ben fliegenartigen Schmetterlingen einige Aehnlichkeit, nur daß fich bie Blugel mehr in die Lange behnen. Cramer.

Cramer uytland. Kapellen, Tab. II. fig. D.E.

# 53. Der Ragenschwanz. Sphynx Coardata.

53. Raken Coarétata.

Segenwartige Art fommt aus Demerary fdwang, und Berbice. Das Mannchen hat am Rorper einen fabenformigen fchwarzen Schwang, ber noch langer als ber Rorper ift, und darum fuhret diefe Art obige Mamen, welche aber von herrn Dallas in seinen Spicil. Zool. fasc. IX. p. 27. Sphynx cerberi genennet wird. Die Flugel find alle gelblich durchfichtig, die vordern fehr lang und Schmal, Die hintern gang turg und flein. Rorper febr lang, ohne ben Schwang zu rechnen. Das Weibchen hat feinen Schwang. Cramer. Cramer uytland, Kapellen, Tab. IV. fig. F. G.

# 232. Befdlecht. Pfeilfdwanze, 305

### 4 54. Die Medufe. Sphynx Medufa.

Baftard unruben

Sie kommt mit der Ringelmotte No. 35. Meduse. Dir Meduse. Hinterforper hat einen scharlachrothen Gurtel. Die Meduse Flügel find gleich gefarbet. Die vordern haben swen weisse runde gleden und einen Punct auf ber mittlern Flache ftehen, an der Burgel aber befind det fich ein rothes Auge in einem weissen Ringe, und am dittern Rande zeiget fich noch ein langlicher rother Fleden. Die hinterflugel hingegen haben mur einen einzigen weiffen Punct, und find am duffern Rande greiß. Man trift biefe Art auf ber Hirschwurg an. Dallas Reisen.

# + 55. Der Blutring. Sphynx cruenta.

Dieser Pfeilschwanz hat die Große und Ges Sints stalt der Aingelmotte No. 35. ist blaulicheschwarz, ring. und führet einen Seidenglanz. Der Hinterforper Cruenift mit einem tothen Gurtel gezieret. Die Bors ta. derflüget haben fünf rothe, und mit einem weissen Dand umgebene Bleden, wovon die zwen mittlern ineinander fließen. Die Hinterflügel aber sind roth, und mit einem schwarzen Rande eingefast. Man trift diese Art zu Anfang des Julii in den trauterreichen Gegenden am Wolga und Jrcis ilemlich häufig an. Pallas Reifen.

233. 311

# 233. Geschlecht. Nachtvögel.

Lepidoptera: Phalaena.

Mitlaffe. A. Attlaffe. Attici.

17. a. Das weiffe D. Phalaena Tarquinia.

ieser überaus schone Nachtvogel, welcher ein Weischen ist, kommt aus Suriname. Er Tarquis ist mit ausgebreiteten Flügeln über vier Zok breit. Die Jühlhörner sind fast nicht gesedert, der vorder re Korper ist dunkelbraun, der hinterleib hat braus ne Ringe mit abwechselnden gelben Jugen. Die Vörderstügel sind dunkelbraun, und in die Quere mit einem weissen Phison gezeichnet, darauf macht eine weisse Linie eine Abtheilung zu einem breiten Rande, dessen hellbraun ist. Die hinterstügel sind obenher zies gelroth, und haben in der Mitte einen hraunen länglichen, etwas gebogenen Flecken, am Rande aber eine breite aschgrau gelbe Einsassung. Cras mer.

Cramer uytlandsche Kapellen, 'Tab. IV. fig. A.

# 17. b. Das fleine D. Phalaena Tarquinia.

17. b. Rleines Wermuthlich ist, nach Herrn Cramers Muth-Rleines D. massung, diese Art das Mannchen zu der vorigen. Tarqui- Sie kommt ebenfalls aus Suriname, und wie nia. man unter der vorigen Art keine Mannchen, and unter diefet feine Beibchen findet, fo gehoren A. fie wohl wahrscheinlich zusammen. Inzwischen ift Attlaffe.

boch der Unterschied groß.

Borerft ift gegenwärtige Art ein Drittel wie ner, welches fast durchgangig ben den Mannchen ber Schmetterlinge fatt hat. 3mentens find die Bordetflugel auf der Oberflache weiß mit feinen braunen Grenfeln, baben aber in ber Mitte einen braunen beriformigen Gleden, ber mit einem weiß fen Poftlon barchichnitten ift. Die hintern Flügel find oben blaß ziegelfärbig, und am Rande weiße lich, haben aber in der Mitte dennoch einen fleis nen braunen langlichen Fleden, woraus man die Achnlichkeit mit obigem Weibchen erfennet. ber untern Blache find alle Blugel blagigiegelfarbig. Cramer.

Cramer uytland. Kapellen, Tab. IV. fig. B. C.

### 17. c. Der Augenspiegel. Phalaena Polyphemus.

In Meujort und Jamaica zeiget fich ein Augen. Schoner großer Spiegelträger ober augiger Nachts spiegel. vogel, der vier Boll in ber Breite austragt, und Polyfehr niedlich gezeichnet ift. Die Borderflugel find Phemus obenher braumlichegrau, nach bem Korper ju roth. lid, in der Mitte mit einem rothlich grauen Bande, und einem langlich runden, glasartig durchfichtis gen Spiegel verfeben. Im Rande haben fic einen gelblichegrauen breiten Saum, welcher durch eine breite, ichwarze, an der auffern Seite weiß unters fricene Binde von dem übrigen Felde unterfchies ben ift, desgleichen auch an der obern Seite ber hinterflügel ftatt hat, nur ift das innere Feld berfelben ichmarglichigrau, und in ber Mitte mit zwen febr großen befonders ichonen Augen gezieret. Dies k Augen haben zuerft einen fehr großen schwarzen Ring,

### 308 Fünfte El. III. Orbn. Staubflügel.

A. Ring, dann ein inneres weißepunctirtes Feld, und Untaffe. nach unten zu in diesem Felde einen dicken gelben drepeckig erhabenen runden Ringel, durch dessen Mide eine schwarzepunctirte kinie auf einem durche sichtigen weissen Spiegelselbe gehet. Die untere Seite der Flügel ist dunkelgrau, mit rothlich weissen, bogigen Schattirungen versehen, und besser im Bemalde als durch Beschreibung deutlich zu erklären. Cramer.

Cramer uytland Kapellen, Tab. V. fig. A. B.

# 17. d. Der Braunmond. Phalaena tuffa,

17.d. Braun, mond. Ruffa.

In den sidlichen Theilen von Quropa zeiget sich ein Nachtvogel mit weissen Flügeln, das von die obern niedergebogen sind, und neben der Brust einen gemeinschaftlichen braunen Flecken führen, der nach den Seiten herad einen rostfars bigen Schatten wirft. Im hintern Rande aber zeigen sich sechs verloschene braune Mondslecken. Die hintern Flügel sind ganz weiß, und am hintern Rande braunlich. Die Fühlhörner sind kammsertig, und samt den Füßen von brauner Farbe. Die Eröße ist etwa wie eine Biehbreme. Linneus.

### 17.e. Das Großauge. Phalaena macrops.

17. e. Groß auge. Ma-crops.

Er hat burstenfühlhörner und eine gewickelte Bunge. Die Flügel sind mit braun, und schwars zer wellenformiger Zeichnung besett. Die Bors derflügel tragen oben ein roftfarbiges Auge, und sind unten weiß gesteckt. Das Baterland ift Offendien. Linneus.

B. Spin-

### 233. Gefclecht. Nachtvogel. 309

B. Spinner, (Bombyx) Bendeflügel. ad No. 33. Der Seibenvogel. Phalaena mori.

Spin. net.

Mur eine fleine Probe von den Beobachtungen in Absicht auf diefe Art zu geben, so ift angu- vogel. merten, daß ein einziger Seidenwurm 930 Schuh Mori. doppelte Raden fpinnt, welches eine Lange von 1860 Schuh ausmacht. Ben ber Zerglieberung einer Raupe fand man 1336 Lungenafte, Die aus 232 großen Stammen entspringen, und 1647 Muß ruln. Den Nachtvogel betreffend, so legt er 500 Eper, woraus gemeiniglich 200 Mannchen, und 300 Beibchen kommen. Diese Brut legt im zwenten Jahre hundert und funfzig taufend Ener, aus welchen im dritten Jahre fcon 1125000 Ener emfteben. Go baf bie Bermehrung biefer Thierchen unbegreiflich groß und gang erstaunlich ift.

### C.c. Mit Saugerüßel und glattem Ru-C.c. den. (Noctuae.)

**Glatts** fauget.

### 116. a. Der Blaufled. Phalaena allica.

Er ift gelb, hat aber auf den Borderflugeln zwen blaue Flecken, bie vermittelft einem blauen Blau. Rande miteinander verbunden find. Das Bater, Allie land ift Oftindien. Linneus.

116.2.

### 116.b. Der Bangflugel. Phalaena deplana.

Es find die Flügel niedergedruckt, und der Dang, ganze Nachtvogel hat die größte Achnlichkeit mit fingel. dem Glachflügel No. 115. nur ift er etwas grof. Depla-fer. Die Stirn, und die Augen find schwarz, das na. Bruftftuct ift gelb. Die Borberflugel find oben П 3 Maulich.

### 310 Funfte Ct. III. Orb. Staubflugel.

C. c. Ewien, Slatti fauger. blaulichigelb, am Rande ben der Burgel schwarz, hintenher braunlich gestreift, und an der untern Seite ganz braun. Die hinterflügel hingegen find gefalten, gelb, und nur am aussern Rande braunlich. Linneus.

#### † 116. c. Die Frühlingseule. Phalaena Pyrausta.

T16.c. Frub: lings: eule. Pyraufta, Diese Art ist dem Purpurhals No. 113. und dem Flachstügel No. 115. nahe verwandt, aber dreymal kleiner als die erste Art. Die Flügel sind verloschen schwarz. Die Vorderstügel haben dren sehr schwarze Puncte, welche gerade in einer Reihe stehen. Die hinterstügel sind noch blasser. Der Körper ist kohlschwarz, aber der Unterleib seuergelb, ausgenommen an der Wurzel, und untenher nur mit schwarzen Puncten besprenget. Man hat diesen Nachtvogel im Frühjahr am Wolsga wahrgenommen. Pallas Reisen.

C. c. c. Eulen, Ramm: fauger.

C. c. c. Eulen mit Saugerüßel und Kammernden.

#### 193. a Der Pinselschwang Phalaena Julia.

193. a. Pinfeli Johnang Julia. Am Vorgebürge der guten Sofnung zeis get sich ein Eulchen, welches oben auf den Bors derstügeln auf einem dunkel isabellfärbigen Grunde braun rothe runde Flecken und Zeichnungen hat, auf den hinterslügeln aber einfarbig braun roth ist, den Rand ausgenommen, welcher hinter einer schwarzen Einfassung bellbraun gesäumt ist. Die untere Fläche ist an allen Flügeln hellbraun, ausgenommen, daß sich an den Vörderslügeln einige isabellenfärbige Flecken zeigen. Im Schwanze des

Rorpers befindet fich ein pinselartiger Buschel. C.c. Der herr Cramer der biefe Art anführet, halt Ramme fie fur das Mannchen Desjenigen Bogels, welchen fanger. wir ben der Phalagna aestuata No. 241, nebst eis ner Abbildung angeführet haben, (fiehe sten Theil, pag. 714.) und wenn deme also ift, so gehoret felbige, als bas Beibchen, nicht unter die Gpannenmeffer, sondern mit diefer Art allhier unter die Eulden. Cramer.

Cramer, uytland Kapellen. Tab. VII. fig. E. F.

### 193. b. Die grune Gule. Phalaena Ilyrias.

Sie ift oben einfarbig grun mit einem gele 193. ba ben Saume an den Flügeln, und mit einem gelben Grune Buschel am Schwanze. Die Borderflügel haben Lyrias. bren fcmarge Querftriche, und die hintern jeder eis nen gelben und einen schwarzen Punct. Die uns tere Flache ift einfarbig gelb. Die Fuhlhorner find gefedert, und der Aufenthalt ift in Surina. Cramer.

Cramers, uytland. Kapellen, Tab. X. fig. E.

#### 193. c. Die Docte. Phalaena decora-

Am Vorgeburge der guten Sofnung zeiget 193.c. fich ein nichlicher Nachtvogel von mittlerer Broge, Doce. welcher einigermaffen mit einem gewundenen Saugerußel verfeben , und befonders ichon gezeichnet ift. Es find namlich die Borberflugel rotheweiß: blau : und schwarz : bunt, auf der Oberflache weche feln einige runde schwarze und weiffe Blecken mit einander ab. Der hintere Rand aber hat fieben langliche weisse Blecken. Die hinterflügel hinges gen find roth, und haben einen ichwarzen Rand. Linneus.

Petiver Tab. 58. fig. 7.

114 D. Span-

### 312 Junfte Cl. III Ordn. Staubflugel.

D. d. Eran. nenmeff. Rund. flugel.

### D. d. Svannenmesser, (Geometrae,) Rundflügel.

### 229. a. Der Achatflügel. Phalaena Syrings.

229. 2. Achato fügel. Syring2

Dieser Nachtvogel hat apfelbluthfarbige Bors derflügel, mit grauen, gelbgesteckten Querbinden. Die Hinterslügel aber sind fleischfarb mit zerstreues ten schwarzen Flecken. An der untern Fläche sind alle Flügel roth mit schwarzen zerstreueten Flecken. Die Breite ist anderthalbe Zoll. Man bekommt diese Art von der Rüste Loromandel. Cramer. Cramer, uytland. Kapellen. Tab. V. fig. C. D.

D. d. d. Bürsten borner.

### D.d.d. Spannenmesser mit edigen Siw geln und bürstenartigen Hörnern. Geometrae.

### 236. a. Dreveckflügel. Phalaena Manto.

236.2. Drep edflügel Manto

Die Flügel sind grau mit einer aschgrauen Binde und schwarzen Einfassung. Die Borders slügel sind edig, und jede mit einem länglichen gelben Auge verschen, dessen Kern schwarz ist. Die Hinterstügel sind zwar rund, laufen aber in der Mitte in eine Spise aus. Unten sind die Flügel einfarbig blaßebraun. Das Vaterland ist Suris name. Cramer.

Cramer uytland. Kapellen, Tab. X. fig. F.

### 236. b Der Rauhflügel. Rhalaena hirtaria.

236.b. Raube fliget Hirtaria.

Die Flügel sind weißgrau, rauhhaarig und mit zwen schwarzen. Striemen besetzt. Die Hinterflugel siehen aneinander. Die Fühlhörner sind schwarz. Der Aufenthalt ist in Buropa. Linneus.

236, c. Det

#### 236. c. Der Schabflugel. Phalaena defoliaria.

Auf ben Birn. und Aepfelbaumen zeiger fich 236.a. noch ein hiehergehöriger Nachtvogel, welcher graue Chabe Flügel hat, die in der Mitte weiß find, aber einen flügel. fcmargen Punct und hinten einen schwarzen Strie, lineis. men führen. Linneus.

Rofel Infect. Cupplem. p. 83. Tab. XIV. bas Weibchen.

#### 236. d. Der Engellander. Phalaena 8-maculata.

Der Korper hat die Groffe einer Wiehbreme, Engel sind ift gang schwarz, nur hat bas Bruftftuck zur lander. Seiten neben den Flugeln einen fleinen weisen 8 macua Flecken, und der hinterforper hat zwischen den Ringen weisse Einschnitte. Die Flügel find alle miteinander gleichfarbig schwarz, und auf jedem find zwen große weisse Flecken befindlich, davon der vordere rund, der hintere aber mehr oval ist, und in die Quere ftehet. Das Baterland ift Ene gelland. Linneus.

#### +236. c. Der Birfenvogel. Phalaena fulvulata.

Er ist ein wenig größer als der Seckenkries 236. a. cher No. 243. sitzet aber mit den Flügeln auf die Birken wamliche Art wie jener. Der Körper ist schwarz, Fulvumed sehr rauh. Die Börderstügel sind oben braum lata. licheruffarbig, und haben an dem dicen Rande afchgrau , weiffe gewolfte Binden. Die Sinter. Augel find gelbliche braun, und führen an der Burgel ein langliches schwarzes Feld, bas hintene ber in zwen Spigen ausgehet, desgleichen einen ichmarien Rand. An der untern Glache find alle 11 5

# 314 Hunfte. El., III. Ordn. Staubflügel.

Blugel gelb, und haben nur einen braunen Bogen, und bergleichen Rand. Man trift biefe Art, noch ebe bas Laub ausschläget, und ben Tage baufig in den fibirifchen Birtenmalbern an Dallas Reisen.

G. Motten. (Tinea.) Mottett.

453. a. Der Beißstriem. Phalaena nigrella.

Beif. ftriem

Die Flügel find schwarz, und mit weissen Striemen besetzt. Der vordere Striem ift gerade, Nigrel- ber hintere aber gebogen. Man findet diese Art in Oftindien. Linneus.

Pierte

# Vierte Ordnung.

# Mit aberigen Flügeln.

Insecta: Neuroptera.

# 234. Geschlecht. Jungsern. Neuroptera: Libellula.

B. Mit weit auseinander stehenden Augen.

B. Nympf. Weitaugen.

† 22. Der Federfuß. Libellula pennipes.

iese Art hat die Große und Gestalt der Reber Sumpfnympfe No. 21. Das Bruft, fuß. ftud ift bandiret, der Ropf hat zwischen Penniben Augen eine Binde und einen Querftrich, übri, pes. gens ift der Korper fehr weiß und schwach rothlich, oder blaulich verschieden. Der hinterforver hat unten der lange nach eine schwarze linie, die ben etlichen drenfach, und noch dazu mit einer minder oder mehr unterbrochenen Ruckenlinie vermehret Die Schenkel der Juge find gleichfalls mit amen linien befent. Die Schienbeine find weiß, ermas breit, und mit Federchen befest, die einen ftrichformigen schwarzen Riel ober Schacht haben. Die Blugel find glasartig durchfichtig, und haben an der Spite ein fleines braungelbes Feld. Art ift hin und wieder am Wolga und Samara wahrgenommen worden. Pallas Reifen.

237. 900

# 237. Geschlecht. Stinkfliegen.

Neuroptera: Hemerobius.

### 16. Die Creutfliege. Hemerobius cruciatus.

16. Ercuş: ficge. Cruciatus. ginianischen Pflaumen eine Stinksliege, beren Börderstügel vorneher mit vier schwarzen Flecken besetzt sind, und wenn sie zusammen liegen, wie Gold glänzen, hinten aber ein gemeinschafte liches braunes Ereutz führen. Die Hinterstügel sind glasartig durchsichtig, und glänzen ebensfalls wie Gold. Die Jühlhörner sind länger als der Körper, aber kurzer als die Flügel. Der ganze Körper ist nicht größer als eine Laus, mit braunen und blassen Flecken besetzt. Das Bruststück ist von oben creusweise eingeschnitten, und die Jüße sind blassfärbig. Linneus.

# 238. Geschlecht. Baftarbjungfern.

Neuroptera: Myrmelea.

### 46. Der Drepftrid. Myrmeleatrigrammus.

fr ist größer als der Umeisenlowe No. 3. und Oren-hat auch breitere Flügel. Der Körper und steich. Die Juge sind gelb. Die Augen sind braun kupfers Trifarbig. Die Fühlhörner habet, eine niedergedruckte gram-Keule welche gelblich ist. Die Stirn ist schwarz, mus. Der Wirbel fuhret eine schwarze Linie und zwen bergleichen Puncte. Der Sale, die Bruft und ber Bauch, find mit bren fchwarzen parallel laufen, ben Strichen befest, movon ber mittlere am breites fen ift. Das Bruftftud ift glatt, ber hinterfore per oben weißlich wollig, und unten schwarz. Die Mannchen haben an den zwen legten Ringen einen Schwang, der auf benden Seiten einen Fortsat bat, welcher mit zurückgebogenen Zoten besetzt ift. Die Flügel find glasartig durchsichtig, und haben blaffe Abern, Die zuweilen braun unterbrochen find. Die Borderflügel haben nach der Spige zu einen. weissen Striemen. Man findet sie in den stidle chen Wiften Rußlands haufig. Pallas Reisen.

Bunfte

# Kunfte Ordnung. Mit häutigen Klügeln.

Insecta: Hymenoptera.

242. Geschlecht. Schlupswespen.

Hymenoptera: Tenthredo.

Reule borner. A. Mit abgestutten Kuhlhornern.

10. a. Der Windenschlupfer. Tenthredo convolvuli.

Minden filmary, und etwas aschgrau wollig. Die schlupfer Guhlhörner sind abgeschutzt, und endigen sich in einen vull. Eriangel oder abgeschnittenen Keule. Der erste Ring des Unterleibes hat unten vier aufgerichtete Dornen. Sie siget matt und faul in den Bluten ber Winden in Rußland. Pallas Reisen.

# 244. Geschlecht. Raupentobter.

Hymenoptera: Ichneumon.

B Mit weißlichem Schilde und schwatzen Fühlhörnern.

# 22. a. Der Kirfdmubler. Ichneumon cerafi.

Fr hat einen fleinen, blaulich grunen und vers guldeten Körper, schwarze, etwas keulformis mubler. ge Fühlhorner, ein schwarzes Maul, die Flügel Cerasi. ohne Punct, einen anschließenden hinterforper, und blaffe Schienbeine, benn die vier vorbern. Schienbeine und alle Fußsohlen find gelblichblaß. Diefe Art balt fich in ben fegelformigen Ballen ber Rirfchbaume auf, und wird ziemlich haufig ges funden. Linneus.

D. Schild und Brufffud einfarbig die Kühlhorner schwarz und bürsten barken. artia.

#### 54. a. Der Großschwang. Ichneumon macrourus.

Der Körper ift gang roftfarbig, und zwen Boll 54.2. lang. Die Sublhorner find burftenartig und nur fowans. halb fo lang als ber Korper. Die Fuße hingegen Macro-haben de Lange des Korpers. Der hinterforper urus. ift fichelformig, gehet nach ber Burgel ju allmählig

# 320 Funfte Cl. V. Orb. Mit hautigen Flug.

schmal ab, und sitet-kaum noch an einem Stiel. Die Flügel sind bram. Die ersten haben zwen glavartig durchsichtige Binden, davon eine in der Mitte, und die andere an der Spite lieget. Der Stackel oder Schwanz gehet in dren Kaare aus, (davon die zwen äussern in einer Scheide stecken,) ist zwenmal so lang als der Körper, und stehet etwas in die Hohe gebogen hervor. Das Vaters land ist Carolina. Linneus.

# 245. Geschlecht. Bastardwespen.

Hymenoptera: Sphex.

### B. Der Hinterleib fast ohne Bald.

B. Lucz. Dalfe,

† 39. Der Eidechsentobter. Sphex lacerticida.

Diese Art ist so groß als eine gemeine Wespe, Cibech und schwarz. Am Kopse besindet sich vor sen, und hinter den Augen ein gelber Strich. Der idder. Bogen des Bruststucks ist vor den Flügeln gleich, Lacerfalls gelb. Der hinterkörper ist etwas klein, schwarz und glänzend, die dren mittlern Ringe desselben sind auf benden Seiten mit einer kleinen gelben Querlinie bezeichnet. Die Fühlhörner sind greiß, ziegelfarbig. Die Füße haben eine vollkommene Ziegelfarbe, und sind an der Wurzel der Schenkel schwarz. Die Flügel sind braungelb, und an dem aussern Kande schwarz. Man hat diese Art, die sehr verwegen ist, und sogar die kleinen Sidechsen tödtet und vergräbt, in der Gegend des Samras susses und entbeckt. Pallas Reisen.

# † 40. Der Samarier. Sphex samariensis.

Die Länge dieser Art ist fast wie eine Hornisse, Samad der Körper kohlschwarz ohne Glanz. Zwen Ringe rier. des Hinterkörpers sind auf dem Rücken ziegelfäre Samadbigeroth und glänzend. Uebrigens ist sie der Wund riensischerweise No. 15. sehr ähnlich, nur sind die Flüskinne Suppl. B.

### 322 Fünfte El. V. Ord. Mit häutig. Flugeln.

B. gel braun, und haben einen violetfärbigen Gegens Rury fchein. Sie wird auch am Samara gefunden. Pallas Reisen.

### + 41. Der Beißflügel. Sphex leucoptera.

Die Größe ist wie eine Wespe. Der Körper sügel.
Leucoptera bunden, daß weiter nichts als eine Halsschuppe swischen benden komter nichts als eine Halsschuppe swischen benden kommt. Die Flügel sind weißlich, die Füße diet und stachelig, die Fühlhörner aber, dunn, fadenförmig, und kaum langer als das Brussstuff. Man hat diese Art von dem Indersee bekommen. Pallas Reisen.

### +42 Der Ranzeltrager. Sphexmanticata.

Ranzels In eben der Gegend wird noch eine andere Art trager. in der Größe der Wunderwespe No. 15. gefuns Manticata. den, welche schwarz ist, auf dem Bruststück aber, welches hinten und vorne roth ist, in der Mitte gleichsam einen rothen Ranzel trägt. Der hinters theil des Bruststücks ist dreneckig abgestunt. Die Klügel sind schwärzlich. Pallas Reisen.

# † 43 Die rothe Bastardwespe. Sphex erythraea.

Stothe Bastard Das Schildlein ist zweneckig und roth, der vordere wespe. Einschnitt des Bruststucks ist gleichfalls roth, und Eryder Sinterforper hat vier rothe Flecken, alles übsthrass. rige ist schwarz ohne Glanz. Diese Art streift in den durren Feldern am Jrris herum. Palias Reisen.

+44. Der

# 245 Gefdlecht. Baftarbwefpen. 323

† 44. Der rußische Doppelvorn Sphex Rury balfe.

Es hat der Ritter Linneus No. 14, eine 34. Urt, welche gi Bidens, und wir Doppeldoen sicher nennen. Dun zweifelt der herr Pallas, ob ges Doppels genwärtige Art nicht des Ritters Sphex bidens Dorn. fen mochte? Wir wollen fie daher ju jedermanns Bidens. Beurtheilung unter dem Mamen rußischer Dope peldorn beschreiben.

Die Größe ift wie eine Sornisse, und der gange Korper haarig rauh. Das Weibchen ift großer, hat einen großern, vorneher glatten und gelben Ropf mit ichwarzen Augen und Augen. Die Sublhorner find furg, und das Gelenke an der Burgel ift mit einer fleinen Burfte besett. Das Bruftstud ift schwarz, und nur vorneher roftfarbig sotig, hintenher zwenedig, mit sotigen Eden. Auf dem Schildlein befindet fich ein gelber Fleden. Der hinterforper ift mit zwen paar citronfarbigen Bleden bezeichnet, davon die vordern ein wenig zusammen hangen. Die Spige beffelben ift ein wenig roftfarbig jotig. Die hins terfuße find langer und dicter als an den Mannchen, und daben fehr rauh. Die Flügel find roftfarbig. brann gelb. Das Mannchen ift fleiner, gang idwars, und hat einen dunnen Ropf, ausgenome men, daß der Wirbel, so wie auch das Brufts fid auf dem Rucken, gang roftfarbig e wollig ift. Die Fuhlhorner find lang, dick und enlindrisch. Der hinterkörper hat größere Flecken, die paats weise ineinander fliegen. Der Schwang ift rofts farbig mollig, und die Blugel find wie am Beibs den beschaffen.

Won

974.0

### 324 Gunftell. V. Debn. Mit hautig Bugeln.

Bon dieser Art giebt es noch wohl zehn Berschiedenheiten, die in vielen Studen von den Baftardwespen abweichen, und gleichsam das Mittel zwischen den Wespen und ungeflügelten Bienen halten. Das Baterland ist in den süddlichen Gegenden Sibiriens. Pallas Reisen.

247.000

# 247. Geschlecht. Wespen.

Hymenoptera: Vespa.

### 29. Die prientalische Bespe. Vespa orientalis.

Der Korper ift mehrentheils braun, sonft aber Orien-ben Bespen vollkommen abnlich. Die Stirn talische tft gelb, die Jublhorner rostfarbig, der erste Ring Bespe. Des hinterforpers braun, mit einem gelben Rans Orien-De, der zwente braun, und größer als die übrigen, talis. der dritte und vierte gelb mit schwarzen Puncten, ber funfte und fechfte braun, und mit einem Stadel verfeben. Man hat diefe Art im Orient gefunden. Linneus.

### + 30. Die Glanzweste. Vespa galbula.

Sie ift von mittlerer Große und glanzend, Glanze als ab fie mit Del überftrichen mare. Es giebt mefpe. aber eigentlich drenerlen: als große, welche die Galbuls Weibeben find, mittelmäßige, welche vielleicht tein Geschlecht haben, und tleine, welche vermuthlich die Mannchen find.

Betreffend nun die großen, oder die Weib. den, fo find fie mit greifen hagren gang befest und rauh, nur find diese Saare mitten auf bem Rucken schwarz. Sie haben keine Zunge. Kopf ift vor und hinter ben Augen gelb gezeichnet. Die bren mittlern Ringe des hinterforpers find mit zwenen fast runden citronfarbigen Bleden gegieret. Die Blügel ziehen sich auf Bioletfarbe,

Digitized by Google

### 326 Funfte Cl. V. Ord. Mit hautig. Flugeln.

find vorneher einigermassen ziegelfarbig, und an der Spise braunlich glasartig durchsichtig. Die hins tern Schienbeine sind etwas dicker, drenseitig, an der aussern Seite etwas rauh, und am Ende mit zwen mißfarbigen Dornen, und einigermassen spelformigen Spisen bewafnet.

Die mittlern, (vermuthlich Zwitter,) find sehr glanzend, schwarzhaarig, und haben etwas langere Fühlhorner. Der zwente und dritte Ring des hinterforpers ist eitronfarbig. Die Flügel haben einen schwarzen Bioletglanz. Die Zunge im Maule ist sehr furz, und die Schienbeine sind einfach.

Die kleinern (vermuthlich die Mannchen) find weniger glanzend, schwarzeraubhaaria, haben einen kleinern Ropf, aber langere, dickere und nicht glanzende Sublhorner. Der hinterleib ift fcmach tig, unbewafnet, jedoch an der Spige mit dren burftenartigen Dornen verschen. Der dritte Rina ift gang citronfarbig, und ber zwente hat nur einen bergleichen herzformigen Fleden. Die Blugel find alle glasartig durchsichtig, aber die Borderflügel find an der Rippe braunlich violetfarbig. Diefer Berfchiedenheiten, Die man eigentlich für feine besondern Arten halten fann, hat gefaltene Blugel, daher fie fur eine Mittelgattung zwischen ben Wefpen, Bienen, und Baftardwefpen muß angesehen werden. Uebrigens find fie von einer tragen Beschaffenheit, und tommen ziemlich selten por. Dallas Reisen.

# † 31. Die drenfärbige Wespe. Vespa tricolor.

Iren, farbige Tricolor.

Sie ist von mittelmäßiger Große, hat flache Flügel, aber die Bestalt einer Wespe, wie denn auch die Juhlhorner damit überein kommen, und ist

ift ganz schwarz, ausgenommen daß der zwente Ring des hinterkörpers, (welcher ziemlich länglich ist,) in Größe die andern übersteigt, und zwen braungelbe Flecken hat. Der dritte Ring aber ist auf dem Rücken ganz gelb, Die Flügel sind schwärzlich. Man hat diese Art in der Gegend em Indersee gefunden. Pallas Reisen.

£ 4 248. Ste

### 248. Geschlecht. Bienen.

Hymenoptera: Apis,

B. Dummel B. Rauhe Bienen oder Hummel.

56. Die virginische Biene. Apis virginica.

Sirgionische Biene. Virgionica. den ersten Ring ausgenommen, schwarz, Die Flügel sind an der Spike schwärzlich. Man trift diese Art, welche etwa die Bröße einer Erde hummel No. 41. hat, in Virginien an. Line neus.

† 57. Die wohlriechende hummel. Apis fragrans.

28 oblerichens bedumentel. Fragrans.

Sie ist größer als unsere Hummel, sehr raube haarig, obenher ganz mit einem gelben, selten aber weissen wolligen Wesen überzogen. Der Kopf die Füße und der ganze untere Körper sind wenig wollig und schwarz. Das Bruststuck hat zwischen den Flügeln eine schwarze breite Querbinde. Die Mannchen sind ein wenig kleiner, aber die Weibe den sehr groß, an der Stirn gelblich und riechen nach Rosen. Man sindet sie häusig in den selsigen Gebürgen am Wolga. Pallas Keisen.

+ 58. Die

# +58. Die Schenfelhummel. Apis femoralis. Dummel

Sie hat die Größe einer großen Fliege, Der St. Schen-Kopf und das Bruststud sind blaß-greiß-wollig. telbum-Die Fuhlhörner sind braun. Der hinterleib ift mei. glatt, hat dren weisse Querftriche, und ift klauen: Femo. formig gefrummet. Die vier Borberfuße find ralis. bunn, die Schenfel der hinterfuße aber find oval, fast fo bict als ber Ropf, an ber Burgel mit einem Rahnchen besett, und greißwollig. Die Schien, beine find furs und fleisthig, über der Wurgel bineus in einem weißlichen Stiel verlangert, welcher glatt, gedruckt und abgestutt ift. Alle Rufe find greiß, und nur an den Schenfeln ichwarg. Man findet fie, jedoch felten in ben Buften am Jait. Dallas Reisen.

### + 59. Die Feberhummel. Apis plumipes.

Sie ift größer als eine Fliege, febr bick und Reber-turz, oben gelb: und unten greiß: wollig. Das bummel. zwente paar Buffe ift etwas mehr verlangert, und Plumiunten gehet bis zur Rlaue eine fleine, fcmarge, pesmit einem bichten Barte befente Feber. Manitrift fie baufig am Jrtis in ben Blumen an. Dallas Reisen.

### †60. Die Schwertelhummel. Apis Ireos.

Sie ist sehr schon und zwenmal so groß als 60.
eine Schmelksliege. Maul und Stirn sind gelb, Schwen
Das untere Gelenke der Fühlhörner ist vorneher telbum
gelb, übrigens aber schwarz, die übrigen sind mel.
ziegelkarbig mit einem schwarzen Rücken, Der Birbel, das gange Brufiftuck, ber gange untere Theil des Hinterforpers, und der erste Ring, find mit einer braungelben Wolle überzogen. Der X 5 übrige

### 330 FunfreCl. V. Orb: Mit hautig. Flugelte.

übrige Theil des Körpers ist oben auf dem Rücken schwarz, glatt, und an dren Ringen mit einem weissen breiten Rande verschen, der in der Mitte unterbrochen ist. Die Füße sind greiß gelb, has den eine braungelbe Wolle, und es sind nur die Hinterschenkel (ausser der Spige) allein schwarz. Das zwente Paar Füße ist sehr lang und einwerts gekehret, das hintere Paar aber ist sehr dicke, bessonders an den Schienbeinen, das erste Glied der Fußwurzel ist groß, niedergedruckt, und in einem banchigen Winkel erweitert, übrigens aber an der Wurzel inwendig mit einer Vorste besest. Diese Art kommt häusig in den Blüthen der Schwerds lilien vor, und ist sehr träge. Pallas Reisen.



# 249. Geschlecht. Ameisen.

Hymenoptera: Formica.

19. Die Bierpunctameise. Formica 4-punctata.

Niers puncts ameife. 4-pun-Etata. Diese Ameise ist roth, aber doch kleiner, als die gewöhnliche rothe Ameise No. 7. Hinset der Spisc des Bruststucks führet sie eine vollsständige, zwischen eingeschobene Schuppe. Der Hinterkörper ist etwas rund, schwarz und glatt. Ein paar kleine weisse Puncte stehen auf den Rüsten an der Wurzel, und ein paar dergleichen anderes die etwas größer sind, in der Mitte des Rückens. Der Aufenthalt ist in Deutschland. Linneus.

250. **G**ts

# 250. Geschl. Ungeflügelte Bienen.

Hymenoptera: Mutilla.

### + II. Die Beißwolle. Mutilla albeola.

ie ist größer als der Deutsche No. 6. hat aber die namliche Gestalt. Der Kopf und wolle. Das Brussstück ist obenher weißlich-silberfärbig-wol. Albeola lig, und etwas aschgrau gefärbt. Um den Dinters leib gehet ein breiter Gürtel. Das Weibchen ist mehr rauh, und ganz wollig, hat schwarze Flügel, und längere Fühlhörner. Man hat sie in den südlichen Gegenden am Jaik gefunden. Pallas Reisen.

### + 12 Die Rothbruft. Mutilla fungora.

Sie ist zwar nicht größer, aber doch länger Roth, als die vorige Art. Das Bruststuck ist roth, brust, an der Wurzel des Hinterkörpers besindet sich ein Sungorunder silberfärbiger Flecken, und mitten herum ra. ziehet sich ein vollständiger Gürtel. Das Weibchen hat schwarze Flügel und längere Fühlhörner. Sie hält sich in den südlichen Gegenden am Irris auf. Pallas Reisen.

### † 13. Die Bitwe. Mutilla viduata.

Sie ist beträchtlich groß, langer als die üb. 13.
rigen, und nicht so wollig. Der Wirbel, der vor, Wittwe.
der Theil der Brust, die Seiten und die Juße sind ta.
mit einer weissen Wolle beseit. Der erste-Ring
des

### 332 Fünfte Cl V. Orb, Mit häutig. Blugeln.

bes hinterforpers ift, ausser dem Stiel, noch etwas kegelformig, mehr verdunnt und gang roth. Der zwente und dritte aber auf dem Ruden filberfärbig, wollig. Die Flügel find etwas groß und schwarz, und haben ein hoderiges Gelenke, ungeflügelte aber sind von dieser Art nicht entdeckt worden. Die Fühlhorner find ein wenig verdunnt. Der Aufente halt ist ben den vorigen. Pallas Reisen.

+ 14. Die Silberwolle. Mutilla bicolor,

14. Silber wolle. Bicolor

Sie ist etwas größer und rauher als der Deutsche No. 6. Der ganze Ropf vorneher, der Rucken des Bruststuds, und ein breiter Gurtel mitten um den hinterkörper, sind mit einer aschgrauen Silberwolle besetzt. Alles übrige ist kohlschwarz. Man hat sie auch in den südlichen Gegene den Sibiriens gefunden. Pallas Reisen.

Sechste

# 3 wen flügelige. Insecta: Diptera.

251. Geschlecht. Bremsen. Diptera: Oestrus.

+ 6. Der Antilopenbohrer. Oestrus
Antilopum.

Shat gegenwartige Art die Größe der Schmeißstlegen Einen blassen Kopf, brauz Antilowne Augen, schwarzes Maul, und einen denspringigen schwarzen höcker auf dem Wirbel. Antilowne Bruststud ist greiß, der Rucken schwarz, und pum. mit einer blaße greisen Wolle überzogen. Der hins terförper ist schmunigeziegelsärbig oder rostsärbigs wollig, mit vier Flecken, und oben in dren Reisen mit schwärzlichen drevectigen Puncten besetz, und ten aber draun gesteckt. Der Schwanz ist enlind bestschen der gestelch, hornartig, schwarz, den den Mannchen interwarts gedogen, den den Weischen aber gestade. Die Flügel sind trübe, und haben einen Auerstecken mit einem schwarzen durchschrigen Punct, und zwen dergleichen Puncte an der Spige. Die Füße sind greiß. Die Larve hält sich unter der haut der scrischen Intilope auf, ist weiß, und mit hornartigen Zähnchen versehen, welche auf neun Ningen, die den Körper umgeben, verstheilet sind. Pallas Reisen.

252. St

### 252. Geschlecht Langfüße.

Diptera: Tipula.

+62 Die Zwergmucke. Tipula Solstitialis.

62. Iwerge muce. Solftitialis. ie ist die kleinste im Geschlecht, am Körper braun, und hat einsache Juhlhörner. Die Flügel sind aschgraus bunt und nepartig gewebet. Man siehet sie des Abends vom Junio an, häusig an der Wolga in der Luft wimmesn. Pallas Reisen.

† 63. Die vielmannerige Mude. Tipula

Bielem Minner rige Ducke. Polygama. Sic ist zwen bis drenmal größer, als eine voentliche Mucke. Der Hinterkörper ist blaulichs braun, und die Flügel sind braun geadert. Die Füße haben eine mittelmäßige Lange. Man hat sie gleich zu Anfang des Frühlings an dem sandigen Ufer des Flusses Sym in den uralischen Geburs gen wahrgenommen, da sich denn um ein Weibchen unzählige Mannchen auf der Erde herum kugeln, wovon mehrentheils nur dren das Gluck-haben, sich mit ihr zu begatten. Dallas Reisen,

.666 106 **253. Se** 

# 253. Geschlecht. Fliegen.

Diptera: Musca.

# F. Glatte mit Burftenfühlhornern.

F. Glatte.

ir machen hier eine neue Unterabtheilung, weil wir diese Fliege nicht unter die andern ju bringen wissen.

### 130. Die geripte Fliege. Musca costata.

Sie ist ganz glate und schwarz, hat bursten Geripte artige Fühlhorner, einen blassen Kopf, braune Fliege. Angen, an den Seiten des Bruststucks vor den Flugeln eine weisse Linie, den aussern Rand der Flügel nach der Spize zu braun, mit schwarzen Rippen, und braunlicheblauen Füßen. Die Größe ist etwa zwenmal so groß als eine Laus. Der Aufzenthalt ist in Upsal. Linneus.

255. Sei

## 255. Geschlecht. Mücken.

Diptera: Culex.

### 8. Der Ochsentobter. Culex Lanio.

Dofen tobter. Lanio. In der Provinz Bonat an der Wallachey ist eine schwarze Mucke, in der Größe einer großen taus, entdeckt worden, welche sogar den Ochsen tödtlich senn soll. Das Bruststück ist höckerig. Der hintere Körper oval. Die Schenkel sind schwarz, an der Wurzel weiß. Die Füße sind länglich, die Schienbeine mehrentheils weiß, und mit braunen Spisch, die Jußsohlen aber schwarz, und mit einem schwarzsgegliederten Jinger versehen. Die Klauen sind ungemein klein. Die Flügel glasartig durchsichtig. Brunnich. Line neus.

### † 9. Die caspische Mucke. Culex Caspius,

9. Cafpir fche Mude. Cafpius

Sie ist der Singschnacke No. 1. sehr ahn lich, nur ein wenig kleiner, schwärmt aber auch so, und führet den nämlichen Gesang. Die Farbe ist etwas greiß. Das Bruststück ist aschgrau bandiret. Die Füße sind ein wenig geringelt. Der ganze Körper ist mit einer gelinden Wolle besetzt sogar sind die Abern der Flügel, und der Rand derselben sehr fein mit harchen besetzt. Bende, sowohl die Weibchen als die Männchen haben faden förmige Fühlhörner. Der Stachel des Mauls ist burstenartig, einfach, und länger als das Brustsche,

ftud, auffetdem find viele Scheiden, zwen febr furge Suhlerchen, die etwas bid, und faum fo lang als ber Rorper find, vorhanden, und biefe Bertzeuge unterfcheiden die gegenwärtige Art beut-lich von der gemeinen. Sie wird an den falzigen Sumpfen in ber Begend bes cafpischen Meeres gefunden, und ift eine große Plage. Pallas Reifen.

### + 10. Der Hyrfanier. Culex Hyrcanus.

Diese Art ist etwas langer als die vorige, Ontas von Farbe aschgrau, und unten am Korper, wels nier. der linienartig ist, braunlich. Die Stirn ist ets Hyrcawas rauh. Die Guhihorner haben been Belente, nus. bavon das lette bren Knoten hat, die Burgel aber ift mit schwarzen Saaren, als wie feberig befest. Der Stachel ift nacht, hervorragend, faft fo lang als ber hinterforper, an ber Burgel ein menia hearig, und an der Spite etwas bict. Die guffe febr lang, greiß, und faum fichtbat raub. Die hinterften davon find drenmal langer ale der Rorper, und besonders an der Fußwurzel verlangert. Die Flügel find spießformig, etwas afche arau , haben raubhaarige Adern und find am dicken Rande Schwarz geflectt, obenher zwar find fie glatt, und nur an ber untern Geite rauh. Diese Art balt fich ben ber vorigen auf, ift aber feltener, bech falt bagegen scharfer an. Pallas Reifen.

# 258. Geschlecht. Raubfliegen.

Diptera: Asilus.

### †18. Der samarische Räuber. Asilus Aethiops.

is. Samai rifche Ráuber. Aethiops.

Er ist so groß wie der Strassenrauber No. 4. ganz schwarz und glatt, am Bruststuck und an den Füßen mit Burstenharchen besetzt, am Kopf und After aber wollig. Der Bart ist nicht schr haarig. Die Stirn und die Flecken in den Seiten des Bruststucks und des Hinterforpers, sind weiß silberfarbig. Die Flügel sind rußfarbig, und haben breite gedehnte schwarze Adern. Die Balancktsstäden sind schwefelgelb. Man trift diese Art im Junio häusig in den Feldern am Samarastuß am Dallas Reisen.

-Siebenbe

# Siebende Ordnung. Ungeflügelte Insecten.

Insecta: Aptera.

262. Geschlecht. Pflanzenstöhe.

Aptera: Podura.

15. Der Enlinderfloh. Podura Helvola.

r ist roth und hat einen chlindrischen Körper. Man sindet ihn häusig in den Feldern die Eplinfeinen Gräser und Moose besetzen, kaum der sob. siehet man ihn hupfen, und solches noch dazu Helvola sparsam.

3) 2

266. 500

### 340 Funfte El. VII. Orb. Ungeflügelte.

## 266. Geschlecht. Milben.

Aptera: Acarus.

## 36. Die Saarmilbe. Acarus vegetans.

36. Saari milbe. Vegetans. Die Insecten mit Flügelbecken haben eine Larve von einer Milbe auf einem weissen Haare sitzend, welche, wenn sie sich verwandelt hat, sich davon absondert, und herum läuft. Der Körper ist oval, erhabenrund, und wie eine Schilbkrötensschale dicht oder schilbkormig, glatt, glänzend, rostfärbig, und allenthalben mit einem Nande ums geben. Das Maul dieses Thieres besindet sich zwischen den zwen Borderfüßen. Linneus.

## 267. Gefchlecht. Rrebsspinnen.

Aptera: Phalangium.

† 10. Die Giftspinne. Phalangium Bychorcho.

ben Calmucken Bychorcho genennet wird, spinne. in dem Schiffe der sublichen Buften auf, und ift, Bychorwie jedermann versichert, von giftiger Art. In cha. der Größe übertrift sie oft die Carantuln, und ift langer als felbige. Der hinterforper ift weich, geringelt, und langlich. Das Bruftftud hockerig, frugformig, vorneher abgeftutt, und am mittlern Rande mit einer fart hervorragenden, und mit Augen befesten Erhöhung bezeichnet. Die Schees ren am Maule find groß, bauchig, und laffen ein Sift fliesen. Ihre tage ift fenkrecht, so daß ein Finger oben, und der andere unten liegt, welcher lette beweglich ift. Die Arme find größer als die Füße, und mit den erften paar Füßen unbewafnet, indem fie in eine flumpfe Spige ausgehen, und nur als Fuhler dienen. Die dren paar folgenden Fuße aber haben alle miteinander Klauen. Die Dinterhuften haben von unten ohngefehr funf drenedige, flache Angehange an Stielchen. Alle Glies ber find etwas rauh, indem fie, obwohl fparfam, mit langen Sarchen besett find. Die Farbe ift greiß; aber die Binger der Scheeren find ziegelfar. big und gezähnelt. Dallas Reisen.

268. Ste

## 268. Geschlecht. Spinnen.

Aptera: Aranea.

#### 48. Die Eigerspinne. Aranca Tigrina.

48. Liegere fpinne Tigrina

In Schweden ist noch eine Spinne mit einem großen rostfärbigen Korper entdeckt, deren Hinterkörper länglich oval, ziegels oder rostfärbig und schwarz punctiret ist. Das Bruftstück hat auf dem Rücken der Länge nach eine gelbe Linie. Die Seiten des Hinterkörpers sind etwas blaß. Line neus.

#### 49. Der Eulmacher. Aranea Curacaviensis.

29. Tollmas cher. Curacaviensis.

Auf der Infel Curacao befindet fich eine sehr fcabliche Spinne unter ben Burgeln und Rtautern, die zuweilen auf dem Lande in die Saufer, doch niemalen in die Stadt fommt, von deren Big Menschen und Thiere unfinnig werben, und Schwerlich mit dem Leben davon kommen. flein, und nicht größer als eine mittelmäßige Saus fpinne, der Farbe nach braun, und an jeder Seite mit einem pomerangenfarbigen Blecken verfeben, Dabero fie auf befagter Infel Oranjes genennet werden. In unfern benden Eremplaren, die uns aus Curacao geschickt murden, haben wir nicht mehr als fechs Bufe gezählet. Die Thiere, als Schaafe ober Rube, fterben von ihrem Big in vier und zwanzig Stunden mit heftigen Buckuns gen. Die Menschen aber befommen Bahnwit, aber ein Erant aus Zabacksmaffer, Urin und Rills Duivel

wivel oder Zuckerbrandewoin, ift bisher noch als bes befte Mittel befannt, fie benm Leben zu erhale ten. D. 21. L. Muller.

#### † 50. Die rußische Carantul, Aranea Tarantula.

Sie ift oft nicht fleiner als der Colibrifres Ruffi fer No. 31. wenigstens kommt fie ihm nabe, und fche Las ift über und über wollig. Das Bruftfluck ift lange tantul. lich, vorneher schmal, auf dem Rucken afthgrau, Taranweb mit schwarzen Strahlen, die nach dem mittlern Felde hinlaufen, gezeichnet. Auf dem Rucen fteben vier große Augen, vorneher befinden fich vier fleine, welche in die Quere stehen. Der hinters forper hat die Große einer Ruß, ift oval-kugels formig, asthgrau, und braun gepudert. Seche paarweife ftebende Augenpuncte, welche durch eine verloschene Querlinie miteinander verbunden gu fenn fcheinen, zeigen fich auf dem Ruden des Sinterforpers. Untenher ift ber gange Rorper fammet. artig fcwarz. Die Scheeren und Rubler find gelb, an der Spike aber schwarz. Die Fuße find unten-her weiß, obenher aschgrau. Die Schenkel find fcmargebunt, und mit baarigen Puncten befett, die zwen nachften Zwischengelenke haben einen breis ten Ring, und find untenher fcmarg, fo wie auch die Afterfußsohle gang schwarz ift. Man trift biefe Art des Machts in der Erde mublend an, und der Aufenthalt ift hin und wieder in den südlichen Begenden, in gelbern, und in durren leimigen Ufern. Pullas Reifen.

+51. Die Beiligenspinne. Aranea speciosa.

In den sudlichen Buften am Jait balt fich Beilte eine Spinne auf, die auch ofters in den Haufern ne. ift wahrgenommen worden, und von welcher man Speciofagt, fa.

## 344 Bunfte Cl. VI'. Orbn. Ungeflügelte.

fagt, daß fie fich gerne an die Bilder der Seilie gen anspinne, welche man baselft' in den Zimmern Au halten pflegt, daber fie von den Colacten gerne in ben Saufern gelitten wird, und barum obis gen Damen unter ihnen erhalten hat. Das Bruft. ftuct ift greiß, und hat zwen langliche braune Bles den. Es find acht Augen vorhanden, und davon ftehen an jeder Seite die zwen aufferften dichte bene fammen. Die Fuße find gelblich, und schwarz geringelt. Das erfte Paar berfelben ift febr lang. und das dritte paar ift unter allen am furgeften. Der hinterforper ift langlich voval, gelb, und mit Schmarzen bogigen Querftrichen gezieret, bavon eis ner etwas entfernt an der Wurgel allein ftebet, Dann aber folgen zwen benfammen, bann wiederum bren, bavon ber erfte ein wenig wellenformig ift, endlich aber folgen noch bren paar breitere Bogen, nach dem Schwanze zu. Unten ift der hintertor. ver mit einer ichwarzen nepartigen Zeichnung, und mit zwenen ber lange nach ftreichenden gelben Banbern verfeben. Dallas Reifen.

## 270. Geschlecht. Rrebse.

Infecta: Cancer.

### I. Arabben. Brachyuri.

B. Mit glattem Ruckenschilde, an den Sager Seiten eingeschnitten. B.

27. a. Die Blutfrabbe. Cancer sanguineus.

an hat in dem großen Weltmeere an der 27. 2. Inful Ascension eine brutrothe Krabbe trabbe. gefunden, welche dem gemeinen Lafchentrebs Sanguis No. 27. sehr ahnlich ift. Das Bruftstud ift glatt, neus. mehr breit als lang, auf benden Seiten in der Mitte mit zwen fageformigen Einschnitten fibmach gezeichnet. Die Bruft ift ein wenig rund, die Stirn gerandelt, und fehr fcwach vierlappig. Die Scheeren find glatt, faum weiß gezähnelt, und haben schmarze Finger, die an der Burgel rudwerts zwen Bahnchen führen. Alle Buge bas ben blaßfarbige Rnie, mit einem Scharfen spisigen Singer. Linneus.

#### C. Mit rauhem, oder stadelichem Ruden C. schilde.

fcbilbe.

#### 38. a. Der dine fifde Rrabbe. Cancer finicus.

Das Bruftfluck ift etwas enformig, niederges 38. 2. die Bruft, und führet zwen und drensig Stacheln, Chineste bavon stehen am hintersten Rande an jeder Seite Krabbe. bren ftarte, vorne der Lange nach an jeder Seite Sinicus. vier, in der Mitte vorne neun, wovon der mittels

#### 346 Fünfte Cl. VII. Orbn. Ungeflügelte.

ste erhaben stehet, und die lette ohne eins etwas erweitert find, bann vorne an jeder Seite noch zwen fleine. Ditten auf dem Rucken, welcher braun geflect ift, fteben funf bis fechs erhabene langliche Puncte. Die Bruft ift etwas freißformig. Stirn stehet quer, die Schceren find glatt, und am obern Rande mit dren Dornen fageformig gegabnelt. So find auch die untern Theile ber Buge, deren man vier Paar jahlet, mit etlichen Dornen befest, jeder Suß hat einen langen fpisigen Singer mit einer Furche. Das lette paar Rufe fiebet frumm, und ift mit Sagren befest. Der Finger an felbigen ift fpießformig und flach, und am bintern Rande haarig. Der Schwanz ift einwarts gebogen, ohne Blatter, und die Gelenke find mit bren schwachen Bahnchen besett. Das Baterland ift China. Linneus.

#### III. Rrebse. Macrouri.

G. Glatte fcilbe.

G. Mit glattem Rudenschilde.

+ 67. a. Der caspische Krebs. Cancer trixapus.

67. 2. Cafpis fcher Rrebs. Trixapus.

Diese Art ist eine Squille, kommt in der Fars be und Gestalt mit der Garnale No. 67. überein, ist aber nicht größer, als etwa noch einmal so groß als der Seestoh No. 81, und wird sehr häusig in dem Busen des caspischen Meeres gefunden, wo sich die Wolga und andere Gewässer ergießen.

Das Brustud ist turz, hinten tief ausgeschniteten, und auf benden Seiten an den Augen mit einer kleinen Spise versehen, oben aber glatt. Die Augen sind groß, und stehen dichte bensammen. die Theilchen der kleinen Scheere sind flach, und linienartig, die Juhlhorner sind burstenartig, die vier

vier untern haben die lange des Korpers. Es find acht paar Juffe vorhanden, welche alle nach vorne ju getebret find, und jum febreimmen bienen. Gie find dunn, zusammengelegt, und haben an der Burgel ein chlindrifches Glied. Das aufferfte aber ist burstenartig rauh. Der Schwanz ist langer als der Körper, verdunnet sich enlindrisch, und gebet in vier langlichen raubhaarigen Blattern aus, die noch ein scharfes, furges in ber Mitte haben. Das Weibchen fuhret ihre Eper in einem gallertars tigen Ballen an der Wurzel des Schwanges mit fich berum. Dallas Reisen,

## K. Mit länglichem Ruckenschilde und K. gangi Scheeren ohne Finger, foulbe

schilde.

#### 74. a. Der Meptunusfrebs. Cancer Neptuni,

Er ift langgeschwänzt, hat das Bruftschild vore Meptus ne und hinten mit bren Dornen besetzt, ift nicht nus größer als eine Mucke, und halt fich auf bem schwim, trebs. menden Seemoof oder Lang auf. Linneus.

Neptu-

#### L. Mit furzem Rudenschilde, und Scheeren ohne Kinger.

schilde.

#### 76. a. Der Eiffrebs. Cancer glacialis.

Er gehöret unter diejenige Art, welche vom 76. 2. Ritter Mantis, und von uns Schwanentrebe Eis No. 76. genennet worden. Der ganze Korper ist Glaciafo groß, als eine Laus, halb chlindrisch, ohne ge- lis. meinschaftlicher Schale, mit fieben bis acht fast gleis den Ginschnitten verseben. Die Bublhorner find fo lang als der Rorper, vier paar Borderfuße find einfach ohne Scheeren, und die letten vier paar Sufe endigen fich in zwen Spiken. Das lette Paar

#### 348 Fünfte El. VII. Orbn. Ungeflügelte.

Paar am Schwanze ift etwas langer, mehr vorge-Rucis frecte, und macht gleichsam einen zwenspitigen fcbilde. Schwang aus. Der hintere Theil bes Rorpers ift mit den Suffen unterwarts gefrummet, nur ift bas auffere ber letten paar Sufe rudwerts gefehret. Diefe Art halt fich im mitternachtlichen Ocean. oder im Lifmeer auf. Linneus.

83.2.

Eplin-

Cylin-

#### 83. a. Der Enlinderfrebe. Cancer cylindricus.

In eben ben nordischen Meeresgegenden berfrebe mird noch ein Rrebs gefunden, ber fehr nahe mit dem Schmalhans No. 83. verwandt ift. drieus. Körper ift oval und glatt, und hat sieben lang. Die Sublhorner bas liche enlindrische Glieder. ben ein Funftel der Lange. Das erfte Belenke ift glatt, das zwente und britte wollig, und bas vierte bestehet aus verschiedenen kleineren Belen. ten, welche burftenartig und haarig find. Die fols genden Suhlhörner find um die Belfte furger, und haben dren etwas haarige Gelenfe. Die gang furjen Sublerchen haben an der Spige eine einfinge. rige Scheere, die etwas dick ist, und am Ende eine bewegliche Klane hat. Die vier Scheeren unter dem erften Gliede find etwas dicker, oval, und einfingerig. Die Rlaue am Ende berfelben ift frumm, fpigig, und beweglich. Unter dem dritten und vierten Gliede befinden fich vier Blaschen und größere Scheeren. Der Schwanz ift nacht und gegliedert, und bestehet aus dem funften, sechsten und fiebens ben Gliede. Linneus.

### 272. Geschlecht. Rellerwurm.

Aptera: Oniscue.

#### † 16. Die Mauerassel. Oniscus ruderalis.

ie ift langlich : halb = cylindrifch, vorneher Mauer mehr ftumpf, einen Biertelszoll lang, mit- affel. hin noch einmal so groß als die Seebreme No. 1. Rude-aber kaum etwas breiter. Der Ropf ist etwas ralis. groß, fast fo breit als der Rorper und rauh. Die Buhlhorner find diet, und halb fo lang als der Rorper, die zwen ersten Ringe find etwas breiter und rauh, doch nicht ben den Jungen. Der Schwanz hat zwen schwerdtformige Dornen, die langer sind, als an bet angeführten erften Art, boch in det Karbe fommt fie damit überein. 'Man trift fie uns ter den Steinhaufen ber tartarischen Stadt Bas ratschick an, ift febr gemein, und hat ofters eine Berschiedenheit von blagrother Karbe. Dallas Reifen.

+17. Die Rerbenuffel. Oniscus crenulatus.

Die Gestalt kommt mit der vorigen Art übers Rerbens ein, aber in der Größe übertrift es jene um die affel. helfte. Die Fühlhorner sind klein, und nech Crenufleiner als an ber gemeinen Affel. Der Ropf ift latus, mit einigen erhabenen Puncten befprenget. bren erften Ringe haben einen Dicken und geferbten Rand, und find an den Seiten rauh, der zwente davon ift etwas größer. Der Schwanz ist viel fürser

## 350 Fünfte El. VII. Ordn. Ungeflügelte.

fürger als an der vorigen Art, und die Dornen find fehr flein. Man hat diefe Art in durren Sugeln am Inderfee gefunden. Dallas Reifen.

## † 18. Die caspische Affel. Oniscus Caspius.

18. Cafpis

Die Geftalt, Jarbe und Große kommt mit fceuffel dem Seeflob No. 81. des 270ften Befchlechts der Caspins Rrebse überein. Der Schwang aber ift großer, und die vordern dren Schildringe fommen in ber Breite mit den Ringen des Korpers überein, und haben auf bem Rucken einen guruckgebogenen Stas del. Die zwen baran folgenden fuhren auf bem Rucen einen ftumpfen, gerade in die Sohe ftchenben Dorn, und an benden Seiten noch einen gas belformigen Stiel, der den Schwang endiger, doch ftebet in ber Mitte noch ein linienformiges Blats chen. Das erfte paar Juge ift fehr flein, bas zwente und dritte ift icheerenformig, die hintern feche aber find juruck gebogen. Man findet fie mit obigem Serfioh febr haufig im caspischen Meere in der Majade, und bem fcwimmenden Saame Fraut. Pallas Reisen.

## Sechste Classe.

Würmer.

Vermes.

Erste

## Erste Ordnung.

## Burmer ohne Gliedmassen.

Vermes: Intestina.

276. Geschlecht. Spulmurmer.

Intestina: Ascaris.

#### 3. Der Langidmang. Ascaris trichiura.

s zeichnet sich diese Art eben dadurch aus, gang, bat sie einen dunnen Schwanz wie Kaar schwanz; bat, ber so lang ist als der ganze Körper. i richiDie Größe, namlich des Körpers, kommt mit der urd
Aftermade No. 1. überein, ist blaßfarbig, und vorneher nicht verdunnt. Der Schwanz aber, welcher burftenartig ift, erreicht die Lange des gangen Thierthens, und ift wohl viermal fchmaler als ber Rorper felber. Stirbt das Thierden, fo liehet es fich in einen flachen Schnirkel gufammen. Der Aufenthalt ist in Deutschland, und der um Die Naturgeschichte sehr verdiente herr Professor Beckmann in Gottingen hat diese Art entbedt. Linneus.

Linne Supl. 23.

4. Det

## 354SedfleCl. I.Orb. Burmer ohne Gliebm.

4. Der Grafmurm. Afcaris fefquipedatis.

Graß, wurm. Selqui pedalis,

Diese Art ist anderthalbe Schuh lang, und in Schweden vom D. Angerstein unter den Wurzeln des Grases gefunden worden, welches obige Benennungen hinlanglich erlautert. Der Körper ist weiß, oder mildig, nicht bicker als kink Jaden, an benden Enden scharf und spisig, und hat das Ansehen, als ob er mit weisen Körnern ausgestopft, oder angefüllet ware. Linneus.



## 278. Geschlecht. Bindwurm.

Intestina: Fasciola.

4 Der Alpenwurm. Fasciola alpina.

Mipentourm. Alpina. In den Brunnen der laplandischen und tkalies nischen Alpen besindet sich dieser Bindwürkt im eiskalten Wasser in großer Menge, dahingegen stirbt er im warmen. Er ist braun, etwas langs lich, und vorneher abgestust. Wenn man das Unsglud hat, einen solthen Bindwurm mit einem Trunk hinunter zu schlucken, so bekommt man eine Colic mit Zuckungen, Eckel, Schlucken, Wahnswis und Schauer, die oft einen tödtlichen Ausgang gewinnen, durch Salz aber kann man sich wieder herstellen, wenn man einen Trunk Pockel darauf khut. Sonst wird auch dieser Bindwurm als schwärzlich beschrieden, mit einem Bauche, der dis zur Helste zwenlinig ist. Linneus.

Zwepte

## Zwente Ordnung.

## Burmer mit Gliedmassen.

Vermes: Mollusca.

287. Geschlecht. Seescheiden.

Mollusca: Ascidia.

## 7. Die Knotenscheite. Ascidia vagabunda.

er Körper ift spießformig, gebruckt, ftumpf, Knotens herumschweisend und fren. Die Große ift scheibe. mens, aufferlich mit einer sandigen Rinde übergos gen. Der Sals ift langlich rund, und so did wie ein Sanfefiel. Das Maul ift am Ende befindlich, und mit Armen umgeben, welche gefingert, buns tel, fo lang als ber Durchmeffer bes Rorpers, und etwa feche und funfzig bie fechzig an ber Bahl find. Die Lippen gwifden ben Armen find hautig, und am Rande mit ben fleinften Bargden befegt. Bibne aber find gar nicht vorhanden. Es wohnet Diese Art im Ocean, und wird wohl, icdoch fele ten, am Strande ausgeworfen. Linneus.

297. 90

## 297. Geschlecht. Quallen.

Musca: Medusa.

## 13. Die Safernqualle. Medula ciliata.

13. Fasern qualle. Ciliata. ie ist rund, am Rande des Körpers mit uns
zähligen Fasern umgeben, welche auswerts
fahren, und so lang wie die Scheibe sind. Unten
zeigen sich funf ohrformige Defnungen, dergleichen
sich auch in der Ohrenqualle, (Medusa aurita
No. 5.) woselbst nur vier dergleichen sind, hervor
thun. Der Ausenthalt ist im mittellandischen
Meere. Linneus.

## 298. Geschlecht. Seesterne.

Mollusca: Asteria.

B. Sterm formige.

B. Sternformige.

10. a. Der Reunstrahl. Afteria Endeca.

· 10. a. Reun Strabl. Endeca

In dem norwegischen Ocean hat man nech einen Seestern gefunden, melder neum Strahlen hat, und allenthalben mit Dornen besest ist, wiewohl Rumpf benfelbigen in seiner Amb. Rariteit-Kamer Tab. XV. fig. F. auch schon angeführet hat. Linneus.

Dritte

# Dritte Ordnung. Burmer mit Gehäusen,

Conchylien.

Erfte Abtheilung. Bielfchaalige.

301. Geschlecht. Meereichel.

Testacea: Lepas.

ad 13. Die Balfischpode. Lepas Diadema.

ie Schaale ift großer als an andern, erhas ben, ober bauchig enlindrisch. Die feche Bal Blatter find feilformig, fteben fenfrecht, fifch. und gleichsam aus vier Enlindern gufammen gefest, podealle miteinander durch Querrungeln, die febr rauh Diado find, verbunden. Diefe Blatter find noch durch gegenseitige Zwifdenraume voneinander unterfdies ben, welche glatt, eingebrucht, und faum in die Quere gerungelt find. Die Sohlung der Schaale ift in die obere und untere einzutheilen. Die obere ift frugformig einfach, und gehet am Boben in die zwente Sohlung hinein. Die untere aber, die ebenfalls frugformig ift, fuhree an den Geiten fechs

#### 258 Sechste Cl. III. Orbn. Condolien.

fechs fleine brenfache Soblungen, benn diefelben find mit ihren eigenen Wanden, die nicht einfach. fondern doppelt find, unterfcbieden. Linneus.

#### 19. a. Der Plattfuß Lepas Palmipes.

Wlatt: fuß. Palmi Des.

Die Schaale ift gerade aufgerichtet, legelfore mig, und die Schilde an der Burgel mit einem flachen Fuße versehen. Die Große ift etwa wie cine große Erbfe und etwas gebruckt, die Sarbe ift weiß. Die Angabl ber Schilde, welche glatt, und an der Burgel getheilet find, belauft fich auf vier bis fechs. Der Deckel ift vierklappig und fchief. Der Aufenthalt ift im Ocean. Linneus.

#### 19. b. Die Belmpocke. Lepas galeata.

10 b. Delm pode.

Die Schaale hat die Bestalt eines Belms, ift tabnformig, glatt, bestehet aus verschiedenen que Galeata fammen gewachsenen Schilden, und hat zur Seiten die Mundung ober Defnung, welche ein fchiefes Biered macht, figend. Der Aufenthalt ift in den Aeften und zwischen den Stengeln der horncoralle. Linneus.

Smente

## Zwente Abtheilung. Zwenschaalige. 303. Geschlecht. Klasmuschel.

Testacea: Mya.

† 32. a. Die caspische Klasmuschel. Mya edentula.

weiß, siehet etwas alt aus, und ist übrigens sche weiß, siehet etwas alt aus, und ist übrigens sche wat, gleichschaalig, gestreift, und klaft sehr breit Klasmus an dem meist gedehnten Ende. Man zählet ohnges schelcher dren und drensig scharfe Rippen, die am fürszesten Ende weit voneinander stehen, am gedehnsten aber dichte zusammen geruckt sind. Das Schloß hat keinen Zahn, aber eine dicke, und etwas einges bogene Lippe, auch merkt man innerhalb der Schaale keinen Dorn. Sie komnt, ob zwar selten, unter den Conchyllen in dem Sande des caspischen Meestes vor, und wird auch wohl lebendig angetrossen. Pallas Reisen.

3 4 304. 90

## 304. Gefchlecht. Scheiben.

Testacea: Solen.

48. a. Der Zwenstrahl. Solen Diphos.

48.2. Amenfrahl. Diphos. Die Schaale fiehet dem blauen Sonnenstrahl No. 38. sehr ahnlich, ist violetsärbig, hat aber nur zwen weisse Strahlen, statt vier. Der Rand am Schloße ist stumpf, zurückgebogen, und raget nicht hervor. Inwendig ist keine Rippe vorhanden. Die Nympfen hingegen sind nicht zurückgebogen, sondern ragen hervor. Das Schloß hat nur ein Zähnchen. Diese Art komme aus Ostinden. Linneus.

306. **©**ts

## 306. Geschlecht. Herzmuschel.

Testacea: Cardium.

#### 76, a. Das Steinherz. Cardium Lithocardium.

ie Schaale ist dem drenseitigen Venusherz 76. 2.
No. 76. einigermassen abnlich, hat aber berz.
keine vier, sondern fast dren Seiten, und die Alap, Lithopen sind in die Quere, vorneher aber der Lange cardinach gestreift, und mit einem gekerbten Kiel ver; um. sehen, hinter welchem sich scharfe Unersurchen bes sinden. Der Vordertheil am Schlose ist oval. Der After stehet nahe. Die Erhöhung des Schlosses ist etwas stad, der Lange nach mit Kerbenstrischen und einem etwas erhöheten Kiel besest. Man trift diese Art unter den Petresacten an. Linneus.

## + 91. a. Das Orenechers. Cardium trigonoides.

Die Schaale ist fast so groß, als die Dick, Dreped schaale No. 91. einigermassen mit ziegelsormig ges berz. legten Schiefern besetzt, sehr banchig, ungleich, Trigoseitig, und einigermassen drepeckig. Die Klappen naides sind einander gleich, nach dem After zu eckig eins gebogen, an der einen Seite aber slach, und an der andern breit und bauchig. Auf der flachen Scite sichet man etwa sechs feine Striche, und

#### 362 Sechste El, III, Orbn, Conchplien,

die Bördergegend ist glatt. Auf der bauchigen Seite aber zählet man vierzehn dis achtzehn breite, slache Striche. Diese Art ist sehr häusig im cassprichen Meere, doch hat Herr Palles kein lebendiges Eremplar können zu sehen bekommen. Pallas Reisen.

309. Oca

## 309. Geschl. Venusmuschel.

Testacea: Venus.

#### E. Berschiedene.

#### 150. a. Die Kindbetterin. Venus puerpera.

ie Schaale ift einigermaffen rund bergformig, Kindbet nabe mit dem Waffel ifen No. 134. vers terin. wandt, Kauft groß, sehr schwer, bauchig, blaß. Puerrofifarbig, vorneher braun, mit hautigen Quers pera. ftrichen befest, in der lange aber schwach gestreift. Immendig, oberhalb dem Borderzwickel violetfare big, der Borderzwickel nicht ausgeschnitten, sondern unter dem Sautlein versteckt, und mit ben Lippen, die biegfam find, oben aufliegend, am Afs ter oval, und am Rande geferbet, Man trift diese Art in Oftindien an, und sie ift sichon vom Gualtbiert Tab. 83. fig. F. und vom D'Argens ville Tab. 26, fig. F. beschrieben. Linneus.

### 150 b. Die Runzelvenus. Venus rugosa.

Sie ist einen Zoll lang und breit, herzfors Rungels mig, dick, rund, aschgrau und weißbunt, der venus. tange nach mit sechzehn parallel-laufenden Furs Rugola den besetht, und in die Quere nit rundlichen Runs geln gestreift. Der Borderzwidel ift einfach. Der After bestehet nur in einem roftfarbigen Puncte. Die Angeln find etwas gefrummet, und ber Rand gefalten. Linneus.

150. c. Der

### 364 Sechste Cl. III. Orbn. Conchplien.

Ber. 150. c. Der Eriangel. Venus tripla.

seine Se ift die Schale sehr glatt, so groß wie das Trian ausser Slied eines Daumens, und mit dem Assel. ter nach dem Vorderzwickel zu gedruckt, so daß Tripla. sie fast einem Triangel ahnlich ist, und die vorder re und hintere Scite, gegen der Schaale zu recht nen, senkrecht stehen. Die innere Wolbung, der Angel, und die Gegend nach dem After zu, ist ins wendig violet. Von dem Vorderzwickel ist kaum eine Spur vorhanden, auch liegen die eckigen festen Rompfen verborgen. Der After ist sehr Wein, und der Rand glatt. Linneus.

### 150. d. Die Sohlfehle. Venus succinca.

Johls größer, als das auffere Glied eines Fingers ift, Succin- vierzehn weit voneinander liegende, zuruckgebogene fa. hohle Nunzeln in die Quere stehen. Der Borders zwickel ist mit einer Spalte ausgeschnitten. Der After ist oval, und eingedruckt, der dussere Kand aber gekerbet. Linneus.

## 150. c. Die Rugelvenus. Venus tumidula.

Nugels Die Schaale ist kugelformig bauchig, und venus. mit emfevnten, gleichweitigen, schwachen Quers Tumirippen besett. Der Vorberzwickel bestehet in einer dula einfachen Spalte, der After ist eingebruckt und schief viereckig ausgehöhlet. Der Rand ist gang und glatt. Linneus.

in the little

150. f. Die

### 309. Beichlecht. Benusmulthel. 365

150. f. Die platte Benus. Venus compressa.

Ber fcbiebene

: Sie iff voal heriformig, gebruckt und zieme 150. f. ich flach, in die Quere mit gleichweitig voneinant Platte ber stehenden Runzeln besetzt. Der Borderzwischel ist kaum linienartig gespalten, und so ist auch der After beschaffen. Der Rand ist glatt. Lins San State Control

J. 1934 32

310. Bes

## 366 Gechfte Cl. III. Orbn. Combplien.

310. Geschlicht Lazarusklappen.

Testacea: Spondylus.

153. a. Die Körnerklappe. Spondylus antiquatus,

flappe. quatus.

ie Schaale ist nicht größer als das aussere forners Glied des Daumens, ziemlich rund, schnees weiß, nicht gefalten, und die Rücken der Jurchen sind gleichweitig mit Körnern besetz, als ob sie geferbet waren. Der innere Rand ist etwas gekers bet, und gleichsam eins ums andere mit Nageln besetz. Das Schloß ist vollsommen wie an den Lagarustlappen beschaffen. Linneus.

## 11. Geschlecht. Gienmuschel

Tellacea: Chama.

167. a. Die Pflugmufchel. Chama rugofa,

Die fast runde Schale ift mit drenfig tiefen geng furchen, welche alle parallel laufen, bers muschel each mit gedruckten, untereinander schiessenben Rugusa. Mungeln : und febr vielen voneinander entferne en verloschenen Schuppen befest. Der inhind ift gefaten, und ftumpf, ber auffere it berborragenden hohlen, und sus der Run. Berdifam hervorgegerreten Dageln befest. Der mael hat swen bis bren ichiefe Furchen, die nach dem arbergmidel ju gehogen find. Die gange Schaale it abrigens nicht großer, als das aufferc Glied eines Singers, bauchig, did und weiß. Linneus.

167. b. Die Angelmufdel. Chama gryphica.

In der Barbarey wird eine Gienmuschel ges 167 b. funden, die einem Grophyren fehr abnlich fichet, muichele aber fo groß wie eine Bauft, fehr dicke, ichwer und Gryin die Quere gerungele ift. Die eine Seite ift breis phica. ter, und ber lange nach burch eine breite lucke uns terichieben. Die Sohlung ift flein, aber fehr gewolbet. Det Angel ift schief, nach bem After ju umgefrummet, und der After felbft der lange nach hohl. Der Borderzwickel hat der Lange nach Hohle tehlen und liegt ichief nach bem After ju. Das Schloß ift allerdings wie an den Gienmuscheln bes fchaffen, hat einen ftumpfen Bahn, und viele fchiefe Striche, wie bergleichen in dem dornigen Pfers defuß No. 167. statt hat. Linneus.

313. Bes

## 313. Geschlecht. Kammmuschel.

Testacea: Oftrea.

#### 215. a Der Otterfuß. Offrea Pes lutrae.

Diteri Diteri fug. Pes lutrae. vom d'Argenville Tab. 74. fig. CC. und vom d'Argenville Tab. 27. fig. A. auch vom Lister Tab. 171. besthriebene Auster ist etwas vval keulformig, purpurfarbig und blaßbunt, der Länge nach sehr fein gestreift, mit sechs gleichweitigen Falten, (ohne die einzelnen Seitenfasten zu rechnen,) die an der Spize hervorstechen, besetzt. Die Seitenrande steigen gleichsam mit elner kleinen Falte nach der Köhlung hinauf. Man siehet kaum einige Ohren, als etwa ein sehr kleines. Linneus.

### 314. Geschlecht. Bastarbe.

Testacea: Anomia.

## 242. a. Die Pantoffelmuschel. Anomia Sandalinum.

Die Schaale ist dicht, die gethürmt, hat eis Pantofs nen slachen Rücken, eine gestreiste Höhlung felmus und einen flachen, strahligen, halbrunden Deckel, schel. der auf die halbrunde Höhlung passet, und deren Sanda-Eriche vom Mittelpunct dis zum Umfange gehen. linum. Der Nand des Rückens zeiget eine Spur vom Schlosse. Der Herr Baron von Züpsch beschreisdet diese Art unter den Versteinerungen Deurschslands. Sie ist im Jülichischen gefunden worden, und nicht größer als das Glied eines Daumens. Linneus.

Linne Supl. 23.

A a

315. Ses

## 315. Geschlecht. Mießmuschel.

Testacea: Mytilus.

## 262. a. Die Norder Mießmuschel. Mytilus Pholadis.

262. a. Morder Mieß, muschel. Pholadis.

Die Schaale ist so groß, wie eine Bohne, rauh, länglich, vorwärts stumpf, auswendig ein wenig zurückgebogen, in die Quere etwas runzelig, von dem After an, bis zum vördern Winkel mit einem schwachen Rücken verschen, und schließt kaum an benden Seiten. Das Schloß hat keinen, oder einen abgenutzten Zahn. Der Aufenthalt ist in dem nordischen Aleere. Linneus.

## 262. b. Die gestreifte Diegmufchel. Mytilus

262.b. Ges ftreifte. Striatulus.

mor-

phus.

Es ist die Schaale nicht größer, als das aufere Glied eines Daumens, einigermassen wie ein halber Mond gefrummet, vorneher breit, etwas durchsichtig, greiß, und mit sehr feinen, fast ein wenig gekerbten Strichen gestreift, der aussere Rand ist gleicherweise ganz sein gekerbet. Es halt sich diese Art ebenfalls in der Vordsee auf. Linneus.

262. c. † 262. c. Die rusische Mießmuschel. Rusische.

Mytilus Polymorphus.
Poly
Genicht ungewien. Die eine kommt aus

Es gicht zwenerlen, die eine kommt aus der See, die andere aus den Flussen. Die aus der See

#### 315. Geschlecht. Mießmuschel. 371

See ist nicht größer als ein Zwetschgenkern, und länglicher als die Gemeine No. 253. Die Klappen am After sind mehr kielsormig, die ausliegende Seite ist slach und ohne Farbe, die andere aber hat eine verschiedene greißbraune Schnirkel, und Wellenzeichnung. Die Spisse am After ist scharf, und niedergebogen. Die Flußmuschel hingegen ist viermal größer, etwas braun, breiter, hat halbovale Schaalen mit einem scharfen Kiel, nies derzebogener scharfer Spisse am After, und ist in der inneren Höhlung durch kurze Scheidewände schwach funktammerig. Sie hangen sich, nach Art der gemeinen Mießmuschel, mit strahligen Fasern an große Steine und Conchylien an. Pallas Reisen.

Dritte

## Oritte Abtheilung. Einschaalige gewundene. 218. Geschlecht. Nautili.

Testacea: Nautilus.

#### A. Runde mit Spiralwindungen.

† 278. a. Der platte Nautilus. Nautilus complanatus.

278. a. Platter Rautis Ins. Complanatus.

piose schr settene Art ist so groß wie eine Handsstäche, glatt, niedergedruckt, und zwar an der einen Seite ganz platt, an der andern aber bäuchig, und der Kiel macht einen scharfen glatten Rand. Die Nathe der Kammern sind gebogens wellenformig, oder ästig. Diese Art wird nur verssteinert am Wolga gefunden, und die abgeriebene Schaale ist dunne, glanzend und gleichsam durchssichtig. Pallas Reisen.

NB. Aehnliche kleinere, ebenfalls versteis nert, besigen wir aus der Segend von Reval und Narva.

## 320. Geschlecht. Porzellanen.

Testacea: Cypraea.

## A. Mit hervortretenden Windungen.

bungen.

338 a. Der hirfd. Cypraca Cervus.

Diese Porzellane hat elne kleine hervortretende Dirich. Svige, die aber mit der Porzellanmaffe übet: Cervus. jogen zu fenn scheinet, ift langlich oval, ziegelfar big, und dichte mit vielen großen weiffen Puncten, bann bin und wieder mit blaffen runden Rleden befest. Etwas seitwerts befindet fich ber Lange nach eine ununterbrochene blaffe Linie. Sinten gehet fie in einen gedruckten scharfen Rand aus. Die Zahn. den an der Mundung find braun. Linnens.

Regenfuß Tab. X. fig. 38.

C. Mit einem Nabel.

Benos

353.a. Die Punctporzellane. Cypraea punctata.

Es ift diese Art nicht größer als die Sicksack, punct. porzellane No. 349. hat ftatt ber hervorragung porzel ber Bewinde, einen vertieften Dabel, ift weiß, und lane. mit ziegelfarbigen Puncten, die zerftreuet doch in Punctaeiniger Ordnung stehen, befest. Der Rand ift faum tabervorftechend und mit einer Reihe ahnlicher Puncte befest, die aber kleiner sind. Die Mundung ift weiß. Linneus.

30 3 322. Ota

### 322. Geschlecht. Walzen.

Testacea: Voluta.

Spindel runde.

D. Spindelrunde.

423. a. Das umwundene Thurmden. Voluta filaris.

423. 2. Umwundenes Thùrm chen. Filaris.

je Schaale ist spindelformig, so lang als das auf fere lied eines Daumens, sehr fein creunweise gestreift, blaßfarbig, und an den obern Sewinden mit dren, an den untern aber mit zwölf rothen Schnurchen umgeben. Die Mündung ist weiß, und hat einfache Lippen. Die Spindel führet dren Falten. Linneus.

er el. Die Farbe gelehrung une A. Slafdenartige, oder Schellenfaneden, glafde

42. a. Das Giretlinkhorn. Buccinum cingulatuin.

and said bound or for a straight of the

ge No. 564. aus dem Geschlecht der Stackels sinkborn schneden Aberein, ift so genkennie eine Pffaume, Cinguaval und aschgrau. Um das erste Gewinde laufen latum. bren erhabene, glatte, und an den Seiten gleichsam ausgekehlte Gurtel herunt. Die Multibung ift oral, bie Spindel platty und bir Lippe unter ben Gurteln gefalten. Der Aufenthalt if imislane dischen Meere. Linneus!

## 442. b. Das Rungestinksorn. Buccinum rugolum.

Die Schagle ift fo groß wie ein En, und 442.b. weiß, in die Quere mit fehr vielen, bicht aneman finthorn der ftehenden erhabenen Strichen befest, davon Kuggder sechste dieter, und zugleich knotig ift, mithin fum. laufen in sine Spike que, und der Schwanz sticht etwas in die Kohe gebogen hervor. Die Lippe ist gerändelt, und inwendig mit gleichen Kockerchen besetz, untenher aber weit gedehnet und inwendig

### 376 Sechste El. III. Ordn. Conchplien.

A. ungleich. Zwischen ber Schaale und ber Lippe go Flaschen het eine starte Vertiefung hinein. Linneus. Bonanni Recr. III. tab, 160.

442. c. Das Gürtelfinfhorn. Buccinum cingulatum.

Die Größe ist einer kleinen Zwetschge gleich, kinkhorn die Gestalt oval. Die Farbe aschgrau, und übris Cingugenk so beschaffen wie ibbiged Bitceinum Angulatum. Wir glauben dahero, es werde die nämliche, und aus Bersehen, in den Linneischen Anhang zwenmal gesetzt senn.

H. Piramidensormige. benfore mige.

488: a. Die Knotenfette. Buccinum monile.

Anden Mit dieser Art ist es aus Versehen eben so tene. wie mit der vorigen gegangen, daß sie nämlich im Monile. Anhange zwenmal stehet. Die Schaale ist gesthürmt, und hat um die Gewinde zwen Gange. Der untere ist breit, und schwach ausgekehlt, der obere aber ist schmal, und bestehet aus einer Kette von Knoten. Sie ist weißlich, oder etwas gelb. Linneus.

# 488 b. Das zwenfäbige Kinkhorn. Buccinum gemicum.

488. b. Swenfa Die Schaale ist gethurmt, und hat zwen biges Sange, wovon der untere breit, und schwach in born. die Quere gestreist; ber obere aber dicker, mehr Gemierhöhet, und gleichsam zwensädig, oder aus zwenen sum, Kaden zusammen geschlungen ist. Linnens.

488. c. Das

323. Gefchlecht. Rinfhorner, 377

488. C. Das einfädige Rinfhorn. Buccinum Biramb proximatum.

miac.

Die Vanart ist mit der vorigen Art. die name Einfadt liche. Das untere Band ist breit, und schwach in ges. die Querc gestreift. Das obere ist fadenformig, Proximo mehr erhöhet, berde bestehen aus zwen Jaden, matumbie aber so ancinander liegen, daß man sie nur für einen Faden ansehen solte. Linneus.

324. Ø# **Aa** 2

### 324. Geschlecht. Flügelschnecken.

Testacea: Strombus.

Breite ffügelige C. Breitflügelige.

512. a. Das fleine Segel. Strombus minimus.

Rleines Segel. Minimus.

512.2. In ber Beftalt fommt diefe mit dem Sockercana. vi No. 512. fast gang überein, ift aber fleiner. Der Rucken ift ziegelfarbig, die Mundung glatt, und gelb, aber nicht gestreift, bende gippen binges gen find weiß. Die Schaafe ift übrigens bockeria, und die Gewinde find fnotig gefalten. Das Bater. land ift Uftindien. Linneus.

Rumpf Rarit. Rammer, 'Tab. XXXVI. fg. P.

D. Ges tbùrmte D. Gethurmte.

517. a. Die Reule. Strombus Clavus.

517. 2. Reule.

Die gethurmte Schaale ist glatt, nicht gar Clavus, einen Finger lang bat drengehn Gange, Davon Die amen untern glatt, bie übrigen aber ber lange nach gestreift sind, der gang untere hingegen ift in die Quere gestreift. Der Schwang lauft spisig aus, ift gerade, glatt, und ein Drittel fo lang ale bic ganze Schaale. Die Mundofnung ift oval und glatt. Linneus.

d'Argenville Tab. XIII. fig. A.

325. Ses

# 325. Geschl. Stachelschnecken.

Testacea: Murex.

#### E. Geschwänzte.

555. a. Die Rothlinie. Murex succinctus. ie.

Die Schaale hat die Große einer Kirsche, ist Roth. blaßfarbig, und auf den bauchigen Gewins linie. den mit rothen erhabenen Strichen umgeben, die Succin-obern Gewinde führen dergleichen sieben, das uns Etus. tere aber drengehn. Der Schwang ift cylindrifch, und faft fo lang als das untere Gewinde, auch mit ähnlichen Querstrichen schief umzogen. Die Lippe ift warzig : gegliedert, und hat inwendig eine Reihe rother Puncte. Linneus.

Bonanni Recr. III. Tab. 47.

### 558. a. Der linke Murer, Murex contrarius.

In den europäischen Meeren ist noch ein 558. 2. Murer besindlich, welcher eine weitoffenstehende Linker geschwänzte Mündung hat, aber links ist. Die Contra-Gestalt kommt der niederländischen Spindel rius. No. 558. sehr nahe. Die Obersläche ist durch ere habene Striche rauh, diefelben find gedoppelt, und haben zwischen inne noch einen feinern Strich liegen. Linneus.

# 329. Geschlecht. Schwimmschecken.

Testacea: Nerita.

C. Sejab nelte. C. Ohne Nabelloch und gezähnelt.

739. a. Die Milchnerite. Norita lactaria.

739. a Mildy nerite. Lactaria. Die Schaale ist weiß und mit vielen voneinander abstehenden Furchen besetzt. Die aussere Lippe hat seche Zähnchen, davon die aussern am stärksten sind. Die innere aber ist der känge nach gerunzelt, und hat vier eingebogene Zähne. Das erste Gewinde ist kugelformig, die übrigen machen eine kleine gelbe Spize. Linneus.

Vierte

#### TO TO THE

## Vierte Abtheilung. Einschaalige, ungewundene.

331. Geschlecht. Rlippfleber.

Testacea: Patella.

C. Mit fpigigen gefrummtem Birbel.

C. Rrumm virbel.

769. a. Die Moachspatelle. Patella Noachica.

No. 778. etwas gedruckt, und mit etwa patele. wanzig erhabenen Nippen gestreift. Der Wirbel Noaist spisig zurückgebogen, und vorneher mit einer chica.
Spalte gezeichnet, daher sie unter die letzte Abtheis
lung E. mit durchbohrtem Wirbel, zu rechnen ware. Linneus.

769. b. Die Zwergpatelle. Patella miliaris.

Sie ist nicht größer, als ein Hanfsamentorn, 769. b. jart und durchsichtig, hat einen zurückgewundenen greelle. und an die Seite gebogenen hackenformigen Wir. Miliabel, kommt in vielen Stücken mit der Marrens ris. Kappe No. 761. überein. Linneus.

Fünfte

## Fünfte Ordnung.

# Thierpflanzen.

Vermes: Zoophyta.

345. Geschlecht. Seckocher.

Zoophyta: Tubularia.

† 8. a. Die caspische Rochercoralle. Tubularia Caspia.

g. a. Cafpi fae Kocher coralle. Cafpia.

5. . . . 475

faden zeiget sich eine gewisse Art der Sees facher, welche dieselbe als eine aschgraue Wolle diet überziehet. Die Röhrchen haben kaum die Dicke einer Sauborste, sind weich und aufgerichtet. Die Scheide, die aus dem Kocher hervorzichtet. Die Scheide, die aus dem Kocher hervorzichtet, ist etwas verdunnt, glasartig durchsichtig, und oben mit dem Kranze des Polypen, der nur acht Fasern hat, und dahero eine Seltenheit ist, verschen. Die Fläche, oder die Scheide dieses Kranzes ist mondförmig, wie an den übrigen Sees köchern, und die Strahlen stehen zierlich aufgerichtet und zurückgebogen. Man trift diese Art sehr häusig in dem calpischen Meere an den schwanken den Meergewächsen gleich einer Rinde oder einem Ueberzug au.

348. **9**0

# 348. Geschlecht. Seegallert.

Zoophyta: Vorticella.

### 14. a. Die boltenifche Thierpflange. Vorticella Bolteni.

the Alumbia and brode sit in ...

liefe neue Thierpflange, fo wie fie durch bie Boltenis Beranlaffung unfers vortreflichen Gonners iche und Freundes, des herrn D. Bolten, Stadt, Thiers phoficus in Samburg, ein Gegenstand ber Be, pflange. trachtung fur die Maturforscher worden ift, murde auch zu allererft durch diefen verdienten Mann ber Belt in einem öffentlichen Briefe an dem Ritter von Linne im Jahr 1770 befannt gemacht, mit eis ner faubern illuminirten Abbildung in naturlicher Große beleuchtet, und nach allen Theilen vollftandig erflaret. Mart und Merfchiebenhelten

Es ift biefes fonderbare Meerproduct in ber Straffe Davids unter dem 69ften Grad aus einer Liefe von 300 Saden mit einer Ballfischharpune bervorgezogen, und um defwillen um fo mehr fchas, bar, weil bergleichen aus folden Liefen mohl fel ten an das Lageslicht fommen; und wir murden and nicht einmahl fo gludlich fenn, von diefem Meergewachse etwas zu miffen, wenn nicht die wies derhohlten Bemuhungen diefes großen Liebhabers und Renners naturlicher Rorper, die Berbenichafe fung folder Geltenheiten, ben den auf die Sifcheren nach Gronland und in die Straffe Davide aus: laufenden Schiffern betrieben hatte. Beil indeffen die Originalbeschreibung, oder der Brief des herrn D. Bolten

### 384 Sechfte El. V. Orbn. Corallen.

D. Bolten in jedermanns Sanden ift, fo haben wi das Nothigste nur mit furzen Worten anzugeben Die Gestalt dieser Coralle kommt einigermas

se Gestalt dieser Coralle kommt einigermas sen mit dem Eperwirdek No. 14. überein. Es saß diese Thierpstanze auf einem mit Corallenmoost bewachsenen Steine, war über einen Schuh lang, hatte einen einfachen Stiel, eine längliche ovale Blume, die an der einen Seite mit zwen Ocknungen verschen war, davon die obere das Maul, und die untere, mehr hervorragende, den After vorsstellte, so daß sie von dem angeführten Eperwirdel darinne unterschieden ist, daß die Blume länglich oder keulformig, und das Maul seitwerts, nicht aber oben, besindlich. Es sassen zwar auf dem Steine zwen Eremplaria, jede aber allein, und ohne Gemeinschaft mit der andern. Bolten. Linneus.

Soviel für diefesmal an Zusätzen. Wie viele Arsten aber noch in allen Geschlechtern übrig senn mogen, können diejenigen beurtheilen, die aus Ueberzeus gung wissen, daß Gottes Werke nicht zu zählen sind. Und wahrscheinlich erreichen wir, ben Samms lung der Arten und Verschiedenheiten in den mehressten Ordnungen und Geschlechtern natürlicher Körsper, niemahls das

ENDE.



नुप्ताः व

Regis



# Register

ber

in diesem Supplementsbande

enthaltenen

Befchlechter und Arten.

Erste Classe.

# Säugende Thiere.

Mammalia.

ter (1917) House (1917) December (1917)	Erste Ordnung	Sale 1 abnliche. 3	
r Seldledt.	Homo. De	r Mensch. 3	
Toh I. fig. 1	na. Durnus,	Langarm 4	,
- mathieti	Simias IIDer geschwanite. Bi	श्राहर.	
TAL I GO W - VILL	- 6.a Mermon,	Sueras -	,
Tab. 1. 65. 30 -	17. a. Mone,  17. b. Patas,	Große rothe Affe	ķ
Tab. I. fig. 5.	18. at Tarabours	Schwarznase E Tab. U	

Regi	ster der Orom	ingen,
Tab. II. fig i. —	23. a. Petaurista, 23. b. Maura,	Weifiga :
11g. 2. —	23. 6. Sinica.	Pataffe 5
fig. 4. —	23. d. Nemans	Der Dud 10
	23. c. Roloway,	Palatinaffe 10
fig. 6, —	26. a. Argentata,	Mjce 11
	Lemur. Ge	
3. Offchecht.		
_	1. a.Botto,	Potto 12 Pougus 12
	a. a. Mongoz,	Wousus 12
Tab. II. fig. 7.	a. Flavus,	.300 (Settlehinging 13
4. Geschlecht.	Vespertilio.	Mebermans. 14
4. Wilgings	7. Haftatus,	Riechlatnase 14
	8. Soricinus,	Spernafe 14
	Lepgrinus,	Dafenscharte 15
	so. Largarius,	Charles "
	11. Serotine,	blaffe Kledermaile 16
	12. Pibistrelle,	Bwergfledermaus 16
•	13. Barbastelle,	Kurzmaul 17
	- 14. Barbatus,	Bauffedermaus 17
	15. Pictus,	Buntflügel 17
•		Spisobr 18
2 1	17. Molossus,	Hundsmanl 18
	18. Cephalotes,	Graffapf ( 19
•	19. Marsupialis,	Beutelftager 19
11. 15 c	20. Equinus,	Henfeisennase 20
ii.	21. Borealis,	Renjortte 2
<b>4</b>	mente Sydnin	ige and fid. 1
ຼຸ່ລ		and the state of t
Bruta. Thick		eidezähne. 21
6. Geschlecht.	Trichecus.	Geefuh. g 21
. 4	2. a. Dugon,	Dugung 31 1.421
10. <b>இ</b> டிடுட்டு t.		fruitfill. 23
, ,	5. a. Octocinctus,	Uchtgüttelige 23
<i>y</i> .	7. Duodecim einel	. Zwolfgarielige 42
	8. i8-cintitus,	Mittelingarteliges

<b>G</b> efo	blechter und	Arten.	<b>.</b>
g	dritte Ordn	ung.	Seite
Fera	e. Raul	othiere.	25
11. Geschlecht.	Phoca.	Seefalb.	25
	2. a. Leonina,	Seelowe .	25
7.	3. a. Vitulina,	Robbe	25
	4. Pulilla,	Rleine Seehu	
	5. Hispida,	Stachelfeehur	
12, Geschlecht.	Canis.	Hund.	27
•	1.2.Der Daush	und, Unterarten	27
·• .	2. a. Der Bolf,		28
•	10. Corfac,	Wolfsbund	28
	11. Lycaon,	Steilobr	28
	teus,	gen-Silberhund	29
13. Geschiecht.	Felis.	Rape.	29
	8. Uncia,	Rleiner Panth	
• ,	9. Leopardus,	Guineifche Lec	
		parb	29
•	io. Margay,	Margan	29
·:	11. Moschate,	Bisamtage	30
	12. Concolor,	Brasilianische	
	C	Rape	30
	13. Guepard,	Wolfstiger .	30
	14. Serval,	Serval	30
	15. Caracai,	Caracal	30
14. Geschlecht.	Viverra.	Das Frett.	31
•	4. a. Putorius,	Stinkthier	31
• • •	7. Fusca,	Braunfrett.	32
	8. Cinche,	Chunt	32
\$ 100 pt 100 pt	9. Mapurita,	Mapurit	32
e the to	10. Tossana,	Melirte Frett	32
	986 0	75	CSS.44

Regis	der der Ordnu	ngen,	
2.01	•		<b>B</b> eite
15. Geschlecht.	Mustella,	Wiesel.	33
	12. Potto,	Potte	31
†	13. Sarmatica,	Sarmatier .	33
Ť	14. Sibirica,	Sibirier	34
17. Geschlecht.	Didelphis.	Philander.	35
	6. Cajopelin,	Cajopolin	35
•	7. Indica,	Amboinefer	35
18. Geschkat.	Talpa. Ma	ulwurf.	35
10. Ochhuda	3. Virginea,	Purpurmanier	7 -
*	4. Americana.	RotherMeulm	. 36
	5. Frilius,	Geflectter Dau	lm.36
19. Geschlecht.	Sorex.	pi <b>şmaus.</b>	36
13. 6.10.00	6. Aquaticus,	Wafferfpigma	ng 46
*	7. Americanus,	Brafilianifche	
•	7	Spi <b>şmaus</b>	~ <b>36</b>
2	Bierte Ordnun	<b>9.</b>	
Glires.			37
Omes.	Manne	Cijiiiii	3/
22. Geschlecht.	Lepus.	Paafe.	37
22. <b>Et lytty</b>	5. Pufillus,	Zwerghafe	37
4	6. Alpinus,	Berghafe	38
	· <del>-</del>	Maus.	39
24. Geschlecht.		Eumpfmaus	39
	22. Paludofus, 23. Citellus,	Sikirake	39
	23. Chenus, 24. Aperea,	Brasilianische	
	24. Aperca, 25. Cabiai,	Umericanische	
••	26. Bobak,	Polnische	40
4	27. Agrarius,	Actermans	41
	og Minutus.	3mergmans.	41
4	· 20. Tamariscinus	, Tamaristenm	ans42
i	30. Meridianus,	Langfuß	42
•		T 21. E	Tr Athy,

#### Wefdlecter und Arten. Seite † 31. Migratorius, Zugmaus 43 Damftermaus † 42. Sungarus, 43 + 33. Arenarius, Candmaus 44 † 34. Barabenfis Dbpmaus Maubichwani † 35. Lagurus, 45 Befellige Maus + 36. Socialis. 45 † 37. Subtilis, **Bartling** 46 46 + 38. Sagitta. Pfeilmaus Bilbe Maus 29. Barbarus, 47 Tab. III. fg. 3. - 40. Canguru, Rångurub 62 Der Cavia. 24. a. Beschlicht. Cavia. Tab. III. fig. 1. - 1. Capenfis, Caapiche Cavia 48 Kunfte Ordnuna. Wiederkauende Thiere. 27. Weichlecht. Camelus, Das Cameel 51 2. Guanicoc. Schaafbromebarg : 29. Defdlect. Cervus. Der Hirsch. 5 I 8. Pygargus, Bilber Dirfc Antilope. Der Hirschood 29. a. Orfol. I. Capenlis, Blane Bod 12 2. Europea, Gemie 53 Afric. Gemfe g. Dama, . 13 **C**rummborn 4. Redunca, 53 5. Trago Camelus, Rameelbod 53 6. Scytica, Sarter 53 7. Pygargus, Beikarfc) 54 8. Dorcas. **Gajelle** 54 Plattborn. 9. Kevella, 54 10. Bubalis, Debsengagelle' 54

11. Bezoartica,

25 b 2

12. Grimmia,

13. Scripta,

14. OPYX,

55

55

55

Bejoarbock

Ereusbod

Jungfernbock

Regi	fter der Ordn	ungén,	ماده ماده
Spranning, and Artificial Artific	14. Oryx, 15. Strephceros, 16. Rupicapra,	Cubu Condoma	Seite 55 55 1111 56
32. Sefdlect.	Bos. Der		57 57
no de C	sechste Ordnu	ng. 4 - 20 . 111	đa'
Belluae.	hiere mit P	ferdegebiß	.58
35. Sefchlecht. Tab. III. fig. 2	1. b. Scropha, 1. c. Aethiopicus	Mastschwein	58 58
e	iebe <b>nde</b> Ordn	ung.	
Cete.	Säugende (	Seethiere.	60
38. Weschlicht.	Balaenae.	Mallfiche. Anotenfijc	60
40. இடிடுடு			61

Zwente

### , Gefchlechter rund. Arten.

saute Bishille

## Zwente Stasse.

# Die Bogel.

Aves.

### Erfte Ordnung.

e	256 4	Sn	ente
44. Gefclecht.	27. Leucorinus, 28. Bicolor, 29. Albus, 30. Auriculatus, 31. Caiennenlis, 32. Viridis, 33. Coeruleus, 34. Angrajen, 35. Chabert,	Grüner Blauer Schwarzer Manikischer	7 [ 71 71 71 72 72 72 72
version had ?	18. Domingenfis,	Domingische	70
22 makeschingtonic	17. Cajennensis.	Cajennische	70
There serate	16. Caparoch,	Weißbacken	69
ा है है है है है है है है	14. Uralensis,	Uralifche Eule Mignatureule	69
B. Ungehö	13. Accipitrina,	Sabichteule	67
	5. a. Deminuta,	Kleine Schuhu	67
43. Wefdlecht.		ale.	67
the entire of	33. Lencorypha, 34. Regulus,	Aleine Konig	66
42. Gefchlecht. B. Mit bi	inkeler Wachsho	ut.	65
	itres. Hal	sidyte.	65
Lineirte Paraden	1 - 1 - 100 W TO TOP TO STORE TO ST		

#### Awente Ordnung Spechtartige. Picae. 15. Wefchlecht. Pfittacus. Dapagen. 73 A. Langichwange mit feilformigem Coman-73 6. a Lineatus. Lineirte Paragen 73 b. Haematodus, Blutraragen 73 Beflectter Partit 74 c. Maculatus. d. Purpureus, Purpurtopf 74 e. Carolinensis, Gelbtopf 74 f. Fasciatus, 2Beiftopf 74 g. Ferrugineus, Roftbauch 75 h. Leucocephal. Beigauge 75 i. Verficolurus, Buntichmani 75 Corallenbals k. Notatus, 75 Gemablte Varfit 75 1. Pictus. m. Hiftrio. Arlequin 76 B. Rursichwange. 903 48. Aurora, Gluthpapagen 49. Mafcarius, Mafcarin 76 00 50. Albus, Weiffe Ratatu 76 (1) Designation of 51. Hæmaturopy- Rotharichtafatu gius, Thankafatu 52. Roratus, Chinefifche Ratat. 77 Chinenfis, usidaimi Gelbrandpapag. 77 54. Marginatus, Dankout 1 Brauner Papag. 78 55. Fuscus, Bunter Dapagen 78 56. Verficolor, 72 Cajennifcher D. 78 Cajaneus, 74 Pectoralis, Schediger V. 78 58. 50 Rothtehl D. Gutturalis, 79 57 Rothbauch P. 60. Ventralis, 79 Bunter Parfit 61. Varius. 79

62. Inquinatus,

69. Araufiacus,

23530-0103

Ranificialer

STRAINER

Register ber Orbnungen.

Schningiger Part79

Domerangenhale 79

64. Auran-

<b>G</b> efi	blechter unb.9	leten.	•
okmout. 88	64. Aurantius,	Pomeranjenschn	seite as
or in the control of	65. Jugularis, 66. Capensis, 67. Peruvianus, 68. Philippensis, 69. St. Thomae, 70. Cajaneus, 71. Guineënsis,	Selbkehl Blaurand Langschwanz Graurand St. Thomaspar Cajennis Parti Suineischer P.	
64. Gefdlect.	Ramphastos	Loufan.	82
io ioblinensi io ioblinensi io iopini io iopini io iopini	9. Toco, 10. Byron, 11. Atricollis, 12. Monilis, 13. Flavicollis, 14. Discolor, 15. Pulcher, 16. Flavus, 17. Glaucus,	Tofo Byron Schwarzhals Weißhals Gelbbals Rothbauch Scheck Gelber Toufan Blauer Toufan	82 82 83 83 83 83 84 84 84
50. Geschlecht.	Corvus. 2 20. Albus, 21. Fuscus, 22. Ruber, 23. Tricolor, 24. Cinereus,	Rabe. Weißhals Brauner Rabe Rothfeder Gruner Rabe Purpurtopf	85 85 85 85 85 85
51. Gefclecht.	Coracias. § 7. Leucocephalus 8. Glaucurus,	Racervogel. Beißtopf Blauschwanz	86 86
52. Befdlect.	21. Tricolor,	Droffel. Drepfarbige Rappenbroffel Gruner Eitroufarbiger	87 87 87 87 87
	286 5	56,6	Dt,

	Regi	iker, der 1838	wnungen,	
- A			•	Seite
50.	Geschlecht.		Großmaul.	88
31	Section 1	2. Verficolor,		88
CX		3. Hæmacepha		88
C/		4, Niger,	, Schwarzer	89
€3		5. Maculatus,	Fleckenbruft	89
57.	Geschlecht.			90
£ = 1	A. 15 y 1.29 : 31	23. Caponies,		90
وتحديها		24 Niger,	Edwarger	90
		25. Toulou,	Edulon .	150
59.	Geschicht.	Picus.	Specht.	91
٠.		22. Senegalie	nfis, Gelbrucken	91
. '		23. Goertan,	Górtan	91
ን	****	24. Striatus,	· · · Geftreifte	91
. 3				91
45		26. Elegans.	: Bierliche	92
6e.	Beschlecht.	Alcedo.	Eifvogel.	93
<b>7</b> 1]		16. Tridaftyl	as Drepfingerige	4 92
	•	17. Rubra,	Rother Cyfor	gel 93
	•	18. Galerita,	- Haubenengvo	gel 94
:		19. Leucocepi	ala, Beißtopf	94
• •		20. Aurea,	Goldvogel	94
63.	Geschlecht.	Merops.	Bienenfresser	:. 95
	وفرز بالمرائع	B Americanus		
,	PI 4	9. Pufillus,	. 3wergbienenf	r. 95
÷.4	gista variat attac	10. Giganteus 11. Persica,	, Grofe Bienen	fr. 95
	, †	11. Perfica,	Persianer	95
65.	Geschlicht.	Certhia.	Baumlaufer.	97
•	Appel of the	26. Capenlis,	. Caapfeber	97
P &		27. Violacea,	Bioletter Bau	ml. 97
•	Carrier Co	28 Intermedia	, Baftard	, 98
•		29. Jugularis,	Blaufehle	98
1.6	61	30. Cinerea,	Ascaner	28
• .	•	. •	21	. Tri-

Geft.	plecher und A	rten,	
	31. Tricolor, 32. Notatus,	Drenfarbiger Bioletflect	99 99
66. Geschlecht.	Trochilus.	Colibri.	100
cor appu	2. Jugularis,	Blauhals	100
our ( 149)23.	dritte Ordnun	g.	,
Anseres	. Schwim	mvögel.	101
67. Befchlecht.	Anas. En	te. Aftracanische	101
Smerter Det - 188	39. b. Borealis,	Rordifche Bat	
Carbo Science	39. c. Stelleri,	Stellers Ente	102
the buildalance	46. Rufina,	Einfame Ente	102
III . Pril . pridicity	47. Merfa,	Ruderente	102
69. Befchlecht.	Alca. Papa	gentaucher.	104
BLA SALE CONTROL	6. Cirrata,	Manenpapage	1) 104
Tongsto 2,	7. Pfittacula,	Geepartit	104
	8. Criftata,	Geefatatu	104
Ell Imponione	9. Tetracula,	Bierfarbiger	105
72. Geschlecht. B. Gåge		Pelecan.	106
	4. a. Pygmaeus,	3mergmaffer:	106
75. Gefdlecht.	Colymbus.	Taucher.	107
ret Vi conside	12. Duplicatus,	Doppeltauche St. Thomas.	
OLE SOLDS	- 14780808141 - P.1	taucher	107
76. Seichket.	Larus. D	lewen.	108
			108
	13: Albus,	Weiffe Mewe	108 Miarta

Regi	ister ber Or	dnungen,	<b>~</b> .,
. 2	Bierte Ord	nung.	Sei
Gralla	ae. Stel	zenläufer.	IO
84. Sefdlecht.	Ardea.	Reiher.	10
B. Grues		Kraniche.	10
	6. a. Leucoge		10
•	b. Mexican	a, Mexicanisch	er 11
•	c. Japoneni	is, Japanischer	110
•		or, Erompeter	110
C. Ciconi	ia. 🤇	Storch.	11
	8. a. Fuíca,	Grauner	11
D. Ardea	ı <b>.</b>	Reiher.	111
	27. Pufilla,	2mergreiher	: 11
	28. Cristata,	Paubenreihe	
	29. Tricolor,		
i	30. Comata,	Mahnenreih	er 111
85.Gefalect.	Tantalus.	Brachvogel	112
	8. Courly,	Cour in	111
	9. Castaneus,	Donauer	112
87. Geschlecht.	Tringa.	Strandläufer.	113
	24. Islandica,	Iglander	113
<b>`</b> :	24. Senegaller		113
	26. Hudsonica		114
	27. Fusca,	Brauner Str	and
		länfer	114
88.Gefalect.	Charadrius.	Regenpfeifer	.115
†	13. Gregarius,	Gefellige	115
Ť	14. Asiaticus,	Mfer	115
- , <b>†</b>	15. Tataricus,	<b>Tartor</b>	116
	16. Dominicus		116
	17. Anglus,		117
	18. Jamaicense		117
,	19. Utopiensis,	Schneppenpfe	4.117

<b>G</b> efd	plechter und 2	irten.	_
	20. Mexicanus, 21. Bengalensis, 22. Aureus,	• ,	Edik 117 118 1. 118
91. இடிடுடித்த.		essennische	119
33. Gefckecht.	11. Capenfis,	alle. Caapfche Grûne	120 120 120
8	unfte Ordnun	ıg.	
Gallina	ie. Hühne	rartige.	121
98. <b>छर्गका</b> रकार	Pavo. P		<b>121</b>
99. இடிடுட்ஷ்ட	Melcagris, 2. a. Cristata,	Bruthahn. Beafilianifc	<b>122</b>
101. Geschlicht	Phafianus, s. a. Gallus,	Phafan. Daußhabn u fernere Berfd denheiten die	mb )ies fer
-		Chinefifcher Gebornte Doazin Marail Caracara Chacamel	193 124 125 125 125 125
102. छर्गक्रिंदिक्री	Numida. 1. a. Meleagris, 2. Cristata,	Perihuhn. Perihuhn Saubenperie buba	126
	3. Coronata,		

		م من څ		
	: Megiff	n der Opp	heigen,	<b>S</b> eite
≠: う 102-	Geschlecht.	Tetrao.	Berabubn.	127
	A. Sederfu		3.	
277.5	T. Benerini	ov. Separations	is, Genegallischet	2
مر ساخت			Bastardhuhn-	
CII	- 6 MESE		Salentohaha	. +1
<b>4</b> .2	B. Kahlfüß	<b>.</b>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
		o. a. Coturnix,	<b>Bachtel</b>	128
120	2.1772	L. Europaeus,	Europaliches.	.129
Or I		2. Afer,		129
130		3. Chineulis,		
		4. Colin,	Colin	129
	÷ 2	5., Coyoleos,	Cojoleos	129
		6. Colenicui,	Colenicui	13,0
}	Œ o	difte Ordnu	ma ·	•
3 4 5				. 0.
101	Passeres.	Sperli	pgartige. i	ιái
	1	and the second second		
TÁL.	Geschlecht.	.Columba.	Laube. 👈	131
	A. Geradsc		•	
		a, Gutturalis,	Rropfer, effic	Бe
£21	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		Berfchiedenh	apr
<b>4</b> :			ten beffelben	131
27.1	3	5.a. Viridis,	Grune	132
Ç i	HAT BEEN A T	b. Australis,	Gelbichwang	132
:48	1.7	c. Amboinensi		132
124	474 - 1 J	d Moluceenfi		133
e C	<b>3</b> ( 5.50)	er Indica, 🛂 S	Batavische	133
آھ <u>َ</u>		f. Senegallent	is, Rothbauchige	
129	,	g, Javanenlis,	Grunructen	133
1.7	. Transl	h-Afiatica,	Rothhal <b>s</b>	133
127	D Gaillichm	Ante 3 3 3		

41. Histrio, 4 42. Fusca,

43. Macroura, 44. Ventralis,

45. Atricollis,

ÒE I

105. 50

134

135

Langfcmanz Weißbauch

Schwarzhals

. <b>S</b> efd	bledher-und	Anten.	
ii. *9	_		Seite
305. Orfakat	Alauda.	Lerche.	136
1 19 19 19 19 19	12. Tatarica,	Tartarlerche	136
	13. Cochevis,	* Roftflügel	136
1	14. Plumata,	· Weißbauch	137
r and they	15. Senegallensi		137
	16. Collaris,	Rragenlerche	137
	17. Calandre,	Braunbruft	137
• • • • • • •	18. Calandrotte	3 Audenerche	137
106. Geschlecht	. Sturnus.	Staar	120
	- Commission C		138
	6. Militaris,		
107 Defdirdt	Burdin, Ki	Soften befrun	Acf
in and in the	29. Pulcher,	A 16 answer	
			139
१६४ : अभिन्य	30. Merle,	Beißfied	5,130
	32. Madagascar	Cajenitis Der	
<b>30</b> 5000 3	enfis,		139
	33. Auratus,		•
gealeann i g	34. Carelinus,		140
To the state of the	25 Canadentis,		140
Same Same	36. Cinercus,		140
i	37. Americanus		140 140
9510			00f14x
ः वेष्ट्रवेशवाध्यक्ताः 😅	39. Mauvis,	Mauvis .	141
74 19 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	401 Maculatus,	Schwarzschno	B. 141
rate of the property of	41. Ferrugineus	4 Rostfärbiger	141
	42. Superbus,	AngolischeDe	erl 142
ist firet is	43. Pufcus,	🖰 Muscheltrage	T 142
क्षा 🚽 🚉 📆 🤭	44. Senegalius,	· Senegallischer	142
, r	45. Viridis,	Gruner	142
mi (1. 1. 1. 1.	46. Selitarius,	Einfiedler	142
Set 1997	47. Purpureus,	Purpurvogel	143
នទេ ។ ស្រួន វា នេះ 🦠	48-Palmista,	Palmvogel	143
	49. Caftaneus,	Caftanienvog	
A GEN	50. Europaeus,		143
१२६ - १५ १५ - १६ १५ इ.स. १ <b>५० ल</b> ालाहरू	51. Sordidus,	Schmußer	143
	52, Galidatus,	Langschwang	144 Mo-
72.17		5	3. Mo-

Negi	ter der Ordnu	ingen,	
23	•	•	Sett
•	53. Moluccensis,	Blauflägel	34
•		Kronendroffel `	144
	55. Gutturalis,	Gelbfehlchen	144
	46. Dominicus,	Bunte Droffel	144
	57. Indicus,	Braunschnabel	14
•	58. Triftis,	Dunkelfarbiget	14
	59. Philippensis,	Gruntopf	149
	60. Podobe,	Podobe	14
•	61. Cyaneus,	Blautopf	14
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	62. Guajanus,	Blaubruft .	14
<u> </u>	63. Rousserolle,	Rouffcrolle	140
108. <b>Gefdlec</b> t.	Ampelis. Se	iden februatte 1	47
Acres (Aurilia	4. b. Maculatus,	Bunfect	
	4. Di Iviaculacua	Onules.	147
109. <b>B</b> eschlicht			148
	49. Orix,	Grenadier	14
Ť	so. Sibirice,	Cibirier .	148
7 · <b>1</b>	51. Cristate,	Eacatufint .	149
,	52. Caudata;	Paubencolion .	149
	53-Melanocephal	1,Schwarztopf	150
	54. Maja,		150
c	55. Leucura,		150
•	56. Maculata,	Geflectte	150
<u>1</u>	57. Moineau,	Comargoirbel	
a di jama di kababatan	58. Coromandela		151
	59. Jacobiu,	Jacobin	151
	60, Undulate,	Gewölfte	151
	61. Laticauda,	Breitfchwang	151
	62. Rubricóllis,	Rothbals	151
	63. Nonette,		151
•	64. Aurata,		151
	65. Papa, 4		152
	66. Cucullata,	Rannentrager	152
•	67. Nigra,	Trauervogel	152
,	68. Notata,	Weißband	152
•	69. Fimbriata,		153
•	70. Melanura,	Schwarzschwan	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	A . a med la de a	Ď

<b>D</b> AG	pleaser and s	arich	_
•	•		Geitt
	71. Erythrophtha	il-Rothauge	153
j	72. Hæmorrhoid	a-Rothfeder	153
	73. Verdier,	Reichevogel	153
	74. Liturata,	Streifbruft	153
	75. Bourbonnenti		154
. •	76. Bouvreuil,	Caper `	154
	77. Conchata,	Muschelvogel	
•	78. Crifpa,	Reaufbauch	154
to. Gefchlecht.		Ammer.	155
†	25. Pasterina,	Sperlingean	
• • •	26. Pithiornus,	Sperlingsbui	rg. 156
• •	27. Aureola, 28. Notata,	Gelbhals	156
•		Weißbauch	157
	29. Moineau	Gelbband	157
III. Geschlicht	. Tanagra.	Merle.	158
1	25. Varia,	Bunte	158
• •	26. Vicidis,	Grünkopf	<b>158</b>
	27. Soledon,	Gelebonkopf	158
,*	28. Cyanocephala	1, Blaukopf	159
	29. Nigra,	fcmarje Mei	
	30. Maxima,	große Merle	159
	31. Mitrata,	Paubenmerle	159
	32. Pompadura,		159
	33. Fuica,	Praune Merle	
	34. Elegans,	Kaisersmerle	160
ين سنداند	35. Foemina,	Weibchen	160
112. Geschlicht.	. Fringilla.	Finke.	161
	40. Calcarata,	Spornfink	161
: <b>*</b>	41. Flavirostris,	Gelbschnabel	162
	42. Mozambica,	Mosambiqui	
	5 5 d	scher	163
	13. Fusea,	Brauner Fint	_
Alman Chamil 4	44- Vitis,	Beinftocffint	163
Linne Gupl. B.	Œ ¢	45.	Cara

Register	der Ordni	ingen,
46. 47. 48.	Cardinalis, Tarin, Proyer, Cerata,	Scharlachfint Reujorfer Welirter Fint Braunrucken

49. Diadema,

Beite

Buschfint

164

	50. Flava,		164
,	51. Bruante,	Bourbonnifche	164
	52. Capenlis,	Caapicher Bint	165
•	53. Mexicana,	Mexicanischer	165
	54. Linotte,	Die Rothbruft	
	55. Cabaret,	Der Rothtopf	165
	46. Falciata,	Gelbbanbiriet	165
	57. Chalybeata,	Crabifarbiger	166
	68. Dominicanae	Domingischer	
•	-	Cardinal	166
	59. Čucullata,	Daubenfint	166
	60. Rubricollis,	•	166
	61. Conchata,	Muschelfint	166
•	62. Cherulea,	Blaufin?	
•	Ozi Guezaion,	- condition	••,
13 Gefchl.	Muscicapa. Blic	genfänger.	168
	22. Caudata,	Langichwanz	168
.*	23. Coronata,	Gefronter	168
•	24. Virginea,	Virginischer	168
	25. Leucocephala	, Weißtopf	169
, r	26. Maculata,	Geflecttet	169
1	27. Ater,	Schwarzer	169
	28. Tyrannus,	Rleiner Epran	ıt 169
	29. Purpurata,	Purpurfehle	169
	30. Fusca,	Braunet	170
	31. Spurca,	Schwarzbacke	170
	32. Nitida,	Conner -	170
•	33, cyanea,	Blaurucken	170
2		Rlügelfled	171
	35. Cinerea,	Blaubauch	171
	36. Viridis,	Grunteblchen	171
•	37. Bourbonnens	s. Bourbonner	171
	38. Arauliaca,	Oranier	175
	301 minness	20	Fa
•		77	

Chris	plechter und	Athtic.
	39. Falciata,	Bandirter 172 Echwarzwirbel 172
	Motacilla,	Bachfelze. 173 Rinberfielze 173
	52. Maura, 53. Cyanurus, 44. Griffage 3	Dobrentot 173 Mobrentopfch. 174 Blauschwang 178 greise Bachstelze 175
F	\$5. Fulca, 56. Tripplora, 57. Cristata,	Flügelsteck 175
ris. Sefaltat		Beifige. 177 Rother Belfig 177 Au, Schwarztopf 177
<b>&gt;</b> ************************************	16. Plumata,	Apthfeder 177
100	15. Erecins,	Meise. 178 Blaubusch 178
r17. Geschliccht	Hirundo.	
r 21. (2 <b>)</b>	. 14. Alpegris,	Sibirische Berg. [comabe 180
		7 · · ·
- i 35%		The second of th

c 2 Drif

श्र ।	Register be Dritte N P h Am	e. Class	ė. i e i	Cette L.:
१ । स्टब्स् १८ अ.स्ट्रा १ । १	Erste	Ordnun	g.	
10 E	Reptiles.	Ariec	hende.	183
ig2; School of the control of the co	† 20. Si blecht. La Birbelfchwan † 9. 2. H † 49. 2. C † 19. b. ( Eangschwänze	idibunda, elpertina, tibunda, Certa. (186, eliofcopa, Velox, Cruenta,	Lachfrosch Abendfrosch Durstfrote Eidechfen. Sonnenscha Pfliebeichst Blutschwan	183 184 185 186
Śe	rpentes.	Shle	ichende.	189
125. <b>S</b> efe	98. Ci † 99. So † 100. I †*101. I †*102. S † 103. I	rotalinus, cutatus, Hydrus, Melanis, Scytha, Dione,	Klappernat Echildnatter Klufinatter Teufelschlan Waldschlan Ealzschlang	ter 189 r 190 190 nge 191 ge 191

```
Gefchlechter auch Arten.
                                      Reite
126. Wefchlecht. Anguis. Malichlange. 193
             † 17. Miliaris,
                            Cafpifche Hals
                              fcblange
             Dritte Ordnung.
      Nantes. Schwimmende. 194
                 Accipenser. Stor. 194
 134. Gefdlecht.
                  Stellatus, Sternftor
142. a. Machlecht. Siren. Sirene.
                                       197
                             Girene bes Bat
 Tab. III. fig. 4. — Bartholin.
                          Milode i, the
Tab. Halifden ? . Lagentina . Cibechfenfirene 198
     172. Of A. B. Wela. Cechain.
gericke Green
                 N. 44 .
    Carelle teter
हार भारतालुक्त
            Berte Ochung,
Abdominales. Shandhaffir oct
       179 Gifflicht, Salmo. Erim.
    A T Little, Other Windlesson, T. A.
        Saute.
                                      Vierte
                      E: 3
V10 103 5
```

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	interat d		
A Section 1	Vierte Cl	CONTRACTOR WOULD SHOW	126
in C	e F i	s c h	e.
mmenbe. 194	Pisces.	Nantes.	
Ciernffor 194	dritte Ordi	nung. (c) (c)	134.
Thorac		ustbäucher.	
9428 @ this	ozyphaena.	Stuntopfe.	203
168 Geldlech	Perea.	Bariching.	
		enen Rückenfle Etadelbar	
172. <b>Geschlich</b> t	Trigla.	Seehahn. KleineSeeh	205 abn 209

11. Carolina, Carolinischer Seebabn 205

### Bierte Ordnung.

Abdominales. Bauchstosser. 207

178. Beschlicht. Salmo. Salm. 208 A. Truttae, Buntfarbigelachsforellen.

† 12. a. Nclma, Relma 208 † 12. b. Taimen, † 12. c. I enob Laimen 208 Lenot 208

**E** : 3

185. Ou

Gefchlechter und Arten, Seite 185. Sefchl. Exocoethus. Bliegende Bifche 209 3. Exfiliens, Springfift 189. Geschlicht. Cyprinus. Karpfe. 210 D. Mit gabelformigem Schwange. † 32. Rivularis, Bachtarpfe in the first the later designing and the The state of the state of the said grant are.

E : 4

Control of the Contro

17 (1)

Fünfte

### Regifter ber Ordnungen.

## Kunfte Classe.

Insecta.

#### Erste Ordnung.

Coleoptera. Mit ganzen Deckschile den oder Rlügeldecken.

189. b. Weschlicht. Scarabaeus. Rafer. 212

A. Das Brufiftuct gehörnt.

11. a. Dichotomus, Doppelhorn 213 11. b. Claviger, Coluffeltrager 214

† 11. c. Polyceros, 2Biclbern 214

B. Der Kopf gehörnt.

† 35. a. Cephalotes, Obrenfafer 214

† 35. b. Humerolus, Schultertafer 214

C. Ungehörnte.

...??

88. Orichalcus, Rupfertafer 80. Goliatus. Boliatetafer. 216

90. Totradactylus, Bierfingerige Rafer

216 † 91. Oxypterus, Rurafuß 217

92. Albellus, Weiflingfafer 217 † 93. Vertumnus, Frühlingetafer 217

Beiffer Rafer 4-94. Albus, 218

95. Spireae, Spierlingtafer 219

196, Geschlecht. Silpha. Tobtengraber. 220 36. Carolina, Carelinifder

<b>(9</b> )	slichtebear inne s	Acress'	Scite
TOS Chalable	Coccinella.		
Ole A This	Flügeldecken roth	ober aelh mit	
	warien Juncten.	oon Sin and	
· 149		Augentafer	221
	† 31.b. Cimicifugae	,Bangenfraute	
	Blackada Chu	tafer	`222
	: Flügewacken schw ecken.	ars anti-rother	18
ຸ <b>ນ</b> ເ ກະເວັ	47; a. Axiridis,	<b>R</b> engeltafer	222
and the contract of	1 24 25		_
199.Geschl.	Chrysomela, &	oldhähnchen.	223
E Long	ggedehnte.	. •	
33,44,11,7	123, Paracenthel	ls, Cylinder báhn	•
2 300,40	124. Lustanica,	chen Cianalhábacha	22}
s sitt intima		to the	H 445
	fchiedene Rußische		224
Taller Taller	† 126.Atxaphaxid	is, Strauchmelde	
		· kaknahan	224
A	† 127. Afelepiada,	Aefculaphahr	-
	+ 128. Ablinthii.	Wernuthhah	<b>1835</b>
្រាស់ ប្រាស់	† 128. Absinthii.		225
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	† 129. Adonidis,	Megnishahnd Asiatisch Sab	
<b>b</b>	, † 1300 Aliatica.	wingth and	226
	c. Giganauer	6 616	
200. O (   0   1	ot. Hispa. 3	Dorntater.	228
346 344	5. Sanguinicoll	is, Bluthals	228
and the fait.	dit. Curculio.	MARA IFA For	220
A Par	ngt. Cutturo.	Eachen when hi	im.
ाण्डीमार्क्टवा	igschuchel mit ein Schenkeln.	Immeti aner hi	411-
- SB - 12	Lo. 2. Colon.	Cotontafer	239
ichebychina	40. a. Colón,	Pflüger	229
See 15 4			c. Trip
***			

, area	libret net menn	mulletil	Cet
	40. c. Trifolii,		. 23
C. Langs	chnabel, mit gesä	hnelten Scher	
3,21	67. 2. Ireos, 67. b. Crucifer,	Ereugtraget	23
E.Ruczsch	hnabel, mitungerd 	hnelten Sher	la
	† 96. a. Candidatus † 96. b. Pictus	L Candidat Gemablte Raf	<b>2</b> 3
នេះ ប្រជាជាជាជាជា	go, c. Hicous,	Gemablte Kaf Pedirifel	<b>.23</b>
ing to Joyce the	96. d. Inderientis 96. e. Singularis,	Warzentafer	<b>23</b> 3
esa nudo Santania en E	96. f. Carinatús; 1 96. g. Scabriculus	Rielkafer 5, Stachelkafer	23 23
203 <b>ઉત્તૈ</b> ર્ણ A	ttelabus, Bafta		234
	14. Senex,	Mitvater . Der Unhestanl	234
N. S.	16. Bimaculatus,	Bwenfleck	235
204. Geschich	t. Cerambyx.	Bockfafer.	236
	Brust zur Seiten' nen besetzt	mit beweglich	en 236
្សាស្រ្ត ស្រួន ស្រួន ស្រួន ស្រួន	2. a. Lufftanus, 1.		236
rghlfr. 2.15	2.c. Giganteus,	Mickenberg .	237
B. Die X	bruft zur Seizen elten Rande.	mit einem ge	4
	Currintonius	-Diches mel	\$0^ 217
Ren	unden din ven S	eiten vornigen	1
1 <b>5.5</b>	51. a. Suaveoleus, 51. b. Afer,	Attanamol, Dan	n 238 f 238 1. c.
		1 7	** ^*

entimitation and institut	
	Seite
† 51.6. Glicyrchizaci Salboubect	238
f gri di Halodendri, Robinbod	239
f grae Carinatus, Rielbock	,239,
D. Das Brustschild cylkidrisch und oh	ne
Dornen.	
62.2 Panelatus, Dunesbock	_ 240
63. b. Trilineatus, Drenliniger	B. 240
† 63. c. Hieroglyphinkuperbest	241
Submer Control (1988)	
272 2 to 6 4632d, Perforatus, Durchbohrter	241
EP Das Brustschild ungedornt und rur	id.
+ 84. Floralis, Blumenbock	242
STE TOTAL TO	4 2 2
205. Beschlicht. Lepturac, Meiche Dol	1
Tie gefichen genebode.	243
A. Mit enformiger Bruft.	
† 1.a Violaceasys in Statement	242
	243
D. Mitt entithmi Sentilaren	
26. Maffilienas, ! Rleine Sched	243
7009. Grichtecht: Elateite Garingfafter.	-244
gene of ustrockapifogialis, or Affen fo and	244
210 Gefdecht. Cicindela Enthlaufer	215
The Court of the C	
712 Turing Anthon Lacteology - Wildrand	245
† 16 Atrata, Trauerrod	245
12 Toloficafinos † 174 Coepulean + Weißmaul 72 to freed fria & Gracifist + Comalband	245
-211. Geldlecht. Bupreftis. Stinffafer.	247
C A charter Chienter	/
A. Mit bauchigen Flügeldecken.	
2. a Aurata, Golbbauch	247
B. Die Ochitoe an den Opthen gesanne	lt.
8. a. Deprofius, - Gebrucker	247
•	Blatte
<b>C.</b> (	ンルバイ

_	.9(19)	her der Andun	mgen,	
,	A Rilan	dube		Criti
er v		go. Variolaris,	Martensinter	248
·		3s. Tatarics,	Sartarischer	248
۲. <del>۲</del> .	,	an Aurana.	Balariden	249
<b>5</b> 120	da seen ark f	33. Picta,	NUANIAGIANIN	249
213.	Geldlecht	Carabus,		250
241	B. Akine	<b>भ</b> ारत कर्ने <b>अ</b> हर्त		
		44. Bimaculatus,	Smenfted	210
		44. Marginatus,		250
.Ç.:	รา เคลือน <b>รั</b>	Pittus Sing	<b>Eddid</b>	250
^14 <b>4</b>	ريو دوو پرونويو	Tenebrio.	om tiele	
214,	Geschiecht.	, lenebrio,	michitater	252
(3)	A. Geffug	relte.	grape <b>199</b> 7	OZ
5	22. 04	13. a. Pestinans,	Rluchtling	252
•		ilus, b. Lanipes	Mot full	252
: +2		ügelte. 7 = 1		•
. •	TD: Minachi	34. Leucegman	26. Weitlichrift	253
		36 Bupreftoides	Erbnie bifaf	er 253
£ 43	307 300 300 11	Will Winkridtle . Mas	<b>C</b>	,,
MIF.	Stefdled!	Meloe3 1	and thee	255
	Contraction of the second seco	alda suiete (Blifamili	section to land	,
\$#2 . T	B. Selind	jelte e mit Flügeli		
,245	alsa	ger Korper.	Cowarstafe	210
		17 Conains	Comargrape Communication	t" 255
2-45	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	184 Erythrocepha		255
2:5		lus,		6
CY *		19. Feneftrata,	. Rentectates	256 256
8, <b>3</b> - 4	#C - 1 - 1 - 2 - 2 <b>- 1</b>	20. Quadrimacul 21. Necydalea,	manhad	256
د درې	· ( )	22 Sibirica	Sibirier	1 557
· • • • •	** T	22 Sibilita,		
		· a4 Frifascic	Drenhand	258
Ţ#?	(547) / <b>(4</b>	24. Ucellata,	Mapauge	258
		26. Festiva.	Rosentafer	259
<b>5</b> ; :		27. Lutes		259
•.	•	-(. 200000	+ 28. A	

	Beldiledi	ter und 8		<u>د.</u> بيط
**	7,2% I	Atrata, Jraleniis,	Geschwarztet	260 260
217. Beschl		phylinus.	Raubkafer.	261
<b>A. G</b>	7 7. a.	Tataricus,	Lartarifche R bec	261 gń.
218 Gefch			drwürmer. Uferobewum	
•	Zwent	e Ordnu	18.	
Hemipte	ra. 🤋	Nit halb	en Flügel	. 4
و داد الم		decken.		<b>26</b> 3
219. Gesch				<b>2</b> 63
CX 11.	† 11. <i>l</i>	Afiatica,	Aster	263
220 Gefchi	echt. N	lahtis. 🚯	espenftfafer.	264
	Ť 15 l	Pennicornis,	Kederhorn Kurzflügel	264
	<b>7</b> 16.	Brachyp <b>tera</b>	Ruriflugel	264
221. Gefchle	echt. C	Gryllus. (	Braßhupfer.	.266
A. A.	cridae.	Spiel	opfe.	`
			s,Spadelfopf	
C. Ac	hetae.	Mit zwen C	Schwanzburst	en.
D. To			Landstreicher euschwerten.	
	1 24. 2	. Pedo.	C'tengel	264
£	†≀34.t	. Laxmanni,	Larmannsgry	Ue268
E. Lo	ocustae.	Heuschr	ecten.	
1.4		•	Naube Peufch	re: 260
Co. Carlo	11 . 4 . 12		. <b></b>	20 <b>9</b> 42 Si

•	Diegipten	der Bride	mgon,	Edi
	+\62	. Sibiricus,	Sibirifche De	
2 .	7 · 1			
	1.64	Miniatus,	Rothflügel .	270
	4 64	Miniatus, Variabilis,	Buntflügel	270
	· + 66	. Salinus,	.Eathbeulchte	đt 27
٠,	<b>†</b> 67	· Fulcus,	Braune Deufe	<b>4</b> t.27
	† 68	. Tibialis,	Zahnschenkel	27
•	<b>4</b> 69	Barabensis,	Barabrifcher	27
\$ 3, " " "	75	. Tibialis, . Barabeniis, . Squarrofus,	Schuppengri	nb 27
223.00	blecht.	Cicada.	Citaden.	274
C. (	Sinaer h	velche nicht hi	ipfen.	
•	₩ 21	a Querula,	Rlager	27
· .	† 21	b. Pralina.	Graficicabe	27
124. Sefi	di. Not	oneda. W	affermanzen	1.275
ارد معجد	A.	Indica.	Indianerin	27
	À 5.	Indica, Atomaria,	Zwergin	27
226. Orfe	hlecht.	Cimex.	Wanzen.	276
, . B.	Schildtra	lger. Das C	Saild to lan	g^.
	als ber	Hinterleih.		
	12	, a. Druraci.	Drurimange	27
•	12	. b. Fabricii,	Zabricia	27
H., 5	langliche.	1	.14	٠ ,
	i' 10	o, a Balteatus	. Güntelwanze	277
X 14 5 1	† 10	o. b. Lanatus,	Bollenwang	277
	Dri	tte Ordnur	ig.	
Lepido	otera.	Schmet	terlinge.	279
			•	
231.98	yirwi. m. 20 a tès	Papilio.	Endnoakt	279
, <b>A.</b>	Attealla	e Ritter. '		
1.34 11.34	19	, a. Hecub <b>a</b> ,	decuba	279
	19	. b. Philenor,	Philenot 19. C.	280
			19. C.	Lucia.

e chieffer und a	rien.	
	· ·	Seite
19. c. Phorbanta,		2X0
19. d. Phorcas,	Rleiner Page	281
A. Breitflügel.		
. 38. a. Pelias,	Bobelschetterlie	tá 28 t
38. b. Amplitrion	,Palbmond:	282
38 c. Hypolitus,	Umboinefer	283
47. a. Meander,	Blauband	282
49. a. Thoas,	Gelbe Flecken	y
A Charles and the second	band 4	284
49. b. Thurnus,	Raiser comette	T,
the state of the s	ling	284
B. Heliconiek.		
72. a. Antiochus,	Untica	285
72. b. Doris,	Doris	286
† 72. c. Sappho,	Wolgaer	286
C. Danai candidi. Weiff	e Rundflügel	_
107. 2. Java,	Batavier	• 287
110. a. Dedalus,	ite Niundslinge	
110. b. Liriope,	Rachtschatten Erauettock	287
110, c. Lucinda,	Crabifiugel	288
119. a. Erippus,	. Bimmerflugel	288 288
rip b. Jairus,	Umbervogel	289
119-t. Pygmaea,	Mudlandifeber	, -09
	Broerg	289
119 d. Odites,	Curinamifche	r -Uy
	Weigling	290
119. č. Salome,	Salome	290
130 a. Acontius,	Chinefer '-	291
D. Nymphales gemmati.	Mit augige	ett
Flügeln.	2000 000	***
14% 2. Doris,	Doris	**
148. b Herse,	Violetvogel	291
148. c. Helione,	Braunflügel	291 2 <b>92</b>
157. a. Jole,	Reujortischet	-7-
	Diftelvogel	292
	, ,	. 1

Megister oft Aron	ungen,	<b></b>
f 162. Junthe,	Sibirifcher P	<b>Č</b> eiti
, ion, juncary	pillon	292
† 163. Phryne,	Milchflugel	293
† 164. Tarpeja,	Rugifche Arg	118294
D.d. Nymphales phalers		
nelten Flügeln ohne	Muaen	**/-
netten Hugett offic	Augen.	
168. a. Progne,	Sarrenbuget	294
† 168. b. Laodice,		294
E. Plebeji rurales. Ba	urenvogel.	· •
255. a. Telemus,	Affelraupensch	ymev
	terling.	296
215. b. Gabriela,	Michage	296
255. c. Telemon,		297
4 255. d. Orion,	Dridn	297
† 255. e. Archiades		297
255.f. Eryx,	Chinesischer	4
Tishanna	Bauer	29%
255. g. Tithonus		161298
E. Plebeji urbiculae. 🦇	Burgervogel.	
† 274. Palaemon,	Palamon	299
† 275. Morpheus,	Morpheus	299
232. Geschlecht. Sphinx. P	failldimänse	201
232. Ottomus. Spinik 4	icula in mine.	301
A. Aechte, mit eckigen Il		
5.4. Lugubris,	Damerungsv	<b>3</b> ,
. , . , . , . , . , . , . , . , . , . ,	gel	301
5. b. Tetrie,	Bierect	30t
A. a. Nechte mit glattem §	lhaelrande.	
24. a. Terfa,	Langlinie.	302
B. Bastarbunruhen.	,	,
	60 . k	
48. Strigilis,	Braunstrich	302
49. Thetis,	Ehetis	303
50. Hylas,	Dylas	303
51. Satellitia,	Srabant	303
72. Helymus,	Schwarzbrau	ne304 Coate
	53.	-UAL-

entrancial terms at	115419	_
		Beite
53. Coarstata,	Ragenschwanz	304
	Medusa	305
† 55. Cruenta,	<b>Elutring</b>	305
Beschlecht. Phalaenae. 9	Rachtvoael.	206
A. Attici. Atlasse.	······································	,
17. a. Tarquinia,	MP 44 M	
17. b. Tarquinia,		306
17. 6. Polyphemus.		
17. or oryphemus	Reguner Man	307
17. d. Russa, 17. c. Macrops,	Grafanas	208 208
	Octoping.	200
B. Bombyces. Spinner.	A	
ad No. 33. Mori,	Geibenpogel	300
C. Noctuae. Eulen, Gla	ttsauger.	
116. a. Allica,	Blaufleck	309
116.b. Deplana,	Sangflügel	309
† 116. c. Pyrausta,	Frühlingseule	310
C.c. Noctuae. Gulen mit	Saugeruffelr	1
und Kammrucken.	• <b>.</b>	•
tor a Tulis	Minfelfchmanz	1.0
193. a. Julia, 193. b. Ilyrias,	Brune Gule	310
193, c. Decera,	Dode.	311
D. Geometrae. Spanne		_
flugel.	aneller & Other	/-
229. a. Syringa,	Achatflügel	312
D. d. Geometrae. Spai	anemeffer mit	į
eckigen Flügeln und b		
Hörnern.		312
236. a. Manto,	Drenedflügel	312
236. b. Hirtaria,	Rauhaŭael	312
236. c. Defoliaria,	Schahfliget	313
236. d. S-maculata,		313
† 236. c. Fulvulata,		313
	~	<b>3-3</b>
G. Tineae. Motten.	500 alfidmiano	
453, a. Nigrella,	weißletzen	314 lierte
	42	

† 40. Samariensis, Samarier

† 41. Leucoptera, Weißflügel 322 † 42. Manticata, Rangeltrager 322

321

+43. Ery-

Geschlechter und	arten.
	Self.
† 43. Erythraea,	Rothe Baftard, weipe 321
† 44. Bidens,	Rufischer Dops peldorn 323
247. Geschlecht. Vespac.	Meinen, 225
29. Orientalis,	Drientalische 325
29. Orientalis, † 30. Galbula,	Glanzwespe 325
† 31. Tricolor,	Drenfarbige 326
148, Geschlecht. Apis. 28	
B. Rauhe Bienen, oder	Hummel.
56. Virginea,	Birginische Pume mel 328
† 57. Fragrans,	Wohlriechende Hummel 328
† 58. Femoralis,	Chentelhum .
d so Diversas	·····
† 59. Plumipes,	Feberhummel 329 Schwertelhume
† 60. lreos,	mel 329
249. Geschlecht, Formica.	Ameisen. 330
19. 4-punctata,	Pierpunct 330
250. Seschl. Mutilla, Ungefli	ügelteBienen.331
† 11. Albeola,	Weiswolle 331
† 12. Sungora,	Rothbrust 331
† 13. Viduata,	Witme 331
† 14. Bicoler,	Silberwolle 332
Sechste Ordni	ing.
Diptera. Zwens	lügelige. 333
<u>-</u>	Bremfen. 333
	Antilopenbohrer333
252. Seschlecht. Tipula.	
† 62. Solstitialis, † 63. Polygama,	Bielmannigere 334
1 03, Full Ballia,	20111111111111111111111111111111111111

Register ber Ordnungen,	
	Seite
253. Weschlecht. Musca. Bliegen.	335
F. Glatte mit Burftenfühlhörner	n.
130. Costata, Geripte	Fliege 335
130. Costata, Geripte 255. Geschlicht. Culex. Much	en. 226
8. Lanio, Desfent	ödter 336
† 9. Caspius, Caspisch	e Muce 336
8. Lanio, Ochsent † 9. Caspius, Caspisch † 10. Hyrcanus, Hyrtani	er 337
258. Sefchlecht Afilus. Raubflieg	en. 338
† 18. Aethiops, Camar	fcpe Raus
ber	338
Siebende Ordnung.	•
Aptera. Ungeflügelte	339
262. Weschlecht. Podura. Pflanzen	lobe, 220
15. Helvola, Enlinde	rfieb 339
266. Weschlecht. Acarus. Milbe	n. 340
36. Vegetans, Haarmi	lbe 340
267. Sefchl. Phalangium. Rrebefpir	inen.24 F
† 10. Bychorge, Giftspin	ne 341
268. Defclecht. Aranea. Spinne	
48. Tigrina, Ligerfpt	nne 342
49. Curacaviensis, Tollmad	her 342
† 50. Tarantula, Rußisch	e Taran:
tul Transport Continue	343
† 51. Specios, Heiligen	
270. Geschlicht. Cancer. Rrebse.	345
1. Krabben.	
B. Mit glattem Ruckenschilde, at	n den
Seiten eingeschnitten.	<u>_</u>
27. 2. Sanguineus, Blutfrak	
C. Mit rauhem, oder stachelichem	Rú=
cfenschilde. 38. a. Sinicus, Chinesisch	he
Krabb	¢ 345
	U. Rrebfe.

ු ගු	schles	hter	und !	Arten	,	es da
	III	. Kt	ebse.	•		Scite
G. Mit	glatt	em N	uckenf	chilbe.	eischer Kr	3 <b>46</b> 8346:
K. Mit	-		-			
	cheere	n ohn	e Fing	er.	-	347
	•			•	tunustr	
L. Mit	Furzei	m Ků	ctensch	ilde, 1	und Si	
ren		gnig s	ger. cialis,	æis	frahæ	347
	83.	<b>a.</b> Cvi	lindrici	19. <b>E</b> 19	inderfre	347 68 344
At-CAI-A	-					•
272. Geschled						
-	T 10.	Cren	eralis, mietne	LKA Perl	uerassel benassel	349 349
	† 18.	Casp	ins.	Caf	pische Af	१५० १६ ३५०
	•.	•	,	J.,	,,,,,,,,	, ,,.
		-4	<b>e</b> =			
(	Sec	bste	Cla	sse.		,
					44	
20	u	ľ	m	e	ţ.	
			nes.			
;	Grí	ie s	rdnui	14.		
Intestina.	-			_	Glied	ما
michilia.			•	Jue v		
•		rasse				353
276. Geschled	jt.	Aſċa	ris.	Spu	lwurm	.353
•	3• ˈ	Trich	iura,	Lang	s <b>fdw</b> anz	353
	4.	Selqui	pedalis	s, Gra	gwurm	354

278. Geschlecht. Fasciola. Bindwurm.354 4. Alpina, Aspenwurm 354 Db 3 Zwey

Register ber Ordnungen,	Celte
Zwente Ordnung.	-
Mollusca. Würmer mit Glieds massen.	355
287. Geschlecht. Ascidia. Geescheiben. 7. Vagabunda, Anotenscheibe	355
297. Geschlecht. Medusa. Quallen. gasernqualle	356 356
298. Geschlecht. Asteria. Seesterne.	356 356
Dritte Ordnung, Testacea. Würmer mit Gehäuser oder Cochylien.	n 357
Erste Abtheilung, Vielschaalige.	
301. Seschlecht. Lepas. Meereichel. ad 13. Diadema, Ballsischpock. 19. a. Palmipes, Plattfuß 19. b. Galeata, Selmpock	357 357 358 358
Zwente Abtheilung.	
3 wenschaalige. 303. Geschlecht. Mya. Klasmuschel. † 32. a. Edentula, Caspische	<b>359</b>
304. Geschlecht. Solen. Scheiben. 38 a Diphos, Imenstrahl	360 360
306. Befchlecht. Cardium. Bergmufchel.	
† 91.2. Trigonoides, Drepecther;	361 361 . Ge

Beschlechter unb	Arten.	Seite
309. Geschlicht. Venus. We	nusmuschel.	
E. Berschiedene.	Rindbetterin	363
150. D. Rugola,	Rungtivenup	363 364
150, c. Tripla, 150, d. Succincta	, Sobifeble	364
rece e Tumidula	. Rugelvenus	364
150. f. Compress	1, Platte Zenns	365
310. @efcl. Spondylus. Laz	atuviiappeii. E Ekraerfianne	.30a 366
	s, xoencesappe Rionmuschol	267
311. Geschlecht. Chama. Q	Afluamuschei.	367 367
167. b. Gryphica	Ungelmuschel	367
313. Geschlecht. Oftrea. Rai	nmmuschel.	368
215. a. Pes lutrae,	Hieclng"	308
314. Geschlicht. Anomia.	Bastarde.	369
242. a. Sandalium		
315. Geschlicht. Mytilus. A	Nießmuschel.	370
262. a. Pholadis,	Rorder Miet muschel	3, 370
262. b. Striatulus	Seftreifte .	370
† 262. c. Polymor-	Rugische	370
pkus, Oritte Abtheilu	44 A	
	9 4	
Einschaalige gen		
318. Geschlecht. Nautilus.	Nautilus.	372
A. Runde, mit Spiralwi	ndungen.	
† 278. a. Complana tus,	- Pianer Rann	11 372
320, Geschlecht. Cypraca, P		373
A. Mit Windungen.		<i>J( )</i>
338. a. Červus,	Pir <b>(c)</b>	373
C. Mit einem Nabel.	Manustus and a	
353. b. Punctata,	~~ (	
322. Geschlecht. Voluta.	Walzen.	374
D. Spindelrunde. 423, a, Filaris,	Umwundenes	
4-31'-1		37 <b>4</b> 3. <b>G</b> ¢
	32	3. G¢

Register ber Ordn. Geschl. und Arten.
<b>S</b> d
323. Geschlecht. Buccinum. Kinkhörner. 37
A. Flaschenartige, oder Schellenschnecken.
442. b. Rugolum, Rungelfinthorn
4,12, c. Cingulatum, Ciehe verige
lit.a.
H. Piramidenformige. 488. a. Monile, Anotenfette
488. h. Gemicum, Zwenfadiges Rin
born 3
488 c. Proxima- Einfábiges Kint- tum, horn
324. Weichl. Strombus. Blugelichneden.3
C. Breitflügelige.
512. a. Minimus, Rleine Gegel
D. Gethurmte.
517. a. Clavus, Reule
325. Gefchl. Murex. Stachelschneden. 31
E. Geschwänzte.
555. a. Succinctus, Rothlinie 558. a. Contrarius, Linte Murer
329. Sefchl. Nerita. Schwimmschnede 3
C Ohne Mahellach und gezähnelt
C. Ohne Nabelloch und gezähnelt. 739. a. Lactaria, Milchnerite
Vierte Abtheilung.
Einschaalige ungewundene
331. Geschlecht. Patella. Klippfleber 3
C. Mit spikigen gekrummtem Wirbel. 769. a. Noachina, Meachspatelle 769. b. Miliaris, Zwerypatelle
769. a. Noachina, Reachspatelle
Fünfte Ordnung.
Zoophyta. Thierpflanzen. 3
345. Befchlecht. Tubularia, Geefocher. 3
† 8. a. Caspia, Caspische Rocher
coralle Coralle
348. Geschlecht. Vorticella. Seegallert. 3
14. a. Bolteni, Bollenifche

Suppl: Band . T. I.



Digitized by Google

.J. 2,

Digitized by Google

Suppl: Band. Tab. 11.





Suppl: Band. Tab. III.





## Register

über samtliche seche Theile

des

## Linneischen Thierreichs.

NB. Die römische Zabl zeiget ben Theil, die deutsche die Seite, und der Buchstabe S. den Suplementsband. Ben dem fünften und sechsten Theile, welche jeder aus zween Banden bestehen, hat man das Nachschlagen dadurch zu erleichtern gesucht, daß jeder zwente Band mit V2 ver VI2 bemerkt worden. Weil auch mehr rere Thiere verschiedener Art, einerlen Bennamen führen; so bat man, wo es der Raum verstattete, auch das Geschlecht hinzugesetz, und solchergestalt () eine geschlossen; welches man auch ben den verschiedenen Sprachen beobachtet hat.

N.	L pa
Aakster, (bolland.) Elfter -	Theil, Seite
Mal, gemeiner, Muraena Anguilla	- 1V. 38
Male, Muraenae.	- IV. 31
Maleidechse, Lacerta anguina.	III. 120
Malgrundel, Gobius anguillaris -	IV. 132
Malmurmel, Mormyrus Anguilloides.	IV. 362
Malmutter, (Roufifch,) Blennius viviparus	IV. 106
Aalput , (Aalquap.) Malmutter.	IV. 106
Malruppe, Trusche, Gadus lota	IV. 96
Malschlange, Anguis. — III	l. 209. S. 193
caapiche, Anguis miliaris	S. 193
gesticte, Anguis Meleagris.	III. 211
Malwels, Silurus anguillaris	IV. 294
A	Aab,

a war and	Tb.	€.
Aap, (boll.) Affe	ĺ.	118
Aard - toren , (holl.) Erbfafer -	V.	352
Aard - vlooyen, (holl) Erdflohe -	V.	385
Massiege, Musca cadaverina —	V2.	
Abana, (javan.) Rafenhorn -		469
Abborre, Abora, (schweb) Barfching -	IV.	
A. B. C. Toot, (boll.) Tieger, (Tute) -	VI.	
Abdominales, Bauchstoffer - IV. 281		
Abeia, (span.) Biene	V2.	
Abeille, (fr.) Biene	V2.	
Abeille coupeuse, (fr.) Lappenbiene	V2.	
Abeilles masonnes, (fr.) Mauerbienen -		
Abendes majonnes (11.) Authetokenen  Abendlander, (Affelwurm) Scolopendra occide	<b>V</b> .	240
	n- V2. t	.60
Mbenblanber, (Rachtschmetterl.) Phalaena occidu	V 20 1	100
Abendlander, (ungeflügelte Biene) Mutilla oceide	<b>z</b> y.	055
talic - Tatalitia occide	V2.	A. 0
Mbenblander, (Biebbreme) Tabanus occidentalis	V 2.	710 206
Abendling, (Rachtschmetterl.) Phalaena vespertari	- <b>3</b> 7	yo"
Abendfrosch, Rana vespertina -		
Abendrothe, (leuchtender Rafer) Lampyris languin	<b>6</b> .	181
Of what when Enhance we Continue	CAV.	305
Abendthierchen, Ephemera volpertina	V2.	779
Abies, (Gorgonia) Seechpresse -	V12.	755
Ablette, (fr.) Restling (Karpfe) -	IV.	
	<b>V2</b> . 1	013
Abtrunniger, (Raupentoder) Ichneumon priero		
gator -	V2.	
Abucatuja, (braf) Meerhahn (Spiegelfisch)	IV.	
Acanthias, (Squalus) Dornhaan -	III.	253
Acanthion, (griech.) Igel	1.	304
Acanthopterygii, Spik ober Stachelfioffen	IV.	3
Acara, (braf.) Zahnbrachsem	IV.	190
Acaroides, (Phalangium) Milbenspinne	72. 10	062
Acarus, Milbe	V2. 10	044
- acgyptius, egiptische Milbe	- 1	045
americanus, Waldmilbe	<b>— 1</b> 0	046
- aquaticus, rothe Waffermilbe	_ 1	053
baccarum, Johanniebeermilbe		054
coleoptratorum, Rafermilbe -		055
coleoptratus, Rafermilbe -		049
	Acar	• •

Acar	us	Achatporze	llane '	3
Jan Brand			21	). S.
Acarus croceus,	Safranmil	be	V2.	1018
dysenter			-	1050
elephanti	nus, Elefa	ntenmilbe	-	1044
exulceran			,	1051
fungorun	1, Schwan	mmilbe		1057
- geniculat	us, Anoten	fuß -	-	1053
gymnopt	erorum, L	ienenmilbe	, -	1055
holoserice			-	1053
indus, in		ilbe -	-	1045
lactis, D		- ,	-	1050
littoralis,	Ufermilbe	-	-	1056
- littoralis, - longicorn	is, Langbo	rn -	-	1056
motatorii	is, Kühlerf	ug -	-	1048
- muscarun	1, Fliegenn	nilbe -	_	1054
passerinu	s. Sperling	milbe -	-	1048
reduvius,	hundsmil	be -	1,1 -	1045
ricinus,		_	-	1047
	Cteinmilb.	e -	1	1056
falicis,	Beidenmilbe	_	-	1017
fanguifug	us, Blutsai	iger -	-	1046
scaber,	ranhe Milbe	-	-	1057
telarius,		-	-	1049
tinctorius			1.10 70	1053
tremella	, Gallerin	ilbe –	-	1057
- vegetans			S.	340
vespertili		ermausmilbe	V2.	1047
Acasta, (Papilio)			V.	589
Accipiter fringill		enhabicht	II.	
Accipitres, Sal		_	II. 46. (	
Aceste, (Papilio			V.	
Acetabulum, (T	ubularia) N	labelfocher		818
Achalalactli, (ind.	.) Krageneis	svogel -	· II.	241
Achar, (hebr.) &	ausmaus	-	I.	349
Achatbien, (Ctad	relichnecte)	Murex Iul	ipa; VI	517
Achatdattel, (Dliv		-	- VI	419
Achatflügel, (Mac	ofometterlin	ig) Phalaena	meti-	600
Achatflugel, (Rac		Dhalaana S		689
Achaiporjellane,	Cypres am	ethy flee	Tinga W	312
and and a Betratte)	Clbres all	A 2	_ V I	. 392 Uchati
THE PERSON NAMED IN			•	

À	Achattute		Acris		
				Th.	
Achattute, (C	Schildfrotentute	<b>)</b>	<b>-</b>	VI.	374
Achėlos, (g:	riech.) Aaleided	bfe	-	III.	121
Achetae, (Gr	rylli,) Grillen m	it zwoSch <b>n</b>	anzbürfter	ı V.	422
Achilles, (Pa	apilio) großer 🤉	Argus	_	V.	578
Achivi, (Eq	uites) griechisch	e Ritter	-	V.	57I
Achrah, (ar	ab.) Scorpion	_	,	V2. 1	088
Achschubh,	(bebr ) Bipper	, (Ratter)	•	III.	153
Matanaencor	alle, Madrep	ora oculata		VI2	704
Matthern. (6	Spinne) Aranes	fpinosa	<b>-</b>	V2. 1	087
Notect, (Ku	gelthierchen,) V	olvox bica	udata	VI2.	911
Achtfuß, (Bl	ladfisch) Saepis	i octopodia		VI.	113
Nchtaurtelige	er Armadia, Da	(ypus octoc	inctus	€.	
Achtpunkt, (?	Tagschmetterl.)	Papilio En	celadus	V.	596
Achtpunktesp	inne, Aranea o	Etopunétata	_	V2. 1	972
Achtichnirfel,	Helyx octor	12		VI.	579
Achtzebnaurt	eliger ArmadiA,	Dalypus	octodecin	n-	•••
	cinctus	-	-	G.	24
Achtrebnounf	t, (Sonnentafe	r) Coccine	lla offod	e-	
•	cimpunctata	_	-	′ <b>V.</b>	151
Achtzehntrop	f (Connentafer	) Coccinella	a octodec	im-	
. , , , ,	guttata	_	-	V.	159
Acipenser,	Stor	-	III. 286	s. S.	194
fte	ellatus, Stern	stor .	,	S.	194
Acterflügel, (	(Springfafer)	Elater pore	catus	V.	319
Ackerhoen,	(fcweb.) grun	er Regenpfe	ifet 🔻	II.	419
Ackerhóena,	, (schwed ) Feli	dhuhn	<u>-</u>	II.	488
Ucterlerche,	Alauda arveni	is	-	II.	517
Actermann, (	Raupentdber) la	chneumon à	gricolato	r. V2.	857
Actermaus,	Mus agrarius	-	•	<b>G</b> .	
Acterschnecke,	, Limax agre	ftis	-		65
Ackermetbel,	(Maultvurfgri	ae) (	- ′	_,V.	422
Acterwespe,	Velpa arvenii	\$	<b>~</b>	V2.	
Acoho, Ph	afan	-	<b>-</b> .		423
Acontia, P	eitschschlange		-	III.	<b>201</b>
Acontias, (g	riech.   Schies	d)lange	•	III.	175
Acontius, (F	Papilio) Chine	let	•	€.	291
Acredula,	florentinische Le Grylli) Spißtö	raje	-	11.	520
Acridae, (C	irylli) Spikto	pre	-		417
Acris, (grie	d') henichteg	ť	-	V.	437

Actaeon	<b>01</b> .	_5
Attacon, (Scarabacus) fliegender Stier -	26. V.	<b>5</b> .
Actinia, Geeneffel - '	VI.	
- effoeta, Seeblume	VI.	_
- equina, Felfenneffel -	VI.	
felina, Kronennessel -	ŲΙ.	
- judaica, Meersteb -		89
- Cenilis, Austernessel -	VI.	
Actorion, (Papilio) Salbschwanz -		63 I
Acucella, (ital.) Meernadelhecht -	IV.	
Acus, Meernadelhecht -	IV.	341
Acus, (Syngnathus) Spignadel -	III.	341
Abamadoublet, Ostrea gibba -	VI.	319
Adder, (boll.) Ratter, (Otter)	щ	154
Abebar, (nieberfachf.) Storch, -	111	375
Adella, (ital.) Sterletftor -	IV.	29I
Adelvisch, Aeste	II.	299
Aden, (port.) Ente Aberlasser, (Mutigel) Hirudo medicinalis	VI.	40
Abermuschel, \ enus Meroë	VI.	
Aderpunkt, (Rachtschmetterl.) Phalaena leporina	V.	685
Mberschraube, Mondschnecke) Turbo variegatus	VI.	558
Aberstrich, (Tagschmetterl.) Papilio Niavius	V.	595
Adipe, (Papilio) Fleckenreibe -		620
Abler, (Bohrkafer) Ptinus imperialis -		112
- gemeiner, Falco fulvus -	11.	
fcmarzer, Falco melanetus -	II.	
on Oronoto -	11.	
Ablersteine -	II.	
Admirable, the (engl.) Scheckflugel -		gir
Abmiral, (Bockfafer) Cerambyx Ammiralis	V.	259
Momiral (Eute) Conus Ammiralis -	VI.	370
— gemeiner	V 1.	370
- westindischer - Charles Adapidis	VI.	371 226
Abonishahnchen, Chrysomela Adonidis		
Abonisschild, (Schildlaus) Coccus Adonidum		5 <b>29</b> 63 <b>5</b>
chte Pfeilschwänze mit eckigen Flügeln - mit glattem Flügelrande		637
mit rauhem After (Unruhen)		643
schie Benus, Venus Dione		264
B 2		chtes.

		Tb.	6.
ächtes Strickboublet Venus literata	-	VI.	277
Aedea, (Papilio) Paradiesschmetterling			586
Aedilis, (Cerambyx) Chreiner	-		266
Aedoon, (griech.) Rachtigal -	•		602
Meffer, (Raupentober) ichneumon affect	ator	$V_2$ .	
Aegeria, (Papilio) bunter Argus	-		603
Aegistus, (Papilio) Grunfprentel	-	V٠	580
Aclg, (fcmeb.) Elenbthier	• '		38 E
Melster, Corvus Pica -		II.	179
Aeneas, (Papilio) Grunfled	-		570
Nepfelschaler, (Machtschmett.) Phalaena G	ielatell <b>a</b>	V.	735
Mepfelschaler, (Rufelfafer) Curculio por	morum	V.	228
Aerla, (fcmeb.) weiffe Bachftelze	-		607
Aerone, (Airone) (ital.) grauer Reiher			<b>379</b>
Aeropus, (Papilio) Einauge	-		199
Aesalon, Sperber -		II.	_
Nesche, Salmo Thymallus	-	IV.	
- mit faft unsichtbaren Babnen. Cor	egonus	IV.	
— — schwedische, Salmo Vimba	<b>-</b> ′ .	IV.	
Mefculaphabnchen, Chrysomela Asclepiad	2 -		225
Mesculapschlange, Coluber Aesculapii	-		177
Methiop, (Scorpion) Scorpio Maurus		V2. 1	
Aethiops, (Alilus,) Samarifcher Rauber			338
Afdelles, Meerjunter, (Liprfifch)	• ,	IV.	
Afer, afritanischer Colibri	• _		264
Affe, Simia -	I. 1	18, 🤇	
- angolischer, Macaquo,	-		127
- großer rother, Simia Patas		€.	7
- furggeschwanzter, (Bavian) -		21.	
- langgeschwangter, (Meertage)	l. r	23. 6	
- nickenber, Simia nictitans -	-		232
- ungeschwänzter -			118
Affectator, (Ichneumon) Aeffer	-	V2.	
Affen, Geschichte von ihnen			138
Uffennafe, (Matter) Coluber Fimus		III.	
Affenstein, eine Seltenheit	Ge	Va	145
Afrikaner, (Bastarbwespe) Sphex Capen		V2.	
Afrifaner, (Dungtafer) Hister major	_	v	115 443
Afritaner, (Grashupfer) Gryllus obseur	J\$	Merit	445

Afrikaner	<b>Alan</b>	7	
		Th. S.	
(frikaner, (Dummel) Apis tropica	-	V2. 906	
lfrifaner (Jungfer) Libellula capenlis		V2. 772	
lfrikaner, (Rackerlack) Blatta africana		V. 404	
lfrifaner, (Råfer) Scarabaeus Capensi	S	V. 87	
sfrikaner, (Käfer) Scarabaeus Mauru	s -	V. 67	
Ifrifaner, (Meelfafer) Tenebrio barb	arus	V. 370	
Afrikaner, (Rüßelkäfer) Curculio Cap	enlis	V. 240	
Ufrikaner, (Schweber) Bombylius Ca	penlis	V2. 1008	
Ufrikaner, (Scorpion) Scorpio Afer		V2. 1091	
Ufcikaner, (ungeflügelte Biene) Mutill		V2, 920	
Afrikaner, (Biehbreme) Tabanus mau	ritanus	V2. 984	
Ufrikaner, (Wanze) Cimex meurus		V. 479	
Ufterauge, (Lagschmetterl.) Papilio Bo	eticus	V. 624	
Afterbacken, (Bleischschen)	-	VI. 481	
Afterholzböcke, (Bastardholzböcke) 🔌	-	V. 292	
Afterjungfer, (Stinffliege) Haemerobi	us Phalae		
noides -		V2. 794	
Afterfriecher, (Bremfe) Oestrus haemo	rhoidalis	V2. 927	
Aftermade, Afearis vermicularis	-	VI. 35	
Afterraupentoder, (Baftardwespen)	•	V2. 863	
Afterrugeltafer, (Baftardrugeltafer)	-	V. 243	
Aftersturmhaube, Buccinum mutabile	-	VL 459	
Agaate Peer, (boll.) Achatbirn	-	VL 517	
Agamemnon, (Papilio) Mondauge	_	V. 572	
Agenor, (Papilio) Breitstreif	-	V. 570	
Aglaja, (Papilio) Biolenvogel	-	V. 620	
Agneau, (fr.) Lamm -		1, 421	
Agnello, (Agno) (ital.) Lanm	-	I. 421	
Agnus, Lamm —	-	I, 421	
Agret-toren, (holl.) Stinftafer	-	V. 332	
Agricola, Relbfafer -		V. 79	
Agricolator, (Ichneumon) Adermann		V2. 857	
Agrotto, Aropfgans -		II. 324	,
Agtdraay, (boll.) Achtschnirkel	•	VL 579	
Ahaetula, Peitschschlange	-	III. 200	
Abornsauger, Chermes Aceris	-	V. 525	
Ahu, (perf.) Reb, Dirichbod	- 1.	401. 414	
Ai, (amerif.) Faulthier	-	L 179	
Aiah, (hebr.) Geier -		II. 48	

Albatros	Alchata	9.
Arra Arraya	9	Th. G.
Albatros, Penguin		II. 321
Alberteola, Losser	•	II. 361
Albifrons, (Gymnolus) Weikstirn	-	IV. 48
Albifrons, (Musca) Weisstirn	•	V2. 968
Albora, (venet.) Rothschuppe	•	IV. 184
Albula, (Mugil.) Weißling -	•	IV. 353
Albula, (Salmo,) Weißfisch		IV. 326
Albumen, (Nerita) geschobener Gie	rdotter	VI. 587
Alburnus, Weißbarsch -		IV. 229
Alca, Papagentaucher -	II. 308.	<b>S</b> . 104
- aretica, Ceepapagen -	•	II. 311
- cirrata, Manenpapagen	• '	S. 104
- cristata, Seckakatu -	• •	<b>E</b> . 104
- impennis, nordischer Penguin	•	II. 310
- plittacula, Geeparfit -	•	<b>E.</b> 104
- tetracula, vierfarbiger Papagen		G. 105
Alcedo, Eisvogel -	• II. 236	s. G. 93
aurea, Goldvogel -		©. 94
Capenlis, Caapicher Eisvoge		II, 241
criftata, Oftindischer Eisvog		II. 237
erithaca, bengalifcher Eisve	gel -	II. 239
galbula, Keilschwang	•.	Il. 244
galerita, Saubeneievogel	•	G. 94
inda, westindischer Gievoge	[ -	II. 237
ifpida, europaticher Etevog		II. 237
leucocephala, Weißtopf	. •	S. 94
Madagalearienlis, Madage	estarifcher Eis	34
vogel -	•	II, 239
paradisea, Paradiesvogel	•	11, 244
rubra, rother Eisvogel	•	<b>E</b> . 93
rudis, bunter Eisvogel	-	II. 243
Senegallensis, Genegallisch	er Eispogel	II. 242
Smyrnenfis, Emprnischer		ll. 242
fuperciliofa, gruner ameritan		I II. 239
torquata, Rrageneisvogel		II. 241
- tridactyla, brenfingeriger	Eisvogel	S. 93
Alces, (Cervus) Elend -	•	I, 381
Alceus, (Scarabaeus) Riefentafer		V. 54
Alchata, (Tetrao) pprendisches Das	felbuhn II.	
A s		(Ichnmiß

	Tb.	€.
Alchimist, (Rachtschmett.) Phalaena Alchemillata	V.	716
Alcyon, Eisvogel	, IL	236
Alcyonium, Sectort -	VI2.	773
- agaricum, Korkniere -	VI2.	777
- alburnum, Seesplint -	VI2.	782
— arboreum, Korfbaum -	Vl2.	
- asbestinum, Asbestfort -	VI2.	
- aurantium, Seepomerange	VI2.	
- cotoneum, Baumwellenball	VI2.	786
cydonium, Seeball .	VI2.	
- digitatum, Mannshand -	VI2.	779
- epipetrum, Feberfort -	Vl2.	776
- gelatinosum, Geegallert -	Vl2.	788
- Iobatum, Lappenalcyonium	VI2.	
_ Lyncurium, Seepomerange	VI2.	
- mammillatum, Korfwarze -	VI2.	781
- Schlosseri, Fletschforf -	VI2.	782
- fpongissum, Kerkschwamm	VI2.	<b>78</b> 0
Alebrenne, (fr.) Fenersalamander -	III.	118
Alecto, (Sphinx,) Graufügel -	V.	641
Alector, (Crax,) Guajanischer Pauwi -		465
Alector, (griech.) Paushahn -		469
Alegon, (Alcedo,) Saubeneisvogel -		240
Algazel, (arab.) Gajelle -	I.	412
Algierer, (Ameise) Formica barbara -	V2.	912
Algierer, (Cibechie) Lacerta Algira -	III.	93
Algierer, (Mantafer) Meloë Algiricus	V.	383
Algierer, (Rußelkafer) Curculio Algirus	V.	225
Algierer, (Schnirkelichnecke) Helix barbara	VI.	579
Alidras, (Coluber) Beigling		160
Aliekruiken, (boll.) Stranbmondichnede	VI.	, .
Alimena, (Papilio) Blauband -		612
Alf, (Papagentaucher) Alca torda -		308
Alle, (Alca,) gronlandische Seetaube -		312
Alles mas sich beweget, lebet nach feiner Art	111.	
Almana, (Papilio) dinesischer Pfau -		600
Alocharello, (ital.) Baumeule -	11,	
Alodetta, (Alodola) (ital.) Lerche	II.	. 517
•	Alc	pex,

Alopex	Ameife	1	11
		Th.	€.
Alopex, (Canis) Kelbfuchs	<b>-</b> .		277
Alopex, (griech.) Fuchs		ı.	224
Alosa, Alese, (Clupea) Alse		IV.	
Alouette, (fr.) Lerche	-		517
- des bois, (fr.) Baumlerche	<del></del> .		519
- des champs, Kelblerche			519
- des prez, Biefenlerche	` —	11.	518
- hupee, Saubenlerche	_	11.	520
Alpenwurm, (Bindwurm) Fasciola a	lpina	S.	354
Alphenaar, (boll.) Reftling, (Fifch)		ÍV.	
Alphestes, (griech.) Steinfisch	, <b>-</b> · ·	IV.	
Alse, (Dering) Clupea Alosa		IV.	
Altavela, (ital.) zwenpfeiliger Fisch		III.	248
alte Saube, Patella antiquata	-	VI.	611
Alter der Kische		IV.	
Altes Beib, Venus Paphia	_	VI.	265
Altise bedaude, (fr.) Gartenbupfer		V.	181
Altise du choux, Bilfenfresser	-		181
Altrap, Bergboble -		II.	180
Altvater, (Baftardrugelfafer) Attela	bus senex	S.	234
Altvater, (Meerfage) Simia veter		J.	124
Altvater, (Tagschmetterl.) Papilio N	lestor.	V.	578
Alt Weib, (Fliege) Musca anilis		V2.	955
Alt Weib, (hornfisch) Balistes vetul		III.	300
Aluco, (Murex) Bastard Pabstfron	e –	VI.	522
Aluco, (Strix) Nachteule		11.	102
Alwargrin, (fcmed.) gruner Regent		11.	419
Amaranthus, (Madrepora) Secamo		VI2.	682
— — - saxeus, Seeamaranth		VI2.	702
Amathea, (Papilio) Spreckelflugel	<b></b>	٧.	611
Amazon, (Ammer) Emberiza Amazo		11.	566
Amazon, bunter, (Papagen) Psittacu		II.	144
Amazon, (Rafer) Scarabaeus Amazo		.V.	74
Amboineser, (Philander) Didelphis in			35
Amboineser, (Tagschmetterl.) Papilio	nypolitus		283
Ambre gris fount von Rachelot	_	Į.	500
Ameira, (braf.) Marmeleidechse		III.	92
Ameise, Formica —	V2. 908		330 oile
		3N 191	0110

12	Ameise 26	Ammer	•	
7 17		3-	Th.	
Um	eise, braune, Formica fusca		V2,	913
-	- graue, Formica obsoleta	· <del></del>	V2.	913
	- große rothe, Formica rufa	_	V2.	912
-	- fleine rothe, Formica rubra	<b>—</b> .	V2.	913
	- schwarze, Formica atrata		V2.	915
	- schwarze, Formica nigra		V2.	913
Am	eisenbar, Myrmecophaga	-	J.	18Q
-	- brevfingeriger, Myrme	cophaga tri-		_
	dactyla	-		181
	- langhaariger, Myrmeco			
-	- vierzehiger, Myrmecophi			183
-	- zwenfingeriger, Myrme	cophaga di	-	
	da&tyla	*		180
Am	ieisenlowe, (Bastarbjungker) My	rmeleon for	-	
	micarum	٠	V2.	799
An	leisenluchs, (Bastardjungser) My	rmeleon for		
	mica - lynx	_	V2.	800
Am	eisennatter, Coluber Cenchoa		III.	206
	erikanse Kousdoublette, (hou.)	Golomufchel	VI.	269
	erifaner, (Erbfafer) Carabus Ar			360
Qín	ieritaner, (Goldhahnchen) Chrys	omela occide	n-	
**	talis —	F	V.	168
	ieritaner, (Jungfer) Libellula Ai		V2.	771
	ierifaner, (Kackerlack) Blatta An		V.	403
An	ieritaner, (Råfer) Scarabacus k	ınius	V.	88
An	ierifaner, (Krammetsvogel) Turdi	ıs Americanu	s G.	140
Un	teritaner, (Rrebs) Cancer carcin	ius	V2.	1124
	terifaner, (Schlupfwespe) Tenth			
4.	cana —		V2.	824
Au	nerifaner, (Ecorpion) Scorpio A	mericanus	V2.	
An	nerifaner, (Biebbreme) Tabanus	fervens		986
An	terifaner, (Bielfuß) Julus maxin	nus	V2.	1165
An	nia, Wallerfisch -			285
	- calva, Moderfisch	-	_	, 287
	- (Scamber) Etreitthunfisch	-	IV.	266
	sinthe, (fr.) Rupferbruft	-	V.	769
	amer, Emberiza -	11. 560	. G.	155
	- afrifanische, Emberiza Ori		<b>1</b> I.	964
-	- aflatische, Emberiza familia	ıris	II.	566
	The state of the s	•	Min	mer

Ammer	Amphis	13
		Li. G.
Ammer, bunte, Emberiza principal	is —	11. 570
- caapfche, Emberiza Capenli	is —	II. 565
geflecte, Emberiza Cirius	-	II. 566
- graue, Emberiza miliaria		II. 562
— — indianische, Emberiza Que		II. 564
— — louistanische, Emberiza Luc	do <b>vicea</b>	II. 565
Ammiralis, (Cerambyx) Admiral	-	V. 259
Ammiralis, (Conus) Admiral	-	VL 370
Ammodytes, Schmelte	-	IV. 56
- (Coluber) Sandfriechen	r. —	III. 157
— — Tobiznus, Sandaal		IV. 56
Ammon, (Capra) fibirifche Biege	-	I. 416
Ammonshornlein, Helix complanat	.2	VI. 555
Ammonshorn, Nautilus Beccarii		VI. 357
Amourette, (fr.) Wollfrautfreffer	\ <u> </u>	V. 120
Ampelis, Seidenschwang	_	IÌ. 540
- Cajana, Cajennischer Geibe		II 542
cotinga, Prafilianifcher Ce	idenschwanz	II. 142
- maculata, Kunfect	<del></del>	S. 147
- Majana, Majanischer	-	II. 542
Pompadura, Pompadour	/	11. 541
- terfa, bunter Seitenschwan	<b>.</b> –	IL 543
Ampelis, Bachter, (Reuntober)		II. 113
Ampherfauger, (Rugeltafer) Curcu	lio rumicis	V. 232
Amphibia reptilia, friechende Imp	hidien 111. 13	). <b>©</b> . 183
Amphibien, Animalia Amphibia		III. r
- allgemeine Eigenschaften t	declerden	III. 4
- gebende, meantes	_	<b>6.</b> 196
- friechenbe, reptiles,	-	III. 13
- fcleichende, serpentes,		III. 122
- schwimmende, nantes,		III. 227
- find in dren Ordnungen v	errbener	111. 8
- was sie sind?		111. 6¢
Amphibienschnecke, Helix putris	aana Bratint-	VI. 581
Amphibium, (Rachtschmetterl.) Phal	ache filelioes	V. 612
Amphinome, (Papilio) Blauwolfe	· —	III. 221
Amphisbæna, Ringelschlange	-	III. 223
alba, Weißringel fuliginosa, Rusting		III. 222
variontared amornia		Amphi-

		Th. S.
Amphi-Silon, Mefferfifch	-	III. 336
Amphitrion, (Papilio,) Salbmond	_	S. 282
Ampluftre, (Bulla,) rothes Band	-	VI. 410
Ampulla, (Bulla,) Riebitsen	-	VI. 408
Amfel, Turdus Atricapilla	_	. II, 135
Amfellerche, Alauda Calandrotte	-	<b>5.</b> 137
Amufium, Compasiunichel	-	VI. 305
Anacandia, (ceplon.) Konigefchlange		III. 147
Anade, (span.) Ente -		ll. 29 <b>9</b>
Angethetus, Kischervogel	_ ′	II. 331
Ungfardienweikling, (Tagfchm.) Papille	o Anacard	ii V. 587
Ananas, (Madrepora,) Secananas	'	A15. 682
Anaphah, (hebr.) Doble	_	II. 174
Anarhigas, Geewolf -		IV. 54
Anas, Ente	II. 27	5. <b>6</b> . 101
- acuta, Pfeilschmanz	-	IL 295
- adunca, Rrummschnabel		II. 300
aegyptiaca, egyptische Gans		II. 284
- albenla, Weißling	_	II. 290
- arborea, Baumente		II. 301
- autumnalis, herbsteute	-	II. 298
— — Bahamenus, Bahanninge Ente		II. 289
bernicla, Ringelgans		1I. 285
- borealis, nordische Gans	-	<b>S</b> . 101
- Bucephala, Dictopy		II, 292.
- rampestris, Trapgans	•	II. 444
- Canadenlis, Candonale Gans	_	II. 286
Casarca, astratanisme Ente	-	<b>©</b> . 101
- Circia, Commerhalbente	-	II. 297
clangula, Quaderente		IL 292
clypeata, Loffelente		II. 290
- coerulescens, blaue Gans		II. 285
- crecca, Rriechente		II. 297
- cristata, Saubenente	-	IL 301
- discors, bunte Ente	_	II. 298
Dominica, Domingische Ente	Banks 1	II. 292 II. 284
- erythropa, Rothfuggans	-	II. 287
— — farnensis, Eiderente		IL 296
— — ferina, Rothhals	_	Anas,

Anas	Angel	15	,
		£6. €.	
Anas fuligula, europdische Saubene	nte	_ II. 302	
- fusca, wilde braune Ente		II. 281	
- galericulata, Feberfappe		II. 300	,
- Gambensis, gambischer Schr	оп —	II. 279	
glacialis, Eisente	****	II, 296	
- histrionica, Eragenente		II. 297	
- hyemalis, Winterente	-	II. 295	
marila, Bergente	-	II. 281	
- mersa, Ruberente		<b>6.</b> 102	•′
- minuta, 3mergente		11. 298	
mollistima, Gibergans		II. 287	•
- moschata, Bisamente	<u> </u>	11. 288	
nigra, fcmarje Ente	•	II. 281	•
penelops, Pfeifente	-	11. 294	,
- perspicillata, Brillente	-	II. 293	
querquedula, Winterhalbente	t —	II. 296	
rufina, einfame Ente		G. 102	
- rustica, graue Salbente		II. 293	
spectabilis, bunte Ente		11. 280	
sponsa, die Braut		11. 301	
Stelleri, Stellersente		©. 102	
strepora, Schnatterente	-	ll. 291	
tadorna, Brandgans	-	II. 279	
viduata, Witme	-	11. 298	,
Anastatica, Jerichorosenpolppe		VI2. 868	
Anastomasis, (Phalaena) Wirrband		V. 668	
Anatarius, Kischadler	_	II. 87	
Anatre, (Anitra,) (ital.) Ente		II. 299	
Anapachoras behauptet, daß die Thier	e Berstand he	ben I. 3	
Ancaea, (Papilio) Mohrenflügel	_	V. 614	
Anchises, (Papilio) Pfeilritter		V. 569	•
Anchorago, (Curculio) Langbrust		V. 231	
Ancilla, (Phalaena) Ranmerjungfer		V. 682	
Anderer, (Rachtschmetterl) Phalaer			
Anderthalbauge, (Tagschmett.) Papi	lio electra	V. 593	
Ane, (ft.) Esel —		- I. 453	
Anflugmotte, (Rachtschmetterl.) Phalac	ena Turione		
Ange, (fr.) Meerengel, (Daapfifch)	-	111. 257	
Angelfich, (engl.) Meerengel	~	III. 257	
•		Angelick	
٠			
		~ · ·	
•	. Dig	tized by Google	

Σb. €.
Angeliefhoef, (Bastarbbod) Necidalis podagrariae V. 295
Angelmuschel, Chama gryphica - 5. 367
Angrajen, (Lanius) schwarzer Reuntober & 72
Anguella, (venet.) Kornabrenfisch - IV. 350
Anguilla, gemeiner Mal - IV. 38
Anguille, (fr.) Hal - IV. 38. 56
Anguille de Haye, (fr.) Ringesnatter - III, 180
Anguilloides, (Mormyrus) Malmurmel IV. 362
Anguis, Aalschlange - III. 209. S. 193
— — Colubrina, Ratterdal — II. 212
— fragilis, Bruchschlange — 111. 218
- laticauda, Breitschwang - III. 217
lumbricalis, Wurmschlange - Ill. 215
- maculata, Fleckentrager - III, 213
— miliaris, caarsche Aalschlange - S. 193
- reticulata, Resschlange - III. 213
- ventralis, Dickbauch - III. 216
- ventralis, Kurzbauch - Ill. 219
Angusicula, (ital.) Meernadel (hecht) - IV. 34t
Anhang, (Machtschmett.) Phalaena succenturiata V. 719
Anhima, (bras.) eine Urt Kraniche - II. 365
Anhinga, (Plotus) Schlangentopf - 11. 333
Ani, (braf.) Mabenfresser - 11. 165
Anima sensativa wird ben Thieren zugeschrieben I. 3
Anisocalyx, Kederforalline - Viz. 839
Anka, (poln.) Ente – 11, 299
Unmertung, anatomische, von bem Burme bes euro
paischen Rashorntafers - V. 59
Anmerkung, anatomifche, von den Lagthierchen V2. 77?
Anmertung über die Stein und Thierpflangen Vl2. 931
Annulus, (Cypraea) blaue Taurts - VI. 309
Anomia, Bastard — VI. 317. S. 369
- angulata, Reil - VI. 324
- aurita, Ohrmuschel - VI. 321
- Biloba, Bilobit VI. 325
— Cepa, Zwiebelschale — VI. 319
- craniolaris, Lodentopfchen - VI. 318
- crispa, Rrause - VI. 323
- electrica, Bernsteinauster - VI. 320
- farcta, Ruß - VI. 323 Anomia,
Willound

Anomie	Antilope	<u>i</u> 7
August trauser augusik		Th. E.
Anomia historica, Spsterit		VI. 325
— lacunosa, Kurche	· · ·	VI. 323
— patelliforinis, Kappè		VI. 320
— pedinata, Kanus		Vk 318
- placenta, Transparent	نجت	VI 325
- plicatella; Falte	<b>-</b>	VI 322
— — pubescens, Haarimschel	•	VI. 323
- reticularis, Sohlbedel	- ;	VI. 322
retula, Ctumpfmufchel	2	VI. 321
scobinata, Bobrmuschel	•	VI: 321
Spiriosa, ftacheliche Anom	iè -	V: 326
squamula, Schuppe	<b>.</b>	VI: 320
ftriatula, Striffcole	÷	VI. 322
truncata, Stumpfichlof	<b>.</b>	VL 322
Anser, Gans		H: 282
Ameres, Schwimmvogel	- II. 273	e tot
Ansjobis, Argentina spyrocus	<u>•</u> :	IV. 347
Ansjovis, (holl.) Sarbelle	<b>≟</b> 120 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	IV: 373
Ansjovis - mother, (engl.) Baftar	omatrele	IV: 264
Ant; (engl.) Ameife	,	V2: 9ô8
Ant-bear; (engl.) Anteifenbar	÷	Li igo
Antehnina, Bornerforalline	رية بالسام الأنفاطية المنف	VI2. 843
Anthelopa, (Antilopa) afrifanif.	Profession I. 376	412.414
Anthias, (Labrus) Rothling	• بنشيخ	IV. 197
Anthribe des fleurs, (fr.) Flohfa	terchen	V. 108
Anthus, Grunfink	• ,	14 554
Anti - Cantharus, 3mitterfafer	<u>.</u>	V: 379
Antigone, (Ardea) oftindischer Ri		11, 374
Antilochus, (Papilio) Langforma		V. 576
Untilope, bengalische, Antilope ru		C 16
Antilope bubalis, afrifanifche Bie	ge L 4:	16. <b>E.</b> 46
Antilope, Dirichbod	•	<b>(4)</b>
bezoardica, Bejoarbid	•	<b>5</b> . 45
bubalis, Ochsengageffe		<b>G</b> : 54
- Capensis, blauer Dirschl	wa -	S 52
- Dama, afritanische Gemi	•	<b>E</b> : 53
- Europaea, Genise	•	<b>E</b> . 53
- Grimmiz, Jungfernbock	<u>=</u>	<b>E</b> . 55
= = Hevella, Platthorn	•	S. 14

	•	au.	_
Antilone manage CD 16		Th.	
Antilope pygarga, Weißersch	•		· 54
- redunea, Krummborn			53
- rupicapra, bengalische Antildpe	• •		. 56
scripte, Kreusbock	3		55
— — Scythica, Tartar	•		53
Untilopenbohrer, (Bremse) Destrus An			333
Untioch, (Tagschmettetl) Papilio Antic	ochus		285
Antiopa, (Papilio) Trauermantel	.4.		609
Antipathes, (Gorgonia) schwarze Kor		VI2.	•
- cupreilina, Seecopteffe	•	VI2.	
- orichalcea, Seebimfe	•	VI2.	
- fpiralis, Seestrick	. 3	Vie.	
Anus, (Murex) Grimaffe	<i>m</i>	VI.	500
Unverwandter, (Rachtschmetterl.) Phala	ena amn		
Aonis, (Papilio) Wolfenpfau	•	. V.	
Anuaré, (guajan.) Waldrate	•		292
Apachycoatl, (mer.) Trauernatter	•	III.	
Ape, (engl.) Uffe -	•		118
Ape, (ttal.) Biene	<b>-</b>	V2.	
Apeca, (Apoa) (bras.) Bisamente	•		289
Aper, wildes Schwein	• ,		460
Aper, (Zeus) Sauruffelfisch	<u> </u>	IV.	
Apfelschaler, (Rachtschmett.) Phalaena	Gelatelli		735
Apfelfchaler, (Ruffelfafer) Curculio po	morum		228
Aphidioides, (Acarus,) Pflangenmilbe		V2. 1	
Aphis, Pflausenlaus -	•		508
- Absynthii, Bernuthlaus	, <b></b>		516
- Aceris, Masholverlaus	•		519
- Acetolae, Sauerampferlaus	÷		514
- Atriplicis, Melbenlaus	•		519
- Betulae, Birfenlaus	-		517
- Brassicae, Robliaus	۵		515
burfaria, Beutellaus	•		£18
- Cardui, Distellaus	•		516
- Cirsii, Schartenland	•		516
- Craccae, Widenlaus			515
- Fagi, Buchenlaus -	-		\$17
Jacone, Jacoenlaus	•	V.	•
		A	<b>aid</b> g

Aphis	Apis	t9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		₹1. €.
Aphis Lactucae, Lattichlaus	· <b>b</b>	V. 515
- Lychnidis, Wiederstoflaus	1	V. 514
Nympliæi, Bafferrofentaus	•	V. 514
- Padi, Bogelfirfchenlaus	•	V. 514
- Pastinacae, Bastinaflaus	3	V. 513
— — Pini, Kichtenlaus	•	V. 518
- Piftaciae, Piftacienlaus	•	V. 519
- Populi, Papelnlaus	÷	V. 518
- Quercus, Gichen Langfchnauße		V. 517
- Ribis, Johauntebeerlaus	<b>.</b>	V. 512
— Roboris, Sichenlaus — Rofae, Rofenlaus	•	V. 517
- Rumicis, Lapathlaus	•	V. 514
- Salicis, Beldenlaus	<b>*</b>	V. 514
- Sambuci, Hollerlaus	•	V. 518
- Sonchi, Ganfedisteffaus	•	V. 513
- Tanaceti, Reinfarrenlaus	<b>.</b> .	V. 516
- Tilize, Lindenlaus		V. 516
- Tremulae, Zieterpappeler	-	V. 114
- Ulmi, Ulmenlaus		V. 518
= Urticae, Brenneffellung	2	Vi 512
Aphrodita, Seeraupe	<b>a</b>	V: 519 V <b>I.</b> 72
aculeata, Staupelruden		VI. 72 VI. 72
- imbricata, Riegelrucken		VI. 74
- Cohra Mauhinistal	•	VI. 74
- iquamata, Schuppentucken	<b></b>	VI. 74
Aphya, (Cyprinus,) Spirling	-	IV. 390
Aphya, (Gobius) Milgrundel	2	IV. 129
Apiaster Madagascarientis, Bienenfre	Ter 198	S 95
Apis, Biene -	. 3	V2. 888
- Acervorum, Erdwühler	•	V2. 906
minea, Rupferbiene	• '	V2. 896
- Eftuans, Beißlander	-	V2. 905
- alpina, Berghummel	<b>3</b>	V2. 907
- amulata, Schwarzeingel	•	V2. 901
argillofa, Chonbiene	• .	V2. 899
barbara, Roibrand	<b>.</b>	V2. 900
- bicornis, Pernbiene	. 1	V2. 893
B 4		Apis,

		Th. S:
Apis Brauliana, Brafilianer	÷ .	V2. 905
- Caffra, Caffer .		V2. 993
- carbonaria, Roblerin		V2 893
- cariosa, Moderbiene	•	V2. 902
- Carolina, Caroliner	4	V2. 903
- centuncularis, Lappenbiene	-	V2. 89t
- cineraria, Afchbiene	. •	V2. 892
- clavicornis, Reulhorn	4	V2. 891
_ coerulescens, Blauring	•	V2. 896
- conica, Regelbiene	• '	V2. 900
- cordata, Dergbiene	•	V2. 895
- cunicularia, Graber	•	V2. 898
- dentaxa, Badenschenfel		V2. 894
- Fabriciana, Beilfftien	`` <b>`</b>	V2. 895
- Fasciata, Bandbiene		V2 900
- femoralis, Schenfelhummel	÷	<b>E.</b> 329
- ferrugines. Rostbiene	÷	V2 901
_ flokisomis, Blumenschlafer	•.	V2. 894
fragrans, wolriechende hummel		<b>©</b> . 328
- helvola Beikbauch	3	V2. 895
- hortorum, Gartenhummel	•	V2. 904
- hypnorum. Mooshummel	<b>~</b>	V2. 905
- Ichneumonea, Schlupfbiene	. •	V2. 901
ingopoda, Raubfuß	•	V2. 899
in lapidaria, Steinhummel	٠, ٠,	V2. 904
- longicornis, Langhorn	· <b>-</b> ,	V2. 891
- kagorum, Buschhummel	. •	V2. 905
manicata, Efausbiene	· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V2. 900
- maxillofa, Rieferbiene	. ;	V2. 894
mellifica, Honigbiene		V2. 896
- Mexicana, Meritanerin	. •	V2. 892
- mulcorum, Grashummel	•	V2. 905
pratorum, Wiefenhummel	•	V2. 904
- quadridentata, Wierjaya		V2. 900 V2. 893
- retula, Stumpfruden	, <u> </u>	V2. 899
roltrata, Schnabeler		V2. 893
- rista roide colene	•	V2. 951
ruficornis, Nothhom	<b>∴,1</b> 1,5	Apt,

B 3

Aramaca, (braf) Bargenflunder

Aranea, Spinne

Aramacao, langichmangiger Papagen

Aranca,

II. 121, 126, 130

V2. 1066. 6. 342

		₹6. <b>E.</b>
Aranea angulata, Ecfeite	•	V2. 1073
- aquatica, Wafferspinne	•	V2. 1084
arundinacea, Robrspinne	•	V2. 1073
- avicularia, Colibrifreffer	•	V2. 1080
bimaculata, Saftanienspinne	. •	V2. 1078
bipunctata, Soblpunkt	•	V2. 1073
ealycina, Gienentober	•	V2. 1072
cancriformis, Rrebsspinne	4	V2. 1086
- carollata, Ringelspinne	•	V2. 1075
cucurbitina, Egermickler	•	V2, 1072
- Curacavensis, Loumacher	•	- <del>©</del> . 342
domestica, Sausspinne	•	V2. 1073
— — extensa, Langkörper	₹	V2. 1077
flavislima, Schwefelspinne	•	V24. 1078
fimbriata, Saumspinne	÷ ′	V2, 1077
- fumigata, Rauchspinne	•	V2. 1076
- holoicrica, Cammetspinne	•	V2. 1079
- labyrinthica, Wiesenspinne	₹	V2, 1074
- montana, Bergspinne	•	V2. 1076
— — nocturna, Nachtsvinne	*	V2. 1077
- notata, Bogenspinne	-	V2, 1076
- ocellata, Chineser	•	V2. 1081
- ochopunctata, Achtpunktespinne		V2. 1072
- palustris, Sumpffpinne	•	V2. 1085
- quadrilineata, Glasspinne	ŧ	V2, 1075
- quadripunctata, Bierpunt	•	V2. 1079
- redimita, Rrangspinne	•	V2. 1075
- reticulata, Resspinne	•	V2,:1071
riparia, Uferspinne	-	V2, 1074
- rupestris, Steinhupfer	•	V2, 1083
- Caccata, Sacttrager	•	V2. 1084
sanguinolenta, Blutspinne	•	V2. 1076
feenica, Mauerspinne	7	V2. 1083
senoculata, Cechsauge	•	V2, 1079
sexpunctata, Cechepunkt	•	\ 2. 1077
fpeciola, Beiligen. Spinne	•	E. 343
spinimobilis, Pornfug	•	V2, 1081
spinose, Achtdorn	•	V2. 1087
		Aranea

Aranea	Airche	23
		Ih. C.
Aranea tetracanta, Bierborn	100	V2. 1086
tigrina, Tigerfpinne		S. 342
trilineata, Balbfpinne		V2. 1074
truncorum, Baumbupfer		V2. 1083
- venatoria, Jager		V2. 1081
viatica, Rrabbenfpinne		V2. 1085
virefcens, Rolbenfpinne		V2. 1085
Araneo, (tostan.) Salmbarfch		IV. 228
Araneus pifcis, Ctachelbrache		IV. 76
Arapapa, (indian.) Soblichnabel		II. 368
Arapede, (fr.) Rlipptleber		VI. 602
Ararauna, (Plittacus,) blaugelber R	ahe -	II. 127
Araffade, (fr.) Feuerfalamanber		III. 118
Arator, (Curculio) Pfluger		S. 229
Arbach, (gront.) Ballfifch		I. 480
Arbeh, (bebr.) Beufchrede		V. 437
Arboro, (venet.) Rothschuppe		IV. 184
Arca, Arche		VI. 292
- antiquata, Baftarbarche		VI. 296
- barbata, Bartarche	AS LIB	VI. 294
- decuffata, Rreugarche		VI. 297
- glycymeris, Gogelhopflein		VI. 298
- granofa, Korb	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VI. 296
- lactea, Milchboot		VI. 295
- Now, Roachearche -		VI. 294
- numeraria, Dblate -		VI. 299
- pallens, blaffes Ruchendoublet	100	VI. 297
- pella, Joue		VI. 295
- pilofa, Schmalgfüchlein		VI. 299
- fenilis, Breitrippe		VI. 296
- tortuofa, Safpel -		VI. 293
- undata, Tortlein -		VI. 298
Arcanius, (Papilio) Roftflugel		V. 627
Arcafe, (ital.) Rrummfchnabel		II. 394
Arche, Arca	Sale Janes	VI. 292
- mit geferbtem Rande und geboger	nem Angel	VI. 298
- mit geferbtem Rande und gefrumm	ntem Angel	VI. 295
- mit glattem Rante und gebogenen		VI. 294
B 4		Urdje

	Şħ. €.
Arche mit glatten Rande und gefrummtem Ange	
Arche torfe, (fr ) Saspelboublet -	VI. 293
Arches, (fr.) Archen	VI. 293
Archiades, (Papilio) Pallas -	<b>€.</b> 247
Arctos, (griech) Bar -	1, 270
A - Gas (II-Gre) comeines Mile	1. 277
Arcularia, (Buccinum) weiffes Rufferherncher	
Ardea, Reiber - 11. 369- 377.	
- aquinoctialis, weiffer Grunfchnabel	11. 388
- alba, meiffer Belbichnabel .	11, 387
Americana, amerifanischer Rranich	11, 373
- Brafilienlis, meftinbifcher Reiher	11. 387
- Canadenlis, Canadischer Rranich	11 .
- Ciconia, weiffer Ctorch	11, 374
- cinerea, grauer Reiber -	11. 378
- Cocci, aschgrauer Reiber	11, 38t
- coerulea, Rrabbenfrester	11. 383
comata, Mahnenreiber -	<b>C.</b> 111
- cristata, haubenreiher -	<b>€.</b> 111
- criftata, Rronenvogel -	II. 369
- fulca, brauner Storch	S. iII
- garzetta, meiffer Reiber .	11, 387
- grifea, oftindifcher Aciber .	ĮI. 387
- Hudsonia, Sudsanischer Reiher .	11. 384
— Japonenlis, japanischer Kranich –	<b>E.</b> 110
- leucogerana, weisser Rranich -	<b>S</b> . 109
- major, blauer Reiher	11. 380
- Mexicana, meritanischer Regnich	<b>.</b> 110
minuta, kleine Robrdommel -	11. 388
- nigra, schwarzer Storch	II. 376
- nycticorax, Quactreiber	II. 377
- pavonina, Pfauenreiber -	II. 370
- purpurea, Purpurreiber	II. 378
- pusilla, 3mergreiber -	<b>6.</b> 111
- ftellaris, große Robrdommel -	• •
- ftriata, geftreifter Reiber -	IL 384
- tricolor, brenfarbiger Reiber -	<b>6.</b> 111
- violacea, Bioletteibet.	II. 382
·	Arden

Ardea	Armadill	Th. S.
Ardea virefcens, grungeflecter Rei	her -	11. 385
Areignee, (fr.) Spinne	-	V2 1066
Arenaria, (Tringa) Dolmeffcher		11. 407
Areola, (Buccinum) Gartenbeetche	n =	VI. 454
Areola, (Madrepora) Rrofelstein	Time To.	V12, 682
Argentina, Cilberfisch	- IV.	
- Carolina, bahamifcher Ber	ing	IV. 348
- fpyroena, Ansjovis		IV. 347
Argiolus, (Papilio) Streupunft	7	V. 626
Argo, (Doris) rother Argus		VI. 70
Argo, Papiernautilus	-	VI. 348
Argonautæ, Schifeboote	7	VI. 347
Argus, (Cyprea) doppelter Argus	-	VI, 389
Argus, (Rlippfisch) Chætodon Ar	gus -	IV. 171
Argus, (Matter) Coluber Argus	75	III. 208
Argus, (Papilio) Gilberauge	-	V. 625
Argus. (Phasianus) Wfaufasan		11, 473
Argus, (Porzellane) doppelter, Cyl	prea Argus	VI. 389
Mrausfalamander, Lacurta punctat	a -	III. 117
Argus, (Geefchnede) rother, Doris	Argo	VI. 70
Argus, (Sonnenfafer) Coccinella	ocellata	V. 154
Argue, (Tagichmetterl.) bunter, Pa	pillo Acgeri	a V. 603
großer, Pap	ilio Achilles	V. 578
fleiner, Pap	ilio Ivioera	V. 602
	apilio Tarpe	ja G. 294
Ariadne, (Papilio) Bellenlinic	-	V. 610
Ariech, (hebr.) Lowe	77	I. 230
Aries, (Ovis) Widder	12	I. 422
Ariete, (ital.) Schaaf		I. 421
Ariolator, (Ichneumon) Bahrfage	f -	V2. 849
Arion, (Papilio) Randrunft	-	V. 625
Arivan, (chald.) Lome	~ .	I. 230
Arke-Noachsdubbletten, (holl)	Urchen	VI. 292
Arlequin, (Papagen) Pfittacus Hift	110	S. 76
Arlequin, (Porgellane) Cyprea cril	praria	VI. 398
Arlequin, (Tagfchmetterl.) Diftelny	mphe	V. 606
Arlequin, (Bange) Cimex Hiftrio	T	V. 480
Armadia, Dasypus		88. S. 23 S. 23
- achtgurteliger, Dafypus of	tocinctus	Armadill.

	Th.	€.
Armadill, achtsebngurteliger, Dalypus oltodecim		,
cinctus 🕳	€.	24
- beengurteliger, Dafypus tricinctus		190
- eingürteliger, Dalypus unicinetus		189
- neungurteliger, Dalypus novemeinetus		192
- fechegürteliger, Dasypus sexcinetus	I.	191
- fiebengurteliger, Dasypus septemginaus	1.	191
- viergurteliger, Daspyus quadricinstus	I.	190
— - molfgürteliger, Dasypus duodecimeinen	ys 🛎	. 23
Armadillo, Oniscus) Steinassel -	V2. 1	1153
Armpolype, Hydra fusca -	Vi2.	874
	Vl2.	635
Armqualle, Medula bracchiata	VI.	127
Armving, (Bake) Voluta monilis	VI,	422
Urm Weibchen, (Walze) Voluta paupercula	VI.	425
Arnebet, (hebr) haase	I.	318
Arobh, (hebr.) Ungeziefer -		. 1
Arrête-Nef, (fr.) Sauger -	IV.	
Arricilla, (Larus) Spotter		348
Arrosoir, (fr.) Gicefanne -	VI.	
Arlalte, (Papilio) Schwarztreffe -		591
Arschfuß, (Caucher) Colymbus podiceps II.		
Arschfriecher, (Dornfisch)	IV.	254
Arsmade, (boll) Aftermade -		35
Arumatia, brafilianischer Gespenftafer		410
Arzilla, (ital.) Spiegelroche	111.	
Asad, (arab.) lowe -		230
Asbecha, (perf.) Pferd -		445
	VI2.	
A-Scack, Schach, (Reuntober)		115
Ascaris, Epulmurm - VI. 35.		
sesquipedalis, Graswurm -	€.	
- trichiura, Langschwanz	G.	
vermicularis, Aftermade -	VI.	35
Aschbiene, Apis cineraria	V2.	
Alche, (Nascufich)	ĮV.	
Aschenstöber, (Lute) Conus rusticus -	VI.	
Afche poester, (boll) Aschenstöber -	VI.	
<b>9</b>	Tichft.	ci COL

Alchitrich	Año	<b>27</b>
		Th. G.
Afchstrich, (Tagschmett.) Papilio Eribe	ote	V. 596
Alcidia, Miegmuschel -		VI. 327
Alcidia, Seescheide -	VI.	83, 6, 355
echinata, Stachelscheibe	-	VI. 86
gelatinola, Gallertscheibe	<del></del>	VI. 84
intestinalis, Darmscheide		VI. 85
papillosa, Warzenscheibe	-	VI. 83
- quadridentata, Kugelscheibe	-	۷I. 8ç
rustica, Eplinderscheide	~	VI. 85
Ascita, (Silurus) Dickbanch	-	IV, 301
Asellus, (Cyprea) Eselchen	-	VI. 398
Asellus, Kabeijan -		IV. 78. 94
— — luscus, Blodauge	~	IV. 88
Asellus, Oniscus) Kellerassel	-	V2, 1152
After, (Bastardwespe) Sphex Aliatica	-	V2. 865
After, (Raderlad) Blatta Afiatica	. •	<b>S</b> . 263
Aster, (Arebs) Cancer Gymnista		V2. 1128
Mfier, (Regenpfeifer) Charadrius Alia	iticus	Ø. 115
Molus, (Oniscus) Scebrene	••• 17• •	V2. 1147
Asilus, Raubstiege -	V. 2. I	901. <b>E</b> . 338
æftuans, Penfilvanier	₩,	V2. 1003
— Aethiops, samarischer Rauber	~	<b>©.</b> 338
— Algirus, algierischer Rauber	<del></del>	V2. 1002
- ater, Weißbart -	_	V2. 1003
- barbarus, Rauberriese	_	V2. 1002
crabroniformis, Straffenraube	€	V2. 1002
flavus, Gelbrucken	<b>-</b>	V2. 1004
- forcipatus, Scheerenschwang - Germanicus, Rothstrumpf		V2. 1005 V2. 1005
— gibbolus, Docter	_	V2. 1003
— gilvus, Rothrucken	_	V2. 1004
- Lusitanicus, Portugiese	_	V2. 1005
- marginatus, Gelbrand	_	V2. 1004
- Maurus, maroffischer Caper	=	V2. 1004
- Oelandicus, Delander	•	V2. 1005
- Teutanus, Deutscher		V2. 1004
Alinus, Efel -	-	I. 453
Alio, (Strix) virginifche Eule	777	II. 97
trans to see a second second	-	Afiones
,		

	2	6. S.
Asiones, Horneulen -		İ. 89
Askalobotes, (griech) Streithahn	III. 10	5. 106
Askos, (griech.) Seefcheide	- V	I. 83
Alna, (schmeb ) Efel -		1. 453
Alno, (fpan.) Efel -		I. 453
Aspalax, (griech,) Maulmurf	-	Į. 295
Aspic, (eppr.) Sandfriecher -	III. 15	8, 169
Aspide del corno, (ital ) Candfriecher		II, 158
Alpis, eifengraue und roftfarbige Ratter		II. 167
Aspis, Otter -		II. 168
Aspredo, Langbart, (Bele)		<b>7.</b> 299
Aspredo, (Silurus) rauber Bels	- 17	V. 292
Als, (engl.) Efel -	. •	I: 453
Ussel, afrifanischer, Scolopendra ferrug		. 1159
- caspischer, Oniscus Caspius	- 6	<del>5</del> , 350
- frangofifcher, Scolopendra Gabrieli	V <sub>2</sub>	2./1159
- indianischer, Scolopendra morsitans		. 1158
Affelpage, (Eagschmett.) Papilio Gabriel		5. 296
Affelporgestane, Cyprea Staphylaea		1. 402
Affelraupenschmetterling, Papilio Telemi	1 .	<b>E</b> , 296
Affelschnede, Scrombus Quiscus		'I. 483
Uffelwurm, Scolopendra		. 1155
Astacus, (Cancer) Klustrebs -		. 1123
After, (griech) Geeftern -		I. 129
Afteria, Seeftern -	VI. 129, 6	
- a culeata, Stachelschwang		1,.139
- aranciaca, Seepastete -		I. 137
— — ciliata, haarschwanz		L 140
endeea, Manstral	- 6	5. 356
equestris, Stachelstern	V	I. 137
— — glacialis, Eißdorn —		l. 134
— — lævigata, Glattstral		I. 138
- minuta, 3merg		I. 133
— multiradiata, Bielstral	- V	I. 142
- nodola, Anstenstern		1. 136
- ophiura, Schlagenschwang		l. 139
ma Office A		I. 131
pectuata, Kammichwan;		I. 140 Steria,
	n	1-64-2

Afteria	Attelabus	29
	,	Eb. S.
Afteria reticulata, Regftern	Artal main	VI. 134
- rubens, Komet	A STATE OF THE STA	VI. 132
Afterns, (griech.) Sternfalte	The Control of the Co	11. 89
Afterie, (Papilio) indianischer	Vfaii –	V. 600
Uftfocher, Tubularia ramola	-	VI2. 816
Aftore, (ital.) Sternfalte		II. 89
Aftrild, (Loxia) fenegallifcher S	Rernbeiffer	II. 552
Aftroites, (Madrepora) Stern	ftein -	VI2. 687
Aftrolepas, Sternpatelle	PRODUCTION OF THE PARTY OF THE	VI. 607
Aftur, Cternfalte -	Christian State	II. 89
Afturnellato, (ital.) fpanische I	anbe -	II. 499
Atalantha, (Papilio) Schecfflig	jel –	V. 64
Ataleph, (hebr.) Fledermaus	a distance of the said	1. 150
Athemon, (Papilio) Weißfelb	8000 C. 11875.12	V. 627
Atherina, Kornabrenfisch	Uracillus	IV. 349
Atherina menidia, carolinischer	Kornahrenfisch	IV. 351
Atherinoides, (Clupea) Gilber	rband	IV. 373
Atingacu Camuci, (braf) gebo	enter Guckguck	II. 215
Atlas, (Phalæna) Pfauenfpicgel	AND THE WARDS	V. 651
Atlas, (Scarabæus) fliegender	Elephant	V. 53
Atlas, (Tagichmetterl ) Papilio	Menelaus	V. 571
Deutscher, (Tagschm.) Pa	pilio Hermione	V. 604
- = europaifcher, (Lagfchm.)	Papilio Semele	
- großer, (Tagichin.) Papi	lio Teucer	V. 579
fleinet, (Tagfdim.) Papi	lio Momenæus,	V. 579
Atlasbattel, (Dlive)	Yallanda) are	VI. 419
Atlaffe, (Rachtschmetterlinge) A	ttaci -	V. 651
Mtlasmucke, (Langfuß) Tipula	tericea -	V2. 945
Atlekeha, (arab.) Taube	011415111990	II. 497
Atomos, (Cancer) 3mergfrebs	one of transfer a	V2. 1135
Atricapilla, Umfel	p/1	II. 535
Atringa, (Diodon.) Rugelfich	Top measurements	111. 324
Atropos, (Coluber) Giftichla	nge in the order	111. 155
Atropes, (Sphinx) Tobentopf	realistable ( a	V. 638
Attaci, (Phalænæ) Utlaffe	Estador P.	V: 651
Attelabus, Baftardrußelfafer		3. G. 234
- apiarius, Bienenfresse	A THE RESERVE TO SECURITY.	V. 246
Avallanæ, Rugbeiffet	sum, (Lucho)	V. 244

	Th.	Q,
"Attelabus Betülæ, Blatfraußitt -	V.	245
bimaculatus, Zwenfleck	҈.	235
- Coryli, Rollenbreber	V.	243
- formicarius, Jäger -	V.	246
— — melanurus, Echwarzschwanz	V.	245
mollis, Sammetrock -	V.	247
- Pensylvanicus, Pensilvanier -	V.	245
— polymorphus, Unbestand —	☻.	234
lenex, Altvater		234
sipylus, Morgenlander		24 <del>6</del>
— — Surinamenlis, Zahnflügel —		244
Atthis, (Gracula,) egiptische Doble -		195
Attilus, Sterlet Stor		29 <b>t</b>
Auck, (engl.) Alf, (Papagentaucher)	II.	309
Auerhahn, Urogallus	11.	479
Auerochse, Bos Taurus -	Į.	432
Auge, (Sphinx) Spiesborit	V.	647
Augentafer, (Sonnentafer) Coccinella ocellata		22 t
Augenobr, (Gefpenftfafer) Mantis tricolor		414
Augensaum, (Lagschmett.) Papilio Carice	V.	627
Augenschwamm, Spongia deulata - 1	/12.	108
Augenschwanz, (Barfching) Perca ocellita	IV.	
Augenschwang, (Lägschmett.) Papilio Stelenes	V.	574
Mugenfpiegel, (Rachtschmett ) Phalena Polyphemus		
Augenspige, (Lagschmett.) Papilio Timantes	V.	627
Angenwimper, (Rosfifch) Blennius superciliosus	IV.	104
Augias, (Papilio) Schlesband Aura, (Vultur) Menschenfteffer, (Geler)	ν.	630
Aurelia, Insettenpuppe —	II.	•
Murelia, (Tagichmett.) grofe, Papilio polychloros	V.	13
- Tleine, Papilio Urtica		
Auricoma, Cammetvogel		609
Auricomus, (Cerambyx) Golbschlager	11,	267
Auriol, (fr.) Mactrele	V.	267
	17.	257
Auris Judæ, (Voluta) Zauberschnecke	VI.	480
Auris Midæ, (Voluta) Dibasohr —	VI	417
Auriscalpellum, (Turbo) Obrieffelden	VI.	\$59
Towns demand when House		410
		41.

Aurivitis	Aypha	31
at the second of the second		Th. E.
Aurivittis, Diftelfint	-	II. 582
Aurora, (Coluber) Schiesschlange	-	III. 174
Aurora, (Pfittacus) Glutpapagen	-	S. 76
Aurorpartit -	_	II. 141
Ausdunftung der Thiere	-	I. 33
Muslander, (Goldhahnchen) Chrys	omela ofto	-
punctata	-	V. 198
Muslander, (Sochschauer) Cobitis het		IV. 285
Auslander, (Meife) Parus peregrini		II. 628
Muslander, (Matter) Coluber getult	IS -	III. 186
Aussah, (Kliege) Musca lepræ	-	V2. 973
Ausschlagmilbe, Acarus exulcerans	-	V2. 1051
Auster, gemeine, Oftrea edulis	-	VI. 314
Aufterfischer, (Meerelfter) Hæmate	pus oftra	1
legus	27	II. 424
Mufterfifcherlaus, Pediculus liæmato	pi	V2. 1053
Austern -	T Halle	VI. 312
Austernessel, Actinia fenilis	and the second	VI. 88
Austheiler, (Raupentoder) Ichneumor	prærogat	or V2.854
Autor, (Rachtschmetterl.) Phalæna I	inneella	V. 755
Autoren welche von Infetten gefchrieb	en haben	V. 17
Autour, (fr.) Sternfalte	-	11. 89
Autruche, (fr.) Strausvogel	Care Toron	11. 447
Auxo, (Sphinx) Rundflugel	IN AN TON	V. 645
Avaron, (braf.) Rahlfopf	hlumblike.	11. 367
Aves gallinæ, Bubnerartige Bogel	OFF STORY	11. 454
Avestruz, (fpan.) Strausvogel	VI Loubo <del>rne</del> i	H. 447
Avis Lybica, (numidica,) indianisch	es Huhn	II. 45E
- tarda, Trapgans	at <del>libi</del> lutanoi	II. 441
- vivivora, Loffelgans	al Augusta	II. 363
Avoine, (fr.) Blindschleiche	W. (3) 100 100	III. 218
Avoltojo, (ital ) Beier	Se things of	II. 48
Avoletta, (ital.) Wafferfabler	inle son	11. 422
Ayal, (bebr. ) Sirfc, Geme	- 1	
Ayalah, (Ayeleth) (hebr.) Sinde	efternio -	I. 390
Ayoquantototl, (amerif.) gelbe Dro	ffel	11. 190
Ayotochtli, (amerif.) Armabill	blittou 7 m	1, 191
Aypha, Garbelle -	distantifusi	IV. 373
AND THE PARTY OF T	and the same	Azin,

£6. €. 1∏. 253

Íl. 388

ł

## B.

Baabichnede, Turbo Thermalis	VI. set
Baardknyper, (boll.) Bartineifer -	VI. 223
Baardmannetje, (holl.) gezactter Delphin	VI. 550
Baars, (holl.) Barfch -	IV. 222
Baba, (ruff.) Kropfgans	II. 324
Baboon, (engli.) Bavian	I. 123
Dabouit, (fight) Sadian -	I; 123
Babouin, (fr.) Bavian Babylonicus	VI. 510
Kannionitate Ebutin, ividica Baby ionicus	Ì. 467
Babyrussa, (Sus) Dirscheber	
Bacaffandoublet, Tellina Gari -	VI. 233
Bacchus, (Rugeltafer) Curculio Bacchus	V: 226
Bachamsel, Sturnus einetus	II. 52 <del>5</del>
Bachbungenfpringer, (Rugeltafer) Curculio Bec	:2-
bungæ —	V. 226
Bachfarpfe, Cyprinus tivularis	<b>⊗.</b> 2:ô
Rachmucke, (Langfus) Tipula rivola -	V2. 93i
Rachifelte: Motacilla - 11. 60:	ž. S. 173
- amerikanische, Motacilla mans -	П. 616
blaue, Motacilla coerulea -	II. 618
- brafilianische, Motacilla Guila	11. 616
bunte; Motacilla varia -	11, 612
caapiche, Motacilla capensis —	II. 612
canabifche, Motacilla Canadensis II.	613. 617
- bomingische, Motacilla Dominica	IÍ. 612
- brenfarbige, Motacilla tricolora	<b>©</b> . 175
- geffectte, Motacilla Patechia -	II. 613
gefronte, Motacilla coronata -	11, 611
gelbe, Motacilla flava:	II. 608
_ greife, Motacilla grifes	S. 175
mabagastarifde, Motacilla Maderafe	
tank	a- 1L 613
	IL 617
- megicanische, Motacilla Cajana -	
- penfilvanische, Motacilla Pensylvanica	Hi, dio
	Bachstelk

>>> 0.00 As effe	Bagyne	33
	Th. 6	3.
Bachstelze, philippinische, Mota		17
- fenegalifche, Motacilla	Senegalenfis II. 6	11
- fpanische, Motacilla ft		
- meiffe, Motacilla alba	- II. 60	7
Badenmalgen, (gefronte Bargen		8
Backreu, (fome) ) Forelle	IV. 31	7
Baetris, (Bruchus) Reenbeiffer	- V. 20	R
Babener, (Rugelfafer) Curculi		
Badger, (engl.) Dache	I. 28	I
Baber, (Rampentober) Ichneum	non fomentator V2. 86	25
Banberbarich, Perca vittata	- IV. 23	7
Banderhanden, Chrysoniela Tce	polina V. 18	0
Bandetwante, Cimex lineatus	V. 47	0
Bar. (Rachtfibmetterling) Phala	ena Caja V. 66	2
Bar, Urfus	I. 27	7
Meneiner, Urfus Arctos	- Î. 27	1
Barentaferchen, Dermeftes hirt	us - V. 10	6
Barenflaufliege, Mufca Heracli	i - V2. 98	~
Barentrebe, Cancer arttus	V2. 113	·
Barenranber, (Raubtafer) Stup	ohylinus hirtus V. 38	0
Barenftinter, (Stinffliege) Hem		<b>.</b>
Barentraubenmotte, (Rachtschm.		,
tella	V. 74	2
Barentraubenfild, (@diblaus)	Coccus Uvæura V. 52	-
Barfching, Perca-	- IV. 222. 6. 20	4
- fliegender, Perca volite	ans - IV. 25	¥ 2
- Ilnirter, Perca lineata	- IV. 24	7
- mit einer Rudenfloffe		•
<b>6</b> - 1 - 1 - 1 - 1	IV. 23	9
- mit einer Ruckenfloffe,	und ungetheiltem	
<b>Echwange</b>	+ IV. 23	ľ
- mit jmo anterfchiebeneit	Zuckuftoffen IV. 22	5
- penftpanlicher, Perça l	Philadelphica IV. 23	á
- weißbandirter, Perca P		3
Baf, bif, piemontefffche Laftthiet		5
Befred rivier Paulekroon, (bel		
hácnite	- VI. 49	Þ
Bagre, (Silurus) Schmeerfoffe	- IV. 30	
Bagynes Drollen, (boll.) Miran		
C	Baie	

34	Baiel	<b>Bandca</b>	ralle		
	•			Th.	
Raich	(arab.) Pfeed	•			445
Bak, (	poln.) Reopfgans,	Ashedommel	II.	324.	
Battel	jan, (Rabeljau)	-		. 82.	
Balæn	a, Wallfisch	~	I. 48	io. S	
	boops, Ednabel	ma)	_	I.	492
	musculus, Breitt	naul -		2. S.	
	mysticetus, groul	iougilabet krom	n (a)		481
	physalus, Finnsis	<b>1)</b>	_ 		491
Balain	e, Balainon, Balei	ne, (fr.) Xuall			480
Balak2	eel, (türk.) grauer	Keiher	<b>-</b>		379
	pides, (Lepas) fle		<del>-</del>	VI.	
	is (Lepas) große (	•	<b>~</b> €,		201
	fifth, Squalus Zyg		<b>T</b> . :	III.	-
	Buzzard, (engl.)		, 🕳	II.	
	Cock, (engl) schw	arl wallechuhu	}		428
Balific	s, Hornfich	• .	1	111.	294
جبد سعد	aculeatus, Stach	esportanz	<b>.</b> .	111.	299
	hispidus, Saubi	iche =	, 4		296
-	papillosus, Poce	nrucen	2.0		298
100	ringens, Rafenri	impret de la la la la la la la la la la la la la	167 M	III.	
	tomentofus, Bote				297
Ballite	s, Geetrote and	Danellalininad	1000000		284
Balten	ischröter, Lucanus	Paranenpiped	Cort	V.	98
Batten	malter, (Rafer) So	arabæus Carii	rex	137	63
Baller	us, (Cyprinus) Bula, (ital.) hermel	nae -	F0304	TA.	399
Balloti	ula, (ital.) Dermei	alia Daltimore	±3111631	11	274
20alum	iore, (Droffel) Ori as, Droffel	olus Baltimore	41	187.	i88
Banan	as, (maleisch.) molu	diffier Grahe	4.44	V24	
Bancas	blanes, (Nachtschi	metter 1 Phala	ens Fra	<b>V 24</b>	
Dano,	xini	-	Olle I In	V.	688
- W	tothes, (Blafe) Bu				410
Banha	irgus, (Tagfchmette	rl.) Papilio N	legera		603
Bankh	iene, Apis fasciata	S const in w	mp ktal		
Banda	led, (Tagfchmett.)	Papilio Camill	acmore	v.	
Banha	lugel, (Jungfer) L	ibellula fasciat	a.Tank		
Banda	lügel, (Tagfchm.) P	apilio Lyfippi	isi		
Bank	lugel, (Tagichm.)	apilio obrinu	(SUTUS)	V.	
Bankf	oralle, Millepora f	accialis	nation!	VIe.	71B
Chillan	Acmes, Tittle Corn't			299	Anb

25

Bartmannchen, (Melfe) Parus biarmicus Barimoos, Corallina barbata Bartmufchel, Mytilus barbatus VI. 333 Bartrand, (Rachtschm.) Phalsena sticticalis V. 734 Bartunber, Sciant cirrola IV. 220 Martinels, Silurus Mystus IV. 294 Bartmurm, Fasciola barbata VI. 44 Bartmurm. (Geetaufenblein) Noteis cirtola VI. Bafilist, (Eibechfe) Balilifcus III. 102

Basset, (fr.) Dachsbund Baftango, Baftonaga, (ital.) Pfeilichwangrede Hi. 247 Bastars, (Frost) Rana paradoxa Baftach, (Ruffelfafer) Curculio dispar Pastarbabmiral, Conus Senator VI. 373 Baftarbameife, Mutilla formicaria V2. 921 VI. 296 Baftarbarche, Arca antiquata

Baskak, (arab.) Sthman

Bastardbaumlaufer, Certhia intermedia Baftarbbettzuche, zadige, (Dufcatennuf) . VI. 466 Bestard-

II. 276

111, 64

V. 210

**S**.

€. 27

	Baitard	<b>33</b>	astinat		37
1, 7		,		31.	€.
Baftard - Bifc	hopsmyter,	(bou.) Mean	chefappe		430
Bastardblase,	(Blasenfug)	Thrips par	adoxa	V.	538
Baftardbode,	Necydales		-	V.	292
<del></del>	mit turgen &	lügeldecken	-	V.	293
	mit fpigigen	Blugeldeden	-	V.	294
Baftarbdrache	ntopfchen, C	vprez Errer	Jea .	VI.	398
Baftarddroffel	, Oriolus (p	urius	-		189
Baftarde, An		-	VI. 317	<b>. .</b>	369
Baffagbeisung	el, Todus		<b>-</b> 、		234
Baftarderdfaf					374
Bastardgoldhd			eloides	V.	382
Bastardgrunde			-	IV.	
Bastardhubu,			•		127
Baftardjungfe			V2. 798		
Paffardfrania					365
Baftarblampe,				VI.	
Baftarbmafrel				IV.	264
Bastard - Oly	phanties, (b	ou.) Bastari	er i Belkafer	V.	243
<b>Softand</b> pablic	cone, Murex	Aluco	-	VI.	
Bastard - Paus	kroen, (boll	.) Sastardp	abstirone	VI.	
<b>Baffar</b> bparadi	espogel, Par	adilea triftis	5	11.	
<b>Bakar</b> opfellfd	produte			V.	
<b>Saffardpolype</b> <b>Saffardrußell</b>	, Vorticella	•	•	VI2.	865
menterarn Belte	ifer, Attelab	1	V. 243		
Baftardfeetoni	ie, Strombus	paluntris.		VI.	490
Bear of the La	ogel, (Sagid	men.) Papi	mo Miode	V.	022
<b>Millionical Replie</b>	ege, iviller (	Coughtordes	•	¥ 2.	755
Saftard Stri				VI.	
Market Grobelli	áfer, Tenebi	io 211buoid	es	V.	
Baftardvenus,			•	VI.	
Baftarbwendel		DO MINDIBUU	3 - 370 - 060	VI.	553
<b>Baftardwespe</b> ,	Sprex	alk fact above	V2. 863		
	deren Hinterl			V2.	902
	deren hinterer		entetti time	¥7e	<b>0</b> 4 .
	gen Palse bet rothe, Sphex			V2.	
stard - Zeet				VI.	
Baftinaflaus,	Anhie Refi	see	unte.		490 513
	bms muni	C	_		
16 A		U 3			Bat,

38	Bat	Baumpe	rling	Th.	<b>«</b>
Bat, (engl.)	Riebermans	•			150
Retates. (A	earus) Patatesn	tilbe	<u>~</u> ~ ~ •	V2. 1	
	agschmett ) Pap		-	· <b>G</b> .	
	, (griech.) Roch		_	111,	
	læna) Braunaug		_	V.	-
	) Stachelroche		,	III.	_
	(griech) Frosch		•	III.	48
	alios, Meerfrofe	b, Ceeteufe	ĺ	III.	
Batrachus,	Seefrote	-	•	111.	
Bauchfloffer,	Pisces abdomir	nales	IV. 281.		
Baudroi. (fi	r.) Meerfrosch		-	Iil.	280
Bauer. (200	dfåfer) Ceramb	yx rusticus		V.	
Bauer. (Tag	sschmett.) chinest	fcher, Papil	io Eryx	<b>G.</b>	
Bauer, (Lag	sschmett) deutsch	er, Papilio	Tithonus		
Bauer, (Wa	ise) fleiner, (Ol	ventern)	-	VI.	
Bauer, (Sti	nftafer) Bupres	tis ruitica	-	V.	337
Bauernbockle	ein, (Holzbock)	Leptura ru	ítica	V.	288
Bauernhahn	chen, Chrysomel	a ruitica		V.	183
Bauernjunge	, (Kinthorn) Bu	ccinum un	aoium	VI.	162
Bauerntappe	, Patella ruftica	l habaana	•	VI.	514
Banerumnitt	(Tute) Conus	neoræus	- 	VI.	377
Bauernvögel,	, (Eagschmetterli beji rurales	nge) rapiti	– oues bie-	<b>V.</b>	622
Baumente, A			-	II.	
Baumfalte, I	Falco Subbuteo	-		II.	78
	Pflanzenfloh) Po	dura plomi	bea	V2. 10	
	, (Fliege) Musc			V2.	
Baumbacter,	(Specht)	-		218.	253
Baumhacker,	Trogon •	-	-	11. 2	292
Baumbupfer,	(Spinne) Aran	ea truncor	um · T	V2. 10	
Baumflette, (	Certhia familiar			II.	254
Baumlaufer,	Certhia	-	II. 25	3. <b>S</b> .	97
Baumlaufer,	(Pflanzenfloh)	Podura arb	orea \	<b>72.</b> 10	
	Alauda arborea		· <b>-</b> ,	II. 4	
	(Safranmucke)		<b>-</b> '	V2.	
	al, Modacilla n		-	JI. 6	
	, Helix arbusto	rum	.•	VL 4	
	e, (Wiedebopf)		-	II. 2	
<b>Ba</b> umsperling	, Fringilla mon	itana	-	II. 9	

<b>Savian</b>	Denemoth	C 39
Bavian, (furgefchwangter Uffe)	Panio I.	Th. G.
Barian, Simia Sphinx	and Departure	1. 122
Bavofa, (ital.) Spifmaulroche	BARRY CILLS	TIT. 244
Bazant, (poln.) Fafan	1 4 4 4 4 4	II 472
Bdellae, (griech.) Blutigel	1 1111	VI. 47
Bear (onal ) Bar	100 12	1 Own
Beaver, (engl.) Biber	CONTRACTOR OF THE CO.	I. 206
Bebe, (inbian.) Ente	mil 48 1.7 (	11, 299
Becaffe, (boll.) Schnepfenfchna	bel, (Muschel)	VI. 494
Beccafigo, (ital.) Reigeneffer	1 TO 1 1	11, 606
Beccaroveglia, (ital.) Loffler	\$400 E	II. 361
Beccaffa, (ital.) Schnepfe	32 MIN -	II. 393
Beccasse, (fr.) Sauting, (Salm	1)	IV. 327
Beccaffe, (fr.) Schnepfe	7100 - 1100 I	I. 393. 396
Beccaffeau, (fr.) Strandlaufer	070 : 1200	11. 404
Beccassine, (fr.) heer (Baffer	o) Schnepfe	II. 397
Beccho, (ital.) Bod	Marie Charles	I. 494
Bec de Cire, (fr.) fenegallifcher	Kernbeiffer	11, 552
Bec de Perroquet, (fr.) Terebr	atul -	VI. 324
Bec d' Ove. (fr.) Ganfeschnabel	(Tummler)	1, 505
Bec en cifeaux, (fr.) Berfehrtfe	chnabel	11. 355
Bec en ciseaux, (fr.) Berfehrtst Becfigue, (fr.) Feigenesser	volt (Allege Tel	II. 606
Becherschwamm, Spongia crater	riformis	VI2. 795
Becquafigo (venet) Golddroffel	-	11. 185
Beddekens, (holl.) Gartenbeetd	yett -	VI. 454
Bee, (engl.) Biene -	-	V2. 888
Beef-Aal, (holl.) Bitteraal	A11.5	IV. 47
Beenviss, (boll.) Beinfisch	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	III. 303
Beer, (boll.) Bar -	i	I. 277
Beer, (bon.) Eber	-	I. 461
Beerenfleder, (Bange) Cimex in	iterstinctus	V. 488
Beetle, (engl.) Rafer	-	V. 49
Befehlebaber, (Raupentober) Ichi	neum, edictoriu	15 V2. 848
Befruchtung, Dennungen davon	-	1. 78. 82
Begattung ber Infeften	-	V. 10
Begattung ber Raferarten		V. 58
Begattungegeschafte der Thiere	-	I. 11
Begleiter, (Raupentober) Ichn.	comitator	V2. 849
Behemoth, (Rilpferd) Hyppopot		I. 457
Contractor.	4	Beili

•	
	<b>Eb. G.</b>
Beilbauch, (Bering) Clupea sternicla -	IV. 375
Beinbrecher, (Ralfe) Falco offifragus -	11. 64
Beinfisch, Ostracion -	IIL, 303
Bekas, (poln.) Baffer (heers) Conepfe	11. 397
Bekker-el-wash, (arab.) afrifanische Ziege	I. 416
Beld, (fcweizerich) fcmarges Bafferhubn	II. 427
Belette, (fr.) Permelin	1. 274
Belia, (Papilio) Fraumusub	V. 589
Belier, (fr.) Widder -	l. 421
Belladonna, Diftelnymphe -	V. 606
Bellarina, (ital ) weisse Lachstelze	II. 607
Bell - flower - animal, (engl ) Glodenblumenthier	VI2. 819
Bellhooren, (boll) Schelle -	VL 449
Bell-flak, (boll.) Pringenfabue -	VL 413
Bell-flak, (boll.) Schellenschnirkel -	VL 563
Bell-flang, boll.) Rlapperschlange	III. 133
	15. G. 58
Belone, (Efox) Meernadel, (Pecht) -	IV. 341
Belzebul, (Simia) Fliegenfanger	I. 125
Bengaler, (Bange) Cimex Stockerus	V. 478
Bongalus, (Fringilla) bengalifcher Stule	IL 598
Bergooble, Corvus pyrrhocorax	II180
Bergente, Anas marila -	II. 281
Bergeronette, (fr.) gelbe Bachftelje	11. 608
Bergfafte, (Erdgeter) -	11. 59
Bergfiele, Fringilla montifringilla	II. 581
Bergforelle, Salmo alpinus -	IV. 320
Berghaase, Lepus Alpinus —	G. 38
Serghubn, Tetrao - II. 47	8. <b>E.</b> 127
Berghummel, Apis Alpina -	V2. 907
Berglerche, Alauda Alpestris -	II. 521
Bergmerle, Turdus merula -	11. 536
Berg - mosch, (boll.) Berg . Baumsperling	II. 193
Bergschlange, Boa Ophrias -	III. 150
Bergionece, Limax rufus -	VI. 64
Bergichwalbe, sibirische, Hirundo Alpestris	<b>5.</b> 180
Bergsinne, Aranea montana -	V2. 1076
Bergtaube, Columba montana	II. 504
	Bermt-

•	
	<b>24. 6.</b>
Fesoar, grauer, Buccinum glaucum —	VI. 459
Bezoarbock, Antilope bezoardica —	<b>S</b> . 55
Rejearbed, Capra bezeardica —	I. 415
Bezola, (favoi.) weißer Sangfisch -	IV. 326
Bi, (schwed.) Biene —	V2. 888
Bib, (engl.) Blodauge	IV. 88
Siber, Castor	. I. 326
Biberrage, Castor muschatus -	L 332
Pibertaucher, Mergus Castor	II. 306
Biceps, (Anguis) zwentopfige Malfclange III.	
Biche, (fr.) Hinde -	I. 390
Bichon, (fr ) Schoosbund, Bolognefer Sund	6. 27
Bicho-Vergonboso, (braf.) Schuppthier	I. 182
Bidder, (holl.) bas europaifche manbelnbe Blat	V. 411
Biegeleisen, (Beinfifch) Oftracion Triqueter	III, 304
Liene, rothe, Apis rufa -	V2. 893
	3. 6. 328
- eigentliche -	V2. 898
- raube, ober Dummeln -	V2. 902
- ungeflügelte, Mutille - V2. 91	R. G. 331
Bienenfreffer, (Baftarbrugeltafer) Attelabus	;
apiarius —	V. 246
Bienenfresser, (Falte) Falco apivorus -	II. 87
	45 6. 95
Bienentorbeben, (Mondichnede) Turbo Uva	VI. 554
	V2, 1038
	V2. 1055
Bienenschmetterling, (Pfeilschmant) Sphinx api-	
formis	V. 644
Bienentober, (Spinne) Aranea calycina	V2. 1072
Bievre, (fr.) Biber -	I. 326
Bigatti da feta, (ital.) Ceibenwürmer -	V. 660
Bigourneau, (fr.) Strandmondschnecke	VL 541
Bihat, (áthiop.) Rilpferd -	I. 457
Bihoreau, (fr.) Quadreiher -	II. 377
Bilberboef, Cerambyx hieroglyphicus	€. 241
Bilberflügel, (Machtschm) Phalæna glyphica	V. 684
Bile-cock, (engl ) Bafferralle -	II. 436
	Bilobit,

Bilobit	Burnwake	43
a La		₹b. €.
Bilobit, Anomia Biloba	The state of the s	VI. 325
Bilobus, (Scarabæus) Lappenfa	fer -	V. 56
Bilfenfreffer, (Goldhahnchen) Cl		- 20
feyami		V. 181
Bilfenfrautfliege, Mulca Hyofcy	ami —	V2. 979
Bilfenfauger, (Bange) Cimex H		V. 496
Bimfenforalle, Cellepora pumice		VI2. 726
Binbfliege, Musca combinata	-	V2. 978
Bindmurmer, Fasciolæ,	- VI. 4	2. 6. 314
Binfenforall, Madrepora cafpite	ofa —	VI2. 693
Binfennachtigal, Motacilla School		II. 604
Bioerkna, (Cyprinus) Biertna		IV. 399
Bioern, (fcwed.) Bar	-	I. 277
Bion Cambu, (provenc.) Bernha	rbus	V2. 1119
Bipes, (anguis) Doppelfuß	_	III. 211
Birfenfelber, (Rugelfafer) Curci	ulio Betulæ	V. 226
Birfenlaus, Aphis Betulæ	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	V. 517
Birfenmejer, (Goldhahnchen) Ch	ryfomela Betul	æ V. 168
Birtennager, gruner, (Stintfafer)	Buprestis virid	is V. 341
fcmarger, Bupreftis	atra -	V. 341
Birfenfauger, Chermes Betulæ	-	V. 524
Birtenfdild, (Schildlaus) Coccu	s ilicis	V. c31
Birtenfteiger, (Schlupfmefpe) Te	nthredo Betula	V2. 834
Birfenvogel, (Rachtschm.) Phalæ	na fulvulata	G. 313
Birfenmange, Cimex Betulæ	-	V. 482
Birtenwidler, (Rachtichm ) Phale	æna Solandrian	12 V. 728
Birthubn, Tetrao Tetrix	-	II. 480
Birthubnerlaus, Pediculus tetra	onis -	V2. 1036
Birn, achate, (Stachelfchnede) I		VI. 517
- gebratene, Murex Lotorium		VI. 503
- getroducte, Murex Pileare		VI. 504
Birnfliege, Musca pyraftri	-	V2. 963
Birngallert, Vorticella pyraria		VI2. 871
Bienkafer, Curculio pyri		V. 235
Birnmotte, (Rachtfchm.) Phalæn	a pomonella	V. 746
Birnfauger, Chermes pyri	- Formenega	V. 522
Birnfcnede, (Feige)		VI. 410
Birnmalge, Voluta Pyrum	-	VI. 436
THE CO. C.		Bicom.

•••	•
	E1. C.
Bisamasse, Simia Jacchus —	Ĭ, 132
Bisambocklein, Cerambyn moschatus -	V. 264
Bisamente, Anas moschata -	II. 288
Bisamentenlans, Pediculus moschatæ -	V2. 1033
Bisamtaser, Sytpha Vespillo -	V. 123
Bisamfațe, Felis mosehata	€. 30
Bisamthier, Moschus moschiferus -	. I. 379
Bischoff, (Merle) Tanagra Episcopus	11. 577
Bischossenütze, (Walze) Voluta mitra -	VI. 431
Bischops - Myter, (bell.) Bischoffsmute	VL 431
Sischosses Nantilus Orthocera -	VI. 361
Biset, (fr.) Ringtaube	11. 506
Bison, (Rafer) Scarabæus Bison -	V. 66
Bison, (Ochse,) Bos Bison -	I. 439
Bissebedjes, (boll.) Bauernvogel -	V. 623
Bistard, (engl ) Trappgans -	II. 441
Bitarde, (fr.) Bielfuß, (Regenpfefer) -	II. 420
Bittern, Bittour, (engl.) Rohrbommel	II. 386
Bivaro, (ital.) Biber -	I. 326
Bivora, (fpan.) Bipernatter -	III. 154
Blashoorens, (boll.) Blasen	VI. 404
Blaasje, (holl.) bas Taubenen .	VI. 407
Blaauwe druppen, (holl.) Spisbattel	VI. 421
Black-hird, Blackonsle, (engl.) Amel	11. 536
Black- Cap, (engl.) Schwarzfappchen	- II. 610
Black - Cuttle, Black - Fish, (engl.) Dintenft	ft 1V. 235
Blackfisch, Sepia -	VL 112
Black - Fish, (engl.) Bels -	IV. 294
Black-Game, (engl.) Birthabn	H. 481
Black - Mose, (engl.) eine Art Clendthier	I 389
Black - Tail, (engl.) Schwarzschwanzsisch	IV. 240
Blaßling, Fulica atra	II. 427
Blatter, (Klipptleber) Patelle pustule -	VI. 615
Blatterfuß, Wange) Cimex phyllopus	V. 504
Blatterhorn, (Rachtschm.) Phalena Cossus	V. 673
Blatterkamm, Mytilus Hyotis -	VI. 329
Blatterrinde, Flustra foliacea	VI2. 808
Blatterschuppe, (Umberfisch) Sciena Lepisma	IV. 218
	Blaue

Haning	Blatta	45
		Th. G.
Blanting, (Goldhahnchen) Chryfom	ela cyanea	V. 186
Blauling, (Meeltafer) Tenebrio co		V. 373
Blauling, weiffer, Salmo albula	-	IV. 326
Blaffer, (engl.) Regenvogel	•	11. 398
Blaireau, (fr.) Dochs	•	l. 281
Mande, (fr.) Feuerfalamander	-	III. 118
graf, (fcweb.) Blaufuchs	' <b>-</b>	l. 227
Slafen, Bullæ, —	. •	VI. 404
Blasenfuß, Thrips	•	V. 538
- bandirter, Thrips fasciata	. <b>.</b>	V. 540
chwarzer, Thrips Phylapu unsidektbarer, Thrips minut		V. 539
	IIIIII	V. 539
Blafenforallinen Blafenträger, (Eidechfe) Lacerta bu	17aria	VI <sub>2</sub> . 833
		III. 108
Blasenwurm, (Rellerwurm) Oniscus		V2. 1149.
Blafenileher, (Stechfliege) Conops v		V2. 998
Blafer, caapfcher, (Stachelbanch) Te	trodon lage	
cephalus	• -	III. 314
venier, (Deiphin) le loumeur	•	I. 508
Blaser, (Falte) Falco suffiktor Blassingel, (Tagschm.) Papilio Jati	-	II. 80
Hagingel, (Lagiam.) Papino Jati	rebres	V. 610
Blagunge, (Ratter) Coluber pullid		III. 183
Blaftuden, (Erdtäfer) Carabus livi Blaftuden, (Meeltäfer) Tenebrio		V. 358
Blaßschnabel, (Kernbeisser) Loxia d		V. 371
Blasstrich, (Tasschm.) Papilio Ness	Araja	6. 150
Blakkrich, (Wanje) Cimex indus		V. 617 V. 496
Blat, wandelndes, (Gefpenstafer) Mi	intis liccifoli	4 V 440
Blatfliege, Musca furta		V2. 968
Blattafer, (Goldhahnchen)		V. 163
Blattorall, durchgebrochenes	-	VI2. 712
Blattorall, durchgebrochenes Blattitusler, (Bastardrüßelf.) Attol	abus Bemiæ	V. 245
<b>Blatrollet. (Kuffelfafer)</b> Cur <b>c</b> ulio t	ortrix	V. 234
Matfanger, Chermes	<b>—</b>	V. 521
Blatfchild, (Citabe) Cicada foliata		V. 452
Blatichramm, Spongia frondola	,	VI2. 795
fatta, Raderlad	V. 401	· © 263
	. 7	Blatta.

•	
	Th. E.
Blatta ægyptiaca, Egiptier -	V. 403
- africana, Afritaner -	V. 404
- americana, Amerifaner +	V. 403
- aliatica, After -	S. 263
- byzantina, Rrausschnede -	VI. 498
- Germanica, Deutscher	V. 406
- gigantea, Buschkackerlack -	V. 402
— — laponica, Lapplander —	V. 406
- nivea, Weißling	V. 403
— nivea, Weißling — oblongata, Schwarzmond	V. 406
- orientalis, Offindianer -	V. 404
_ pistrina, (molendinaria) Oftindianer	V. 405
surinamensis, Surinamer -	V. 403
Blatte des cuisines, (fr.) Oftindianer -	V. 405
Blatterhahnchen, Chrysomela variolosa -	V. 175
Rlatternatter, Coluber guttatus -	III. 197
Blatterschild, (Schilbfafer) Cassida bipustulat	8 V. 144
Blatwanderer, europäischer, Mantis religiola	V- 44E
Migtwespen, (Schlupfwespen) -	V. 819
Blatwickler, (Nachtschm.) Phalæna tortrix	V. 723
Blauauge, (Lagidhm.) Papilio Ecclyptis	V. 594
Blauauge, (Eagschm.) Papilio Philoctetes	V. 574
Manband, (Tagstom) Papilio Alimena	V. 612
Blauband, (Tagfd)m.) Papilio Meander	<b>©.</b> 283
Blaubaftard, (Baftardwefpe) Sphex coerulen	V2. 865
Blaubauch, (Bienenfreffer) Merops American	nus 🛎. 95
Blanbauch, (Colibri) Trochus Ourissia -	il. 268
Blanbauch, (Flie genfanger) Muscicapa cincre	2 6. 170
Blaubauch, (Goldwespe) Chrysis cyanea	V2. 876
Blanbock, (Bocktafer) Ceramby's violaceus	V. 277
Blaubruft, (Droffel) Turdus Guajanus -	<b>5.</b> 146
Blanbusch, (Meise) Parus erectus -	<b>5. 178</b>
Blanfeld, (Tagschm.) Papilio Janassa -	V. 614
Blaufint, Fringilla coerulea -	· 6. 167
Blanfleck, (Goldhabnehen) Chrysomela quadri	
culata -	V. 188
Blausted, (Rachtschm.) Phalæna allica	6. 309
;	Blan

	Th. 6.
Blaufonne, (Tagichm.) Papilio Ulysses -	V. 572
Blauftral, (Tagfchm.) Papilio Telemachus	V. 578
Blauftrich, (Goldbabnch) Chrysom fastuola	V. 170
Blauftrich, (Schildtafer) Cassida nobilis	V. 137
Blaustriem, (Ruffeltafer) Curculio dorfalis	V. 219
Blauvogelchen, Sialis -	11, 616
Blauwange, Cimex coeruleus -	V. 489
Blauwolfe, (Lagicom ) Pap. Amphinome	V. 612
Blauwurfel, (Matter) Coluber rhombeatus	111. 178
Blauwurjel, (Tagschm) Papilio Pirho -	V. 623
Bleak, (engl ) Restling -	IV. 396
Blechschmid, (Erbfafer) Carabus Cephalotes	V. 355
Blenbinde, (Rachtschm.) Phalaena Pariana	V. 739
Bleicher, (Rachtschm.) Phalaena pallens	V. 684
Michfalte, Falco pygargus -	11: 70
Blenfliege, (S. Job Kliege) Cantharis livida	V. 308
Blenfliege, (S. Joh Kliege) Cantharis livida Blennatter, Coluber Saturninus	III. 191
Riepporiessane, Cyprea sandestina -	VL 397
Blenmalje, Voluta livida -	VI. 417
Blennius, Rossisch -	IV. ido
- cornutus, Potnierche -	IV. 10t
- cristatus, Kammlerche	IV. 101
_ gunellus, Buttersisch –	IV. 106
- lumpenus, Lumper -	IV. 107
- mustelaris, Lampretenfisch -	IV. 106
- raninus, Froschsich	IV. 108
— — ocellaris, Schmetterlingfisch —	IV. 102
superciliosus, Augenwimper -	IV. 104
- viviparus, Aalmutter -	IV. 106
Blennos, Schmetterlingfisch -	IV. 102
Bleff- Aand, (Dan.) fcmarges Bafferbuhn	il. 427
Blew - bird, (engl.) Blauvsgelchen .	11. 616
Blew-shark, (engl.) blauer Daapfich -	Ш. 272
Blew-Titmouse, (engl.) Blaumeise -	II. 627
Bley, (holl) Weißbarfch	1V. 229
Blide, (Rarpf) Cyprinus Ballerus -	IV. 399
Blindaal, Murex coeca	IV. 43
Blindauge, (Lagfom.) Papilie Briscis -	V. 602
•	Slinde

Blindbecke	Blutband	4	9
		Th. E	
Blindbecke, (Wange) Cimex apteru	is 🕳	V: 49	
Blindfisch, (Radelfisch) Syngnathus		III. 34	
Blinds, (engl.) Blobange	•	1V. 8	
Blindschleiche, (Malschlange) Anguis	fragilis	III. 21	
Blindschleichen, Cæciliæ	-	III. 22	ż
Blindworm, (engl.) Blimbichleiche		III. 21	8
Blingler, (tippfisch) Labrus luscus	, <b>L</b>	IV. 8	Ž
Blingler, (Biebbreme) Tabanus coe	cutions	V2. 98	7
Bloas - Klacka, (fcmed.) fcmarz &		II. 42	7
Blodange, (Rabeljan) Gadus luscus	; <del>-</del> (	IV. g	Ž
Rloedje, (hou) rothe Erbse	<b>~</b>	VI. 54	9
Bloedige Tanden, (holl.) Blutzahn		VI. 59	I
Bloedkoraal, (boll ) Blutforalte	- j	VI2. 74	3
Bloedzuiger, (holl.) Blutigel	•	VI. 4	7
Blood-Sucker, (engl ) Blutigel	•	VI. 4	7
Bloot-Ruggen, (holl) Kahlrucken	<b>3</b>	IV. 4	5
Blutenfliege, Musca florescentie	-	V2. 986	3
Matennugden, (Gallapfeltourm) C	ynips fagi	V2. 81	4
Manenbock, Cerambyx floralis Musca florea		C. 24	Ž
menfliege, Mulca florea	• • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V2. 95	8
menflob, (Todengr.) Sylpha pul	icaria -	V. 13	
mentifer, Scarabæus fasciatus		V. 80	
menforalle, Madrepora prolife	ra -	VI2. 70	3
Cancer floridus	mikima	V2. 110	3
Mantenfrager, (Lodengr.) Sylpha	dicularia	V. 13	3
munenlaus, (Lobengr.) Sylpha pe		V. 13	3
Linenmilbe, (Lovenge.) Sylpha a		V. 38	
	LUIIIALIA	V. 13. VI. 63	Ŧ
Minespolype, (Rohrenpolype)	arės	V2. 95	5
Minerifauget, (Fliege) Musca nell	intà	V2. 956	S
Manenfauger, (Mantafer) Meloe	ntherinus	V. 384	•
Minischander, (Langfuß) Tipula i	lorilega	V2. 94	
Matenschlafer, (Blene) Apis floris	omnis	V2. 89	2
menvogel, (Schmetterlinge)	-	V. 542	ż
raber, (Nachtschm.) Phalæna Ch	ristiernans	V. 72	
taber, (Englom.) Papilio Hyps	arete	V. 59	
Mitband, (Eifade) Cicada languin		V. 46	È
D		<b>V</b> lut	•

	Tb.	Ę,
Blutband, (Krausel) Trochus divaricatus	VI.	231
Blutband, (Nachtschmett.) Phalmna sanguinalis		734
Blutbauch, (Bange) Cimex hæmorrhous		485
Blutbod, (Bodtafer) Cerambyx sanguineus		280
Blutfint, Loxia Pyrrhula -		547
- meritanischer, Loxia nigra	11.	557
Blutfled, (Lagiont.) Papilio Eurypylus	V.	583
Blutfleden, Tellina bimaculata -	VI.	241
Blutfloffer, (Rarpfe) Cyprinus Idbarus	IV.	301
Blutflugel, (Dolibod) Leptura sanguinolenta	V:	285
Blutflugel, (Raubtafer) Staphylinus sanguineus		393
Blutflugel, (Connentafer) Coccinella sanguinea		147
Bluthals, (Dorntafer) Hilpa sanguinicollis		228
Bluthabnchen, Chrysomela sanguinolenta		176
Bluthund, mit hangenden Bacten -	é.	27
Blutigel, Hirudo -	VI.	47
Blutteble, (Ratter) Coluber jugularis	Ш;	10%
Bluttorper, (Tagichm.) Papilio languinolenta		683
Bluttopf; (Großmanl) Bucco Hæmacephalus		88
	/12.	
	V2. 1	477     [6
Bluttrabbe, Cancer languineus	6	345
Bluttling; (Rachtschin) Phalmna sacraria	V:	709
Bluillippe, Venus deflorata -	VI.	272
Blutmantel, Ostroa sanguinea -	VI:	200
Blutpapagen, Psittacus hæmatodus -		73
Blutpuntt, (Rachtschm.) Phalæna pulchella	V:	736
Blutpuntt, (Springtafer) Elater bipustulatus	<b>.V</b> .	320
Blutrand, (Lagfchm.) Papilio Pyranthe		592
Blutting, (Citabe) Cicada hæmatodes -		456
Blutring, (Pfeilschwang) Sphinx cruenta		305
Blutfauger, gemeiner, Hirudo fanguiluga	VI.	
Blutfauger, (Dilbe) Acarus fanguilugus	/2. I	
Blutschenkel, (Grasbupfer) Gryllus grossus		445
Rimidmuner, (Mante) Cimex laniarius	V.	496
Rintschnabel (Kernbeisser) Loxia languiniroltris	11.	552
Bintschmani, (Droffel) Oriolus hæmorrhous	11.	187
Bintschwani, (Eidechse) Lacerta cruenta		187
Annihitation described and and and		lute

Blutspinne, Aranea sanguinolenta V2. 1076 Blutstreme, (Barsching) Perca Cabrilla IV. 244 Blutsabn, (Schwimmschnecke) Nerita virginea Boa, Serpent — canina, Hundskupf — cenchria, Krieselschlange — enydris, Wasserschlange — hortulana, Gartnet — murina, Mausesanger — hortulana, Gartnet — ill. 145 — murina, Mausesanger — hortulana, Gartnet — ill. 150 — hortulana, Gartnet — ill. 151 — murina, Mausesanger — ill. 161 Bodak, (Mus) polnische Maus Bodak, (poln.) Murmelibier Bockei, (poln.) Murmelibier Bochelties, (boll.) Buckel Bockeles, (boll.) Buckel Bockele	Blutspinne	Bocktoren	51
Blutspinne, Aranea sanguinolenta  Blutsteine, (Barsching) Perca Cabrilla  IV. 244  Blutsabn, (Echwimmschnecke) Nerita virginea Boa, Eerpent  — canina, Hundskupf — cenchria, Krieselschlange — enydris, Wasseret — hortulana, Gattnet — murina, Mausesanget — hortulana, Gattnet — ill. 150 — hortulana, Gattnet — ill. 151 — murina, Mausesanget — hortulana, Gattnet — ill. 151 — murina, Mausesanget — ill. 152 — hortulana, Gattnet — ill. 154 Boar, (engl.) Eber — il. 461 Bobak, (Mus) polnische Maus Bobak, (poln.) Murmelscher — il. 343 Bocca in campo, (ital.) Batzentopf — IV. 72 Bochelties, (boll.) Budel Bochet-tor, (boll.) Budelsafer — bie Merc, (hirschbock) Antilope Capenss Bockborn, (Goldbabnd.) Chrysom. Ceramboides  V. 201 Bockje, (boll.) Bocsschenese — vig6 Bockjes, (boll.) Bocsschenese — vig6 Bockjes, (boll.) Bocsschenese — oas Brusstädischenese — oas Brusstädischenese — bie Brusstäur Eeite mit beweglichen Dornen — bie Brusstaur Eeite mit beweglichen Dornen — bie Brusstaur Eeite mit beweglichen Dornen — bie Brusstaur Eeite mit einem gezähneltem  Rande — breistinger, Cerambyx trilineatus — bie Brusstaur Eeite mit einem gezähneltem  Rande — breistinger, Cerambyx trilineatus — bie Brusstaur Eeite mit einem gezähneltem  Rande — breistinger, Cerambyx trilineatus — bie Brusstaur Eeite mit einen bernigen  Brusscher, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 252  Bocksbort, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  Brusscher, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 258 Bocksbort, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 258 Bocksborten, (poll.) Bocksfer  V. 249 Bocksbortensiline, Sertularia eornuta  VI. 342 Bocksbortensiline, Sertularia eornuta  VI. 342 Bocksbortens, (poll.) Bocksfer  V. 249		7	- 1
Blutstrieme, (Barsching) Perca Cabrilla  Blutzabn, (Schwimmschneck) Nerita virginea Boa, Eerpent  — canina, Dundskupf — cenchria, Krieselschlange — enydris, Wasserschlange — hortulana, Gartner — murina, Mausesánger Boar, (engl.) Eber — Bodak, (Mus) polnische Maus Bodak, (Mus) polnische Maus Bodak, (Mus) polnische Maus Bocca in campo, (ital.) Watzensopf — IV. 72 Bochelties, (boll.) Buckel Bochet-tor, (boll.) Buckelsfer — blauer, (Hirschboch) Antilope Capensis Bockbon, (Goldbadnch.) Chrysom. Ceramboides  Bockje, (boll.) Bockschnecke Bockjes, (boll.) weithe Holzbock Bockjes, (boll.) weithe Holzbock Bockjes, (boll.) weithe Holzbock  Bockjes, (boll.) weithe Holzbock  — afrikanischer, Cerambyx Afer — das Brusskichild ungedornt und rund — das Brusskichild ungedornt und rund — das Brusskichild ungedornt und rund — das Brusskichild ungedornt und rund — das Brussichild ungedornt und rund — v. 271 — das Brussichild este mit einem gegahneltem — Rande — die Brussichild este mit einem gegahneltem — Brussichild este mit einem gegahneltem — W. 262 — des Bockforter, Cerambyx trilineatus — mit rundem, an den Seiten bornigem — Brussichild este mit einem gegahneltem — W. 268  Bockforter, (Machtschild este mit einem gegahneltem — V. 278  Bockformen, (Machtschild este mit einem gegahneltem — V. 268  Bockformen, (Holl.) Boctfafer — V. 249	Blutfpinne, Aranea fanguinolenta		
Blutzabn, (Schwimmschnecke) Nerita virginea Boa, Eerpent — canina, Dundskupf — canina, Dundskupf — cenchria, Krieselschlange — ill. 144 — enydris, Basserschlange — hortulana, Gartner — murina, Mausefanger — Boar, (engl.) Eber — Bobak, (Mus) polnische Maus Bodak, (Mus) polnische Maus Bocca in campo, (ital.) Baszentopf — IV. 49 Bochelties, (boll.) Buckel Bochet-tor, (holl.) Buckelser — blauer, (Hirschbock) Antilope Capensis Bockhanden, Chrysomela caprea — V. 62 Bockhen, (Goldbabnd.) Chrysom. Ceramboides V. 201 Bockje, (holl.) Bockschnecke Bockjes, (boll.) weithe Holzbocke Bockjes, (boll.) weithe Holzbocke — afrikanischer, Cerambyx Afer — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 271 — das Brusskichild ungebornt und rund — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 272 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 272 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 273 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 274 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 275 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 275 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 275 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 275 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 275 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 276 — das Brusskichild ungebornt und rund — v. 277 — das Brusskichild ungebornt und rund — v.		abrilla IV.	244
Boa, Eerpent — III. 144 — canina, Hundstupf — III. 145 — cenchria, Frieselschlange — III. 149 — enydris, Basserschlange — III. 150 — hortulana, Gattner — III. 151 — murina, Mausekanger — III. 151 — murina, Mausekanger — III. 194 Boar, (engl.) Eber — I. 461 Bobak, (Mus) polnische Maus — & 40 Bobak, (poln.) Murmelibter — II. 343 Boca in campo, (ital.) Barzentopf — IV. 72 Bochelties, (boll.) Buckel — VI. 479 Bochet-tor, (holl.) Buckelsafer — VI. 479 Bochet-tor, (holl.) Buckelsafer — VI. 462 Bochhanden, Chrysomela caprea — V. 196 Bockje, (holl.) Bockschneck — VI. 542 Bockjes, (holl.) Bockschneck — VI. 542 Bockjes, (holl.) weiche Holzbock — V. 283 Bockfafer, Cerambyx — V. 249. — 234 — afrikanischer, Cerambyx Afer — 238 — das Brustschild ungebornt und vund — V. 275 — das Brustschild ungebornt und vund — V. 275 — das Brustschild ungebornt und rund — V. 275 — bie Brust zur Seite mit einem gezähneltem — Nande — birchbobeter, Cerambyx perforatus — burchbobeter, Cerambyx perforatus — mit rundem, an den Seiten dornigem — V. 252 — dreislinger, Cerambyx trilineatus — Durchbobeter, Cerambyx perforatus — mit rundem, an den Seiten dornigem — V. 258 Bocksdart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 262 Bocksdart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 262 Bocksdart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 262 Bocksdorten, (holl.) Bocksafer — V. 249 Bocksdorten, (holl.) Bocksafer — V. 249			102
canina, Hundstopf cenchria, Frieselschlange enydris, Basserschlange hortulana, Garner hortulana	Boa, Gerpent	- III.	144
- cenchria, Frieselschlange - III. 149 - enydris, Basserschlange - III. 150 - hortulana, Gartner - III. 151 - murina, Mausesanger - III. 152 - Bobak, (Mus) polnische Maus - E. 40 - Bobak, (poln.) Murmelibier - I. 343 - Bocka in campo, (ital.) Barzentopf - IV. 72 - Bocheltjes, (boll.) Buckel - VI. 459 - Bochet-tor, (holl.) Buckel - VI. 459 - Bochet-tor, (boll.) Buckelsfer - VI. 62 - Bock, Hircus - I. 404 - Bocken, (Goldbabnch.) Chrysomela caprea - V. 196 - Bockben, (Goldbabnch.) Chrysom. Ceramboides V. 201 - Bockjes, (boll.) Bockschneck - VI. 542 - Bockjes, (boll.) Bockschneck - VI. 542 - Bockjes, (boll.) Bockschneck - V. 249 - 234 afrikanischer, Cerambyx Afer - E. 238 - bas Brusstschild ungebornt und ohne Dornen V. 271 - bas Brusstschild ungebornt und rund - V. 275 - bie Brusst zur Eeite mit betveglichen Dornen Brusst zur Eeite mit betveglichen Dornen Brusst zur Eeite mit betveglichen Dornen Brusst zur Eeite mit einem gezähneltem - V. 252 - bie Brusst zur Eeite mit einem gezähneltem - V. 252 - bie Brusst zur Eeite mit einem dezähneltem - V. 252 - bie Brusst zur Eeite mit einem dezähneltem - V. 252 - mit rundem, an den Eeiten dornigem Brusstschilbe - V. 258 - Bocksbart, (Machtschm.) phalæna Tragoponis V. 700 - Bockschoren, (holl.) Bockscher - VI. 542 - Bockschoren, (holl.) Bockscher - V. 249 - Bockschoren, (holl.) Bockscher - V. 249 - Bockschoren, (holl.) Bockscher - V. 249		- III.	145
enydris, Basserschlange hortulana, Gartner murina, Mausefänger Boar, (engl.) Eber Bobak, (Mus) polnische Maus Bodak, (poln.) Murmeltbier Bodak, (poln.) Murmeltbier Bocca in campo, (ital.) Bassensops Bocca in campo, (ital.) Bassensops Bocheltjes, (boll.) Buckel Bochet-tor, (boll.) Buckel Bochet-tor, (boll.) Buckel Bochet-tor, (birschbock) Antilope Capenss Bockbahnchen, Chrysomela caprea Bockbern, (Goldbahnch.) Chrysom. Ceramboides Bockjes, (boll.) Bockschee Bockjes, (boll.) Bockschee Bockjes, (boll.) Bockschee Bockjes, (boll.) Bockschee Bockjes, (boll.) meiche Holzbock Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.) Bockfeste Bockjes, (boll.		- III.	140
— hortulana, Gartner — III. 151 — murina, Mausefanger — III. 194 Boar, (engl.) Eber — I. 461 Bobak, (Mus) polnische Maus — & 40 Bobak, (poln.) Murmelther — I. 343 Bocca in campo, (ital.) Barzentopf — IV. 72 Bocheltjes, (holl.) Buckel — VI. 459 Bochet-tor, (holl.) Buckel — VI. 459 Bochet-tor, (holl.) Buckel — VI. 464 — blauer, (hirschbock) Antilope Capensis — 52 Bockhahnchen, Chrysomela caprea — V. 196 Bockjes, (holl.) Bockschneck — VI. 542 Bockjes, (holl.) Bockschneck — VI. 542 Bockjes, (boll.) weiche Holzbock — V. 283 Bockfafer, Cerambyx — V. 249. — 234 — — afrikanischer, Cerambyx Afer — — das Brustschild ungebornt und rund — V. 275 — — das Brustschild ungebornt und rund — V. 275 — — die Brust zur Seite mit beweglichen Dorinen Besetz — V. 252 — — drehliniger, Cerambyx trilineatus — V. 252 — brehliniger, Cerambyx trilineatus — Sc. 244 — — mit rundem, an den Seiten dornigem — V. 258 Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 258 Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 258 Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 258 Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis — V. 269 Bocksbornforalline, Sertularia cornuta — VI2, 799 Bocksbornforalline, Sertularia cornuta — V. 249		- 111	150
Boar, (engl.) Eber I. 461 Bobak, (Mus) polnische Maus E. 40 Bobak, (poln.) Murmeltbier I. 343 Bocca in campo, (ital.) Barzentopf IV. 72 Bocheltjes, (holl.) Buckel VI. 459 Bochet-tor, (holl.) Buckel VI. 459 Bochet-tor, (holl.) Buckel VI. 459 Bochband, (Chrysomela caprea V. 196 Bochband, (Chrysomela caprea V. 196 Bockjes, (holl.) Bocksche Ceramboides V. 201 Bockjes, (holl.) Bocksche V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockjes, (holl.) meiche Holzbock V. 249 Bockfer, Cerambyx Afer E. 238 Brustschilde V. 275  Bockfer, Cerambyx trilineatus V. 275  Bocksbort, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bocksbort, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bocksbortschalline, Sertularia cornuta VI. 342 Bockstoren, (holl.) Bockfafer V. 249		- 111.	151
Boar, (engl.) Eber 1. 461 Bobak, (Mus) polnische Maus 6. 40 Bobak, (poln.) Murmeltbier 1. 343 Bocca în campo, (ital.) Barzentopf 1. V. 72 Bocheltjes, (boll.) Buckel VI. 459 Bochet-tor, (holl.) Buckelfafer V. 62 Boch, Hircus 1. 404 — blauer, (hirschboch) Antilope Capensis 5. 52 Bochdahnchen, Chrysomela caprea V. 196 Bockjes, (boll.) Bockschee V. 201 Bockjes, (boll.) Bockschee V. 249 Bockjes, (boll.) Bockschee V. 249 Bockjes, (boll.) weiche Holzbocke V. 249 — afrikanischer, Cerambyx Afer 6. 238 — afrikanischer, Cerambyx Afer 6. 238 — bas Bruststück chlindrisch und ohne Dornen V. 271 — das Bruststück chlindrisch und ohne Dornen V. 271 — bas Bruststück eite mit einem gezähneltem Rande V. 262 — bie Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande V. 262 — breihliniger, Cerambyx trilineatus 6. 240 — burchbobrter, Cerambyx perforatus 6. 241 — mit rundem, an den Seiten bornigem Brustschilde V. 258 Bocksdart, (Nachtschm.) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI. 362 Bockstoren, (boll.) Bocksafer V. 249 Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI. 362 Bockstoren, (boll.) Bocksafer V. 249		- UI	104
Bobak, (Mus) polnische Maus  Bobak, (poln) Murmelsbier  Bocca in campo, (ital.) Barzentopf  Iv. 72  Bocheltjes, (boll.) Buckel  Bochet tor, (boll.) Buckelfafer  Boch, Hircus  blauer, (hirschbock) Antilope Capenss  Sockbähnchen, Chrysomela caprea  V. 196  Bockjes, (boll.) Bockschneck  Bockjes, (boll.) Bockschneck  Bockjes, (boll.) Bockschneck  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Bockschaft, Cerambyx frilineatus  Brustschild ungebornt und rund  V. 272  Bocksbort, (Cerambyx frilineatus  Brustschild ungebornt und rund  W. 262  Bocksbort, (Machtschm) phalæna Tragoponis  V. 263  Bocksbortschild ungebornt and ben Geiten bornigent  Brustschild ungebornt entitent gezähneltent  Brustschild ungebornt entitent gezähneltent  Brustschild ungebornt und rund  V. 262  Bocksbort, (Machtschm) phalæna Tragoponis  V. 268  Bocksbortschild ungebornt und  VI. 342  Bocksbortschild ungebornt und  Brustschild ungebornt und  Brustschild ungebornt und rund  V. 262  Bocksbortschild ungebornt und rund  V. 263  Bocksbortschild ungebornt und rund  V. 264  Bocksbortschild ungebornt und rund  V. 263  Bocksbortschild ungebornt und rund  V. 264  Bocksbortschild ungebornt und rund  V. 265  B		- 1	461
Bobak, (poln) Murmelibier  Bocca in campo, (ital.) Barzentopf  Iv. 72  Bochelties, (boll.) Buckel  Bochet tor, (boll.) Buckel  Bochet tor, (boll.) Buckelfafer  Bock, Hircus  blauer, (Hirschbock) Antilope Capensis  Socthändichen, Chrysomela caprea  Vi96  Bockje, (boll.) Bockschneck  Bockje, (boll.) Bockschneck  Bockjes, (boll.) Bockschneck  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Bockjes, (boll.) meiche Holzbock  Bockjes, (boll.) meiche Holzbock  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Wish  Bockfest, Cerambyx  Bockfest wit einem Gezähneltem  Rande  Brustschild ungedornt und rund  Wish  Bockfest wit einem Gezähneltem  Rande  Brustschild ungedornt und rund  Wish  Bockfest wit einem Gezähneltem  Rande  Brustschild ungedornt und rund  Wish  Bockfest wit einem Gezähneltem  Rande  Brustschild ungedornt und rund  Wish  Bockfest wit einem Gezähneltem  Rande  Brustschild ungedornt und rund  Wish  Bockfest with einem Gezähneltem  Rande  Wish  Bockschild wann, an den Seiten dornigem  Brustschild  Brustschild  Wish  Bockschornforalline, Sertularia cornuta  Viz. 862  Bocktoren, (holl.) Bockscher  Viz. 449			
Bockeltjes, (boll.) Buckel Bocheltjes, (boll.) Buckel Bochet-tor, (boll.) Buckel Bochet-tor, (boll.) Buckelfafer  V. 62 Boch, Hrcus  — blauer, (hirschboch) Antilope Capenlis Sockhähnchen, Chrysomela caprea  V. 196 Bockje, (boll.) Bockchnecke Bockjes, (boll.) Bockchnecke Bockjes, (boll.) Bockchnecke Bockjes, (boll.) Bockchnecke V. 283 Bockfafer, Cerambyx  — afrikanischer, Cerambyx Afer  — das Bruskschild ungebornt und ohne Dornen V. 271  — das Bruskschild ungebornt und rund  V. 275  — die Brusk zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  — brehliniger, Cerambyx trilineatus  — brehliniger, Cerambyx trilineatus  — brehliniger, Cerambyx perforatus  — mit rundem, an den Seiten dornigem  Bruskschilde  — wirtschilde  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 258 Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 269 Bocksbornforalline, Sertularia cornuta  Bocksbornforalline, Sertularia cornuta  Viz. 799 Bocksbornforalline, Sertularia cornuta  Viz. 862 Bocktoren, (holl.) Bocktafer  V. 249			
Bocheltjes, (holl.) Buckel  Bochet-tor, (holl.) Buckelfafer  Boch, Hircus  Boch, Hircus  Bockhahnden, Chrysomela caprea  Bockbern, (Goldbahnd.) Chrysom. Ceramboides  Bockje, (holl.) Bockhneck  Bockjes, (holl.) Bockhneck  Bockjes, (holl.) Bockhneck  Bockjes, (holl.) weiche Holzbock  Bockjes, (holl.) weiche Holzbock  Bockjes, (holl.) weiche Holzbock  Bockjes, (holl.) weiche Holzbock  Bockjes, (boll.) weiche Holzbock  Bockjes, (holl.) weiche Holzbock  Bockjes, (holl.) weiche Holzbock  Bockfer, Cerambyx  V. 249. E. 234  V. 249. E. 234  V. 249. E. 234  V. 249. E. 234  E. 238  Bockfer, Cerambyx Afer  Bockfer, Cerambyx Afer  Bockfeyt	Bocca in campo, (ital.) Wartento	of - IV	70
Bochet-tor, (holl.) Buckeltafer  Sock, Hircus  — blauer, (Hirschbock) Antilope Capensis  Sockhähnchen, Chrysomela caprea  — V. 196  Bockbern, (Goldbahnch.) Chrysom. Ceramboides  V. 201  Bockje, (holl.) Bocksche — VI. 542  Bockjes, (holl.) Bocksche — V. 283  Bockses, (boll.) weiche Holzbocke — V. 249. S. 234  — afrikanischer, Cerambyx Afer — C. 238  — das Brustschild ungebornt und ohne Dornen V. 271  — das Brustschild ungebornt und rund — V. 272  — die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 271  — die Brust zur Seite mit einem gezähneltem — V. 252  — dreibliniger, Cerambyx trilineatus — V. 252  — durchbobeter, Cerambyx trilineatus — S. 240  — durchbobeter, Cerambyx trilineatus — V. 252  — mit rundem, an den Seiten bornigem — V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis — V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis — V. 258  Bocksbart, Turbo Pullus — VI. 542  Bocksbornforalline, Sertularia cornuta — VI2. 799  Bocksbornforalline, Sertularia cornuta — VI2. 862  Bockstoren, (holl.) Bocksafer — V. 249	Bochelties, (boll.) Budel		
Bock, Hircus  — blauer, (Hirschbock) Antilope Capensis  Sockhähnchen, Chrysomela caprea  — V. 196  Bockhern, (Goldhähnch.) Chrysom. Ceramboides  V. 201  Bockje, (hou.) Bockschnecke  — VI. 542  Bockjes, (hou.) weiche Holzböcke  — deritanischer, Cerambyx Afer  — deritanischer, Cerambyx Afer  — das Brustschild ungebornt und ohne Dornen V. 271  — das Brustschild ungebornt und rund  — die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 275  — die Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  — dreißlinger, Cerambyx trilineatus  — dreißlinger, Cerambyx trilineatus  — durchbobeter, Cerambyx trilineatus  — durchbobeter, Cerambyx trilineatus  — durchbobeter, Cerambyx perforatus  — mit rundem, an den Seiten bornigem  Brustschilde  — W. 252  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 258  Bocksbart, Turbo Pullus  Bockschornforalline, Sertularia cornuta  Bocksbornforalline, Sertularia cornuta  V. 249  V. 249	Bochet - tor. (boll.) Budeltafer	V	419
Blauer, (Hirschbod) Antilope Capensis Sochhähnchen, Chrysomela caprea V. 196 Bockbern, (Goldhahnch.) Chrysom. Ceramboides V. 201 Bockje, (holl.) Bockschnede Bockjes, (holl.) Bockschnede V. 283 Bocksches, (boll.) weiche Holzbocke V. 283 Bocksches, (boll.) weiche Holzbocke V. 283 Bocksches, (boll.) weiche Holzbocke V. 249. E. 234 — afrikanischer, Cerambyx Afer V. 249. E. 234 — afrikanischer, Cerambyx Afer E bas Brustschild ungebornt und ohne Dornen V. 271 — bas Brustschild ungebornt und rund V. 277 — bie Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 271 — bie Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande V. 252 — breisliniger, Cerambyx trilineatus E brustschilder, Cerambyx trilineatus E burchbobeter, Cerambyx trilineatus E 240 — burchbobeter, Cerambyx perforatus E 241 — mit rundem, an den Seiten bornigem Brustschilde V. 258 Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschart, Turbo Pullus Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI2. 862 Bockstoren, (holl.) Bocksafer V. 249			
Sockhähnchen, Chrysomela caprea V. 196 Sockhern, (Goldbahnch.) Chrysom. Ceramboides V. 201 Bockjes, (hou.) Bockschnecke VI. 542 Bockjes, (hou.) Bockschnecke V. 283 Sockfäser, Cerambyx V. 249. E. 234 — afrikanischer, Cerambyx Afer E. 238 — das Brustschild ungebornt und ohne Dornen V. 271 — das Brustschild ungebornt und rund V. 275 — die Brust zur Seite mit deweglichen Dorinen Beseht V. 251 — die Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande V. 252 — dreihlinger, Cerambyx trilineatus S. 240 — durchbobeter, Cerambyx trilineatus S. 241 — mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschilde V. 258  Socksbart, (Rachtschild) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschorter, Turbo Pullus VI. 542 Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI2. 862 Bockstoren, (holl.) Bocksafer V. 249		Capenfis @	500
Bockjes, (houl.) Bockchnecke V. 201 Bockjes, (houl.) Bockchnecke VI. 542 Bockjes, (houl.) Weiche Holzbocke V. 283 Bockfafer, Cerambyx V. 249. E. 234 — afrikanischer, Cerambyx Afer E. 238 — aas Brustschild und ohne Dornen V. 271 — bas Brustschild ungebornt und rund V. 275 — bie Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 251 — bie Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande V. 252 — breilliniger, Cerambyx trilineatus E. 240 — burchbobrter, Cerambyx trilineatus E. 241 — mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschilde V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschaft, Turbo Pullus VI. 542 Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI2. 862 Bocktoren; (holl.) Bockfafer V. 249	Bochabuchen, Chrysomela caprea	- V	ink
Bockjes, (holl.) Bockschnecke  Bockjes, (holl.) weiche Holzbocke  V. 283  Bockfafer, Cerambyx  — afrikanischer, Cerambyx Afer  — derikanischer, Cerambyx Afer  — das Brustschild ungebornt und ohne Dornen V. 271  — das Brustschild ungebornt und rund  V. 275  — die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 271  — die Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  V. 252  — dreisliniger, Cerambyx trilineatus  — durchbobrter, Cerambyx trilineatus  — durchbobrter, Cerambyx perforatus  — mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockschornforalline, Sertularia cornuta  Bockstoren; (holl.) Bockfafer  V. 249	Bochbern, (Goldbabnch.) Chryfom	Ceramboides V	190
Bockjes, (holl.) weiche Holzbocke  V. 283  Bockfafer, Cerambyx  — afrikanischer, Cerambyx Afer  — des Bruststück chlindrisch und ohne Dornen V. 271  — das Brustschild ungedornt und rund  — die Brust zur Seite mit deweglichen Dornen V. 275  — die Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  — bie Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  — breisliniger, Cerambyx trilineatus  — durchbobrter, Cerambyx trilineatus  — durchbobrter, Cerambyx perforatus  — mit rundem, an den Seisen dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockschortschilde, Sertularia cornuta  Bockschoren; (holl.) Bockfaser  — V. 249	Bockies (hou.) Bocfcbnecke	⇒ VI	7.40
Bockfafer, Cerambyx  - defrikanischer, Cerambyx Afer  - defrikanischer, Cerambyx Afer  - defrikanischer, Cerambyx Afer  - def Brustitud chlindrisch und ohne Dornen V. 271  - das Brustischild ungedornt und rund  V. 275  - die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 251  - die Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  V. 252  - dreiblinger, Cerambyx trilineatus  - durchbobrter, Cerambyx trilineatus  - durchbobrter, Cerambyx perforatus  - mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockschortes, Turbo Pullus  VI. 542  Bockschorten, (holl.) Bockfafer  V. 249		. V	192
- derikanischer, Cerambyx Afer - das Bruststück enlindrisch und ohne Dornen V. 271 - das Brustschild ungedornt und rund - die Brust zur Seite mit beweglichen Dornen V. 275 - die Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande - dreibliniger, Cerambyx trilineatus - durchbobeter, Cerambyx trilineatus - mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschilde - V. 252 - mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschilde - V. 258 Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschorter, Turbo Pullus - VI. 542 Bockschornforalline, Sertularia cornuta - VI2. 799 Bocksbornforalline, Sertularia cornuta - VI2. 862 Bocktoren; (holl.) Bocksafer		V. 240. 6	403
- das Bruststück chlindrisch und ohne Dornen V. 271 - das Brustschild ungedornt und rund V. 275 - die Brust zur Seite mit deweglichen Dornen V. 275 - die Brust zur Seite mit deweglichen Dornen V. 252 - die Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande V. 252 - drehliniger, Cerambyx trilineatus S. 240 - durchbobrter, Cerambyx perforatus S. 241 - mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschilde V. 258 Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschaft, (Nachtschm) phalæna Tragoponis VI. 542 Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI. 862 Bocktoren, (holl.) Bocksafer V. 249		Afer &	224
- bas Brustschild ungedornt und rund  - die Brust zur Seite mit beweglichen Dorinen Besetzt  - die Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  - dreifliniger, Cerambyx trilineatus  - durchbobeter, Cerambyx perforatus  - mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockschornforalline, Sertularia cornuta  Bockstoren; (holl.) Bockfaser  V. 249	= - bas Bruftfict enlindrifch u	ind ohne Darnen V	-30
- die Brust zur Seite mit beweglichen Dorinen beseite mit einem gezähneltem  V. 252  - die Brust zur Seite mit einem gezähneltem  Rande  V. 252  - breihliniger, Cerambyx trilineatus  - burchbobeter, Cerambyx perforatus  - mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockschaft, Turbo Pullus  VI. 542  Bockschornforalline, Sertularia cornuta  VI2. 862  Bocktoren; (holl.) Bockfaser  V. 249	- bas Bruftidild undebornt		
nien Besetht  — die Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande  — breiliniger, Cerambyx trilineatus  — burchbobeter, Cerambyx perforatus  — mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde  — V. 252  — mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockschote, Turbo Pullus  Bockschotens, Spongia hircina  VI. 542  Bockschotens, (holl.) Bockfaser  V. 249			75
— bie Brust zur Seite mit einem gezähneltem Rande  V. 252  — breiliniger, Cerambyx trilineatus — burchbobeter, Cerambyx perforatus — mit rundem, an den Seiten dornigem Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700  Bockschaft, Turbo Pullus  VI. 542  Bockschornforalline, Sertularia cornuta  Bockschoren, (holl.) Bockfafer  V. 249			
Rande  — breiliniger, Cerambyx trilineatus  — burchbobrter, Cerambyx perforatus  — mit rundem, an den Seisen dornigem  Brustschilde  V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis  V. 700  Bockscheefe, Turbo Pullus  Bockschoenforalline, Sertularia cornuta  Bockschoenforalline, Sertularia cornuta  VI2. 862  Bocktoren; (holl.) Bocksafer  V. 249		em desabneltem	., .
- breiliniger, Cerambyx trilineatus - burchbobrter, Cerambyx perforatus - mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700  Bockscheefe, Turbo Pullus VI. 342  Bockschornforalline, Sertularia cornuta VI2: 862  Bocktoren; (holl.) Bocksafer V. 249			200
— burchbobrter, Cerambyx perforatus ©. 241 — mit rundem, an den Seisen dornigem  Brustschilde V. 258  Bocksbart, (Nachtschm) phalæna Tragoponis V. 700  Bockschnecke, Turbo Pullus VI. 542  Bockschonforalline, Sertularia cornuta VI2. 862  Bocktoren, (holl.) Bocksafer V. 249	- brebliniger, Cerambyx tr	ilineatus 6	40
— mit rundem, an den Seiten dornigem  Brustschilde — V. 258  Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700  Bockschnede, Turbo Pullus VI. 542  Bockschounten, Spongia hircina VI2. 799  Bockschounteralline, Sertularia cornuta VI2. 862  Bocktoren, (holl.) Bocksafer — V. 249			at
Brustschilde V. 258 Bocksbart, (Nachtschim) phalæna Tragoponis Bockschinede, Turbo Pullus Bockschounteralline, Sertularia cornuta Bockschounteralline, Sectularia cornuta			
Bocksbart, (Rachtschm) phalæna Tragoponis V. 700 Bockschnede, Turbo Pullus Bockschounteralline, Sertularia cornuta Bockschounteralline, Sectularia cornuta Bockschounteralline, Sectularia cornuta VI2: 862 V. 249			258
Bocksbornforalline, Sertularia cornuta Bockstoren; (holl.) Bockfafer  VI. 542 VI2. 799 VI2. 862 V. 249			
Bocksbornforalline, Sertularia cornuta  Bocksbornforalline, Sertularia cornuta  VI2. 799  VI2. 862  Bucktoren; (holl.) Bockfafer  V. 249			42
Bocktoren; (holl.) Bocktafer = V. 249		VI2	do
Becktoren, (holl.) Bodtafer - V. 249		iuta Vie s	62
		Boen	-01

	Th.	€.
Boere-boon, (holl.) Caubohire -	VI.	227
Boere-boon-doublet, (hou.) Bartfneifer	VI.	223
Boere-jonge, (holl.) Bauernjunge	VI.	
Boere-Musiek, (holl.) Bquernmuste -	VI.	
Boerc-Musiek, (bell.) wilde Duft -	VI.	
Boeren-Zwalluw, (holl) Sausschwalbe		632
Boertje, (holl.) Oliventern	VI.	
Botcherbobrer, (Blafe) Bulla Terebellum	VI.	
granulirter, (Eute) Conus Nussatelle		
Boeuf, (fr.) Dasse -		431
Boeuf-marin, (fr.) Seetub -		175
Boga, (ital.) Grofauge -	IV.	
Bogenband, (Rachtschm.) Phalæna Wilkella		754
Bogenbinbe, (Rachtschm.) Phalæna arcuana		726
Bogenfisch, Chætodon arcuatus -	IV.	
Bogenfled, (Rachtfchm.) Phalæna cruciana		731
Bogenflügel, (Nachtschm.) Phalæna lupulina		680
	VI2.	
Bogenruden, (Citabe) Cicada fornicata		455
	V2. 1	
Bogenstrich, (Solzbock) Leptura arcuata		289
Bohne, (Walze) Voluta Faba -	VI.	
- rothe, (Tellmuschel) Tellina Balthica	VI.	241
- fcwarze, (Kinkhorn) Buccinum prærolum	VI.	465
Bohrer, (Raupentoder) Ichneumon punctator	V2.	
Bohrkafer, Ptini -		H
Bohrmuschel, Anomia scobinata -	VI.	
Boicininga, Boiconininga, (ind.) Klapperschlange		
Boigiacu, Boitiapo, (braf.) Brunette, (Natter)	III.	
Boiguacu, (bras.) Argusnatter -		208
Boiguacu, (ind.) Königeschlange -	III.	147
Boiguathara, (amboin.) gemablte Schlange	111.	
Bojobi, (cenlan.) hundstopf	III,	
Bois veine, (fr.) wilde Musik	VI.	
Bolgetting, (schwed.) Hornisse -	V2.	
Bolina, (Papilio) gestecter Mohr -		614
Bologneser Sund, Canis Meliteus -	_	208
ı	R	om-

Bombici, (ital.) Seibenwürmer - V. 660 Bombos, (afr.) Krefodill - III. 79 Bombyces, (Phalænæ) Spinner - V. 656 Bombycilla Bohemica, Seidenschwanz - II. 541 Bombylius, Schweber - V2. 1007 ater, schwebender Wehr - V2. 1008 Capensis, Afrikaner - V2. 1008 major, großer Schweber - V2. 1007	Bombici	Bos	53
Bombici, (ital.) Seibenwürmer - V. 660  Bombos, (afr.) Krofodill - III. 79  Bombyces, (Phalænæ) Spinner - V. 656  Bombycilla Bohemica, Seidenschwanz - II. 541  Bombylius, Schweber - V2. 1007  ater, schwebender Wohr - V2. 1008  Capensis, Afrikaner - V2. 1008	<b>,</b>		Th. G.
Bombos, (afr.) Krotodil III. 79 Bombyces, (Phalænæ) Spinner V. 656 Bombycilla Bohemica, Seidenschwanz II. 541 Bombylius, Schweber V2. 1007 ater, schwebender Wohr V2. 1008 Capensis, Afrikaner V2. 1008	Bombici, (ital.) Seibenwurmer		
Bombyces, (Phalænæ) Spinner  Bombycilla Bohemica, Seidenschwanz  Bombylius, Schweber  - ater, schwebender Mohr  - Capensis, Afrikaner  V. 656  II. 541  V2. 1007  V2. 1008  V2. 1008		. /	
Bombyeilla Bohemica, Seidenschwanz  Bombylius, Schweber  - ater, schwebender Mohr  - Capensis, Afrikaner  V2. 1008  V2. 1008		1	
Bombylius, Schweber V2. 1007  — — ater, schwebender Mohr V2. 1008  — — Capensis, Afrikaner V2. 1008			
ater, schwebender Mehr - V2. 1008 Capensis, Afrikaner - V2. 1008		. ,	
Caponsis, Afritaner - V2. 1008		4	
그는 그 사람들이 되었다. 그 경기를 받는 내용 사람들이 되었다면 되었다면 되었다면 그 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없는 것이 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 다른 것이다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없		-	
			V2, 1007
medius, mittlerer Schweber V2. 1008			
minor, fleiner Schweber - V2. 1008			
Bombylus, hummel - V2. 902			
Bonano, (Oriolus) Pifangdroffel - 11. 189			
Bonasia, (Tetrao) Saselhubn - II. 485			
Bonafins, (Bos) milber, (Giebenburgifcher) Dchfe 1. 437. 439		r)Ochfe	1 427. 439
Bondree, (fr. ) Bienenfreffer Falte, (Maufefalte) 11. 79. 89	Bondree, (fr. ) Bienenfreffer Ralfe, (Da	ifefalfe)	II. 70. 89
Bone-fishes, (engl.) Murmelfische - IV. 361			
Boncifich, (Mafrele) Scomber Pelamis IV. 259		s	
Bonnetje, (boll.) Sternpatelle - VI. 607		-	
Bonite, (fr.) Bonetfisch - IV. 259			
Bonte- Haay, (boff.) Sundshaapsisch III. 262			
Bonte - Kraay, (boll ) Rebelfrabe - II. 174	Bonte - Kraay, (boll ) Rebelfrabe	-	
Bonte Olyphantje, (boll.) Labrice - V. 224		-	
Bonte-Zilvermond, (boll.) bunter Gilbernund VI. 550		lbernun	
Booby, weisser Fischervogel - 11. 332		ency	
Boomkruiper, (holl.) Baumlaufer - II. 253			
Boomslak, (boll.) Baumschnecke - VI. 571			VI. 571
Boom uiltje, (boll.) Baumeule - II. 99		-	11, 99
Boontje, (hoff.) Bohne - VI. 423			VI. 423
Boops, (griech.) Dchfenaugenfisch - IV. 185		100	IV. 185
Boorworm, (holl.) Solibobrer - VI. 631			
Bootshaak, (hell.) Bootsbaafe - VI. 477		-	
Bootsbaafe, Strombus Chiragra VI, 476		1.64	
Bordelere, (fr.) Blide, Blene - IV. 399		-	IV. 399
Borftenfeder, Pennatula antennina - VI2. 890		-	VI2. 890
Borftenfloffe, (Bering) Clupea Thriffa IV. 374			
Borftenfloffe, (Meerbrachfem,) Sparus Chromis IV. 186			
Borfuk, (poln.) Dache - I. 281		4	
Bos, Dafe - 1. 431, 6. 57		1. 4	
D <sub>3</sub> Bos <sub>a</sub>	Da		

	Şħ.	€.
Bos bubalis, großer Buffel -		441
- grunnicus, Brummochse -		441
- indicus, Imerghuffel		442
Bos - (Bus.) Thalattigs, Seeffier -		243
Bolchas. (Anas) gemeine Ente	11.	299
Boskas, (griech) Winterhalbente :		296
Boffe, (engl.) Salmbarich .		228
Bollue, (fr ) ber Jambus -	VÌ.	
Bostrapp, (boll.) Stiege	VÌ.	
Botargo, (ital.) Cavigy -		352
Boter toot, (boll ) Buttertute -	VΙ,	
Boterel, Batterol, (fr.) gemeine Rrote -	m.	
Bottatrifta, Trufche, Malruppe	IV.	96
Bottelichyerkorallyn, (boll ) Burftenfaralline	VI2.	
Bothenfdild, (Sanblaufer) Cicindela flavipes		330
Pothnier, (Goldbabnchen) Chrysomela Bothnica		192
Bottlenose, (engl.) Geepapagen		311
Botto, (ital.) gemeine Rrote	111.	13
Bouc, (fr.) Bod -	•	404
Bouc-Etain, Bouquetin, Bouctain, (fr.) Steinbod		407
Bouclier, (fr.) Tobengraber, (Seidentrauer) V.		127
Bouclier - de - tortue, (fr.) Schildfrotenschild		613
Bouffron, (fr.) Dintenfifc -		115
Boulerot, (fr.) Grundel		126
Boulon de mer, (fr.) Ceeball -		148
Bounce, (engl.) Dundsbaanfisch -		262
Bouquettin, (fr.) Gemfe -	S.	53
Bourboner, (Bliegenfanger) Mulcicapa Bourba		4.4
nenlis -		171
Bourboner, (Rernbeiffer) Loxia Bourbonensis		154
Bourdon, (fr.) Hummel -	V2.	
Boulier, (fr.) Difttafer -	V.	16
Boulouflou, (fr.) Blafer -	III.	312
Bout de l'etun, cajanifcher Mabenfreffer		165
Boutlier, (fr.) Rogelroche -	111.	
Bouton de Camisole, (fr.) Pharaoschnecke	٧I.	
Bouton de la Chine, (fr.) Piramide -	ΫI.	
Bouvreuil, (Loxia) Raper -		154
The state of the s	Ļ	}ou-

Bouvreuil	Brandvlakje	55
•	• •	₹b. <b>G</b> ,
Bouvreuil noir, (fr.) fcmarget	<b>C</b> olbfint	IL 150
Bouvreuil, (fr.) Thumpfaffe	-	II. 547
Bove marino, (ital.) Sectalb	_	I. 194
Brachionus, Seegallert	•	Vl2, 665
acinosus, Connens	dirmwirbel	VI2. 874
capsuliflorus, Krug	gwirbel	VI2. 877
tubifex, Rohrenpo		VI. 635
Brachvogel, Tantalus	· II. 389	. <b>5</b> . 113
Bradypus, Faulthier		L 177
- didactylus, 3menfing	erige <b>s -</b>	I. 179
- tridactylus, prenfinge	riges 😓	I. 177
Braunling, (Sockfafer) Ceramb	yx luridus	V. 277
Brainstone, (engl.) Gebirnftein		VI2. 679
Brama (Cyprinus) Flugbrachs	rm -	ĮV. 3 <b>98</b>
Brambling, (engl.) Schneeamn	ier, Bergfinke II.	560. 58E
Brame de mer, (fr.) Meerbrad		IV. 176
Brancha, Branchua, (Ital.) Be	rnhardu <b>s</b>	V2. 1119
Branchiostega, Riemenbedel		ĮV. 125
Branchiostegi, Schwimmende 2	mphibien mit Beir	h ***
phren	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	III. 228
Brandaris, (boll.) bornigen Sch	neplentopf	VL 495
Brandeule, Strix stridula	7	II. 103
Brandfint, Fringilla flammea		II. 590
Brandsteff, (Porgell.) Cyprea f	Airma	VI. 400
Brandfleck, (Ruffelt) Curculio	itigma +	V. 230
Brandflugel, (Erdfafer) Carabu		V. 365
Brandflügel, (Rachtschm.) Phale	sus cicissi	V, 672
Brandgans, Anas tadorna	-	II. 279
Brandgopfe, (engl.) Ringelgani Brandborn, (Stachelschnede) M		II. 286
Brandforn, (Infusionsthiereben)	Chees Militare	VĮ. 499 VI2. 922
Brandmaal, (Schlupfwespe) Ter	Ulaus Ululagu,	V2. 825
Brandmeise, (Kohlmeise)	rimenà himiri	II. 626
Brandon d' amour, (ft.) Sief	fanne –	VI. 630
Brandrand, (Rachtschm.) Phalæ	na ustella	V. 743
Brandsys, (boll.) Brandfint		11. 590
Brandfpige, (Machtichm.) Phal.	Harrifella	V. 756
Brandvlakje, (boll.) Brandflect		VI. 400
I	0 4	Brand.

•	Th.	♂.
Brandvogel, (fcmarze Meerschmalbe)	H,	353
Braque de Bengale, (fr.) Sund mit bangenden Dhr	en S	. 27
Brasslaner, (hummel) Apis Brasiliana	V2.	
Bratfisch, (Karpf) Cyprinus leses -	IV.	394
Braunauge, (Nachtschm.). Phalmna Batis		682
Braunband, (Schlupfwespe) Tenthredo fasciata	V2.	824
Braunband, (Schnirkelichnecke) Helix icabra	VI.	567
Braunbauch, (Schlupfwespe) Tenthredo lurida	<b>V</b> 2.	831
Sraynbrust, (Lerche). Alauda Calandra	Œ.	137
Braundecke, (Springkafer) Elater brunneus	- <b>V</b> .	320
Brauneule, (Baffereulchen) Phryganea fusca	V2.	789
Braunfisch, (Delphin) Delphinus Phocoena	ı,	504
Braunsted, (Langfuß) Tipula bimaculata	V2.	934
Braunfleck, (Nachtschm) Phal. Alstromeriana	V.	729
Braunflügel, (Baftardweipe) Sphex gibba	V2.	873
Braunflügel, (Cifade) Cicada rubra	V.	466
Braunflugel, (Gotobahnchen) Chrysomela kurida	<b>V.</b>	173
Braunflügel, (Tagschm.) Papilio Hesione	<b>&amp;</b> .	292
Braunflugel, (Lagschm.), Pepilio Patrockus	<b>V.</b>	573
Brannfrett, Viverra fusca -	Œ.	34
Braunfuß, (Raubtafer), Staphylinus Fuscipes	V.	394
Braunfutter, (Rachtschm.) Phalæna Gouana	V.	730
Braunhaft, (Tagtbierchen) Ephemera juscata	V2.	
Braunborn, (Goldhahnchen) Chry fomola fuscicorni	s V.	1.84
Braunfehlchen, Motacilla rubeta -		609
Braunkehle, (Papagen) Plutacus æruginosus		137
Brauntopf, (Droffel) Oriolus melanocephalus		187
Brauntopf, (Papagen) Plittacus accipitrinus		147
Braunlippe, Venus Meretrix -	VI.	
Braunnialve, (Tagfchm) Papilio Tages	V.	
Braunmond, (Cagichm) Papilio Belia	V.	
Braunrand, (Goldhabnchen) Chry somela Castanzei	V.	177
Braunrand, (Rlippfleber) Patella fusca .	VI.	_
	2, 1	-
Braunrock, (Springfafer) Elater caftaneus	<b>V</b> .	
Braunrucken, (Fint) Fringilla cerata -	Œ.	
Braunsaum, (Cifade) Cicada Capensis -	V.	
Braunsaum, (Rachtschm.) Phalmna simbata	<b>V.</b> :	
•	Brg	HIA

	Th.	S.
Breitflugel, (BBaffertafer) Dytileus latiffimus	_	347
Breitfuß, (Rrabbe) Cancer depurator	V2.	
Breitfuß (Meelfafer) Tenebrio Latipes		376
Breitbale, (Rafer) Scarabæus laticollis	V.	69
Breitflaffer, (Riaffmufchel) Mya Perna		223
Breittopf, (Tobengraber) Sylpha reticulata		13Q
Breitling, (Blide, Blepe) -		399
Breitmaul, (Ballfifch, Balæna Musculus		492
Breitrand, (Mondschnede) Turbo Lincina		555
Breitrippe, (Arche) Arca fenilis -		296
Breitfaum, (Connenfafer) Coccinella margina	a V.	147
Breitschnabel, (Ente) Anas Glaucion -		293
Breitschwang, (Malschlange) Anguis laticauda		217
Breitschwanz, (Kernbeisser) Loxia laticauda	6.	151
Breitschmang, (Matter) Coluber laticaudatus	III.	187
Breitschwang, (Taube) Columba laticauda	IJ.	107
Breitstreif, (Lagschn.) Papilio Agenor		579
Breme, (fr.) Blugbrachsem -	IV.	398
Bremsen, Ocstri - V2, 92	s, G,	333
Bremsen, (boll.) Biehbremen -		982
Brenner, (Bastardwespe) Sphex fervens	V2.	866
Brenneffellaue, Aphis Urticæ		519
Brenta, (engl.) Ringelgans -		286
Brigt, ein Englander, mog 578 Pfnmb -		3
Brille, (Rachtschm.) Phalæna Perspicillaris		693
Brillenbogen, (Rachtschm.) Phal. conspicillaris		693
Brillenente, Anas perspiciflata +		293
Brillenschlange, (Ratter) Coluber Naja -		184
Brillentrager, (Grashipfer) Gryllus perspicillate		446
Brillnafe, (Fledermans) Vespertilio perspicillat		154
Briscis, (Papilio) Blindauge -	_	602
Briffons Eintheilung der Thiere -	L	•
Brocard de Soye, (fr.) Kronenbad -		384
Brochet, (fr.) Pecht -	IV.	
Brock, (engl.) Dachs		<b>281</b>
Brodatare, (schwed.) Offindianer, (Kaderlad)	_	405
Probfresser, (Rleintafer) Dermestes paniceus		107
Problémann, Spongia panicea	VI2.	
	<b>.</b>	3robi

`	Th. E.
Brustrinne, (Erbstob) Mordella paradoxa	V. 385
Bruftstrich, (Rugelfafer) Curculio lineatus	V. 237
Bruta, Thiere ohne Schneidzahne L	158. C. 21
Bubale, (fr.) afritanische Ziege -	1. 416
Bubale, (fr.) Blasengazette	<b>E</b> . 54
Bubalis, (Bos) großer Buffet	J. 441
Bubbola, (ital.) Wiedehopf -	II. 249
Bube, (Strix) Schuhu	II. 93
Bucardium, Rarrentappe	VI. 284
Buccinator, (Ardoa) Trompeter -	. <b>E.</b> 110
Buccins feuillettes, (fr.) Granatapfel	VI. 500
Buccinum, Kinfhern - VI.	442. 6. 375
	S. 375. 376
- cornutum, gehornte Sturmhaube	VI. 447
costatum, Eble Harpfe -	VI. 461
- crenulatum, geferbte Rabel -	VI. 470
- decussatum, Schuppenbezoar	VI. 453
dimitatum, umwundene Rabel	VI. 472
dupplicatum, Rahnadel -	VI. 472
- echinophorum, Anotenschelle	VI. 447
flammeum, Flammensturmhaube	VI. 451
- gemicum, zwenfidiges Kinkhorn	<b>S.</b> 376
- gibbolum, Buckel -	VI. 459
- glabratum, Pomeranzenkinkhorn	VI. 465
- glaciale, Spigbergisches Kinkhorn	VI. 467
- glaucum, grauer Bejoar -	VI. 455
- hecticum, gedruckte Radel -	VI. 471
- lævigatum, Glatthorn -	VI. 469
- lanceatum, Lanzennadel -	VI. 472
- maculatum, Stricknadel -	VI. 469
- murinum, Dornnadel -	VI. 473
- mutabile, Afterflurmbanbe	VI. 459
- neriteum, Dosenschnecke -	VI. 460
— mitidulum, Glanzborn -	VI. 468
— olearium, Zwiebelschaale -	VI. 444
papillosum, Reigbrenfinthorn	VI. 457
- patulum, Weitmund -	VI. 462
perficum, Rudolphus -	VI. 462 Bug-

Buccinum	Buckel	6t (
		Th. G.
Buccinum plicatum, gefaltene	turmbanbe	VL 447
- prærosum, schwarze L	Bobne -	VI. 465
- proximatum, einfadig	res Kinkborn	S. 377
- pullum, braunes Ruff	erbornchen	VI. 459
- reticulatum, Gitterhe		VI. 468
- rufum, rothe Sturmb		VI. 450
- rugosum, Rungelfinkt	orn -	S. 376
fpiratum, Ereppe	_	VI. 464#
- Rrigillatum, geftriege	lte Nadel	VI. 471
fubulatum, Tiegernat	el 🗕	VI. 479
- tuberosum, Anotenfti	ırmbanbe	VI. 450
undatum, nieberlandi	sches Kinkhorn	VI. 467
undosum, Bauernjun		VI. 465
- vittatum, banbirte De	adel -	VI. 471
Bucco, Großmanl		4. <b>S</b> . 88
— — Capenlis, Caapiches Gro	smaul -	II. 204
hæmacephalus, Bluttopf	-	<b>©.</b> 88
maculatus, Fleckenbruft		<b>©.</b> 89
- miger, schwarzes Großma	ul -	S. 89
— — versicolor, Scheck	<b>-</b>	<b>E.</b> 88
Buceros, Hornvogel	•	II. 160
- bicornis, zwenhörniger	r Pornvogel	II. 160
hydrocorax, Wasserra	ibe –	II. 162
- malatus, ungebornter &	ornvogel	ll. 163
Buchbrucker, (Kleintafer) Derme	ites Typographi	IS V. 103
Buchenbohrer, (Gallapfelmurm)	Cynips fagi	V2. 815
Buchenlaus, Aphis fagi	•	V. 517
Buchensauger, Chermes fagi	aria Carat	V. 524
Buchenweiber, (Rugelfafer,) Cu	irculio fagi	V. 227
Buchenwühler, (Rachtschm.) Pha	ilæna Schæmerel	N 754
Buchstint, Fringilla coelebs	D) 1 C	II. 580
Buchftabe, goldner, (Rachtfchm.)	Phalæna Gamma	V. 688
Buchftabendattel, (Olive)	) - 1 14	VI. 419
Buchftakenflügel, (Rachtschm) !	mai, interana	V. 724
Buchstabenhummer	da Waladaaa	V2, 1128
Buchmaizenbahuchen, Chrysome	EDITIKIDES	V. 182
Buck, (engl.) Bock		I, 404 V, 6 <b>96</b>
Buckel, (Rachtschm.) Phalæna j	hru <b>y</b> itti 🐃	
		Buchel

		Th.	نف
Budelhabnchen, Chrysomela Gibbola	خ		165
Budelfrabbe, Cancer scruposus	_	V2.	
Budelmespe, Sphex gibba	_	V2.	
Buderhahn, (indianifcher Sabn)	_		461
Budia, (port.) Meetpfau, (Bifc)	-	IV.	
Buffone Megnung von ber Befruchtung		Ī.	
Bufo; getteine Krote -		'IİL	50
Bugle-Coralline, (engl.) Robrentocher		V 12.	• •
Buglossus, Ochsenzunge -	ÍV.	149.	
Buffel, großer, Bos Bubalis	•		441
Buffelfchlange; Boa Constrictor	÷	III.	
Bunbelfafer, Scarabæus fascicularis		V.	87
Bunbelrobrchen, Tubipora fascicularis	-	VI2.	
Burgermeifter, (braune Deme)	÷		347
Burgermeifter, (Eibechfe) Lacerta princ	cipalis	III.	
Burgervogel, (Tagichm.) Papiliones pl	ebeji ur		
bicolæ -	•		639
Burftentafer, Scarabæus hirtellus		V.	-
Burftenforalline, Sertularia Thujia	VÍ2.	838.	851
Burftentrebs, Cancer letiferus		V2. 1	
Burftenraupenvogel, (Rachtfchm.) Phal.		i V.	669
Burftenfchild, (Stinftafer) Bupreftis fa	lciculari	s V.	338
Burstenwurm, Nereis seticornis	•	Vk	80
Buschelpolypen, Polypus à Pannache	<b>.</b>	VI2.	819
Bufcheltrager, (Rafermufchel) Chiton fal	ciculari	VI.	198
Bulcard, (engl.) Spistopf, (Rosfifc)	÷	IV.	105
Bull, (engl. und holl.) Stier	-		43 É
Bulla, Blafe	÷	VI.	404
achatina, frangofifche Schellenfchi	iecte	VI.	414
aperta, Zimmetwaffel -	•	VI.	408
birostris, Doppelschnabet	<b>~</b>	VI.	
- canaliculata, Rollenblase	-	VL.	4 <b>1</b> 1
conoidea, Regelblase		VI.	411
- cyprea, Porsellanblase		VI.	413
— fontinalis, Perlenblase		VI.	
- gibbola, Bulft -		VL	
— Hypnorum, Mossblafe		VΙ.	-
- lignaria, gestreiftes Ep	-		illa,

Bulla	Buprestis	63
A Line of the second		<b>Lb.</b> S.
Bulla verrucofa, weiffer Jan	ibus -	VI. 406
virginea, Pringenfahn	e 17	VI. 413
Bullæ, (Grylli,) Sochnaden		V. 419
Bullenbeiffer, Canis Molossus		I. 208
Bull-Finch, (engl.) Thumpfo	affe -	II. 547
Bull - Head, (engl.) Ctierfop	f, (Fifth)	IV. 137
Bultje, (holl ) Taubchen		VI. 487
Bultslakje, (boll.) Bulftnabe	and the second	VI. 533
Bunch, (engl.) Pflodfifch		I. 493
Bunk, (poln.) Robroommel	(学)	II. 386
Bunte Schraube, Turbo imb		VI. 555
Bunter Mantel, Oftrea varia		VI. 309
Buntbart, (Nachtschm.) Phala	ena reticularis	V. 734
Buntflugel, (Flebermans) Ve	spertilio pieus	G. 17
Buntflugel, (Grashupfer) Gr	yllus variabilis	G. 270
Buntflugel, (Rachtschm.) Phal		V. 660
Buntflugel, (Tagfchm.) Papil		V. 583
Buntfuß, (Spinne) Aranea la	evipes -	V2 1086
Bunttopf, (Stuttopf) Coripl		S 203
Buntling, (Bange) Cimex fe		V. 491
Buitrucken, (Langfuß) Tipul		V2: 912
Builtschild, (Schildfafer) Caff		V. 140
Buntschwang, (Papagen) Pfit	tacus verficolorus	G. 75
Buphaga, Ochsenhacker		II. 164
africana, afrifan. D	chsenhacker	II. 164
Buprestis, Stinftafer	-	V. 332
meea, Megingschild	4	V. 340
atra; fchrodrzer Birf		Va 341
aurata, Goldbauch;		. 247. 249
aurulenta, Goldrani		V. 337
austriaca, Defterreic		V. 337
bimaculata, Doppel	spiegel -	V. 339
contractilis, En	Self-State Hall Self-Self-	V. 341
cuprea, Rupferschild		V. 340
depreffa, gebructer		G. 247
- fascicularis, Burfter	ischild -	V+ 338
festiva, Braut		V. 342
- gigantea, Goldharni	10	V. 333
	1000	Bupre

	Th. E.
Buprestis granularis, Rleinforn	V. 342
- hirta, Rauhrucken -	V. 338
- ignita, Feuerglut -	V. 33°
- linearis, Parallele -	V. 342
- Mariana, Marylanber -	V. 336
— minuta, Mignaturschild "	V. 341
nitidula, Glanzschild	Vi 339
nobilis, Junter	V. 340
- novemmaculata, Gelbfied -	V. 339
- octoguttata, Fleckenschild -	V. 333
— picta, Mahlerschild -	<b>©. 249</b>
	Vi 340
quadripunctata, Brustpunts - rubi, Brombeerfresser -	Vi 339
- ruftica, Bauer	V. 337
- fternicornis, Bruftborn	V. 336
Krifta, Schmalbauch	V. 335
- Tatarica, tartarifcher Ctinffafer	<b>6.</b> 248
- Tenebrionis, der Schwarze	V. 338
tristis, Schmutschild -	V. 340
- variolaris, Warzenstinter -	S. 248
viridis, gruner Birtennager -	V. 341
Buprestoides, (Attelabus) Dichals -	V. 248
Buprestoides, (Carabus) Erbstinter -	V. 358
Buprestoides, (Elater) Stintspringer -	V. 326
Buprestoides, (Tenebrio) Erdmeeltafer	G. 253
Buri, (arab.) Meerasche	1V. 352
Burrefly, (engl.) Biebbreme	Va. 982
Burrow-Duck, (engli) Brandgans -	IL 280
Burfa , (Alcyonium) Grebeutel -	VI2. 785
Bus, (griech.) Dofe	L 431
Bulan, (perf.) Bort, Buz, Beig -	I. 404
Bufart, Bufe, (fr.) Bushart, (Falte)	II. 78
Buscheule, (Geismelter) -	II. 638
Buschfint, Fringilla Diadema	<b>6.</b> 164
Buschstiege, Musca lucorum	V2. 960
Buschgott, (Affe) Simia Inuus	L 121
Buschhummel, Apis lucorum -	V2. 905
Bufchtaderlad, Blatta gigantea	V. 408
	Busch

- — Mulkorum, Kabinetstäfer

Verbalci. Mollfrautfreffer

wagi, Schwermer

II. tog 11. 78 V. 531 II. 386 IV. 160 IV. 106 IV. 102 V. 733 VI. 376 II. 554 V. 592 VI. 373 I. 505 78 V. 119 V. 120 🕳 — Scrophulariæ, Braunwurznager V. 119 V. 121 V. 120 Œ.

Œ.	• •
C album, (Papilio) weiffee & -	V. 610
C aureum, (Papilio) goldnes & -	V. 610
C goldnes, (Tagschmett.) Papilio C aureum	V. 610
C nigrum, (Phalæna) schwarzes &	V. 696
C, schwarzes, (Nachtschm) Phalæna C nigrum	V. 696
E, weiffes, (Lagfchm.) Papilio C album -	V. 610
Ca, Cay, ein Affe in Loupinambous -	I. 135
Caaperschild, (Schildlaus) Coccus Capensis	V. 529
Caapschnecke, (Porzellane) Cyprea Mappa	VI. 38\$
Cabagi, Cabugi, (arab.) rothes Rebbuhn	II. 488
Cabaret, (Fringilla) Rothfopf	€. 165
Eabeljaufang .	IV. 84
Cabinetstäfer, Byrrhus Mulworum -	V. 120
Cabochon, (fr.) Fischweiberhaube -	VI. 604
Cabra, Cabretto, (ital.) Geiß -	I. 404
Cabrolle, (fr.) Streitthunfisch -	IV. 267
Cabron, Cabrito, Cabra, (fpan.) Bod, Geiß	1: 404
Cabronzillo, (fpan.) Rehe -	I. 401
Cabure, (braf.) Sorneule -	11. 99
Cabuffet, Cabuzzo, (span.) Ohrentaucher -	II. 342
Cacalotli (mer.) Rabe -	II. 171
Cacalotototi, (mer ) Madenfreffer -	ļI. 165
Cacactafer, (Saamentafer) Bruchus Theobron	
Cacao - Walk, (engl.) Rebelfrabe in Jamaita	II. 174
Cacatocha Capitano, (ind) hornfisch -	III. 309
Cacatochafisch von Banda -	IV. 197
Cacatufint, (Kernbeiffer) Loxia cristata -	S. 149
Cachorro de Motto, (port.) Buschraße -	Î. 291
	. 181: 185
Cacrelats, (fr.) Racterlacten -	V. 401
Cadirforalle, Madrepora ramea -	VI2: 702
Cadran, (fr.) Perspectivschnecke	VI. 528
Cæcilia, Blindschleiche	III. 225
- glutinola; Edleinischlange -	III. 226
— — tentaculata, Kuhlschlange -	111. 225
•	Cásalpinus

	Th. 🗗
Camel, Camelus -	I. 365
Cameelstrauß, Struthio Camelus	II. 446
Camel, (engl.) Cameel -	I. 365
Camello, (ital.) Cameel	l. 365
Camelo, (foatt.) Cameel -	I. 365
Camelotchen, geripptes, Nerita Chamæleon	VI. 594
Camelus, Cameel -	I. 365
haetrianus, Dromebar -	I. 369
Camelus, (Sirex) Buceimeipe	V2. 839
Camelus, (Struthio) Kameeistraug	II. 446
Camerugia, (ital.) Garnale	V2. 1125
Cames. (fr.) Benusmuscheln	VI. 263
Camilla, (Papilio) Bandfled -	V. 614
Canmerdiener, (Tagfchm.) Papilio Pamnon	V. 568
Cammerberr, (Tagichm.) Papilio Polytes	V. 567
Cammerpunter, (Lagschm ) Papilio Troilus	V. 567
Campana, Rropftaube -	11. 50d
Camura, (ital.) Gems	1. 409
Canace, (Papilio) Blauflugel	V. 611
Canace, (Tetrao) weißgeflectes Berghuhn	11. 489
Canadella, (ital.) Seberfisch IV.	198. 202
Canaderin, (Befpe) Velpa Canadensis	V <sub>2</sub> . 886
Canadier, (Rrammetevogel) Turdus Canadenlis	<b>6</b> . 140
Canardfranc, (mulqué) (fr.) Bisamente	II. 289
Canardiffleur, (Cane) (ft.) Pfeisente 11.	294. 29 <b>9</b>
Canarienschnede, Strombus gibberulus	VI. 483
Canarienvogel, Fringilla Canaria	II. 587 VI. 487
Canarium, (Strombus) Laubchen - Canaticuli, (neapol) Saubehnen -	VI. 487 VI. 228
Canacicum, (neupot) Education	. E. 344
	V2, 1116
_ araneus, Epinnentrabbe _	V2. 1109
- aretus, Barentrebs -	V2. 1130
- cancharus, Stachelscheere	V2. 1128
- chabrus, Raubrucken -	V2. 1109
- cordatus, Herzfrabbe -	V2. 1099
- cornutus, hornerschnauge	V2. 1114
- craniolatus, Hirnschaftrabbe	V2. 1104
- At Milla turned A. seriladuis and a	Сапсет

		Cancer			69
		•		<b>S</b> b.	€.
Cai	ncer	erikatus, Kammschnauße	-		1134
		cruentatus, Blutfrabbe	-	V2.	1115
<u>.                                    </u>	_		r	V2.	1110
-	—	cylindricus, Enlinderfrebs	-		• 348
-	_	emeritus, Invalide	•	V2.	1133
_		feriatus, Kestfrabbe		V2.	
<del></del>	-	filiformis, Fadentrebs	-		1136
-	_	floridus, Blumentrabbe	-		1103
	<del></del>	germanus, Lausetrabbe .	₹ '		1115
	_	glacialis, Eistrebs			347
	<u></u>	granulatus, Rornericilb.	- '	V2.	
		graplus, Stumpfnafe	•		1116
		haftatus, Spieffrabbe	₩.		1112
		hepaticus, Lebertrabbe	75		1 416
		hexapus, Sechefuß	•		1011
_		hirtellus, raube Krabbe	_	V2.	
	-	horridus, Kelsentrabbe	-	V2.	1113
	_	lactatus, Milchfrabbe	•	V2.	1106
		lanatus, Bollenschild	-	V2.	1109
		linearis, Schmalhans	•	V2.	1135
		longicornis, Langhorn	-	V2.	1102
		longimanus, Longarni	• 1	<b>V2.</b>	1113
		maculatus, Flechichilb	<b>—</b>	¥2.	1105
		Mantis, Comanentrebe	<b>-</b>	V2.	1131
		minutus, 3mergfrabbe		V2.	HOI
_		Moluccanus, (perversus) mol	udische	r	
		Arebs -		V 2.	1139
		museosus, Moosschild	•		1110
_	_	mutus, Stumpftrabbe	-		1099
_	<b>-</b>	Neptuni, Reptuustrebs			347
		Norvegicus, Rormeger			1128
_		nucleus, Eichelfrabbe	-	V2.	
		pagurus, gemeiner Tafchenfrebs		V2.	_
		pelagicus, Stacheltrabbe	-	V2.	
_	_	pennaceus, Keberfrebs	<b>™</b> .		1124
<del></del>	_	personatus, Maste	-		1111
		philargus, Zahnelafter	•	V2.	1104
-	-	pinnophylax, Muschelmachter			1100
		Ea		Ca	nčér

	Canis	<b>C</b> antharis	71
	•		Th. S.
Canis do	mesticus, Paushund	- I. 2	07. 8. 27
	ctrarius, franischer Hun		I. 209
	miliaris, gefelliger hun		I. 207
	ajus, Windhund	٠ 📥	I. 207
	gopus, Saasenfuk	•	I. 226
	eliteus, Bolognefer	<del>~</del>	I. 208
M	exicanus, merifanischer	: Fuchs -	I. 228
fag	gax, Jagdhund	-	1. 207
T	hous, fyrinamischer Fuc	<b>dys</b> –	I. 228
ve	rtagus, Dachshund	•	I. 209
Canne pe	ctiére, (fr.) fleine Trap	opgan <b>s -</b>	II. 445
	(ital ) Meersau, (Haan		III. 260
Canthari	de, (fr.) spanische Flteg	je –	V. 309
Canthari	s, E. Johanniefliege	-	V. 306
	ænes, Rupfertafer	•	V. 309
<b>-</b>	albicans, Gelbstirn	-	V. 310
	atra, Mobr	<del>-</del>	·V. 311
	biguttata, Gelbspige	_	V. 310
<u> </u>	bipustulata, Rethfpit	e -	V. 309
~	Cardiacæ, Bolfetrapl		V. 310
	coerulea, Blaufchatter		V. 313
	-fasciata, Rothband	'-	V. 309
	fusca, Rauber	•	V. 307
	lateralis, Gelbrand	•	V. 309
	livida, Blenfliege	-	V. 308
	melanura, Schwarzsch	manj -	V. 314
	minima, Eichenfliegenl		V. 310
	navalis, Matrofe	•	V. 314
	obscura, Rostrand	-	V. 308
	pektinata, Kammhorn	•	V. 311
	pectinicornis, Feberte	ammsfliege	V. 312
~ _	pedicularia, Laufeflice		V. 309
	rufa, Rothschild	•	V. 308
	sanguinolenta, Doppe	lrand -	V. 307
	ferrata, Sagehorn	•	V. 312
	testacea, Braunschild	•,	V. 310
	tropica, Wendezirfel	,•	V. 312
	violacea, Bioletrucken		V. 313
	E	4	Cantha-

· ·		₹b. €.
Cantharis virescens, Jagerrock	` •	V. 313
- viridiffima, Ceibenmaning	•	V. 313
Canthus, (Papilio) Secheauge	-	\ . 5 <u>99</u>
Canutevogel, (Strandlaufer) Tringa (	Canutus	II. 412
Canutus, (Tringa) Canutevogel	•	II. 412
Caouanne, Riefenschildfrote	**	III. 20
Capauniaus, Pediculus caponis	•	V2. 1036
Capella coelestis, heerschnepfe		11, 397
Capella, Geiftvogel, (Riebig)	•	11. 406
Capellan, (fr.) Zwergfabeljau	<del>-</del> 1	
Capellen, (holl ) Schmetterlinge	•	V. 542
Caper, (Kernheister) Loxia Bouvrouit		<b>E</b> . 154
Caper, maroffischer, (Raubfliege) Asilus	Maurus	
Caper, (Pfeilschwang) Sphinx Corbora		V, 446
Caper, (ungeflügelte Biene) Mutilla be	lvola	V2. 920
Capitaneus, (Conus) Rasetute	-	VI. 368
Capitellum, (voluta) Base	•	VI. 435
Capito, Großtopf, Dicktopf	- IV	. 352. 385
Capo groffo, (ital.) Reultopf	₹ ,	IV. 137
Capa negro, (ital.) Schwartfanchen		ll. 610
Capo negro, (venet.) Schwarzfopf, (	Ente)	II. 302
Capo rosso, (venet ) Breitschnabel (En	ite)	. II. 294
Capone, (ital ) Meerschwalbe, (Seche	ahn)	IV. 277
Caporoch, (Strix) Beighacken	•	E. 69
Cappa (ital.) Gienmuschel	•	VI. 283
Cappa longa, (venet) Mefferbeft	₹ '	VI. 227
Cappa santa, (ital.) Infobitermuschel	•	VI. 303
Cappa, (Sciæna) Doppelschuppe	₹´,	ĮV. 218
Capra, Geiftvogel, (Riebis)	•	II. 406
Capra, Biege	I. 4	04. E. 53
- bezoardica, Bezoardbod, Blafen	gazelle I.	415. 6.54
cervicapra, Hirschbock	, 1	414. S. 54
- depressa, zwergbock	•	I. 411
Dorcas, Gaselle		<b>E</b> . 54
- Gazella, Weißarsch, (hirschbod	) ·	S. 54
- mambrica, fprische Ziege	-	I. 408
— Moschi, Bisanthier	*	I. 375
- pygmæa, guineisches Rebe	•	I. 378
		Capra

Capra	Carabus	73
		Th. G.
Capra reverla, ameritanische Biege	•	I. 411
rupicapra, Geme	- I,	109. 6.53
— — talarica, Hirschbock	•	<b>€</b> . 43
— — tartarica, tartarische Ziege	-	1. 417
Capra di acqua, (ital) Basserspi:	ine -	V2. 929
Capra montes, (span.) Geme	•	I. 409
Capreolus, (Cervus) Reb	•	1. I. 4QI
— — guincensis, guineisches — marinus, afrikanischer	Reb -	I. 403
— marinus, afrikanischer	Licky.	1. 393
— — Moschi, Bisamthier	₹	1. 375
Capreolus, (Lucanus) Rehichröte	<b>r</b> -	V. 96
Capricornes, fr.) Bodtafer	٠, ٦	V. 249
Capricornus, Steinbock	• •	1. 407
Caprimulgus, Biegenmeiter	∢'	II. 636
Americanus, Geifin	nelfer -	II. 638
Europæus, europáiso		lbe II. 636
Capriolo, Cavriolo, (ital.) Rebe		1. 401
Capuciner, (Meerfage) Simia Cap	oucina	I. 136
Capuciner, (Nachtschm.) Phalæna	Capucina	V. 678
Capueinerfaferchen, Dermeftes Ca	pucinus	V. 102
Caput Chili nocturnum, gebornte	r Kiebig	ll. 431
Caput Meduste, (Afteria) Mebut	ien <b>t</b> opf	VI. 142
Caput mortuum, (Cancer) Tobe	ntopf	V2. 1121
Caput oculus. Chinefischer Kolun	₹	· C. 124
Caput serpentis, (Anomia) Col	angentopf	VI. 323
Caput ferpentis, (Cyprea) Mohi	renbauch	VI. 393
Capybara. Margarafe Cumpfichn	rein •	I. 467
Caraboides, (Chrysomela) Rafer	hahnchen	V. 201
Caraboides (Dytiscus) fleiner @	ch to thinties	V. 346
Caraboides, (Lucanus), Rateriori	oter -	V. 98
Caraboides, (Staphylinus) Gelbs	child •	Y. 393
Caraboides, (Tenebrio) Bastari	stafer	V, 734
Carabus, (Cancer) Kahnfrebs	7	V2. 1126
Carabus, Erdfafer .		2. 4. 250
Americanus, Amerikaner	-	V. 360
- atricapillus, Schwarzior	topen -	V. 366
— — auratus, Goldflitter	•	V. 355
himaculatus, Zwenfleck	•	C. 250
F A	3	Carabus

— 🗕 vulgaris, Pobelkafer

Caracal, (Rage) Felis Caracal

Caracara, (Fasan) Phasianus Caracara

Caracol, (fran.) Erdschnecke ohne Saus

V. 362

G. 125

VI. 59 Cara-

**G**. 30

Caramote	Carett	75
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	Th
Caramote, (fr.) Garnale	. ₹	V2. 1125
Carapo, (Gymnotus) Brasilianisch	er Rahlrücken	IV. 45
Carallius, (Cyprinus) Rarausche	-	IV. 384
Carbo, (Pelecanus) Rormoran	-	11, 328
Carbonarius minor, Sannenmeife	ę -	11. 627
Carcharias, (Cerambyx) Sunb	sbock -	V. 271
Carcharias, (Squalus) Menschen	freffer	III. 266
Carcinus, (Cancer) Umeritaner	•	V2. 1124
Cardaire, (fr.) Stachelreche	e.	III. 242
Cardello, (ital) Distelfint	• į.	II. 582
Cardinal, domingifcher, (Fint) Frin	gilla Dominica	na 6. 166
Cardinal, (Saubenblutfink)	- 11,	549. 577
Cardinal, (Merle) Tanagra milit	taris -	II. 577
Cardiffa, (Cardium) Menschenh	erz · -	VI. 245
Cardium, Bergmuschel	•	VI. 244
— aculeatum, Nagelhers	=	VI. 247
— — ciliare, Dornherz	• ,	VI. 248
—  — coltatum, gerippte Ben	us -	VI, 245
echinatum, Stachelher,	å •	VI. 248
— — edule, Kammdublet	-	V. 251
flavum, gelbe Erdbeère		VI. 251
- fragum, meiffe Erbbeer		VI. 249
- hemicardium, brepfeiti	ges Benusher;	VI. 247
— — lævigatum, Osteren	•	VI, 251
lithocardium, Steinbe	rj -	<b>©</b> . 361
- magnum, Riesenberg	- ' [	VI. 250
— — medium, Mittelhers	•	VI. 247
— — muricatum, Sagerippe		VI. 250
- pellinatum, Reighuble	<b>f</b> •	VI, 252
- rotulum, ftumpfes Ben	iusherg -	VI. 246
— — rusticum, Dickschale		VI. 252
- Gerratum, gelbes En	•	VI, 251
— — tuberculatum, Karthag	zodublet	VI. 248
— — virgineum, Jungfernhe Carduelis, (Fringilla) Diftelfint	rrz -	VI. 253
Carduelis, (Fringilla) Distelfint	•	II. 582
Carduelis, (Papilio) Distelnymp	he -	V, 606
Caret, (fr.) Karettschildfrote	•	III. 30
Carett, Schildfröte	9	III. 17

	Th.	Ø,
Cariama, (braf.) Baftarbfranich -	· II.	
Carigue, Cariguoja, (amerif.) Beutelrage, Ball		•
	288.	298
Carigueibeju, (braf.) Meerotter -		259
Caripira, (port.) Fregntvogel -	II.	328
Carlevogel, (fcweb.) Blautehlchen -		616
Carnero, Cordero, (span.) Schaaf -	I.	42·I
Carnifex, (Ampelis) Morter .	II.	
Carnifex, (Scarabæus) Ballenmalger .		63
Caroli, (mailand.) Krummschnabel	/Π.	
Caroliner, (Grashupfer) Gryllus Carolinus	V.	
Caroliner, (Summel) Apis Carolina -	V2.	
Caroliner, (Jungfer) Libellula Carolina	V2,	772
Caroliner, (Rrammetevogel) Turdus Carolinus	Œ.	140
Carolinerin, (Besve) Vespa Carolina -	V2.	879
Carp, (engl.) Rarpfe -	IV.	378
Carpe, (fr.) Rarpfe -	IV.	
Carpentero, (span.) Pfefferfrester, (Loufan)	II.	155
Carpenteros, (fpan ) brafilianischer Specht II.	220.	221
Carpio, (Cyprinus) gemeiner Rarpfe	IV.	380
Carpio, (Salmo) Golbforelle .	IV.	
Carrion - Crow, (engl.) Rrabe -	II.	
Carte geographique, (fr.) Raapschnecke	.IV.	388
Carthagenische Porzellane, Cyprea Mus	VI.	394
Carthagodublet, Cardium tuberculatum	VI.	
Caruge, (fr.) Pisangbrossel -	II.	
Caryocatactes, (Corvus) Ruftaber, Rufbeiffer II.	160.	177
	VI2.	695
Casca vela, (span. u. port.) Rlapperschlange	III.	133
Caschive, (arab) Ualmurmel -	ĮV.	362
Casoar, Casuel, (fr.) Rasuar	II.	450
Cassandra, (Sphinx) Rothafter -	V.	646
Caffawar, (engl.) Rosuar -	Π.	450
Cassida, Schildkafer .	$\nu$ .	135
angustata, Schnwidece -	V.	144
- bicornis, Flügelborn -	V.	
bifalciata, Doppelband , -	v.	
- bipunctata, zwenpunkt	V.	143
	Caff	ida,

9	ъ.	Č.
		40
Cataphractus, Pangerfisch - III. 34	47.	246
Cataphraetus, Pangerhabnfifch - IV. 2	77.	207
Cataphractus, Pangerthier, Armadill		188
		350
		337
		544
		262
		298
Catheret, (piccarb.) Jitis	_	269
Catodon, (Physeter) Witfisch		497
Catta, (Lemur) Eichbornaffe		148
Catul, (hebr ) Rage		229
	Ht.	262
	irı.	264
Catus, (Felis) Haustaße		240
		298
Cauris, blaue, Cyprea annulus	VI.	399
	VI.	399
	VI.	399
Cavalier - pigeon, (fr.) Posttaube	Ħ.	503
Cavaletta, (ital.) heuschrecke	V.	437
Cavallo, (span.) Mactrele _ j	IV.	257
Cavallo, (span. u. ital.) Pferd -	1	446
Cavallo marino, (ital.) Scepferdchen -	III.	344
Cavallo verde, (ital.) das europ, wandelnde Blat	V.	412
Cavallus, (Equus) Rog	I.	446
Cavia, Cabaya, brafilianisches Raninchen, Meet,		•
fcweinchen - 1. 3	35·	338
Cavia, ber Cavia		. 48
- capenlis, taapscher Cavia		. 48
	111.	79
	VI.	96
Ceatototl, (mexif.) Lauchente	II.	303
Cedernforalline, Sertularia cedrina - V	12.	854
	VI.	371
Cela, (Parus) gestecte Meise		629
Celerio, (Sphinx) Traubenlecker -		639
· ·		116.114

• .	Cellencoralle	Cerambyx	7.9
<b>3</b>			<b>£6.</b> S.
	alle, Lythophyta Celle		VI2. 724
	lepore, Millepora trun	cata —	VI2. 715
Cellepor	a, Cellentotalle	÷	VI2. 724
	ciliata, Saarcelle	-	VI2. 727
<del></del>	hyalina, Glastoralle		VI2. 728
	pumicola, Bimfentora	ille -	VI2. 726
<u> </u>	ramulosa, Sandforall		VI2. 724
	verrucosa, Warzentor	alle —	VI2. 727
Cellnlari	a, Cellenforalline	•	VI2. 855
	chelata, Rrebeicheere		VI2. 563
	falcata, Schildformic		VI2. 562
	, (Coluber) Ameisenna	tter -	III. 206
	, (braf.) Ameisennatter	•	111. 205
	latotli, (neuspan.) Rebh	uhn -	II. 490
Cencotla	totli, (mer.) Sauger	•	ÌI. 533
Cenchria	, (Boa) Frieselschlange	• `	III. 149
Centrisc	us, Schildfilch	. •	III. 335
- ==	scolopax, Schneppen	रिकि -	III. 337
<u> </u>	scutatus, Messerfisch	*	111. 336
Cephalot	es, (Carabus) Blechic	hmið	V. 355
Cephalot	es, (Formica) Dickfop	<b>.</b>	V2 915
	tes, (Scarabæus) Obre		€. 214
	es, (Vespertilio) Gro		<b>E</b> . 19
Cephalus	s, (Cyprinus) Dicktops	<del>-</del>	IV. 385
Cephalus	s, (Mugil) Stoffapf	-	IV. 35 <b>e</b>
	Crisschwanz	_	IV. 110
r	ubescens, Riemfisch	<u> </u>	lV. 111
Cerambo	oides, (Attelabus) Ech	vammfäfer	V. 247
Cerambo	ides, (Chrysomela) B		Ų. 201
Ceramby	x, Bocktafer	- V. 24	9. 🕏. 249
	Afer, afritanischer B		<b>©.</b> 238
	Alpinus, Steinbockl	ein —	V. 265
	Amiralis, Admiral	•	$\dot{V}$ . 259
	araneiformis, Spinn		V. 260
<del></del> ,	armillatus, Ringelfus	<b>-</b>	V. 253
	atratus, Zingaleser	-	V. 257
	auratus, Goldbock	•	V. 277
	balteus. Rostbeck	4	S. 236
	,		Ceram-

		<b>V</b>		Th. G.
Cet	mbys	barbicornis, Barthorn	<u>*</u>	V. 258
هــــ	-	batus, Rlauenhorn	Ė	V. 259
		bifasciatus, Schwarzband	<u> </u>	V. 258
نسد		cantharinus, Johannisbod	•	V. 28i
	<b></b>	Capensis, Zebrabdcflein	-	V. 265
		cardui, Distelbod		V. 272
	_	carinatus, Kielbock		€. 23 <i>y</i>
-		castaneus, Kastanienbock	-	V. 281
	<del></del>	cervicornis, Hirschbock	•	V. 252
	_	einamomeus, Zimmetbock	-	V. 255
<del></del>		coriarius, Gerber .		V. 214
		cylindricus, Rolle	٠,	V. 274
	·	damicornis, Birfchgeweihbeck		€. 237
أبيسا	-	depressus, Plattrucken	•	V. 262
		depsarius, Pechbock	4	V. 257
_		desertus, Weißband	<b>-</b>	V. 263
		ebulinus, Sollunderbock	<b>-</b>	V. 282
-44-		farinolus, Meelfact		V. 261
	، خد	femoratus, Rothichenfel	•	V. 277
		ferrugineus, Rothbock	•	V. 261
_	<u> </u>	festivus, Treffenbock	-	V. 256
٠ ســ		Finnicus, Finnlander	*	V. 279
_	-	floralis, Blumenbock	• , ,	C. 242
_		giganteus, Riefenbock	•	S. 237
	ڪسي	glaucus, Geladonbock	-	V. 263
		Glizirrhicæ, Sugholzbock	4	€. 238
		Halodendri, Robinbod	-	€. 239
		hieroglyphicus, Bilberbock	•	S. 241
		hispidicornis, Dorn	<b>.</b>	V. 276
-		hispidus, Pornbock	•	V. 263
		imbricornis, Schuppenhorn	•	V. 253
_		irroratus, Thaubock	•	V. 275
-	-	Koehleri, Koblersbock	•	V. 270
_		liciatus, Striembod	-	V. 280
-		linearis, Parallele	*	V. 274
	-	lineatus, Schlegerschild	<b>.</b> .	V. 257
-		longimanus, Langhand		V. 291
-	-	luridus, Bräunling	•	V. 277 Ceram-
				~clmp.

Th. E.
Cercicopthecus, Meertage - L 119. 123
Cerdo, (Cerambyx) Flicter - V. 266
Cerf, (fr.) Dirfc - 1. 390
Cerfvolant, (fr.) Hirschschröter - V. 94
Cernicalo, (span.) Thurmfalte - II. 80
Cerrus, Rothflosse - IV. 181
Certhia, Baumlaufer - II. 253. C. 97
_ Afra, bunter Baumlaufer - II. 257
- Cajana, Cajennischer Baumlaufer II. 257
- Capenlis, Caaricher Baumlaufer C 97
_ Capensis, Caapscher grauer Baumlaufer 11. 255
chaly bæa, rothfarbigbandirter Baumlaufer IL 257
cinerea, aschgrauer Baumlaufer - S. 98
coerulea, blauer urinamischer Baumilaufer II. 256
- cruentata, Rothfopf - 11. 258
- currucaria, Zeilonestscher Baumlaufer IL 256
- cyanea, schmarzblauer Baumlaufer II. 260
familiaris, Blaumtlette - H. 254
famola, Caapicher Colibri - 11. 279
flaveola, Zuckervogel - II. 250
- gutturalis, Gruntehlchen - II. 258
- intermedia, Bastarbbaumlaufer 98
_ jugularis, Blautehichen - II. 256. C. 98
_ Lotenia, von Lotensvogel - 11. 261
- muraria, Manerspecht - H. 254
notata, Bioletsted &. 99
- olivacea, Mabagastarifcher Baumlaufer 11. 255
- Philippina, philippinischer Baumläufer II. 260
- pulchells, Langidmant - 11. 259
- pulila, fleiner indianischer Baumlaufer 11. 255
- Senegalentis, senegallischer Baumlaufer H. 258
- fperata, purpurfarbiger Baumlaufer 11. 257
Pizz, Blaufopf 11. 257
tricolor, drenfarbiger Baumlaufer S. 99
- violacea, violeter Baumlaufer - S. 97
- violacea, violetfärbiger Baumläufer II. 266
— Zeylonica, roftfarbiger Baumlaufer II. 260
Cervicapra, Dirichbod - I. 414 Cervo
CELVO

		Th.	Ğ,
Chætodon saxatilis, Gabelschwan;	-	IV.	174
- Gtriatus, bandirter Klippfisch		IV.	171
- triostegus, Drepstral	•	IV.	170
- · - vagabundus, Schwarmer	-		173
Chafer, (engl.) Rafer	_		49
Chaffink, (engl.) Buchfint	•	II.	580
Chakeus, (griech.) & Peters Fifch	-	IV.	144
Chalcides, (Lacerta) Gifteibechfe	-	III.	112
Chalcographus, (Dermestes) Supfers	techer	V.	103
Chama, Gienmufchel -	VI. 28	3. <b>E</b> .	367
- antiquata, Seenug	-	VI.	287
- arcinella, borniger Pferbefuß	-	VI.	290
bicornis, Regelmuschel	•	VI.	290
calyculata, Eichelmuschel	-		288
cordata, Quernuschel	•		288
granola, bie raube bomingifche	Muschel	VI.	274
- gryphica, Angelmuschel	-		367
oblonga, Scheerbecken			289
- optica, bas griechische A dublet			271
- rugola, Pflugmufchel	•	<b>S</b> .	367
satiata, Rugelmuschel	-	VI.	289
semiorbiculata, Seebobne	•	VI.	288
trapezia, SeesErbse	<del>-</del> -		288
Chame, Benuemufcheln	-	VI.	263.
Chamaleon, (Eibechse) Lacerta Chama	ælcon	111.	95
Chamaleon, (Fliege) Musca Chambeled	n	V2.	950
Chamæleon, (Nerita) geriptes Camel	otchen	VI.	594
Chamaris, (fpan.) Blaumeife	•	11.	627
Chameau, (fr.) Rameel	•		365
Chamel, (arab.) Sauger	-		114
Chamois, (fr.) Geme -	-		4 <b>0</b> 9
Chamor, (hebr.) Efel -	_	1.	453
Champignon de mer, (fr.) Schwamn	nkoralle		676
— — — — Teufelsho	and		789
Champse, (egipt.) Krofodill	•	III.	
Channa, Leberfisch -			198
Changeant, (fr.) Schillervogel	•		607
Chanteur, (fr.) Paubentonig	-		620
		C	haos,

Chaos	Charbot		85
•		Th.	
Chaos, Infufionsthierchen	-	VIa.	917
fungorum, Schwammstaub		VI2.	9-7
infulorium, Infusionsthierchen	1	VI2.	922
redivivum, Rleifteraal	•	VI2.	917
Chapeau cornu, (fr.) Qualle	•	VI.	120
Characini, Salmbrachsemen mit vier	Stralen in t	er	
Riemenhaut	·-	IV.	328
Charadrius, Regenpfeifer -	II. 419	. G.	114
- Egyptius, Egnptifcher Re	gennfeifer	II.	416
- Alexandrinus, Alexandrin	ildser		416
- Anglus, Englander			117
- apricarius, goldgraner	_		418
- Afiaticus, Afier	_		115
- aureus, Goldregempfeifer	_		118
- Bengalentis, Bengalefer	_		118
- Anglus, Englander - apricarius, goldgrüner - Asiaticus, Usier - aureus, Goldregenpfeiser - Bengalensis, Bengaleser - calidris, graver Regenpfeis - Dominicus, Dominger - gregarius, Geselliger Rege - himantopus, Langsus - Jamaicensis, Jamaiter - Mexicanus, Mexisance	fer -	II.	419
- Dominicus, Dominger			116
- gregarius, Gefelliger Rege	npfeifer		115
- himantopus, Langfus			420
Jamaicensis, Jamaiter		5.	
- Mexicanus, Merifaner	•	8	117
- Morinellus, Morinell		II.	417
oedienemus, Dickfuß	-	II.	
- Morinellus, Wortnell - oedicnemus, Dickfuß - pluvialis, Grissvogel - spinosus, Doenstügel - Tataricus, Cartar torquatus, Schwarzkragen	-		419
fpinolus, Dornflugel	-		42Í
- Tataricus, Tartar	•	<b>6</b> .	116
- torquatus, Comarifragen	`		419
- Utopiensis. Schneppenpfei	fer	e.	
- vociferus, der Schreier	_	II.	416
Charafterpapillon, (Tagfchm.) Papilio	o Jalius		573
Charafterfalm, Salmo notatus	_	IV.	
Charafterftien, (Grashupfer) Gryllus	variegatus	V	441
Charanton, (fr.) Rugeltafer	_	<b>V.</b> :	210
pyriforme, Langenfreffer	•	<b>V.</b> :	218
pyriforme, Laugenfresser trompette, Ruftafer	-		232
marax, geflectier Salm, Karaufche	IV.	329.	
Charboniere, (fr.) Kohlmeise	ج.	11.	
Charbot, (fr.) Rafer		<b>V</b> •	• 5
E a		Ch	٠ar'.

		Tb.	(X
Chardoneret, (fe ) Distelfink		Ĭì.	582
Charitonia, (Papilio) Cujavenvetter	-	V.	585
Charlot, (fr.) Krunimschnabel	-	II.	394
Charms, (arab.) Nilbarfc		IV.	
Charmuth, (arab.) Malmels	-		294
Chalidah, (hebr.) Storch	•		374
Chafil, (hebr.) Beufchrede	•	V.	437
Chalir, (bebr.) Comein	-	'I.	461
Chat, (fr ) Lage -	•		229
Chat cervier, (ft.) Ragenluchs	-		242
Chatha, (chald) Kropfgans	_		324
Chat-huant, (fr.) Rageneule -	· I	Ī. 92.	103
Chat-huant de Cajenne, (fr ) Cajennis			
Chattering-Crow, (engl ) Rebelfrabe i	n Jamai	ca II.	174
Chausse trappe, Cheval de Frise, (fi		ig.	-
ichnede .	•		498
Chauve-fouris, (fr.) Alebermaus			150
Chayquarona, (port.) Schleppennatter	~	IĮI.	176
Chelidon, (griech) Schwalbe	-	ll.	630
Chelone, (griech.) Schildfrote	-	III.	15
Chen, (griech.) Gans	•	II.	282
Chenalopex, (griech) Brandgans	• ,	H.	279
Chenille, (fr.) Raupe	•	V.	544
Chenilles, (fr.) Bastardpabstfrone	•	VI,	522
Chermes, Blatfauger -	•	V.	521
abietis, Dannenfauger	-	V.	525
— aceris, Abornsauger	-	V.	525
- alni, Erlenfauger	•	V.	524
betulæ, Birkensauger		V.	524
buxi, Burfauger	-	V.	523
- calchæ, Wiesenblumensauger	-	V.	523
- cerastii, horntraufauger	-	- V.	522
fagi, Buchensauger	•,	· V.	524
ficus, Feigensauger	-	V.	525
- fraxini, Eschensauger	-	V.	525
- graminis, Grassauger	-	V.	522
- pyri, Birnfauger	<b>-</b> ,	V.	522
- quercus, Eichenfauger	-	V.	524
		` <b>(</b>	her-

Chermes	Chinefer	87
	<b>-</b>	Th. G.
Chermes falicis, Betbenfauger	<b>-</b> ,	V. 525
- Gorbi, Sperberfanger	-	,V. 523
- ulmi, Ulmenfauger		V. 522
— — urticæ, Reffelsauger	_	V. 523
Chersea, (Coluber) schwebische Ra	tfer -	III. 166
Cheval, (fr.) Pferd	•	I. 446
Cheval à Dieu, (fr.) Connentafer	· -	V. 145
Cheval marin, (fr.) Geepferbchen	` <b>-</b>	III. 344
Chevalier, (fr.) Reuter, (Schnepf	(e) IL 400.	401. 413
Chevalier de Bengale, (fr.) bengal		H. 439
Chevin, (engl.) Dicktopf (Fifch)	-	IV. 385
Chevre, Chevreau, (fr.) Biege	•	I. 404
Chevreautain, (fr.) guineifch Reb	. •	I. 378
Chevrette, (fr.) Squillenfrebs	_ :	V2. 1125
Chevrette brune, (fr.) Rebichroter	•	V. 96
Chevreuil, (fr.) Reh	•	L 401
Chewingfish, (engl.) bunter Lippfife	<b>5</b> —	IV. 215
Chi, (Phalena) griechisches Ch	•	V. 690
Chichietli, meritanische Eule	_	IL 106
Chick, (engl.) junges Subn	•	II. 469
Chicoree, (fr.) Krausschnecke	•	VI. 498
Chien, (fr.) Hund -	. •	I. 206
Chion cauchant, (fr.) Bubnerbund	-	I, 209
Chien courant, (fr.) Spurbund	•	<b>6.</b> 27
Chien d'Egipte, (fr.) turfischer Du	nb -	I. 210
Chilcanauthli, (brof.) domingische	inte -	II. 292
Chilornita, (griech ) Schnepfe	•	II. 393
Chiltototl, (amerif.) Pabftvogel	- II.	571. 573
Chimæra, Geebrache -	•	III. 276
Chimæra monstrosa, Pfeilbrache	•	III. 276
Chimelas, Chilmes, (fpan.) Bange	n	V. 477
Chimpanzée, Erd ober Buschmensch		I. 109
Chineesche Duivel, (boll.) Schupp	thier	I, 185
Chineser, bunter, (Lagschm.) Papili	io Demoleus	V. 579
Chinefer, (Sefpenftfafer) Mantis p	ectinicornis	V. 414
Chinefer, (Jungfer) Libellula Chin		V2. 771
Chinefer, (Spinne) Aranea ocellata		V2. 1081
Chinefer, (Lagfchm.) Papilio Acont	ius -	G. 291
Chinefer, (Lagfchur.) Papilio Urania	, -	V. 584
F	4	China

·		Th.	6.
Chinquis, (Pfau) Pavo Chinquis	•	<b>©</b> .	
Chin - tchieu - khi, (chinef) Pfau	•		459
Chione, (Venus) Spieldoublet	-	VI.	
Chipeau, (fr.) Schnatterente	•	II.	291
Chiques, (fr.) peruvianische Canbfiobe	1	/2. I	
Chiragra, (Strombus) Bootsbaate	-	VI.	
Chirino, (ital.) Baumeule	•		99
Chirquinchum, (neufpan.) Armabill	•	I.	188
Chirurgien, (fr.) gebornter Riebis	-	H.	<b>43</b> Q
Chiton, Rafermufchel .	-	VI.	196
aculeatus, Dornführer	۹.	VI.	198
albus, Weißbach		VI.	200
cinereus, Grauklappe	•	VI.	20Q
- fascicularis, Buscheltrager	•	VI.	
hispidus, Stachelscefafer	•	VI.	
- punctatus, Punktirschitd		VI.	199
- ruber, Rothziegel	-	Vl.	200
fquamolus, Schuppenmufchel	•	VL	
- tuberculatus, Knotenruden	•	VI.	197
Chloris, (Loxia) Grunfint	•	Ц.	554
Chloropus, (Curculio) Graufus	•	V.	238
Chloropus, (Fulica) Grunfuß	-	H.	428
Chlorolaura, (griech) Springer (Gidec	bse)	HI.	83
Choeneus, (Papilio) Fleckenring	•	V.	595
Chooniclos, (griech.) Meerlerche	•	II.	413
Choiros, (griech.) Schwein	•;	I.	46 E
Choisina, (griech.) Porzellane	•	VI.	384
Choled, Cholda, (bebr.) hermelus	•	I.	274
Chomik, (poin.) Samster		I.	344
Chondrakanthoi, Chondropterygii, fo	pwinuneud		
Amphibien	•	111.	228
Chondropterygii, Anorpelfiossenfiche	-	IV.	3
Choometh, (bebr.) Erdichnede obne De	aus ·	VI.	59
Choras, (Bavian) Simia Mormon	•	҈.	6
Choucas, (fr.) Doble	•		175
Chouette, (fr.) Baumeule	•	II.	99
- grande, (fr.) Steineule		II.	,
- de S. Domingue, (fr.) Domin	gifche Eul		
		C	hro-

		Chromis	Chryfom	ela	89
	,		,	q	.b. <b>E</b> .
Chro	mis, s	Borstenflosse		•	IV. 186
		(poln ) Bachtelfon	ig	-	II. 436
		(griech.) Infettenpi		•	V. 13
		, (Davidsbarrfe)		•	VL 451
Chry	lippu:	s, (Papilio) Zimme	tflågel	-	V. 597
		oldwespe	•		V2. 875
		ata, Goldbauch			V2. 876
		lentata, Dorpeljahi			V2. 876
		nea, Blanbauch	•	1	V2. 876
	– ful	gida, Schimmerbai	ιφ	•	V2. 877
	— ign	ita, Slutwefpe	•		V2. 875
	– ſuc	cineta, Rothgurtet	•	* •	V2. 876
		Scarabæus) westint	ischer Goldkä		V. 74
Chry	ladon	, (Sabella) Golds	ahn	•	VI. 636
Chry	fomel	a, Goldhabnchen	- 7	7. 163.	€. 223
		absynthii, Wermi		•	G. 225
		Adonidis, Abonis	bábnchen	•	S. 226
_	_	ænea, Kupferhabn	chen	•	V. 167
		equinoctialis, Bie	letflügel	•	V. 185
		æftuans, Connent		. •	V. 179
		alni, Erlenfreffer	•	-	V. 167
	-	Americana, Roth	ftrich	•	V. 178
		analis. Rothafter		•	V. 177
	<b></b> ,	armoraciæ, Meet	rettignaget		V. 169
	<u> </u>	Asclepiada, Mesci	llapháhn <b>che</b> n		<b>E</b> . 225
_		Aliatica, Aliatisch	es Hähnchen		<b>G</b> . 226
-		afparagi, Sparge	thábnchen	•	V. 199
	_	atraphraxidis, Gt	rauchmelden <b>h</b>	áhnchen	<b>6</b> . 224
-		atricilla, Echwar	topfchen	•	V. 182
		aurita, Gelbohr	•	•	V. 187
		barbareæ, Genff	rester	•	V. 190
		betulæ, Birfenme	jer	•	V. 168
		bicolor, swenfarb	iges Dáhnche	n	V. 181
		bilineata, Linienh	áhnchen	-	V. 190
-	-	bipunctata, Langl	orn	-	V. 188
		boleti, Schwamm	háhnchen `	• `	V. 175
-	. —	Bothnica, Bothni	er	•	V. 192
	-	Calmariensis, Ed		•	V. 196
			<b>5</b> 5		Chry-

		· -	Th.	E,
Chry	(fame)	la campeltris, Feldhahnchen	v.	200
— ·		caprea, Boch buchen -	. V.	196
		castanei, Braunrand -	. V.	177
	_	cerali, Kirschbahnchen -		169
_		cerealis, Kornfresser -	V.	170
_		cervina, Pirschahnchen .	V.	200
		Chrysocophala, Gelbtorfcen	v.	181
	_	clavicornis, Reulbornchen		173
		coccinea, Kothrücken -		177
_		collaria, Rragentrager -		176
		cordigera, Bergtrager -	V.	192
_		coryli, Dafelbabnchen	V.	191
_		cyanica, Blauting .	<b>' V.</b>	186
	-	cyancila, Blaunafe	V.	197
	-	decemmaculata, Comarischild	V.	192
		decempunctata, Puntihabuchen	V.	174
	-	duodecimpunctata, Innlander	<b>V.</b>	199
		elongata, Schmalruden -	V.	202
	_	erythrocephala, Rothfopfchen -	٧٠.	182
		exfoleta, Ochsenzungenhahnchen	V.	182
-		fastuata, Blaustrich -	V.	170
		fuscicornis, Braunhorn .	V.	184
-		gibbofa. Buckelhahnchen -	V.	165
`		gigantea, Riefenhahnchen -	V.	164
_		Gorteria, Schwarzling	V.	186
		Gottingenlis, Chafgarbenhahnchen	V.	165
		graminis, Grashabnchen -	V.	167
		hæmoptera, Rothflugel -		168
		hæmorrhoidalis, Rothsteiß -	v.	166
		Hatenfis, Salvor -	V.	170
		hemisphærica, halbkugel -	V.	185
	<u> </u>	hirta, Raubbabnchen -	V.	201
_		Holfatica, Solfteiner -	Ų.	184
  		hvolciami, Billenfreffer	V.	181
		hypochæridis, Pabichtshahnchen	V.	175
		inda, Steigenlaufer -	V.	202
-		labiata, Lippenhahnchen -		191
	_	Lapponica, Lapplander		175
-	•	→ Program and Array and	C	hry-

		Chryfomela	91
		•	Th. S.
Chi	ryfome	ela longimana, Langarm -	E. 224
	<b>^</b>	longimana, Langfuß -	V. 193
_		Lufitanica, Biegelbabneben	©. 223
-		lurida, Braunflugel -	V. 173
<del></del>	_	marginata, Gaumflügel -	V. 176
		marginella, Gelbrand +	V. 177
		melanopa, Schwarzfuß -	V. 179
_	-	merdigera, Lilienhabnchen -	V. 194
-	_	minuta, Zwerghabneben -	V. 180
		minutifima, Milbenhahnchen	V. 169
<del>, -</del>	<del></del>	Modeeri, Gelbfuß -	V. 182
-	-	· Moræi, Randflect -	V. 189
_		murina, Maufebabnchen -	V. 201
-	-	nemorum, Baldbabnchen -	V. 183
-	-	nitens, Glanzbahnchen -	V. 198
		nitidula, Glangruden -	V. 183
-		nymphæ2, Kaulenger -	V. 197
~	<del>~</del>	obscura, Socierfügel -	V. 193
_		occidentalis, Amerifaner -	V. 168
-		octoguttata, Spanier -	V. 188
	_	octopunctata, Auslander .	V. 198
-		oleracea, Gartenbupfer -	V. 180
_		Padi, Blobbahnchen	V. 169
-	-	pallida, Weibenhabnchen -	V. 172
-		Phellandrii, Schierlingfreffer	V. 199
-		Philadelphica, Philadelphier -	V. 178
-		pini, Fichtensquaer -	V. 191
_		polita, Spiegekrucken	V. 172
_	_	polygoni, Queckgrashahnchen	V. 172
-	-	populi, Pappelufreffer -	V. 173
_	-	pubescens, Wollenhahnchen -	V. 201
-	-	pulicaria, Flobhahnchen -	V. 184
_	-	punctatissima, Grieshahnchen	V. 198
_	-	quadrimaculata, Blausted -	V. 188
-	<del></del> :	quadrimaculata, Weitfled -	V. 197
_	-	quadripunctata, Schwarzpunkt	V. 187
_	~	quadripustulata, Rothblatter	V. 189
	~	quatuordecimpunstata, Rothbruft	V. 193
			Chrv.

				Th.	€.
Chr	ylome	ela quinquepunctata, Grospunft			165
<b>,</b>	-	rustica, Bauernhahnchen	-	V.	183
		sicra, Türk -			179
	_	sanguinolenta, Bluthábnchen			176
	-	scovolina, Banderbabnchen	-	V.	189
	-	fericea, Seibenbabnchen	_	V.	190
	-	fexpunctata, Gelenfpunfs	-	V.	192
•	-	speciola, Goldstrich	•		170
-	-	stephylæa, Pimpernüfichen	-		172
	-	stercoraria, Rungelbabnchen		V.	195
		sulphurea, Schwefelbahnchen		V.	200
		Surinamenus, Surinamer	•		185
•		tanaceti. Reinfarrenbahnchen			166
-	****	tomentosa, Eraubschild	• ,	V.	198
		tridentata, Drenzahn	-	V.	186
-	-	trifasciata, Braunstrich	-	· <b>V.</b>	183
-		trimaculata, Gelbflilgel	•	V.	178
-		undulata, Javaner	-	V.	175
, <del></del>		variolosa, Blatterhábnchen	-	$V_{\mathbf{b}}$	175
		viminalis, Weidenbinber	-	V.	174
•	_	vitellina, Eperdotter	-		171
-	-	vulgatissima Blauftugel	-		171
		loides, (Meloë) Bastardgoldhål	jkchen	V.	382
		lolonthia, (griech.) Goldtafer	-	V.	31
		, (griech) Goldbrachsem		ĮV.	177
		tris, (griech.) Distelfink	-	II.	582
		uros, (griech.) Goldstrichfisch	•	IV.	187
Chr	ylops,	(Hemerobius) Goldauge	-	V2.	794
		(Sparus) Goldauge -	•	IV.	188
		rma, (Buprestis) Golbpunft		V.	336
Chu	b, (en	gl.) Dicktopf, (Kisch)	-	IV.	385
Chui	uf, (F	rett.) Viverra Cinche	<b>~</b> ,	€.	32
		engalischer Reuntoder	-	II.	
		ital.) Doble —			175
Cian	abetta	, (ital.) Balanzfisch	-	III.	
Cica	da, ©	ifade - V	. 451.		
	- albi	ifrons, Beigstirn -			462
<del></del>	- apt	era, Stumpfdecke -	•		464
				Cica	ida,

Cicada	082	93
		₹b. S.
Cicada aurata, Golbflugel	esti	
The state of the s	The Fire	V. 454
bifasciata, 3menband		V. 455
bipunctata, Punftrand		V. 465
Capenfis, Braunfaum	-	V. 456
ciliaris, haarcitabe	49 00 Em.	V. 454
coleoptrata, hartschild	-	V. 461
cornuta, Horn		V. 454
coryli, Safelnafcher	-	V. 467
cruciata, Rreuttrager		V. 453
cunicularia. Raninchenbant	-	V. 465
deflexa, Gentflugel	-	V. 464
flava, Gelbflügel		V. 466
flavo & Amofolor	ay II	V. 463
flavicollis, Gelbhals	premi	V. 463
foliacea, blatterige Citabe	-	V. 452
foliata, Blatschild	(9-7.	V. 452
formicata, Bogenruden	40	V. 455
fronditia, Laubschild		V. 453
interrupta, Bruchlinie		V. 463
lanata, Schaafpelg	d and	V. 465
lateralis, Beifffügel	4 15	V. 462
leporina, haafenbalg	470	V. 465
leucocephala, Beiffopf	Mark J	V. 462
leucophthalma, Weifauge		V. 462
lineata, Schwarzlinie		V. 463
mannifera, Ginger		V. 454
marginata, Beiffaum	114.5	V. 464
nervosa, Puntenerve	in settle	V. 462
orni, gemeine Cifabe	- 4/2	V. 457
- plebeja, Riesencifabe		V. 456
populi, Pappelneitabe	Ele y	V. 463
prafina, Grascifade		G. 274
quadrifasciata, Bierband		V. 455
- querula, Klager		S. 274
- ranatra faltataria,	t i val	V. 461
- repanda, Breitflügel	- II	V. 459
- reticulata, Regflügel	1 1 1	V. 459
Table 1 To 1		Cicada,

V. 451

S. 245

V. 329

**€**: 246

94

Ί

V. 45 t Cichorientafer, (Mantafer) Meloe Cichorei V. 381 Cicindela, Johanniswurm V. 298 Cicindela, Canblaufer V. 127. 6. 245 æquinoctialis, Surinamifcher Banberer V. 329 aquatica, Bafferschreimmer V. 331 atrata, Trauerrock C. 241 campestris, Courier V. 328. Capenfis, afritanifder Bote V. 328 Carolina, Carolinifder Fuffganger V. 329

coerulea, Beigmaul Germanica, Postfnecht gracitis, Schmalbauch

hybrida, Lauffer ₽. 328 lacteola, Mildrand €. 245 Maura, Tiger V: 330

quadrimaculata, ber Eepreffe V+331 riparia, Uferfteiger V: 330 rupestris, Felfentletterer V: 330 filvatica, Balbjager V-329

Virginica, Eftafette V. 329 Cieindele bedeau, (fr.) Rupferfliegentafer **V:** 309

Cicogne brune, (fr.) schwarzer Storch II. 376 Ciconia, (Ardea) Storch III. 374. 😇. 1iī Cidaris.

Cidaris •	Cimex	95
Ž	ğ	th. G.
Cidaris, (Echinus) turfifcher Bunt		VI. 150
Cigala, (ital.) Cifade		V. 451
Cigale, (fr.) Cifade		V. 451
Cigale flamboyante, (fr.) Soloffu	ael -	V. 466
Cigno, (ital.) Schwan	•	11. 276
Citaben, Cicade, -	V. 451.	<b>S.</b> 274
blatterige, Cicadæ foliaces		V. 452
gemeine, Cicadæ orni	•	V. 457
Cimex, (Turbo) Bangenschnede	•	VI. 542
Cimex, Bange	V. 475.	
abietis, Cannenwange		V. 505
acantharis, Stachelmange	• *	V. 487
acuminatus Grigling	-	V. 491
Aegyptius Egiptier	_	V. 497
Andrea, Rreugmange	•	V. 497
- annulatus, Ringelmange	•	V. 495
- apterus, Blindbede		V. 496
arenarius, Canbfriecher		V. 500
ater, die Schwarze	•	V. 495
baccarum, Beerenfleder		V. 488
balteatus, Gurtelmange		C. 277
betult, Birfenmange	-	V. 482
bicolor, Doppelfarbe		V. 490
bidens, Zwen;abn		V. 484
biguttatus; Weiftropf		90. 495
bipunctatus, Punftichilblei	n -	V. 488
bipustulatus, Wirbelpuntt	-	V. 488
- Branderi, Barbar - calcaratus, Spornfuß		<b>V.</b>
calcaratus, Spornfuß	-	V. 505
— — calens, Keuerwanze — — campeltris, Kelbwanze	•	V. 502
— — campestris, Keldmange	•	V. 498
— — cardui, Distelmanze	•	V. 483
— — clavatus, Reulwanze	•	V. 501
clavicornis, Reulhorfi	•	V. 482
clypeatus, Ropfschild	•	V. 486
— — coeruleus, Blauwange		V• 485
collaris, Guinder	•	V. 492
— corticalis, Rindenwänge	•	V. 482
		Cimex

			Th.	Ć.
Cimex	coryli, Safelwanze	-		107
<b></b> .	crassicornis, Dichorn		V٠	500
	cristatus, Kamunwange	•		492
	dolabratus, Sobelmanje	-		502
	Drurwi, Drurimange	. •		276
	dumofus, Brombeerfeiger	•		489
	equestris, Ritterwange	, <b>•</b>		496
	erosus, Randelschild	•		483
	erraticus, Irrmanze	- 1		503
	erythrophus, Rothfuß	_		491
	Fabricii, Fabricia	•	<b>E</b> .	276
	ferrugineus, Schwarzschild	, <b>-</b>	V,	LOI
	ferus, Wildfang	<b>-</b> `	V.	503
	festivus, Buntling	-	V.	49I
	filicis, Karrentrautwanze.	-	V.	483
	Floridanus, Floridaner	. •		484
	fuliginolus, Rufmanje	-	V.	479
	Gothicus, Gothlander		V.	495
<u> </u>		•	V.	479
	grifeus, Greiß	• ,	V.	488
	Gronovii, Schlenermange	-	V.	503
	hæmorrhoidalis, Kotharsch	•	· V.	486
	hæmorrhous, Blutbauch	•	V.	485
'	histrionicus, Scheck	-	V.	499
	hyosciami, Bilfenfauger	•	V.	496
	ictericus, Gelbsüchtiger	•	V.	484
	Indus, Blaksteich		V.	496
	interstinctus. Mischmasch	-	V.	488
	juniperinus, Wachholderwanse	•	V.	489
	Kalmii, Gelbber;	-	V.	498
		-	V.	505
	lacustris, Wassermucke	•	V.	505
	lanatus, Bollenwange .	➡`	₾.	277
	lanarius, Blutschmuger	•	V.	496
	lectularis, Bettmanze	•	V.	477
	leucocephalus, Beigfopf	٠ -		492
	levigatus, Glattrucken	•		502
-	lineatus, Banbermange		٧.	479
			Ci	mex

Cimex	97
<b>A</b>	£1). G.
Cimex littoralis, Ufermange	V. 481
- marginatus, Saummange	V. 484
- melanocephalus, Schwarzsopf	V. 499
- minutus, Purpchen	V. 492
- mutabilis, Betterfbange	V. 504
nemorum, Waldjager	V. 499
nobilis, Javaer	V. 478
oleraceus, Gemusmante	V. 490
ornatus, Gabelmange	V. 490
- pabulinus, Kuttermange	V. 498
- personatus, Fliegenwange	V. 493
phyllopus, Blatterfuß	V. 504
- pini, Kichtenwante	V. 500
populi, Pappelufteiger	V. 503
pralinus, Grasmanie	V. 489
- pratensis, Wiesenwange	V 498
- punctatus, Ringelfuß	V 486
Punicus, fürkliche Wante	V. 486
- quadripinolus, 2018 and	V. 487
- Inomocus, Stabilialis	V. 483
Rolandri, Halbdecker	V. 501
- ruber, Rothling	V. 49t
rugolus, Rungler _	V- 482
faltatorius, Seiltanger -	V. 500
faxatilis, Steinmanze	V. 497
—— icaber, Raubpeli	V. 485
- femiflavus, Feinborfte	V. 494
- leratus, Stachelafter	V. 480
- rexpunctatus, Comparibunit	V 488
Mveltris, Walbstreifer	V. 504
Stagnorum, Rabelmange	V. 506
stolidus, Marr	V. 480
Ariatus, Strichschildlein	V. 502
fuccinetus, Penfilvanier	V. 497
- fuperciliosus, Wimper	V. 498
- dipularius, muldenmanie	V. 506
- trifasciatus, Drenband	V- 494
triguttatus, Langdecke -	V. 500
G	Cimex

Clia	Coccinella	99	
THE THE PARTY OF T		Th. E.	4
Clio caudata, Schwangwurn	n	VI. 110	
- pyramidata, Piramiden	murm 4	VI. 110	-
- retufa, Drenedicheibe		VI. III	
- retufa, Drenecfcheibe Clio, (Papilio) Sochorapan	pillon -	V. 585	
Cloftervogel, (Rachtschm.) F	halæna triftata	V. 716	
Clupea, Bering	VIII DESCA	IV. 363	
fimia, Krummschnab	el	IV. 374	
Sinenfis, Stugfteme	- 1	IV. 255	
- fterniela, Beilbauch	Bar Shall - 12 Co	IV. 276	
- tropica, Keilschwang		IV. 376	
Clytia, (Papilio) Electenron	10	V. 614	
Clytus, (Papilio) Drenfern		V. 598	
Coale, (fr.) Braunfrett	of any or had been an	S. 32	
Coari, (amerit ) Ameifenbar	4.12	1. 180	
Coati, (Sar) Urius Loter		I. 284	
Coatimonde, Mafenfrett	June 1	I. 247	
Cohella, (Coluber) geschlan	igelte Natter	III. 171	
Cobitis, Sochschauer	at any attended	IV. 281	
- anablebs, Schmerlin	ng -	IV. 282	
- barbatula, Bartgrur	idel à	IV. 283	2
- Fosilis, Peinter	A Committee	IV. 284	
- heteroclita, Auslan		IV. 285	
Cobra de Corais, (braf.) B	runette, (Beatter)		**
Cobra de Korais, (port.) 21	rgusnatter	III. 208	
Cobra de Verdo, (port.) R			
natter		147- 208	1
Cobra di Cabelo, (ital.) Br			
Cobra di Cabelo, Schlanger	iftein =	I. 443	
Cobra verde, (port.) grune	Ochlange -		
Cobras de Capello, (port)	Brillenschlange	III. 184	
Coccinella, Connentafer	V: 145		
- annulata, Ringel	Hect -	V. 148	
axiridis, Mengel	ltarer	C. 222	
bipunctata, 3mer bipuftulata, 3mer	nfact.	V. 148	
- caeti, Melocact	ylitte -	V. 160 V. 160	
cimicifugæ, War	nzenfrantfafer	S. 222	
- conglobata, Gri		V. 157	
Tong.comm, Or.	G 2	Cocci-	

			Th. S	ŧ.
Cac	cinella	conglomerata, hirfbede -	V. 15	
-		decemguttata, Behntropf	V. 15	7 .
	-	decempunctata, Behnpunkt	V. 15	
-	· 🛌	decempustulata, Behnfiect	V. 16	
		duodecimpunctata, 3molfpunft	V. 15	
		guttato - punctata, Tropfpuntt	<b>V.</b> 15	
		hebræa, Sebraer	V. 15	
	<u> </u>	hieroglyphica, Egipter -	V 15	
		impunctata, ungeflecter -	V. 14	
		impustulata, ungeflectter -	V. 16	
		marginata, Breitfaum -	V. 14	
		novempunctata, Reunpunkt -	V. 15	
_		novendecimpunctata, Reungehnpuntt	V. 15	
		obliterata, Wischtropf -	V. 15	9
		oblongo - guttata, Langtropf	V. 15	
_	÷	ocellata, Argus	V. 15	
_		ocellata, Augenkafer -	<b>6.</b> 22	1
_		oltodecimguttata, Achtzehntropf	V. 15	g
_		oliodecimpunctata, Achtschnpunft	V. 15	5
	_	pantherina, Panther -	V. 16	3
`	_	quadripunctata, Bierpunkt	V. 14	9
		quadripustulata, Bierfled -	V:-16	į
_		quatuordecimguttata, Biergebutropf	V. 15	8
		quatuordecimpunctata, Biergebnpunft	Va 15	4
		quatuordecimpustulata, Biergehnflect	V. 16	i
_	-	quinquepunstata, Funfpunts	V. 19	Ö
		fanguinea, Bluttgel	V. 14	7
_		sedecimguttata, Cechzehntropf	V. I	
_		fedecimpunctata, Sechiehnpuntt	V. 15	4
		sedecimpustulata, Sechzehnfled.	V. 16	2
_	_	septemguttata, Ciebenpunkt -	V. 19	
_		fexpunctata, Sechepuntt -	V. 15	
	-	fexpustulata, Cecheffect	V. 10	
		Surinamensis, Schwarzschild	V. 14	
		tigrina, Liger	V- 10	
_		tredecimpunctata, Drengchnpunkt	V: 19	
-		trifasoiata, Drenband -	V: 19	
	-	tripunciata, Drenpunkt -	٧. 14	
	1		Cocc	Ĭ•

•	Coccinella	Cochevis	101
,	v	ŕ	Th. S.
Coccinella	undecimpunctata, Eilfr	ounft,	V. 153
	unipunetata, Einpunft	•	V. 148
	vigintiduopunctata, 3m	en und zwanzi	
	vigintiguttata, 3mangig		V. 159
	vigintiquatuorpunctata,	Bier und gro	
•	ziger -	-	V. 156
	vigintiquinquepunctata	, Fünf und zie	an,
	siger .	÷.	V. 156
	vigintitriapunetata, Dre	n und zwanzig	ger V. 156
Coccinelle	tortue, à bande rouge,	(fr.) Zwenfic	đ V. 161
	eap ) Meerleuchte, (Fisch		IV. 276
	ustes, (Loxia) Diction		544. 546
Coccus, C		•	V. 527
		` •	V. 529
Ao	lonidum, Abonieschild nidum, Glaebeetenschild	• .	V. 529
be	tulæ, Birfenschilb	•	V. 531
-' Ca	Eti, Cochenille	-	V. 536
C	apenlis, Caaperschild	•	V. 529
	prez, Palmweitenschild	. •	V. 533
	rpini, Dagbuchenschild	•	V. 532
co	ryli, Haselschild	-	V. 532
— — he	speridum, Gemachshause	rschild	V. 528
— — ili	ris, Kermesbeer	•	V. 530
-M	yricæ, Myricaschild	•	V. 533
	xyacanthæ, Hagedornschi	1b <del></del>	V. 536
– – ph	alaridis, Glanzgrasschild	<b>-</b> ,	V. 535
	osellæ, Mauseobrieinschil		V. 535
	lonicus, poinisches Korne	ridild	V. 534
	ercus, Eichenschild	•	V. 530
	lci, Mausdornschild	•	V. 532
	icis, Weidenschilb	•	V. 533
tili	æ, Lindenschild	•	V. 532
	mî, Ulmenschild	•.	V. 532
	æ urli, Barentraubenschil	<b>b</b> -	V. 535
	is, Weinstockschild		V. 533
	(Schildlaus) Coccus Ca	čti -	V. 536
ochevis,	(Alauda) Roftflügel	•	II. 136
ochevis,	(fr.) Paubenlerche	. •	II. 520 Cochina
	· 6 •		T OCDINA.

	Colibri	Coluber	103
			Th. C.
Golibri, co	apfcher, Certhia famola		II. 253
Colibrifref	er, (Spinne) Aranca av	ricularia V	V2. 1080
Colin, (B	erghuhn) Tetrao Colin	•	S. 129
Colin, (fr	) bunte Mewe	•	11. 348
Colius, (L	oxia) Regelschnabel	•	II. 149
Collier, (	atal.) Loffelente		II. 290
Collurio,	(Lanius) Kintenbeiffer	• (	II. 113
	(ital.) Taube	- '	II. 497
	aftardwespe) Sphex Col	lon -	V2. 872
Colon. (D	ermestes) Colontaferch	en -	V. 109
	lachtschm.) Phalæna Co		V. 736
	obengraber) Sylpha Col		V. 132
Bolonfåfer	, (Rufelfafer) Curculi	o Colon -	<b>S</b> . 229
Colontafer	chen, (Kleinkafer) Derm	estes Colon	V. 109
Coltatl.	merif.) Seibenschwanz	-	II. 542
Coluber,		III. 152	<b>C.</b> 189
	desculapii, Aesculapschia	mae -	III. 177
	flivus, Commernatter		III, 200
	gilis, Schleuberer	_ ′	M. 181
•	lbus, weisse Ratter	•	III. 168
	ngulatus, edige	•	III. 167
	nnulatus, Ringauge	_	III. 196
a	nnulatus, Ituguuge tratus, geschwärzte Natt	or _	<b>5</b> . 260
			III. 188
a	trox, Tirann	•	III. 182
<u> </u>	ulicus, Hoffunker		III. 161
t	erus, europäische Ratter		III. 161
b	uccatus, Breitbacken		III. 156
c	alamarius, Keberfiel	_	III. 191
c	andidus, Beißtopf	_	III. 186
، سب رکنی	anus, graue Ratter		III. 192
c	arinatus, Rielruden	an -	III. 205
c د	increus, aschgraue Ratt	et -	III. 207
	oerulescens, blave Ratter		III. 168
، ر	coeruleus, blaue Natter	_	M. 192
<del></del>	orallinus, Korallennatte	• -	E. 189
c	rotalinus, Rlappernatter	atter -	III. 178
c	yaneus, himmelbtane Re		III. 173
d	oliatus, Reifnatter	• , .	
	G	4	Coluber

	_			Th.	€.
Col	uber	domesticus, Hausschlange	•	III.	206
	-	exoletus, Kablnatter	•	III,	194
		falciatus, bandirte Matter	-	III.	
-		fikformis, Fadenschlange	•	III.	203
-	-	fimus, Affennase .		111.	157
_		fulvins, Gelbringel .	•	ĮĮĮ,	183
-	-	fuscus, Brinette -	-	III,	
-		guttatus, Blatternatter	•	III.	
-	_	hydrus, Klubnatter	•	҈.	190
		jugularis, Blutteble .		111.	198
-		latteus, Milder .		III,	181
	<del></del>	laticaudatus, Breitschmang	-	III.	187
***	-	lebotinus, Rupfernatter	•	III,	170
	<b></b> ,	74-7-1	•	III.	196
***		lineatus, linirte Ratter	•	III,	
-30	-	Maurus, barbarifche Ratter	<b>-</b> '	III.	179
	-	melanis, Tenfelschlange	<b>.</b>	Œ,	191
		melanocephalus, Schwarzkopf		111.	171
-		Mexicanus, merifanische Ratter		III.	1-4
, ===		miliaris, Gricenatter	₹ .	111.	177
	-	Minorvæ, Dratnatter	4	III.	205
<b>Pro-</b> C	-	monilis, Juwelier .		III.	
<del></del>	-	mucolus, Schleinmatter	***	III.	206
		myeterizans, Rumpfnase	• '	III.	207
777		nebulatus, Wolfschlange	•	III.	189
-		niveus, Schneeschlange		III,	
Street,		ordinatus, Punktlinie	-	ĮII.	173
-	•	ovivorus, Eperfresser	•		193
<del></del>		pallidus, Blagnase	~	`III.	183
****		petalarius, bunte Matter	-	III.	202
_		plicatilis, Wickler .		III.	159
		pullatus, Trauernatter	•	III.	203
-		punctatus, runftirte Matter	•	Ш	161
<del>10-10</del>	-	Reginæ, Koniginnennatter	• '	· 111,	172
-	-	rhombeatus, Blaumurfel	•	III.	178
First	-	Saturninus, Blennatter	•	Ш,	191
<b>PPC</b>	-	scaber, Stachelnatter	•	111.	192
40-3	Price.	scutatus, Schilbnatter	- (	Œ.	190
				Col	uber

	Coluber Co	olumba	105
		7	
Coluber	feverus, Japonesische Matt	an	<b>L</b> h. <b>S</b> .
	sibilane, Zischer		IIJ. 174
	firtalis, Papagenennatter	•	111. 187
	stolatus. Schleppnatter		III. 188
	ftriatulus, Bandruden	. •	III. 176
	triscalis, Drepftrich	. •	III. 157
	viridislimus, grune Ratte		III. 195
	vittatus, Chlenernatter	•	III. 205
Columb	, (Sirex) Taubchen	• • .	III. 176
Columbi	Sauke -	II	V2. 838
		11. 49	%. S. 131
	Afra, afritanische Taube	• • •	11. 508
		Tanka II .	11. 510
	Asiatica, Rothhals		14 S.132
	atricollis, Schwarzhals		S. 133
	australis, Gelbichmang	•	
		aube	S. 132
			11. 510
	Carolinentis, Carolinisch	e Taube	II, 514
	cauda æquali, Geradichn		II, 514
			II. 496 II. 505
	cucullata, Haubentaube	•	II. 500
	cyanocephala, Blautopf	-	II. 507
	domestica, Saustaube		11. 497
<b>-</b> -	fusca, braune Taube	•	S. 134
	galeata, Schutanbe	•	II. 502
	gesticulosa, Taumlertauf	e -	11. 502
	Guinea, guineische Taube		11. 505
<b>-</b> -	gutturalis, Rropfer	•	S. 131
	gutturola, Kropfer	•	II. 500
	gyratris, Taumler	•	II. 502
	Hispanica, spanische Taul	be 🕳	II. 499
	hispida, Raubtaube	•	II. 500
	Jamaicensis, Jamaicaisch	e Taube	11. 508
	Javanenus, Grunrucken	-	©. 133
	Indica, Indianische Taub		11. 509
	Indica, Batavische Tanbe		©, 133
	laticauda, Breitschwang	-	II. 501
	Gr		Columba

Dominicus, Domingischer Taucher dupplicatus, Doppeltaucher -

glacialis, Eistaucher

**€**. 10<del>7</del>

Colym-

Colymbus	, Conops	107
,		Th. G.
Colymbus podiceps, Arfchfuß	<del></del>	II. 343
S. Thomæ, Et Th	omastaucher	S. 107
feptentrionalis, ros		II. 339
Comadreia, (fran.) hermeliu	-	1. 274
Comaliecatl, (merif.) Langfuß,	(Regenpfeifer)	II. 421
Combattant, (fr.) Kampfhahn	_	II. 404
Comet, (Geoftern) Afteria rube	ens -	VI, 132
Comête, (fr ) Comet	•	VI, 132
Comitator, (Ichneumon) Beyl		V2. 849
Comma Butterfly, (engl.) bas	meisse E	V. 610
Comma, (Phalæna) Daflein	-	V. 695
Comma, (Englann.) Papilio Co	mma -	V, 630
Comorra, (ital.) Geme	•,	I. 409
Compasmuschel, Ostrea pleuro		VI. 304
Compunctor, (Ichneumon) Si		V2. 841
Concha anatifera, Entenmuschel		Vl. 208
Concha Venerea, Porsettane	•	VI. 385
Conchilien, Testacea	→ VI. 9	. 14. 147
Condoma, (Hirschbock) Antilop	e strepsiceros	G. 55
Conelo, (fpan) Kaninchen	-	II. 322
Conepatl, Stinffuchs	- I.	245 000
Confeftschinkthen, (Tellmuschel)	Tellina roftrata	VI. 237
Conger, (Murana) weersal	-	IV. 42
Conger-Eel, (engl ) Meeraal	<b>~</b> .	IV. 42
Congre, (fr.) Meeraal	•	IV. 42
Congrus, Meeraal	•	IV. 42
Coniglio, (ital) Kaninchen	•	II. 322
Conops, Stechfliege	-	F2. 995
- acnleata, Stachelmaul	•	V2. 998
- atomaria, Connenstau	bohen -	V2. 999
buccata, Dichacke	_ '	V2. 1000
calcitrans, Babenftech	er 🗀 🖚	V2. 997
- ferruginea, Roftfafer		V2. 999
irritans, Rudenstecher		V2. 997
- macrocephala, Großto	pf -	V2. 998
- petiolata, Salstorper	•	V2. 999
- roftrata, Regelschnabet	-	V2. 996
subcoleoptrata, Rafer	liego -	V2. 1000
		Conops

·	Th. €.
Conops testacea, Rrummafter -	V2. 1000
- vesicularis, Blasenzieher -	V2. 998
Conopsoides, (Musca) Baftarbftechfliege	V2. 955
Conque persique, (fr.) Rudolpheschnede	VI. 462
Conservæ, Scemoofe -	VI2. 649
Constrictor, (Boa) Konigsschlange -	111, 146
Constrictor, (Coluber) Burger -	III. 194
Contor, (span.) Cuntur -	II. 49, 50
Contortrix, (Boa) Aneifer -	III. 144
Contra, (Sturnus) bunter Staar -	11. 525
Conulus, (Trochus) Echnurbund -	VI. 535
Conus, Tute	VI. 362
- aransiacus, Orangenabmiral -	VI. 379
aulicus, Brunette -	VI. 382
- betulinus, Buttertute	VI. 376
bullatus, Boifenback -	VI. 383
- figulinus, Eichenholztute -	VI. 376
- generalis, Kloppelfuffen -	VI. 367
- Genuanus, Genuesische Title .	VI. 372
- glancus, Epprisches Ratchen -	VĮ. 373
- granulatus, granulirtes Ratchen	VI. 379
- hebræus, Bauernmusik -	VI. 377
- imperialis, Kronentute -	VI. 365
literatus, Tiger -	VI. 366
- marmoratus, herztute -	VI. 364
- minimus, grauer Monch	VI. 374
- nobilis, gelbe herztute -	VI. 372
- rusticus, Aschenstober -	VI. 374
- ftriatus, Wolfenschnecke -	VI. 381
- varius, Lowentute -	VL 378
- vicarius, Vice: Admiral -	VI. 371
Cony, (engl.) Kaninchen -	II. 322
Coot, (engl.) schwarzes Wasterbuhn -	II. 427
Coparacoih, (amerit.) Sperbereule -	II. 101
Coprias, Mistafer	V. 56
Cog, (fr.) Daushahn -	II. 469
Coq de Bruyere, (des Bois) (fr.) Auerhahn	II. 479
	II. 461. 465
	Con

Coq	Coralline	109
,		Th. S.
Coq et Poule, (fr.) Terebratul	,—	VI. 324
Coquandototl, (amerif ) Seibenf	chwanij	II. 541
Coquimboische Ranincheneule	•	11, 107
Coquus, (Cerambyx) Roch		V. 268
Cor, (Chama) Rarrentappe	محد هند	VI. 284
Coracias, Rackervogel		82. <b>S</b> . 86
- Bengalensis, bengalischer	Rabe -	II. 183
- Caffra, athiopische Doble		II. 183
— — caudata, Langschwanz	• •	II. 184
- garrula, Mandelfrabe	•	II. 183
— — glaucura, Blauschwanz	-	<b>©.</b> 86
- Indica, Offindischer Sah	er. —	II. 183
- leucocephala, Weißtopf		<b>€</b> . 86
- orientalis, Morgenlande	•	II. 183
Coracinus, Geetrahe, (Umberfifd	) -	IV. 219
Coralle, gestreifte, Millepora line	ata 🗕	VI2. 717
rothe, Corallium rubrum	•	VI2. 744
schwarze, Gorgonia antipa	thes	VI2. 762
Corallen, Vermes: Lythophyta	VI. 10. 23	. VI2. 641
Co-allendublet, Ostrea nodosa		VI. 307
Corallenbale, (Papagen) Plittacu	s notatus.	S. 75
Corallenmoofe, Zoophyta: corallin	1æ <b>–</b>	VI2. 822
berfchiedene Arten	derselben	VI2. 822
Corallennatter, Coluber corallinu	s -	III. 193
Corallenfauger, (Madelfisch) Syngn	athus pelagici	15 III. 342
Corallenwinde, Sertularia volubi	lis -	VI2. 844
Corallina, Korallenmoos		VI2. 822
- antrosaca, Rabeltocher	•	VI2. 819
- barbata, Bartmoos	<b>-</b>	VI2. 828
- cristata, Saamenmoos	. •	VI2. 827
- corniculata, Sornermo	o\$ -	VI2. 828
fragilistima, Stamming - officinalis, Apotheker, A	08 -	VI2. 828
- officinalis, Apotheterik	orallenmoos –	VI2. 826
- rigens, Stammoos	•	VI2. 828.
- rubens, Saamenmoos	-	VI2. 827
- terrestris, Erdforallenn	1008	VI2. 829
— — tubulosa, Kalchköcher	-	VI2. 817
Coralline, (fr.) Korallendoubles	<b>.</b>	VI. 307
•		Epraul.

110	Cotabilien	Corrac	
			Th. 🕏
Corall	inen, Zoophyta: sertulariæ	<b>3</b> -	VI2. 831
	lium rubrum, tothe Koralle	•	VI2. 744
Corbe	au, (fr.) Rabe	<u> </u>	II. 168
Corbe	i, (schottl.) Rabe	<b>-</b>	II. 168
Corbe	tille, (fr.) der Korb, (Arche)	<b>÷</b>	VI. 297
Corbi	, (arab.) Krofodill	<b>-</b>	HI. 79
Corbo	, (Corvo) (ital.) Rabe	•	11. 163
Cordy	la, (Scomber) Breitfisch	•	IV. 262
Cordy	lus, egiptischer Schleuberschw	anz, (Cibech)	e) III. 83
Cordy	lus, (Lacerta) Ctachelschwa	ng -	III. 89
Coria	ius, (Cerambyx) Gerber	′ <del>44</del> '	V. 254
Corip	hoena, Stußtopf	٠	IV. 116
<u> </u>	— acuta, Spisschmanz		IV. 123
سخلنز	- branchiostega, Riemen		IV: 125
ستيد	— , clypeata, Schilbtraget		IV. 125
	- equilelis, Sprenkelfisch		IV. 118
، خت	- hemiptera, halbstoffet		IV. 124
	- lineata, Buntfopf	• •	<b>Č</b> , 203
	- novacula, Mefferructer		IV. 12i
	- pentadactyla, Kunffing		IV. 119
خف	- virens, gruner Stugto		IV. 124
	u, Corly, (fr.) Krummschnal	el II.	
	oran, Wafferrabe		11. 329
Cormo	orna, Pelikan	•	II. 323
	Crek, (schottl.) Wachteltonig	<b>.</b>	11. 436
Corne	ille, (fr.) Krabe		11. 172
Corne	ille moissoneuse, (fr.) Eaats	rape -	· II. 173
	ce, Cornachio, (ital.) Krabe	. •	<b>II.</b> 172
Corni	x, (Corvus) Rebelfrahe		11, 174
Cornu	arietis, (Helix) Bibberhorn	<b>.</b>	VI. 568
Cornu	militare, (Helix) Kathal	-	VI. 566
Cornu	ta nodola, Podagraschnede	•	VI. 478
	oro, (amerik.) Umberfisch	. •	IV. 221
	a, (Nerita) Flußborn	• ,	VI. 588
	e, (Corvus) schwarze Krähe	inani Olksias.	II. 178
	goni, Aefchen mit fast unsichtbe		IV. 325 F. 851
Corru	lcator, (Ichneumon) Schinn 5, (Canis) Wolfshund	HEFEE .	<b>6.</b> 28
COLUM	A PORTION KRALIDANIA		Corta

Corta	Couleuvre	e j	iii
Corta pao, (port.) brafiliani	ider Specht	Eb. II.	
Coruz, Dicfug, (Regenpfeil		11.	
Corvinus, Corvulus, Sectro	ibe. (Umberfild	) IV. 210.	277
Corvus, Rabe	-	II. 167. 🖲	
Afer, afritanische Di	ible -	11.	178
albus, Weißbald	. •	€.	85
- Balicaslius, philippin	uische Doble	II.	
brachyurus, Kurisch	wang .	· II.	180
- Cajanus, Cajennische	r Haber	- п.	
Canadensis, Canadis	cher Rabe	- II.	180
- cinereus, Purpurtop	f	<b>- 6</b> .	86
- corax, Kolfrabbe	•	IÌ.	
- cristatus, Saubenhal	jet , 🕳	II.	
- frugilegus, Saattrál		II.	
fuscus, brauner Rab	t -	Ġ.	85
glandarius, Holhah	er -	II.	174
- graculus, Comeiger	trabe -	<b>- Iİ</b> .	187
- Hottentottus, Sotter	ntottischer Rabe	II.	167
pyrrhocorax, Bergd	oble	– İI. :	180
- ruber, Rothfeber		<b>.</b>	85
Senegallensis, fenega	lische Elster	ÌI.	179
tricolor, gruner Rab	)e , =	☻.	85
Coffus, Solgwurm	•	V.	
Coffus, (Phalæna) Blatterbe	otn =	<b>V.</b>	672
Cossus Saguarius, (Curculi	o) Palmbohrer	<b>'V</b> . :	213
Cotinga purpurea, Purpur,	Seibenfcman;	п.	54 t
Cottoides, (Perca) Knorrba	ríd	IV.	23d
Cottonball, Alcionyum coton	ium -	VI2.	768
Coturnix, (Tetrao) gemeine	Wachtel I	I, 492. <b>E.</b>	128
Cottus, Anorrhabn	•	IV.	133
cataphra&us, Stein	picter -	· IV.	133
grunniens, Brumnie	er -	IV.	135
— anadricarnis, Bierb	beniger Anorth	ahn IV.	135
- fcaber, Gabler		IV.	135
scorpius, Donnerfri	óte <del>-</del>	· IV.	137
Cottus, Seebrache	•	IV.	70
Coucoujou, (braf.) Laterntra	ger -	<u>v</u> . 4	
Coulanchant, (fr.) Doimetfd	her, (Etrandlå)	ufer) II.	
Couleuvre, (fr.) Otterschlan	ge , •	Ш	152

	Th.	G.
Couleuvre à colier, (fr.) Ringelnatter	III.	
Coulon, (fr.) Ringeltanbe		506
Coulterneck, (engl.) Seerapagen		311'
Courier, (Sandlaufer) Cicindela campestris		328
Courli, (fr.) Echnepfenschnabel -	VI.	494
Courly, (Brachvogel) Tantalus Courly	E.	112
Courly d' Amerique, (ft.) Mimmersatt. II.	389.	
Courly de terre, (fr.) Dicffuß, (Regenpfeifer)	II.	420
Courly, (Tantalus) Courly	€.	112
Couronne d' Ethiopie, (fr ) gefronte Wargenback	e VI.	428
Conrtilliere, (fr.) Maulwurfgrille		423
Coulin, (fr ) Schnacke, Mucke -	٧2.	
Couvins, (engl ) Stranbmondichnecken	VI.	
Cow, (engl.) Ruh		431
	462.	
Coyamati, (mer ) Bisamschwein		465
Coyopollin, Philander		295
Coyuta, (braf ) Ameisennatter -	III.	
Cozacoauthli, Cozquauthli, (mex.) Kablhals		. 54
	V2. 1	
Crabe, (fr.) Krabbe -	V2.	
	V2. 1	
Crabro, (Vespa) hornisse	<b>V</b> 2.	
Cracker, (engl.) Pfeilschwanzente -		295
Cranchio, (ital.) Rrebs	<b>V2</b> 7 1	
Crangon, (Cancer) Garnale	V2.	
Crangcoralline, Sertularia verticillata	¥12.	844
Crapand volant, (fr.) Biegenmelter - !!)	Π.	836
Crapaut, (fr ) gemeine Rrote		51
Crapaut terrestre de Surinam, (fr.) Surinami		í
sche Krote –		49
Crassipes, (Acarus) Dicfuß	V2.	
Cravant, (fr ) Ringelgans -		286
Crax, Pauvis		465
- globicera, Karassausche Panwis -		467
- rubra, Peruvianische Pauwis -	II.	466
Creac da Bulc, (fr.) Meerengel, (Saan)		257
Creeper, (engl.) Baumlaufer .	П.	253
	Cre	pera

Crepera Eronen	113
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Th. G.
Crepera, Baumlaufer -	II. 253
Cresserelle, (fr.) Thurmfalke -	II. 80
Crested - lark, (engl.) Saubenferche -	II. 520
Crefted-titmouse, (engl.) Saubenmeife -	II. 626
Crested wren, (engl.) Saubentonig -	II. 620
Cretenfer, (Lippfisch) Labrus Cretenfis	IV. 197
Ereug, (Cifade) Cicada Crux	V. 453
Creuparche, Arca decussata -	VI. 297
Ereugbock, (hieschbock) Antilope scripta	S. 55
Creugdublet, (polnifcher hammer)	VI. 313
Ereiger, (Rlippfleber) Patella cruciata	VI. 615
Creutstiege, Hemerobius cruciatus -	<b>G.</b> 316
Crentfraufel, Trochus cruciatus -	VI. 529
Ereugqualle, Medusa cruciata -	VI. 123
Creugschale, Venus decussata -	VI. 278
Erensspinne, Aranea Diadema - 7	/2. 1070
Creugirager, (Cifade) Cicada cruciata	V. 453
Creugträger, (Rachtschm.) Phalmna Xylosteana	V. 725
Creugtrager, (Ruffelkafer) Curculio Crucifer	S. 231
Ercustrager, (Schildkafer) Cassida cruciata	V. 139
Ereugwanze, Cimex Andreæ -	V. 497
Crevalle, (fr.)' Sichelflosse .	IV. 251
Crex, (Rallus) Wachtelkonig .	II. 435
Crex, Strandschnepfe,	II. 400
Crey-fish, (engl.) Rrebs	/2. 1124
Cribrum, (Phalena) Siebflugel -	V. 677
Cri-cri, (fr.) Hausgrille -	V. 424
Crista galli, (Mytilus) Dahnenkamm -	VI. 328
Crocala, (venet.) Meme	IL 344
Erocodill, Lacerta Crocodilus	III. 78
Croiseau, (fr.) Ringestaube	II. 506
Croker, (engl.) Wellenbarsch -	IV. 231 IV. 213
Cromis, (Labrus) Carolinischer Lippsisch Erone, (Rachtschm.) Phalæna militaris	V. 654
Eronencoralline, Sertularia fastigiata	VI2, 856
Eronenlampe, (Laterntrager) Fulgora Diadema	V. 448
Econenperibuhn, Numida coronata -	G. 126
Geonemogel, (Nachtschm.) Phalmaa Cameliana	V. 678
H	Croque

,	<b>Eh. E.</b>
Croque noix, (fr.) Haselmans -	L 350
Crotalus, Rlapperschlange	III. 133
- durissus, Rlapperer .	III. 142
- horridus, Schauerschlange	III. 139
- miliarius, Schleuberschwang	. IIL 139
- mutus, Stumpfschwanz -	III. 143
Orotopliaga, Minbenfresser	II. 165
ambulatoria, Surmamischer Maber	nfe. II. 166
ani, Afritanifcher Madenfreffer	IE. 167
Crot-pescherot, (burgand) Kormoran	IL 328
Crow, (engl.) Rrabe -	II. mp
Crow-fish, (engl.) Seetrabe, (Umberfisch)	IV. sky
Crucifer, (Curculio) Kreuttrager	6. 43
Crux. (Cicada) Rreuß	V. 413
Crux major, (Carabus) Groffreut	V. 365
Crux minor, (Carabus) Rleinfreug -	V. 366
Cteines, Ctenites, Bastardarden	VI; 296
Cuadervitz, (span.) Wachtel -	II. 492
Cuaiguara, (braf) Bisamschwein -	I. 455
Cuandu, (braf.) Stachelschwein	L 324
Cucco, Cuculo, (ital.) Guragua -	li, 205
Cuculus, Guctguct - II. 2	205. E. 90
- Americanus, Ameritanischer Guckguck	II. 211
- Brafiliensis, Brafilianischer Gudgud	II. 214
- Cajanus, Cajennischer Guckguck	II. 212
- canorus, Europaifcher Gudgud	II. 205
- Capenlis, Caapicher Guckguck	<b>©.</b> 90
— — coeruleus, blauer Guckguck -	II. 213
cornutus, gebornter Gudgud	II. 214
- Coromandus, Coromandelischer Sudg	
cristatus, Saubenguckguck -	II. 214
Dominicus, Antillischer Guckguck	II. 212
- glandarius, Afrikanischer Gudgud	II. 210
- honoratus, Malabarischer Guctgud	II. 210
Mindanenlis, Philippinischer Gudguc	
- nævius, geflecter Gudgud -	II. 211
	212, <b>S.</b> 90
- orientalis, Affatischer Guckguck	II, 208 Cuculus
	Cucuius

100 TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cuculus	Cultellus	115
	Winds Charles	CARTOL O T GUARS	Th. S.
Cuculus	paradileus, Giamii	cher Guckanck	II our
-	punctatus, gesprent	elter Buchauch	II our
775 - 77	Icolopachus, Ctad	elfchnabel -	II our
- N	Senegalenlis, Gene	gallifcher Gudaud	II. 210
T	Sinenus, Chinejiche	r Gudaud	H 212
Cuculus.	(Irigia) (Seequete	ucf.	157
Cucuphi	1. (earnt.) Distebelion	€	TY
CHULL I	THE WORLD AND HADE	LIPTY	S. 55
CHCIII CI	CIL 1 EDHELGGIBS		11 262
Hemer	e. (Tr. ) Jippinchuahe	of and a second second second second	TT -/0
CUCI VOS	LILWII. / DUIDE		11 160
Cuguacu	latana, otunnuntue	Mase	(95 20
Cugume	ua, (pan.) weine 20	achitelie -	II. 607
Enlanaia	gmetterling, (Lagvog	el) Papilio Plidii	V. 585
Enjaveno	etter, (Tagfchm.) P	apilio Charitonia	T/ -0-
Cujelier,	(fr.) Baumlerche	fonithilled affined	II. 519
entr's bi	inppiniplet state	and the	11. 183
Cul blan	ic, (fr.) punttirter (	trandlaufer	II. 411
Cul-blan	ic-roux, (fr.) fpan	iche Bachstelze II.	
Cul-de-	Cheval, Cul d'ane	(fr) Aufterneffe	
Cui de la	mpe, (fr.) Pagoden		VI. 545
Culex, I		V2. 98	9. 6. 336
	furcatus, Gabelschna lpius, Caspische Mü		V2. 992
ca	liaris, Rauhflügel	us de la como	9 336
en	uinus, Pferdemucke	Aller Salute	V2. 991
- H	yrcanus, Hirfanier	वाके का अना किरान्त्र है	V2. 992 S. 337
pi	piens, Singschnate	martin Tr Glude	V2. 991
pu	licaris, Flohmuce	didentify and the state of	V2. 992
re	ptans, Kriecher	swalnik - brook	V2. 992
fte	reoreus, Rothmucke	Dan Jagandis	V2. 993
	ico, (ital.) Beißscht	banz -	11- 600
	o, (ital.) bunter Gr	ocht .	II age
	re, (fr ) Beiffpecht	100 A 100 A	11. 227
	(Solen) polnisches	Meffer	VI. 228
MU0193	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	H 2	Cunapu-

	•		Th.	Ğ.
Cunapu- (	Cugupu-) Guacu, (bras.)	Jacob	137	237
	Evertsfisch –	_		322
Cuniculus,	(Lepus) Raninchen	_	II.	49
Curile (1	iltur Gryphus	<b>-</b>		622
Cupido, (I	Papilio) Ellbertropf	_		483
Cupido, (1	Cetrao) penfilvanischer Fasan			405 465
Curacoa - b	ird, (engl.) Pauwis	V. 21		
Curculio,	Kabeltafet -	V. 21		
al	obreviatus, Kurimantel			242
al	vietis, Tannenkafer	•		231
<u> </u>	eridulus, Langenfresser	•		217
89	quarus, Schwarzruffel			216
a	binus, Weißstirn			237
_ <u>_</u> A	lgirus, Algierer	•	V	225
a	lliariæ, Stengelbobret		V.	215
	ni, Erlenbupfer	نعت .	V	227
a	nguinus, Schlangenkafer	2	V	225
غ aı	nnulatus, Ringeltrager		V	230
a	pterus, Kahlflügel		V.	242
<u> </u>	rgentatus, Gilberfafet	_	V	236
<u>ن</u> ـــ غا	rgyreus, Silverrüßel		_ V	236
A	Canii, Afcantustafer	· 📥 🗓	V	. 225
a سے سے	ter, Schwarzrock		Y.	239
a a ع	terrimus, Köhler	•		217
B	adensis, Babener		<b>V</b>	216
B	sarbarus, Franzosc	• .	V	239
b	ecabungæ, Bachbungenspring	jet	_ <b>V</b>	. 226
→ - b	etulæ, Birfenfelder	_	V	226
b	ipunclatus. Schwaristeck	•	V	. 223
c	ampanula, Glockenblumenfau	get	V	. 216
<b>ب</b> ب	andidatus, Candidat	<b>÷</b>	•	231
<u>-</u> - 0	apenlis, Afrikaner	•	V.	240
c	arbonarius, der Schwarze	-	V	229
c	arinatus, Kicklafer	٠		. 233
c	erali. Ritledtäfet	•	V	. 217
c	ervinus, Hirschborukafer	· <b>-</b> ,	<b>V</b>	235
ر بنہ ح <b>ت</b>	hloropus, Granfuß	•	V	. 238
· c	ornutus, Horntrager	-	٧	. 241
				culie

		Curculio	117
		•	₹6. S.
Çui	rculi	o craccæ, Wickennascher -	V. 215
	_	cupreus, Rupfertafer -	V. 220
-	_	cyaneus, Weidenbohrer -	V. 215
	_	depressus, Plattrucken -	V. 230
_	-	dilpar, Baftard -	V. 230
_	_	dorfalis, Blauftriem	V. 219
	_	druparum, Rothichnabel -	V. 233
	_	emeritus, Spinnentafer -	V. 239
<del></del>		fagi, Buchweider -	V. 227
	-	frumentarius, rother Kornwurm	V. 218
-		Germanus, Deutscher -	V. 231
	-	granarius, schwarzer Kornwurm	V. 219
<del></del>		granulatus, Körnerdecke -	V. 241
		hemipterus, Halbstügel -	V. 215
	-	hispidus, Echuppenkafer —	V. 234
_		inçanus, Stumpfdecke -	V. 237
	~	inderiensis, weisser Safer -	S. 232
		indus, Elefantenrugel -	V. 213
_		lapathi, Equermaul -	V. 220
_		ligustici, Liebstockelkafer -	V. 234
		lineatus, Bruststrich -	V. 237
7	-	melanocardius, Berified -	V. 219
~		mucrosus, Gelbschimmel -	V. 229
	-	nebulosus, Wollendecke -	V. 238
		nucum, Rußtafer -	V. 232
		oblongus, Schmalbauch —	V. 235
-		ovalis, Marmoren -	V. 228
_		ovatus, Enertafer -	V. 235
_		palmarum, Palmbobrer -	V. 211
	_	paraplecticus, Lahmer -	V. 224
	-	pedicularius, Lauser -	V. 234
	_	pericarpius, Kernwachter -	V. 223
	-	piceus, Pedrugel -	<b>€</b> . 232
_		pictus, gemablter Kafer -	S. 232
_	_	pini, Fichtenkafer -	V. 220
-	_	poligoni, Wegtrittkafer -	V. 222
_	_	pomorum, Apfelschäler -	V. 228 V. 226
_	_	populi, Pappelnager -	V. 226 Cur-
		. Нз	Cut

Cushat,

Cushat	Cynips	119
		Th. S.
Cushat, Ringtaube	-	II. 506
Cutte-fish, (engl.) Dintenfifch	_	VI, 115
Cut-water, (engl ) Berfehrtfe		II. 355
Cyanurus, (Motacilla) Blaufc		S. 175
Cyclogaster, Ringbauch	•	III. 333
Cyclopterus, Meerhaafe	-	III. 329
liparis, Ringbaug	fo -	IIL 333
nudus, Schnottol	ŕ -	III. 333
Cydippe, (Papilio) Marmorf	uter –	V. 609
Cygne, (fr.) Schwan		II. 276
Cygnoides, Schwanengans	•	II. 278
Cygnus, Schwan	-	II. 275
Enlindercoralle, Madrepora or	ganum -	Vl2. 692
Enlinderflob, Podura helvola	_	<b>S</b> . 339
Enlinderbahnchen, Chrysomela	paracenthelis	<b>5</b> . 223
Enlinderköcher, Tubularia indi	vila –	VI2. 814
Eplinderfrebe, Cancer cylindri	cus -	©. 348
Eplinderscheide, Ascidia rustica		VI. 85
Eplinderschnecke, Helix subcyli	ndrica -	VI. 578
Cylindre, (fr.) Olive		VI. 419
Cymbium, (Argonauta) Kabn		VI. 350
Cymbium, (Voluta) Jacobater	ıq -	VI. 439
Cyna piona, (Hal.) Meerfau (	Daan) -	III. 262
Cynædus, Steinfisch	-	IV. 216
Cynips; Gallapfelmurm	•.	V2. 810
fagi, Buchenbohrer	-	V2. 815
glechoniæ, Gunderman	in - '	V2. 812
— — hieracii, Sabichtsbohre	r -	V2. 812
inanita, hohlbauch	-	V2. 817
— — quercus baccarum, Ele	henbeere	V2. 812
quercus corticis, Rinde	enbecherchen	V2. 814
quercus folii, Gallnuß	. •	V2. 813
quereus gemma, Schut	ppenapfek	V2. 815
quercus inferus, Rothi	ung -	V2. 813
— — quercus pedunculi, Bl	utennu Boyen	V2. 814
quercus petioli, Stieln	mg —	V2. 813
quercus ramuli, Boller	muß -	V2. 814
— — rolæ, Rosenbohrer	9	V2. 811
	H 4	Cynips

Cyprinoides Dammerunge	121
	Th. S.
Cyprinoides, (Mormyrus) Karpfenmurmel	IV. 361
Cyprineides, (Salmo) Rarpfensalm -	IV. 330
Cyprinus, Karpfe - IV. 378	3. 6. 210
- alburnus, Mesteling -	IV. 396
- Americanus, Krunmfinie -	IV. 396
- aspius, Krummfiefer	IV. 395
- auratus, dinefischer Goldfisch -	IV. 386
ballerus, Blide -	IV. 399
— — cephalus, Dictionf —	JV. 385
— — cultratus, Dunnbauch -	IV. 398
- dentex, Zahnmaul .	IV. 397
— erythropthalmus, Nothauge -	IV. 393
— — farenus, Karen —	IV. 399
- gonorynchus, caapscher Karpfe	IV. 389
— leuciscus, Weißsisch —	IV. 390
— — Niloticus, Nilfarpse	IV. 388
— — phoxinus, Eltity — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	IV 389
— rivularis, Bachkarpfe —	<b>E</b> . 210
- rutilus, Rothflosser -	IV. 392
Epreisches Rathen, Conus glaucus -	VI. 375
Cyranta, (poln.) Rriechente -	II. 297
Cytherea, (Papilio) Gilberband -	V. 619
<b>D.</b>	
Dab, (engl.) Schuppenblutfisch -	IV. 156
Sach, chinesisches, Turbo tectum persicum	VI. 545
Dachkafer, (Erdkafer) Carabus Buprestoides	V. 358
Dache, Ursus Meles —	I. 281
Dachshund, Canis vertagus	I. 209
Dachehund mit langem Korrer und furgen Fußen	S. 27
Dactylus, (Pholas) Steinbohrer —	VI. 212
Daetylus, Steinmuschel -	VI. 332
Daktylus, (Voluta) Schweinchen	VI. 421
Dadels, (holl.) Oliven	VI. 419
Dammerungsvogel, (Rachtschm.) Phalæna cre-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
puscularis —	V. 655
Danmerungsvogel, (Pfeilschwan;) Sphinx lu-	
gubris – –	S 301
. H 5	Dam.

	Th.	C.
Dæmon Thebaicus, Schuppthier -		185
Dane, (Grashupfer) Gryllus Danicus -		445
Dag, (hebr.) Kisch -		. 2
Dails, Dattes, (fr.) Pholaden -	VI.	210
Daim, Daine, (fr.) Dambirsch -		399
Daino, (ital.) Damhirsch -		349
Daker-hen, (engl.) Bachteltonig -	II.	436
Dama, (Cervus) Dambirsch -	I.	399
Dame, (Rachtschm.) Phalæna Matronula	V.	681
Dambirsch, Cervus Dama -	I.	399
Damier, (fr.) caarsche Taube - II.	317.	318
Damone, (Papilio) Liger -	V.	591
Danai candidi, (Papiliones) weiffe Rundflugel	V.	587
festivi, (Papiliones) bunte Rundflügel		195
Dannensauger, Chermes abietis -		525
Dannenwanze, Cimex abietis -		sos
Daplidice, (Papilio) afritamischer Beifling	V.	589
Dard, (fr.) Weißfisch -	IV.	390
Dare, Dace, (engl ) Weiffisch -	IV.	390
Darmscheibe, Ascidia intestina -	VI.	85
Darmwormen, (holl.) Spulmurmer -	VI.	
Darmwurm, Ascaris Lumbricoides -	VI.	
Dasybathus, Ragelroche -	III.	249
Dasypus, Armadia — I. 1	88. €	. 23
- duodecimeinaus, 3mblfgurteliger Ar.		
madill —		23
- novemeinetus, Reungurteliger -		192
— octocinctus, Achtgurteliger —	<b>©</b>	. 23
- octodecimcinclus, Achtzehngurteliger		24
- quadricinctus, Biergurteliger -		190
feptemeinetus, Siebengurteliger		191
sexcinetus, Sechsgurteliger -		191
tricinctus, Drengurteliger -		190
- unicinctus, Eingürteliger -		189
Dalypus, (Columba) Federfuß -		499
Dauta, (port.) Elendthier -	I.	389
Davidsharp, (holl) Davidsharpfe -	VI.	460
Davidsharpfe, (Kinkhorn) Buccinum harpa	VI.	460
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	D:	aw.

Daw	Dentalium	123
_		Th. E.
Daw, (engl ) Doble	-	II. 175
Dea, (Alcedo) Gottin, (Eiste	ogel) -	II. 243
Debora, (hebr.) Biene	_	V2. 888
Deckelforalline, Sertularia op	erculata	VI2. 834
Decelwirbel, Vorticella oper	rcular <b>is</b>	VI2. 873
Decffische, Stromatei	-	IV. 61
Decffleck, (Baffertafer) Dytil	cus bimaculatus	V. 350
Deckflügel, (Nachtschni.) Phal	æna oculta	V. 693
Dedalus, (Papilio) Nachtschat	ten —	S. 237
Degenfische, Niphiæ		IV. 64
Degenhorn, (langfuß) Tipula		V2. 920
Degenfilnge, (Grasbupfer) Gr	yllus viridissimus	V. 432
Debner, (Raupentober) Ichner	umon extensorius	V2. 845
Dejanire, (Papilio) Begdorni	inmphe —	V. 606
Deiphobus, (Papilio) Schlep:	pentrager	V. 568
Delphin, Delphinus	- I. 50	4. 6. 61
- gerippter, Turbo dift	ortus —	VI. 550
- gezafter, Turbo Delp	hinus —	VI. 550
Delphinus, Delphin	- I. \$0	4. <b>S</b> . 61
Delphinus, (Turbo) gezacter	Delphin	VI. 550
Delphis, (Delphinus) Tunml		I. 505
Delusor, (Ichneumon) Spott		V2. 852
Demoiselle, (fr.) Geehahn, (	Seebrache)	III. 277
Demoiselles, (fr ) Jungfern		V. 763
Demoleus, (Papilio) bunter (		V. 579
Demophile, (Papilio) Oftindi		V. 589
Demophon, (Papilio) grauer		V. 580
Dendrokolaptes, (griech) CI	oeast —	II. 218
Denigrator, (Ichneumon) Ei	njapwarzer	V2. 850
Dennenbod, (Bocffafer) Cera	mbyx nebulolus	V. 263
Dentale, (fr.) Elefantenzahn	• ••	VI. 618
Dentale, (ital ) Zahnbrachsem	-	IV. 189
Dentalium, Meergahnchen		VI. 618
- aprinum, Schweine		VI. 619
corneum, hornsahl		VI. 620 VI. 620
- dentale, Wolfsiahn		V1. 620 Vl. 621
— eburneum, Elfenbei		VI. 621 VI. 618
- elephantinum, Elef	musu <b>l</b> uhu	Denta-
		DVIII.A-

	Th. <b>G.</b>
Dentalium entale, hundsjahn -	VI. 620
- minutum, Zahnchen -	VI. 621
- politum, Politzahn .	VI, 629
Dentex, Schweinegabn, (Deerbrachfem) IV	
Dephrada, (arab.) Frosch	III. 48
Depone, (mer ) hundelopf, (Rlapperschlange	
Depurator, (Cancer) Breitfuß -	V2. 1106
Dermeste en deuil, (fr.) Prauertaferchen	V. 105
Dermestes, Kleinkafer -	V, 99
capucinus, Capuciner -	$\mathbf{V}_{i}$ 102
domesticus, Saustaferchen -	V. 105
elongatus, Dratkaferchen -	V. 100
— — eustatius, Schwammkaferchen	V. 107
fencitralis, Fenftergucker -	V. 106
- Gerrugineus, Rostfaferchen -	V. 107
fumatus, Rauchtaferchen -	V. 108
- hemipterus, Halbdecker •	V. 110
lardarius, Speckfaferchen -	V. 100
- muricatus, Stachelkaferchen -	V. 103
- murinus, Mausetaferchen -	V. 107
- miger, Mobrtaferchen -	V. 109
- paniceus, Brodfresser -	V. 107
— pedicularius, Lausckaferchen	V. 108
— pfyllius, Flohsaame —	V. 108
- pulicarius, Rlobtaferchen .	V. 108
Scanius, Schwede -	V. 109
- Surinamenlis, Surlnamisches Raferd	
- undatus, Bellentaferchen	, V. 101
- violaceus, Tobenfreund -	V. 105
Dermestoides, (Cantharis) Raferfliege -	V. 314
Dermestoides. (Elater) Rleinspringer -	V. 326
Desertor, (Ichneumon) Abtrunniger	V2. 851
Desmannskat, (fchweb.) Genethtage -	I. 256
Deutscher Apollo, (Engschm.) Papilio Apollo	V. 581
Deutscher Atlas, (Tagschm.) Papilio Hermion	c V. 604
Deutscher Goldarbeiter, (Erdglanger) -	V. 354
Deutscher, (Raderlad) Blatta Germanica	V. 406
Deutscher, (Raubsliege) Afilus Teutonus	V2. 1004
•	Depti

Deutscher .	Dicklippe	125
	,	£6. €.
Deutscher, (Rugeltafer) Curcu	ilio Germanus	V. 231
Deutscher, (@corpionfliege) Par		V2. 803
Deutscher, (Springtafer) Elate		V. 324
Deutscher, (ungeflügelte Biene)		V2. 920
Dia, (Papilio) oftereichische Mi		V. 619
Diable, Diablotin, (fr.) Mee		II. 352
Diable de mer, (fr.) Meerfro		III. 280
Diable de mer, (fr ) schwarze		II. 427
Diabolo di mare, (ital.) Mee		III. 280
Diadema, (Aranea) Rreutfpin	ne –	V2. 1070
Diadema, (Echinus) Seefrone		VI. 150
Diadema, (Fringilla) Buschfin		<b>S.</b> 164
Diadema, (Fulgora Rronenle		V. 448
Diadema, (Lepas) Wallfischp	octe VI. 20	5. <b>C.</b> 357
Diadema, (Musca) Rronenflie	ge —	V2. 955
Diagramma, (Perca) Titelbar	(d) —	IV. 241
Diana, (Simia) Diane	•	I. 128
Diane, (Meerfage) Simia Dia	na 🛶	I. 128
Diaria, (Infecta) Tagthierchen	-	V2. 776
Dias, (inbian.) Feuerglut, (Re	ifer) -	V. 335
Dib, (arab.) Bolf	-	I. 219
Dichotoma, Dratforalline	-	Vl2. 849
Didbacken, (Stechfliege) Conc	ps buccata	V2. 1000
Dichauch, (Malschlauge) Angu	iis ventralis	III. 216
Diethauch, (Krosch) Rana ven	tricola -	III. 61
Dickbauch, (Wels) Silurus Af	cita -	IV. 301
Didfuß, (Rrebs) Cancer gro	Mipes -	V2. 1134
Dicfug, (Dilbe) Acarus craf	lipes -	V2. 1047
Dicfug, (Regenpfeifer) Chara	idrius oedienemi	IS II. 420
Dichale, (Baftarbrufeltafer)	Attelabus Bupro	;•
Roides	•	V. 248
Didhale, (Meelfafer) Tenebi	rio co'laris	V. 374
Dichals. (Rosfifch) Blennius	Gattorugine	IV. 103
Dichorn, (Bange) Cimex gra	afficornis	V. 500
Dicttopf, (Ameife) Formica C	ephalotes	V2. 915
Dictopf, (Ente) Anas Bucep	hala -	II. 292
Dicttopf, (Rarpfe) Cyprinus		IV. 385
Didlippe, (Rinthorn) Buccini		VI. 446
•••••	· <del>-</del>	Dicto

	Th.	S.
Dicklippe, (Schwimmschnecke) Nerita glaucina	VI.	586
Dictrand, (Nachtschm.) Phalæna plectra	V.	695
Dickrand, (Pfeilschwang) Sphinx Ello -	V.	639
Dickfack, (Tobengraber) Sylpha groffa	V.	130
Dickfack, (Bielfuß) Julus craffus -	V2. 1	162
Dickschale, (Berzmuschel) Cardium rusticum	VI.	252
Dickschale, (Balje) Voluta solidula -	VI.	417
Dickschenkel, (Fliege) Mulca femorata	V2.	465
Dicfchenkel, (Meeltafer) Tenebrio femoralis	V.	376
Didichentel (Chlupfmefpe) Tenthredo vitellinæ	V2.	822
Didichnabel, (Rernbeiffer) Loxia Coccothrauftes	s II.	546
Dickschnabel, virginischer,		548
Didelphis, Philander - I. 28	7. S	35
— — dorsigera, Schwanzraße -		293
indica, Amboineser -	€.	35
- marsupialis, Beutelrage -		288
- murina, Buschraße		293
— — oppossum, Waldraße -		292
Dido, (Papilio) Belifonia -		615
Didus, Straußkasuar -		455
— ineptus, Tolpel -	II.	455
Didymus, (Scarabæus) Zwillingstafer	V.	62
Dikbek, (holl.) Dickschnabel -	II.	546
Dikkopjes, (hon) Burgervogel -	V.	630
Diklippen, (holl.) Großlappen -	VI.	486
Diklippige Oliehoorn, (holl.) Dicklippe	VI.	446
Dillzaadje, (hou) Tillsaame -	VI.	568
Dintenfisch, Sepia officinalis -	VI.	115
Dintenfleck, (Rachtschm.) Phalæna groffularia	V.	714
Dintenlinie, (Golbhahnchen) Chrysomela lineola	· <b>V.</b> .	179
Diodon, Raelfisch -	III.	223
- echinatus, Stacheltaube	111.	325
- holocanthus, Stachelfragen -	III.	
- reticulatus, Ceetaube -	III.	
	V2. 1	
Diomedea, Penguin	II.	
- demerfa, fcmimmender Penguin vom Caa	p II.	322
- exulans, fliegender Penguin -		320
•		Dio-

Diomedes Doggersander 127  Sh. S.  Diamedes, (Papilio) Blaumond - V. 572  Dione, (Coluber) Salzschlange - S. 192  Dione, (Venus) achte Benus - VI. 264  Dipharda, (arab.) Brosch - III. 48  Diphos, (Solen) Zwenstral - S. 360  Dipsae, (Coluber) Durstnatter - III. 197  Diptera, (Inseta) zwenstügelige Insetten V2. 922  Dirce, (Papilio) Schwarzwelle - V. 610  Dischon, (hebr.) Dirschbock - I. 414. 416  Discoides, (Casida) Wittelsteck - V. 143  Distelbock, (Bockfafer) Cerambyx Cardui V. 272
Diamedes, (Papilio) Blaumond - V. 572 Dione, (Coluber) Salzschlange - S. 192 Dione, (Venus) achte Benus - VI. 264 Dipharda, (arab.) Frosch - III. 48 Diphos, (Solen) Zwenstral - S. 360 Dipsas, (Coluber) Durstnatter - III. 197 Diptera, (Inseta) zwenstügelige Insetten V2. 922 Dirce, (Papilio) Schwarzwelle - V. 610 Dischon, (hebr.) hirschbock - I. 414. 416 Discoides, (Cassida) Wittelssch - V. 143
Diamedes, (Papilio) Blaumond  - V. 572  Dione, (Coluber) Salzschlange - S. 192  Dione, (Venus) achte Benus - VI. 264  Dipharda, (arab.) Krosch - III. 48  Diphos, (Solen) Zwenstral - S. 360  Dipfae, (Coluber) Durstnatter - III. 197  Diptera, (Inseta) zwenstügelige Insetten  Dirce, (Papilio) Schwarzwelle - V. 610  Discoides, (Cassida) Wittelssch - V. 143
Dione, (Coluber) Salzschlange  Dione, (Venus) achte Benus  Dipharda, (arab.) Krosch  Diphos, (Solen) Zwenstral  Dipsiae, (Coluber) Durstnatter  Diptera, (Inseta) zwenstügelige Insetten  Dischon, (hebr.) hirschbock  Discoides, (Cassida) Wittelssch  V. 143
Dione, (Venus) áchte Benus - VI. 264 Dipharda, (arab.) Krosch - III. 48 Diphos, (Solen) Zwenstral - S. 360 Dipsas, (Coluber) Durstnatter - III. 197 Diptera, (Inseta) zwenstügelige Insetten V2. 922 Dirce, (Papilio) Schwarzwelle - V. 610 Dischon, (hebr.) Hischbock - I. 414. 416 Discoides, (Cassida) Wittelssek - V. 143
Dipharda, (arab.) Krosch  Diphos, (Solen) Zwenstral  Dipsa, (Coluber) Durstnatter  Diptera, (Insecta) zwenstügelige Insecten  V2. 922  Dirce, (Papilio) Schwarzwelle  Discoides, (Cassida) Wittelssed  V. 610  I. 414. 416  V. 143
Diphos, (Solen) Zwenstral  Dipsas, (Coluber) Durstnatter  Diptera, (Insetta) zwenstügelige Insetten  Dirce, (Papilio) Schwarzwelle  Dischon, (hebr.) hirschbock  Discoides, (Cassida) Wittelsteck  - V. 143
Diplae, (Coluber) Durstnatter - III. 197 Diptera, (Inketa) zweyflügelige Insetten V2. 922 Dirce, (Papilio) Schwarzwelle - V. 610 Dischon, (hebr.) Hischbock - I. 414. 416 Discoides, (Cassida) Wittelsteck - V. 143
Diptera, (Insetta) zweystügelige Insetten V2. 922 Dirce, (Papilio) Schwarzwelle Dischon, (hebr.) Hischbock Discoides, (Cassida) Wittelsteck  V2. 922 V. 610 V. 610 V. 143
Dirce, (Papilio) Schwarzwelle - V. 610 Dischon, (hebr.) Hirschbod - I. 414. 416 Discoides, (Cassida) Wittelsted - V. 143
Dischon, (hebr.) Hirschbock - I. 414. 416 Discoides, (Cassida) Wittelstoft - V. 143
Discoides, (Cassida) Mittelsted - V. 143
Discoides, (Calisda) Millessia - V. 143 Discoides, (Rocffofer) Ceramby Cardul V 272
'SNMMAINAGE ()MAGEGIEF) LEFSMINVY LSEGIII V 579
Distelsint, Fringilla Carduelis - II. 582
Distelfliege, Musca serratulæ - V2. 978
Diftelfuß, (Kleintafer) Dermestes Scarabæoides V. 106
Distelnymphe, (Tagschm) Papilio Cardui V. 606
Distelschnecke, Murex senticosus - VI. 508
Distelschnecke, (Negschnecke) - VI. 505
Distelvink, (holl) Distelnymphe - V. 606
Distelvogel, neujortischer, (Tagschm.) Papilio Jolo S. 292
Distelmange, Cimex Cardui - V. 483
Dixhuit, (fr.) Riebis - II. 406
Dob, (hebr ) Bar - 1. 277
Dobeler, (Hafeling) Dobula - IV. 391
Dobula, (Cyprinus) Häseling - IV. 391
Docke, (Rachtschm) Phalæna decora - S. 311
Dodecos, (Cancer) 3molfborn - V2. 1112
Dodo, (port.) Straußkasuar - II. 455
Doekehuif, (boll.) Papiernautilus - VI. 348
Doekspons, (holl.) Euchschwamm - VI2. 794
Disch, Gadus Callarias - IV. 80
Doschen, (Kammmuschel) Ostrea minuta VI. 304
Doschwurm, Lernæa asellina - VI. 106
Def, Doshiort, (schwed.) Dammbirsch - 1. 399
Doffer, Duif, (boll.) Taube - 11. 497
Dog, (engl.) Hund - 1. 206
Doggentafer, Scarabæus Molossus - V. 54
Doggerfander, (Stachelschnede) Murex Scrobi-
tator VI. 505
Dogger-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	₹Þ. €.
Doggerzander, (hou.) Doggerfander -	VI. 505
Dogue de forte race, Bluthunb -	Ø. 27
Doble, Corvus Monedula -	II. 174
— afrikanische, Corvus Afer -	II. 178
— — philippinische, Corvus Balicassus	11. 178
Doblen, fleine, Graculæ -	II. 192
Dolarium, (Murex) Stiege -	VI. 518
Dolium, (Buccinum) Kaß -	VI. 445
Dolmetscher, (Strandlaufer) Tringa interpres	II. 407
Dolphin, (engl ) Golbfisch -	IV. 117
Domicella, (Pfittacus) Jungfer -	II. 142
Domina serpentum, Klapperschlange III.	
Dominger, (Regenpfeiffer) Charadrius Domini	•
cus	<b>E.</b> 116
Domingo-Schulpen, (boll.) raube Domingo	<b>,</b>
Muscheln -	VI. 274
Dominitaner Rardinal, (Rernbeiffer) -	II. 548
Dominula, (Phalma) Jungfer -	V. 68r
Domiporta, Schildfrose -	III. 15
Domzella, Domzellina, (ital.) Meerjunter	IV. 204
Donax, Drened -	VI. 258
cuneata, Reil	VI. 260
	VI. 260
— muricata, Jounnaldel	VI. 261
— pubelcens, Stachelbreneck - rugosa, Runzelnuschel	VI. 259
- rugola, Runzelnwichet	VI. 259
fcripta, Zulannesische Buchftabenmuschel	VI. 26
striata, Strichschale	VI. 260
Donder - pat, (boll) Donnerfrote -	IV. 137
Dondioe, Breitsich	IV. 262
Donnerfrote, (Knorrhahn) Cottus scorpius	IV. 137
Donnola, (ital.) hermelin	I. 274
Donskorallyn, (boll.) Pflaumfeberforalline	VI2. 856
Donzellina, (venet.) Meerquappe	IV. 98
Doodje, (holl.) Scorpionschnecke -	VI. 499
Doodkist, (boll.) Tovensarg, (Beinfisch)	III. 311
Doodshoofdje, (boll) Lobentopf, (Affe)	I. 137 VI2. 681
Doolhoffteen, (boll.) Irrgarten -	<b>Тоогл</b>
	17001/10

Doornhaay	Doppelspiegel	• .	129
•		36.	œ.
Doornhaay, (holl.) Dornhad	- क्रीरिक		253
Doornwiek, (boff.) Regenpt			421
Doosvils, (boll.) Schachtelfi			310
Dopjeskoraal, (hou.) Jungf		Vl2.	706
Doppelmige, (Ritege) Musca	diophthalma	V2.	961
Doppelange, (Rachtschm.) Pł		V.	717
Doppelband, (Schilbtafer) (		V.	139
Doppelband, (Lagfdm) Pap			613
Doppelband, (Befpe) Vespa	bifasciata -	V2.	
Doppelborn, (Baftardmefpe)		V2.	868
Doppelborn, rufifcher, (Ba	stardwespe) Sphen	:	
bidens	•	€.	323
Doppelbreged, (Rachtschm.)			745
Doppelfarbe, (Bange) Cime			490
Doppelfeld, (Nachtschm.) Phi		V.	690
Doppelfleck, (Lippfisch) Labr		IV.	
Doppelfuß, (Malschlange) An	guis bipes	HI.	21 I
Doppelgurtel, (Fliege) Musc		V2.	960
Doppelhaten, (Dorntafer) H		<b>V.</b>	204
Doppelhorn, (Rafer) Scarab		҈.	213
Doppelkamm, (Laugfuß) Tip		V2.	946
Doppelfiel, (Eidechse) Lacert		III.	, ,
Doppelforalle, Madrepora p		VI2.	
Doppelfreuß, (Rachtschm.) Ph	alæna Loeflingiana		727
Doppellapren, (Rachtschm.)	Phalæna didymata		720
Doorelpunkt, (Langfuß) Tipi		V2.	
Doppelpuntt, (Lobengraber)			125
Doppelrand, (S. Joh. Fliege)	Cantharis langui		
nolenta	Turks lunlingue		307
Doppelrippe, (Mondschnecke)		VI.	550
Doppelripre, (Rachtschm.) Pl		V.	743
Dorpelschild, (Schröser) Luc Doppelschnabel, (Blase) Bulls		V •	97
Doppelichuppe, (Umberfisch) !		VI. IV.	405
Doppelschwanz, (Rellerwurm)	Oniscue Licendatus	V2. 1	210
Doprelschwanz, (Tagschm) f			623
Doppelschwanz, (Lagschm.) F			573
Doppelfpiegel, (Stintfafer) l			
	I		pel

	Th.	€.
Doppelfrige, (Befpe) Velpa biglumis	V2.	884
Connellogen (Rerobubn) letrao bicalcaratus	II.	490
Deppelstrich, (Rachtschm.) Phal. Hartmanniana	V.	728
Doppeltaucher, Colymbus duplicatus -	<b>&amp;</b> .	107
Doppelsahn, (Ameise) Formica bidens	V2.	914
Doppelgabn, (Goldwefre) Chrylis bidentata	V2.	876
Dopping, (chweb.) Quackente	II.	292
Dorado, (port.) Goldfich - IV.	117.	177
Dorcas, (Antilope) Sajelle		54
Dorcas, (Capra) afritanische Biege	- Ii	416
Doré, (fr.) S. Petersfisch Dorfbreme, Tabanus rusticus	ÍV.	144
Darfbreme. Tabanus rusticus	V2.	986
Dorfftinter, (Stintfliege) Hemerobius paganus	V2.	796
Doris, (Papilio) Doris - S.	2864	
Doris, Schnecke ohne Daus	VI.	6g
- bilamellata, Schieferpuckel -	VI.	70
lævis, Glattrucken	VI.	70
vertucosa, Warzenpuckel -	VÌ.	70
Doris, (Lagscom) Papilio Doris - C.	286.	<b>29</b> t
Dorkas, Dorkasthion, (griech) Rebe -	ı.	401
Dormia, (Cancer) Giftfrabbe -	V2. 1	iój
Dormouse, (engl.) Schlafrage	İ.	350
Dornbock, (Bockfafer) Cerambyx hispidus	V	263
Arnhrachsem, Sparus spinus -	łv.	190
Dorncanari, (Flügelschnede) Strombus spinolus	VI.	489
Synthethechte, Lacerta Stellio –	ш.	90
Dorneule, (Rachtschm.) Phalmna Cratægi,		666
Marnfeder, Pennatula grifea	VI2.	896
Bornfich (Stachelbarich) Galteroiteus ipinachia	IV.	254
Comminge (Regennfeifer) Charadrius ipinolus	11.	421
Dornführer, (Rafermufchel) Chiton aculeatus	VI.	198
Dorntüge, Wanien		504
Dornfuß, (Spinne) Aranea spinimobilis	V2. 1	
Dornfuß, (Wespe) Vespa spinipes -	V2.	882
Dornbaan, Squalus Acanthias	III.	253
Dornhals, (Grashupfer) Gryllus spinulolus	V.	445
Dornberg, (Bergmuschel) Cardium ciliare	VI.	248
Dornhundt, (engl.) Dornhaapsis	in.	
	Dorn	uger

-			
		Th.	E.
Ī	Prakon, (griech.) Drache -	III.	
	Drap d'or, Drap d'argent, Drap d'orange, (fr.	.)	
	Spigenrolle -	VI.	
3	ratfeder, (Seefeder) Pennatula filosa	VI2.	
3	Drattaferchen, Dermestes elongatus		100
	and the state of t	VI2.	
		VI2.	
	Statnatter, Coluber Minervæ -	III.	_
	Orechselmake, Voluta tornatilis —	VI.	
	recifliege, Musca scybalaria -	V2.	
	dreckhahn, (Wiedehopf) -		250
	Dreckfafer, Scarabæus conspurcatus -		68
	deg-dolphyn, (holl.) Weißbelphin —	IV.	303
7	drehehals, Yunx torquilla —		216
¥	drebkafer, Gyrinus -		117
-	- ungeftreifter, Gyrinus Americanus		117
	dressa, (ital.) Drossel		527
X	drenauge, (Grashupfer) Gryllus triops		430
2	Drenband, (Mantafer) Meloë trifascis		258
7	renband, (Connentafer) Coccinella trifasciata		151
2	renband, (Bange) Cimex trifasciatus dreneck, (Beinfisch) Ostracion trigonus	V.	494
7	renect, (Qualle) Medusa hyoscella -	III. VL	300
X	drenect, (Zante) Wedita hydicena — Drenect, filbernes, (Rachtschm.) Phalæna Holmians	V 45	124
2.	- weisses, (Rachtschm.) Phalana Schrabe-		728
-	riana — metilies, (Mudicipiii.) i namana Samasse-		729
T	Drepecte, (Muscheln) Donaces -		258
~ ~	drenecksügel, (Rachtschm.) Phalæna hyalinata	V۵	722
r	Drepeckflugel, (Rachtschm.) Phalæna Manto		312
T	renechers, (Bergmufchel) Cardium Trigonoides		36 t
	drenedrobre, (Robrenfcnede) Serpula triquetra	VI.	624
	repectscheibe, (Flügehvurm) Clio retusa	VI.	111
	renfeder, (Rachtschm.) Phalmna tridactyla		757
T	dreybocker, (Nachtschm) Phalæna triplasia	V.	699
Ĩ	drephorn, (Beinfisch) Oftracion tricornis	111.	308
T	Drepfern, (Tagfchm.) Papilio Clytus -	V.	598
	rentiel (Rlippfleber) Patella tricarinata	VI.	611
	drey Rullen, (Rachtschm.) Phalæna miata		716
			)rebe

	Th.	S.
Drenpunkt, (Connenkafer) Coccinella tripunctat	a V	149
Drepring, (Machtschm.) Phalæna strigilis	V.	696
Dreprippe, (Rrebsspinne) Phalang, tricarinatum	V2.	1064
Drenftral, (Klippfifch) Chætodon trioftegus	IV.	170
Drenftral, (Tellmufchel) Tellina trifasciata		238
Drenftrich, (Baftardjungfer) Myrmeleon trigram-		- 1
mum –	ු ලෑ.	317
Drepftrich, (Kliege) Musca trilienata	V2.	951
Drenftrich, (Rachtschm.) Phalæna litura	V.	703
Drenstrich, (Ratter) Coluber triscalis -	III.	195
Drenftrich, (Tagschm) Papilio Euphemo	V.	590
Drep und zwanziger, (Sonnenkafer) Coccinella		
viginti tria punctata —	٧.	156
Drengad, (Barfching) Perca trifurca -	IV.	
Drepsack, (Schröter) Lucanus tridentatus	_	97
Drengabn, (Goldhahnchen) Chrysomela tridentata		186
Drepzehnpunkt, (Sonnenkafer) Coccinella trede	, <b>T</b> 7	
cimpunctata -		153
Driehoekdubblet, (boll.) Drenedmuschel	VI	258
driezydig Venus-Hart, (holl.) das brenfeitige	VI.	0.47
Benusher; —	V2.	
Drillmuggen, (hoff.) hupfer Dromedar, Camelus Bactrianus		369
		672
Dromedar, (Nachtschm.) Phalma Dromedarius		365
Dromedarius, (Camelus) Rameel		672
Dromedarius, (Phalæna) Dromedar		578
Drongo, Madagascarische Merle	III.	300
Droffeln, (hornfich) - 11. 18	c. 6	. 87
Droffeln, Orioli - 11. 18 Droffeln, Turdi -		528
Druckpunkt, (Erdicker) Carabus bipunctatus		364
Druifkorallyn, (boll ) Traubenforalline	Vl2.	
Drummerfish, (engl.) Erommelfchlagerfisch	IV.	
Druriwange, Cimex Druræi		276
Dryfhoorentje, Dryvertje, (boll.) Schrömmer	VI.	
Dryinas, (Crotalus) Ungeziefer -	III.	
Dryskopos, (griech.) Specht -		218
Dubb2, (chald.) Bar		277
Dubbel-Staart, (holl.) Drenjackfisch -	IV.	
I 3	D	ub-

, Dytiscus	Echinus	135
		Th. S.
Dytiscus ferrugineus, Rostpudel	<b>-</b>	V. 349
fuscus, Brunette	•	V. 348
- granulatus, Kornschilb	=	V. 350
latiffimus, Breitflugel		V. 347
luridus, Nymphe	-	V• 347
	•.	V. 349
— maculatus, Weißfied  — marginalis, Gelbsaum  — minutus, Bunktichild	•	V, 347
- minutus, Punktschild	-	V. 351
ovatus, Rothbruft	•	V. 350
paluftris, Sumpfpaticher	•	V. 350
- piceus, großer Schwimm	kti — '	V. 344
— 1emistriatus, Halbstrich	•	V. 347
- — sticticus, Merkmal	. •	V. 348
ftriatus, Querftrich	•	V. 348
— — sulcatus, Rippenschild	•	V. 349
- uliginolus, Außrucken	-	V. 350
<b>©.</b>	-	
Ear-dove, (engl.) Ohrtaube	•	II. ÇIK
Earwigg, (engl ) ber große Dhrmi	ırm	V. 396
Eber, (Schwein) -	•	I. 461
Ecacoatl, (mer.) Winbschlange	-	III. 133
Ecclipsis, (Papilio) Blauauge	-	V. 594
Echalette, (fr.) Baumlaufer	, <b>-</b>	II. 254
Echasse, (fr.) Langfuß, (Regenpfei	fer)	II. 420
Echasse de Mexique, (fr.) merita	nischer Regens	
pfeifer	-	S. 117
Echeneis, Sanger	<b>-</b>	IV. 113
Echino - disci, Geescheibe		VI. 155
Echinos, (griech) Igel, Secapfel	Į. 304 <sub>4</sub>	VI. 144
Echinus, Seeapfel	•	VI. 144
- atratus, Salbfugel	•	VI, 152
— esculentus, Seeball	•	VI. 147
— — lacunosus, Lodenkopf	. <del>-</del> .	VI. 153
mammillatus, großer Bunt	D. —	VI. 151
— — reticulatus, Schildigel	-	VI. 154
— — rolaceus, Rosenblume	-	VL 153
saxatilis, Steinapfel	4	VI. 149 Echion

- ) -		******	•	
1			Th.	€.
Ehion,	(Papilio) Ecange	-	V.	624
Echis,	Echidna, (griech.) Bipernatter		III.	153
Ecauge	e, (Lagichm) Papilio Echion			624
Edidd	be, (Mecitafer) Tenebrio angul	atus		374
	f, (Erbfafer) Carabus pictus	-	€.	250
Edfled	, (Nachtschm.) Phalæna gonosti	gma		671
Eckhoo	orn, (boll.) Eichhorn	•	I.	355
Edfeite	e, (Epinne) Aranea angulata		V2.	1073
Edielli	ine, weiffe, Tellina angulata	-	VI.	233
	iée, (fr.) Wolkenschnecke	-	VI.	381
Ecorch	neur, (fr.) Neuntober	-	II.	108
	ffe, (fr ) hummer	-	<b>V</b> 2.`	1122
Ecureu	iil, (fr.) Eichhorn	•	I.	355
	Fugl, (normeg.) Enberente	-		283
	me, (Papagen) Pfittacus Eupatr	ria	H.	130
	Ite, Falco gentilis	-	II.	73
Ebelma	ann, (Kliege) Musca nobilitata	-	V2.	974
Edelma	nn, (Rafer) Scarabæus nobilis		· V.	90
Eble H	earpfe, (Kinkhorn) Buccinum co	<b>statun</b>		451
Edle K	oralle, Zoophyta Isis	_	VI2,	735
	Schinke, (Stedmufchel) Pinna n	obilis	VI.	342
Eel, (e	ngl.) Aal -		IV.	38
	it, (engl.) Trusche, Aalruppe		IV. 96.	107
	- Bek, (boll.) Entenschnabel	•	VI.	229
Eende-	-Bek, (holl.) Schlammuschel	-		256
Eende	- Schulp, (holl) Entenniuschel	-		208
Egchel	lys, (griech) Aal	-	IV.	38
Egel, (	(holl.) Igel —			304
Egelvii	ls, (holl ) Igelfisch	-	111.	323
Egipter	r, (Umeise) Formica Pharaonis	•	V2.	913
Egipter	r, (Bastardwespe) Sphex ægypti	iac <b>a</b>	√ V2.	867
	r, (Racterlact) Blatta ægyptiaca		V.	403
	r, (Salmbrachfem) Salmo Niloti		IV.	330
Egipter	r, (Connentafer) Coccinella hier	oglyp	hica V.	151
Egipter	r, (Wanje) Cimex Egyptius	-		497
Egiptis	che Laus, (Goldharnisch)	•	· <b>V.</b>	333
	rabbe, Cancer nucleus	-	V2. 1	1105
Eichelm	aus, Mus quercinus	_	I.	351
			(Fi	del.

	Eichelmuschel Eibechse	137
		Th. S.
Bichelmi	uschel, (Gienmuschel) Chama calyculat	
	eere, (Gallapfelwurmer) Ciniphes quer	
•	baccarum -	V2. 812
Bichenbl	lat, (Machtschm) Phalæna quercifolia	· V. 656
Eichenfli	iegenkafer, (S. Joh. Fliege) Canthar	is
	minima -	V. 310
Bichenhi	olidattel, (Olive) —	VI. 419
Zichenbi	olitute, Conus figulinus -	VI. 376
Bichenfa	ifer, (Rußelkäfer) Curculio quercus	V. 222
Bichenla	ingschnauße, (Pflanzenlaus) Aphis quer	
<b>Eichenla</b>	ue, Aphis roboris –	V. 517
Bichenn	iesser, (Nachtschm.) Phalæna dolabrar	ia V. 706
	otte, (Nachtschm.) Phalæna ramella	V. 740
Eichensa	uger, Chermes quercus -	V. 524
Eichensc	hild, (Schildlaus) Coecus quercus	V. 530
Zichenst	reicher, (Rachtschm.) Phalæna quercus	V. 658
	n, (Rachtschm) Phalæna fagi -	V. 659
Еiфbor	n, Sciurus -	I. 355
	afrifanisches, Seiurus Getulus -	J. 357
	aschgraues, Sciurus einereus -	I. 356
	fliegendes, Sciurus volans — gelbes, Sciurus flavus —	I. 359
	gelbes, Sciurus flavus -	I. 357
	gemeines, Sciurus vulgaris -	1. 355
	gestreiftes, Sciurus striatus -	I. 358
		I. 356
	Surinamisches, Sciurus æstuans	I. 358
	naffe, (Gespenstthier) Lemur Catta	1. 148
	naffe, Simia sciurea -	I. 136
Eidechse	. Lacerta -	III. 77
	bandirte, Lacerta fasciata -	III. 112
	blaue, Lacerta azurea	III. 91
	Chamalconartige, (furggeschwangte)	III. 95
	brenfingerige, Lacerta Chalcidica	III. 110
	fliegende, Draco volans	III. 73
<del></del>	funffachgestreifte, Lacerta quinqueline	101 H
	furggeschwänzte	ΠI. 95
	langgeschwänzte, (Leguanartige)	III. 102
	linirte, Lacorta lemniscata -	III, 111
	Ις	Eibechse

	Th.	- €.
Eibechfe mit gebrucktem Schwange, (Rrotobillartige	e) III	. 78
- mit mirblichem Schwanze -	111	
ohne Kinger ' -	Ш	. 120
- punftirte, Lacerta punctata -	Щ	. 111
— — sechsmal gestreifte, Lacerta sexlineata	Щ	
- vierfingerige, ungeschuppte -		. 113
— — wurnformige -		. 120
Eidechsennatter, Coluber Saurita -		194
Eibechfenstrene, Siren lacertina		. 198
Eibechsentober, (Bastardmespe) Sphex lacerticid	a S	321
Eidechefisch, Elops -	٠Ų.	344
Eibecheschmans, (Rachtschm.) Phalmna lacertinari	a V.	706
Eikenhouts- tooten, (boll.) Eichenholztuten		374
Eilfruntt, (Sonnentafer) Coccinella undecim-		
punflata -		153
Eilfstral, (Wels) Silurus undecimalis -		295
Einauge, (Tagichni.) Papilio Aeropus -		599
Einfaltspinfel, (Pelekan)	H.	331
Einfeber, (Rachtschm.) Phalæna monodaftyla	V.	756
Einflügel, (Langfuß) Tipula monoptera	V2.	935
Einborn, fliegendes, (Rafer) Scarabæus Hercule	5 V.	49
Einhorn, (hornfisch) Balistes Monoceros	Ш.	295
Einborn, fleines, (Rafer) Scarabæus Gideon	V.	
Einhorn, (Mantafer) Meloe Monoceros		384
Einhornfisch, Monodon	1.	476
Einhornteufel, Laphius Vespertilio -		283
Ginhorngwerg, (Rafer) Scarabæus Tityus	V.	53
Einleitung in Die Scfchichte der Infetten -	V.	1
Einleitung in die Geschichte ber Bogel -	II.	_
Einleitung von dem vielfachen Leben ber Rreaturen	III.	15
Ein: unft, (Nachtschm.) Phaltena koekeriziana		725
Einzunkt, (Sonnenkafer) Coccinella unipunctata	<b>V</b> •	148
Einschwärzer, (Raurentoder) Ichneumon deni- grator	17.	0
Einfiedler, (Rrammetevogel) Turdus folitarius		850
Eins und zwen, (Lagfchm.) Papilio Lara		142 626
Eintheilung der erften Klaffe der Thiere	I.	
Eintheilung der Fliegen von Geoffron	-	50 949
Cultiderenung ger Queften gon Genilenn		ein:

Eintheilung	Elater	139
	<b>X</b>	Th. G.
Eintheilung ber Fliegen von @	copoli -	V2. 949
Eintheilung ber Infetten ben b	en Alten -	V. 17
Eintheilung ber Cometterlinge	e von Linne	V. 563
	von Reaumur	V. 560
	von Rofel	V. 562
Eintheilung des Thierreichs	-	1. 38
Eisborn, (Geeftern) Afteria g	lacialis -	VI. 134
Eisdublet, (Kammmuschel) Of	trea fasciata	VI. 311
Eisente, Anas glaciaļis	-	II. 296
Eikente, (Tauchente) Mergus	albellus -	II. 306
Eistiebig, Tringa hyperbore	a –	11. 409
Eistrebs, Cancer glacialis		€ 347
Eistaucher, Colymbus glacial	is · •	II. 340
Eistaucherente, Mergus minu	tus -	II. 306
Eisvogel, Alceda		36, 🖲, 93
Ekerhedom, (perf.) Mafenbor	:n -	I. 469
Elma, (Papillo) Braunwolfe	•	V. 613
Elan, (fr ) Elendthier	7	I. 381
Elandshoorn, (hou.) Dirfchge	weibforalle	VI2. 698
Elaphos, (griech.) Dirich		I. 390
Elaphus, (Cervus) Dirich	•	l. 389
Elater, Springfafer	- V. 31	5. 6. 244
aneus, Rupferschild		V. 325
aterrimus, Punftirer	. •	V. 321
balteatus, Gurtelfpring	act -	V. 323
bipustulatus, Blutpuni		V. 320
brunneus, Brannbecke	•	V. 320
castaneus, Braunrocf	•	V: 322
cruciatus, Kreuptrager		V. 320
falciatus, Baffermelle	•	V. 324
ferrugineus, Pompadur	t ·	V. 322
flabellicornis, Webler	, -	V. 316
Germanus, Dentscher	•	V. 324
— — ligneus, Holispringer — — linearis, Streisschild	•	V. 319
	•	V. 32Q
—— lineatus, Rostral	•	V. 321
—— liveus, Blaurod	.♥	V. 322
—— marginatus, Schwarze	mb -	V 323
	*	Elater

1934	Elfenbein	Emberiza	141
March Street			Th. S.
Glfenhein	(Meergabnchen) De	ntalium eburneu	
	foralline, Sertularia		
Elft (ha	n > 9116e	With the state of the	IV. 372
Fik (end	1) Glendthier		I. 381
Filo. (Sp	(1.) Alfe (1.) Elendthier chinx) Dickrand	Mary the years a	V. 620
Flons &	idechsfisch	daz finakir.	IV. 244
far	rus, Langettenschwar	4	IV. 244
	(mex.) Bachftelse		
Elnenor.	(Sphinx) Elefanten	růfel -	V. 640
Glrib (8	arpfe) Cyprinus Pho	xinus -	IV 280
Elediny	(ban.) Elendthier	TOTAL TOTAL TOTAL	I. 281
Gifter co	Innifetia	Three Le filters 110	II. 620
Glitor C	ilonifche prvus Pica Solbat) -	Manual City	II. 170
Gliffor 16	Enlant) -	The second secon	VI c48
Glifferalf	(Papagentaucher) A	lea Pica	II. 210
@ literious	Pediculus pica		V2. 1022
@lifertout	, Pediculus picæ an, Ramphastos pic	atus	II 157
Fluers (	engl.) junge Meeraa	ie -	IV. 43
	riech.) Aaleidechse		
Ema di G	fei, (port.) Straußv		11. 447
	a, Ammer		o. G. 155
Lingeriza	amazona, Amazon	enter a furtidate de	11 666
	aureola, Gelbhals	2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	~ /
	Capensis, Caapscher	* - Mark 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	II. 565
83913 C	cia, Zipammer		II. 565
DOM:	citrinella, Goldani	mer -	II. 563
MONTH.	familiaris, Affatifch		II. 566
ENER /	flaveola, Gelbling		II. 566
	hortulana, Ortolan	2	II. 562
	hyemalis, Bintervi	gel -	11, 560
<b>医性视</b>	Ludovicea, Louisia	nischer Ammer	II. 565
300	miliaria, grauer Un		II. 562
	nivalis, Chneeamn		II. 560
IN I	notata, Weißbauch	_	G. 157
	olivacea, Olivenam	mer -	II. 563
	oryzivora, Reifdie		II. 567
100 A	paradifea, Paradie	animer =	II. 568
AND 1817	pafferina, Sperlin	asammer -	G. 155
100 A	Patrornia, Optimi	Journal of the same	Embe-

	•	3b.	Ġ.
Emberiza principalis, bunter Mumer			576
- psittaca, Paragenammer	· _ * · · · !	п.	568
- regia, Konigeammer	<u>.</u> ;	n.	570
- Gerena, Langschwang	•	Ħ.	569
vidua, Wittime		H.	569
Emeraude, (fr.) Schmaragbschnede		VI.	464
Emeraudine, (fr.) Goldtafer		٧.	88
Emeria, (Lanius) bengalischer Reuntober		Ħ.	118
Emeu, ameritanischer Strauß			453
Emisole, (fr.) glatter Haanfisch	•	m.	
Emmeihunter, (engl.) Wenbehalt	• :		217
Emmete, (engl.) Umeise		V2.	Roo
Emperador, (span.) Degenfisch		IV.	
Empereur, (fr.) Degenfisch	1 21.	īV.	64
Empfindlichteit der Thiere	٠,	: 1,	25
Empis, Dupfer -	•	Va.	994
- Boreatis, Nordlander .	**	V2.	994
forcipata, Zangenschwanz	<u>.</u>	V2	991
livida, Graubupfer -	•	V2.	995
- ftercorea, Mistwalzer	<b>-</b>	V2.	998
Encedonia, (Papilio) Reunzehnpunkt	₩.	V٠	591
Enceladus, (Papilio) Achtpunft	•	₩.	196
Enchelyopus, Spisschwan; -	IV.	. 52.	60
Encrafiolus, (Clupea) Carbelle		tv.	
Encrinus, (Vorticella) Seelilie -	- 😘 🖊	iz.	866
Encubertato, (port.) Armadiff, Pangerthier	I. 888.	III.	150
Enbivienforall, Madrepora angulosa		'Í2. '	702
Enervator, (Ichneumon) Schwächer	• 4	V2.	85\$
Engeltjes, (boll.) Sonnenkafer -	-	V.	149
Englander, (Rachtschm.) Phalæna maculat		G.	3/3
Englander, (Regenpfeifer) Charadrius Ang	zlu <b>s</b>	Œ.	117
Enjokos, Affen im Reiche Loango	•	1.	140
Ente, Anas - II	. 275.	<b>(5</b> )	16t
- einsame, Anas rufina -		<b>©</b> .	102
Entenmiesmuschel, Mytilus anatinus	• 1	VI.	338
Entenmuschel, (Meercichel) Lepas anatifer	a ' '	VI. :	208
Entenschnabel, (Scheide) Solen anatipus		VL.	227
Entoma, (griech.) Infekt		₩.	
		. Er	to-

Entomon	Erato	- 143
2311(0111011		£6. €.
Entomon, (Oniscus) Spie	Amurin	V2. 1149
Enucleator, (Loxia) Rern		II. 546
Entwicklung der Frucht	iceller -	I. 83
Enydris, (griech.) Flufotte	r Masterschlange	I. 262
Enydron, (griech.) Fisch	r) soulierlediande	IV. 2
	- -	IV. 64
Epée de mer, (fr.) Degenf		
Epée de mer, (fr.) Cabel	Moregan -	i. 507
Epeiche, (fr.) Roth, over	metRiberdt -	II. 227
Eperon, (fr ) Sonnenborn		VI. 532 II. 89
Epervier, (fr.) Sperber	<b>.</b>	
Epheh, (hebr ) Vippernatt	er -	III. 153
Ephemera, Tagthierchen	- 	V2. 776
bioculata, Glash		V2. 780
tuliciformis, M		V2. 780
diptera, Zwenflu		V2. 781
fuscata, Braunho		V2. 780
- ihoraria, Stunber	athierchen -	V2. 781
- intea, gelber Saf	<b>t</b>	V2. 779
marginata, Rant		V2. 779
- migra, Schwarzh		V2, 780
ftriata, Strichlin	<b>9</b>	V2. 781
- vespertina, Aben	dthierchen -	V2. 779
- wulgata, Uferade	` -	V2. 778
Ephialtes, (Sphinx) Rotht	ringel .	V. 545
Ephiomachus, (griech ) Etr	eithabn, (Cidechfe)	III. 105, 106
Ephippium, (Anomia) Sle	bauster -	VI. 319
Ephippium, (Ostrea) polu	ischer Sattel	VI: 315
Ephippium, (Ostrea) polu Episcopalis, (Voluta) Biss	bofsmüße -	- VI. 431
Episcopus, (Tanagra) Bisco	hoff -	IL 577
Eponge, (fr.) Meerschwam	m 🚢	VI2. 790
Epops, (griech.) Wiedehop	f, •	- II. 249
Epouvantail, (fr.) schwarze	Meetschwalbe	II. 353
Eques, Posttaube	• •	II. 503
Equites Achivi, Breitflugel	ohne rothe Bruft	V. 571
Equites Troës, Breitflügel	mit rother Beuft	V. 565
Equus, Pferd	- *	I. 445
marinus, Geepferdch	en •	III. 344
Erato, (Papilio) Rothstra	-	V. 586
		Erbfe,

•••
Eb. E.
Erbse, gesteckte, (Tellnuschel) Tellina digitaria VI. 242
rothe, (Mondschnecke) Turbo sanguineus VI. 549
- rothe, (Tellmuschel) Tellina pisiformis VI. 242
- meiffe, (Tellmuschel) Tellina divaricata VI. 242
Erbsenfresser, (Saamentafer) Bruchus pisorius V. 206
Erbsenschild, (Krabbe) Cancer pisum V2. 1100
Erbsenschnirkel, Helix lævigata - VI. 58t
Erbsenschote, Nautilus legumen - VI. 361
Erbsenschote, (Scheide) Solen ensis - VI. 227
Erbswespe, (Raupentoder) Ichneumon pisorius V2. 846
Edboul, (österreich.) Rohrdommel - II. 386
Erdbeer, gelbe, (Bergmuschel) Cardium flavum VI. 251
- weisse, (herzmuschel) Cardium fragum VI. 249
Erbfliege, Musca terrestris - V2. 97?
Erofibhe, Mordellæ - V. 385
Erbflob, (Pflangenflob) Podura atra - V2. 1018
Erbgener, egiptischer, Vultur percnopterus II. 59.
Erbglanger, (Erdiafer) Carabus nitens V. 354
Erdhummel, Apis terrestris - V2. 904 Erdfaser, Carabi - V. 352. S. 250
Erdfafer, Carabi - V. 352. E. 250 - große - V. 352
- fleine - V. 358
Erdforallenmoos, Corallina terrestris VI2. 812
Erdfrebs, (Maulwurfgrille) - V. 422
Erdfriecher, (hummel) Apis subterranea V2. 906
Erdmans, Mus gregorius - I. 35.4
Erdmeeltafer, Tenebrio Buprestoides - S. 253
Erdmilbe, rothe, Acarus holosericus V2. 1054
Erdmotte, (Zuckerlecker) Lepisma terrestris V2. 1016
Erbpapillon, (Lagschm.) Phalæna Phlæas V. 629
Erdsalamander, (Etdechse) Lacerta vulgaris III. 113
Erdschnecke, Helix grisea - VI. 577
Erdschnecke ohne Haus, Limax - VI. 59
Erdstinter, (Erdtafer) Carabus Buprestoides V. 358
Erdvielfuß, Julus terrestris - V2. 1163
Erdwühler, (hummel) Apis acervorum V2. 906
Erdmubler, (Rafer) Scarabæus subterraneus V. 66
Erdwühler, (Langfuß) Tipula terrestris V2. 933
Erd.

	~	
Grammer (Recenimum) Tumbaide	Th.	<b>G</b> .
Erdwurm, (Regenwurm) Lumbricus terrestris	VL	38
Eremit, (Rafer) Scarabæus Eremita - Eremit, (Rrebsfrabbe) Cancer Eremita	V.	87
Cremit, (Rabe) Corvus Eremità	V2. 1	
Eremita, (Cancer) Eremit	¥7-	181
Eremita, (Corvus) Eremit	V2. 1	120
Eremita, (Scarabæus) Eremit	42 'Ti*	181
Eribote, (Papilio) Afchitrich	1 V.	87
Ericoides, Beibefrautforalline -	<b>X71</b>	596
Erinaceus, (Buccinum) inotiges Caumchen	VI <sub>2</sub> .	852
Erinaceus, Igel	VĮ.	454
- Europæus, europaifcher Igel		304
- inauris, Rablohr	I.,	305
- Malaccenfis, Malateifder Igel	· 1.	307
Eriox, (Salmo) graver Lache	117	308
Erippus, (Papilio) Zimmetflügel	ÍV.	31£
Erithacus, (Motacilla) Rothschman	<b>\$</b> .	288
Erithakos, (griech,) Rothtehlchen -	#	619
Erizo, (span ) Igel	11.	618
Erizo de mar, (fpan ) Cecapfel	ΥI.	304
Erlenbodlein, (Solibod) Leptura alni -		289
Erlenfreffer, (Golbbabnchen) Chrysomela alni	V	167
Erlenbupfer, (Rugeltafer) Curculio alni	v.	227 227
Erlenmotte, (Rachtschm.) Phalena Rajella	v.	/ 755
Erlennager, (Schlupfweipe) Tenthredo alni	V2.	830 (33
Erlenfauger, Chermes alni -	V.	52 <b>4</b>
Erlenwidler, (Rachtichm ) Phalæna praliana	V.	722
Ernah, (arab) haase	I.	318
Erne, (engl.) Fifchgener -	II.	61
Erstrücher, (niederfachf.) Dornfisch -	iv.	254
Erua, (port.) Kranich	11.	
Eruca, Raupe	V.	
Erythrocephalus, (Meloë) Rothfopf -	€.	
Erythropus, Rothfußschnepfe	II.	ţœ.
Eryx, (Anguis) Langschwant -		218
Eryx, (Papilio) Chinefifcher Bauer -	Ğ	298
Erstauchet, Colymbus urinator	11.	342
Cfauspiene, Apis manigata	V2.	
K	Efcal	ice;

	-
	Eb. <b>E.</b>
Escalier, (fr.) Perspectivschnecke -	VI. 528
Escarbot, (fr.) Kafer -	V. 49
Escarbot à taches rouges, (fr.) 3menflect	V. 116
Escargots, (fr.) Schnecken	VI. 59
Escarnajo, (span) Rafer -	V. 49
Eschara, Seerinde -	VI2. 807
- Ceilanica, Banbforalle	VI2. 718
— — crustulenta, Laubforalle —	VI2. 720
frondiculosa, Laubrinde -	VI2. 812
— — frondipora, Laubkoralle —	VI2. 719
- lecuriformis, Reiffelrinde -	VI2 810
Efthensauger, Chermes fraxini -	V. 525
Escorpion, (span.) Scorpion -	V21 1088
€fel, Alinus —	I. 453
- geftreifter, Zebra -	I. 456
- wilber, Orager -	1. 454
Eselchen, (Porzellane) Cypres ssellus -	VI. 398
Efelslaus, Pediculus alini -	V2. 1032
Efelsohr, (Fechter) -	VL 480
Elox, Decht -	IV. 336
- Brafilientis, Elefantennafe	IV. 142
- gymnocephalus, Rahlfopf -	IV. 343
- hepsetus, Schnepfisch -	IV. 342
— offeus, Schildhecht –	IV. 337
ignodus, Zahnhecht	IV. 339
Espadon, (fr.) Degenfisch -	IV. 64
Esponja, (fpdn.) Meerschwedmit -	VI2. 790
Egigfliege, Conops, (Stechfliege) -	V2. 996
Estafette, (Sanblaufer) Cicindela Virginica	V. 329
Estourneau, (fr.) Stadt	II. 523
Esturgeon, (fr.) Stor	III, 286
Etalon, (fr.) Springhengst -	I. 446
Etoile de mer, (fr.) Deerstern -	Vl. 129
Eubule, (Papilio) Punftrand	V. 593
Culaffe, Simia Aigula	I. 131
Cule, Strix - IL	92. 5. 67
- Cafennische, Strix Cajaria -	6. 70
Domingische, Strix Domingensis -	<b>6</b> . 70
	Cule,

Eule	Exos	147
·_		Th. S.
Ente, feurige, Strix flammea		II. 102
- gebornte, Strix auriculata	•	II. 93
- grune, (Rachtschm.) Phalæna Ilyi	rias	S. 311
- lapplantische, Strix Scandiaca	-	II. '97
- ungehörnte, Strix inauriculata	-	II. 100
— Uralische, Strix Uralensis	, •	<b>€</b> . 68
— visginische, Strix Asio	-	IL 97
- weisse, (Nachtschm.) Phalmna niv	rea	V. 685
Eulen, (Rachtschmetterlinge) Phalæna	e noctuæ	V. 679
- mit Caugeruffeln und glattem N	lńcfen	V. 680
nut Saugerugeln und Kanmeric	fen	V. 686
- ohne Sangerußel	•	V. 679
Eulenfliege, (Stinffliege) Hemer	obias lex	
punctatus	-	V2. 796
Eulenzwitter, (Großtopf)	-	V. 665
Eupatria, (Pfittacus) Ebelbame	`	IL 130
Eupheno, (Papilio) Drenstrich	•	V. 590
Euphroline, (Papilio) fleine Berlemm	ittet	V. 628
Euripylus, (Papifio Blutfled	<u>,                                    </u>	V. 580
Europier, (Dungtafer) Hister unicol	70	V. 115
Europäer, (Rafer) Scarabæus brunne	cūs	V. 86
Europäer, (Lippfisch) Labrus oslifagu	S	IV. 209
Europäer, (Scorpion) Scorpio Europ	pæus	V2. 1092
Eurorder, (ungeflügelte Biene) Mutilla	Europæa	V2. 919
Europäer, (Wasserstorpson) Nepa cin	er <b>e</b> a	V. 472
Europische Post - hoorn, (host.) Wal	dhorn	VI. 567
Euryta, (Papilio) Schwarzstrich		V. 586
Eustatius, (Dermestes) Comammias	ecopen	V. 107
Euterpe, (Papilio) Beißpunkt	-	V. 584
Evantail, (fr.) Rompasmuschel	. —	VI. 305
Evippe, (Papilio) Beißfläche	-	V. 590
Exarator, (Ichneumon) Pflüger	-	V. 853
Excubitor, (Lanius) Bachter	***	II. 113
Exocoetus, fliegender Fisch	1V, 354	· 6. 209
— — evolans, Hochflieger	-	IV. 356
- exsiliens, Springfisch - volitans, fliegende-Rachtel	•	<b>5.</b> 209
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	IV. 355
Exos, (Alcyonium) Fingerforf		VI2. 775
K 2		Expresse,

	th E.
Expresse, (Sanblaufer) Cicindela quadrimacula	
Exlanguia werden die Infetten genennes, weil fi	
fein rothes Blut haben -	V. 1
Extensor, (Ichneumon) Recker	V. 852
Exter, (hou.) Elster -	II. 179
En, (Blase) Bulla Ovum	VI 404
En, gelbes, (Bergmufchel) Cardium ferratum	VI. 251
En, geftreiftes, (Blafe) Bulla lignaria	VI. 409
En, (Stinffafer) Buprestis contractilis	V. 341
Enbergans, Arias molistima -	II. 287
Eper ber Infetten	V. 11
Eperbruter, (Raupentober) Ichn. ovulorum	V2. 861
Enerdotter, (Goldhabnchen) Chrysomela vitellin	is V. 171
Eperbotter, (Schwimmschnecke) Nerita Vitellus	VI 585
- geschobener, Nerita albumen	VI. 587
Everdover. (boll.) Schwimmischnede	VI. 584
Everdover met het Klotje, (holl.) Anotennabel	VI. 581
Eperfleck, (Rachtschm) Phalæna nifella	V. 741
Enerfresser, (Ratter) Coluber ovivorus	III 193
Eneriael, (Geeapfel) Echinus Lucunter	VI. 15i
Enertafer, (Ruffelfafer) Curculio ovatus	V. 235
Enerfafer, Scarabæus ovatus	· V. 73
Enertugel, (Rugelthierchen) Volvox Berod	Vl2. 910
Egerporiellane, (Eh)	VI. 404
Enertelline, Tellina albida	VI. 235
Enerwickler, (Spinne) Aranea cucurbitina	V2. 1072
Eperwirbel, (Geegallert) Vorticella ovifera	VI2. 875
<b>22</b>	
<b>₹.</b>	
Faber; (Cerambyx) Binimermann	V. 254
Faber, (Zeus) S. Peterefisch	IV. 144
Cabricia, Bange) Cimex Fabricii -	S. 276
Fabro, & Petersfifch -	IV. 146
Kadeltrager, (Laterntrager) Fulgora lucernaria	V. 449
Rabenéule, (Wassereulchen) Phryganea filosa	V. 789
Kabenhorn, (Dorntafer) Hispa mutica	V. 205
Rudenfrebe, Cancer filiformis	V2. 1136
Radenwirmer, Gordii	VI. 30
damental constant	Sarket

		Tb.	€.
Falcon, (engl.) Falte -		IJ.	
Falcone, (ital.) fliegender Fifch	•	IV.	
Falconello, (ital ) Reuntober	-		113
Falte, Falco -	И. 6		
Dubfonischer, Falco Hudsonius	•	II.	81
- mit dunkler Bachshaut -	IL 86	s. S.	65
- mit gelber Wachshant		H.	-
- furinamischer, Falco supercitiosus	•	II.	83
Faltenarten , -	-	II.	73
Fallow-Deer, (engl.) Dambirfc	. I.	390.	
Fallow-smiter, (engl.) Weißschwanz	-		609
Kalte, (Baftard) Anomia plicatella	-	VI.	
Saltenflappe, Lajarustiappe) Spondylus	plicatus	VI.	28 t
Kaltennerite, (Schwimmfchnecke) Nerita	plicata	VI.	593
Saltentrager, (Cibechfe). Lacerta Plica	•	HI.	107
Falunt d'acqua, (ital.) Bafferstaar	•	II.	525
Fangheuschrecke, (bas europ fliegende Bla	t)	V.	411
Faon, (fr.) Hirschfalb -		I.	390
Faren, (Rarpfe) Cyprinus Farenus	-		399
Fario. (Salmo) gemeine Forcile	-	IV.	317
Farloule, (fr.) Wiefenlerche -		Ił.	518
Farra, Genfer Weißgangfisch	-		326
Farrentoralline, (Federforalline)	•	VI2.	
Karrenfrautwanze, Cimex filicis	•		483
Karger, (Erdfafer) Carabus crepitans	•	V.	359
Karzer, (Anarrhuhn) Psophia crepitans		If.	440
Kasan, Phasianus	II. 469		
bunter, Phasianus pictus	-	II.	474
- Chinestscher, Phasianus superbus	• .		124
- gehörnter, Phasianus cornutus			125
— ohne Kinnlappen			124
Fasanella, (ital) fleine Trappgans			445
Kasanenschwanz, Sertularia Myriophyllu	ım '	VI2.	
Sinfauluhu and Stubian		8ςι. æ	
Kasanhuhn aus Indien –	_		123
Fasciale Rindmunn	VI		361
Fasciola, Bindwurm	VI. 42		
- Alpina, Alpentourm	-		35 <b>4</b>
		1.21(	AIUI.

1,		
	,,	Th. E.
Ret	erhummel, Apis plumipes -	S. 329
Bet	erfamm, (Bahrtafer) Ptinus pectinicornis	V. iii
Bet	erkammefliege, Cantharis pettinicornis	V. 312
Ret	ertappe, (Ente) Anas galericulata -	IL 300
Ret	erfiel, (Ratter) Coluber calamarius	III. 156
	ertielfisch, (Igelfisch)	III. 323
	erforalline, Sertularia pennaria, (Myriophyl	,
•	lum) - Vi2. 839.	851. 851
Ret	erfort, Alcyonium epipetrum	VI2. 776
	erfrebe, Cancer pennaceus -	V2. 1124
Ket	ermeffer, (Meereidel) Lepas Scalpellum	VL 207
Fei	ge, (Blase) Bulla Ficus -	VI. 410
-	gefacte, (Stachelichnecte) Muren aruanus	VI. 514
-	lintische, Murex perversus	VI. 514
Fei	genbohrer, milder, (Gallapfelwurm) Cynipe	\$
	Sicomori	V2. 817
Fei	geneffer, (Bachstelis) Modacilla ficedula	11. 606
	genmoos, Corallina opuntia -	VI2 825
Fei	gennascher, (Pfeilschwanz) Sphinx Ficus	V. 639
	gensauger, Chermes Ficus -	V. 525
	genstecher, (Gallapfelwurm) Cynips Plenes	V2. 817
	le (Kanunmuschel) Ostrea Lima —	VI 311
Fei	nborste, (Bange) Cimex semislavus - !	V. 494
	bargus, (Tagichm.) Papilio Laomedia	V. 603
Scl	bfuchs, Canis Alopex	I. 226
Fel	bgott, (Meertage) Simia Fatuellus -	I, 135
	dgrille, (Grashurfer) Gryllus campestris	V. 425.
Rel	bhaase, Lepus timidus —	L 318
	bháhnchen, Chrysomela campestris -	V. 200
:Kel	bhuhn, Perdrix	11. 483
25 cl	btafer, Scarabæus Agricola -	V. 79
Ker	olerche, Alauda campestris —	II. 519
Kel	omaus, Mus terrestris	I. 345
Æcl	oftreicher, (Schlupfwespe) Tenthredo cam-	V2. 829
Œď	peftris —	IL 496
	braube, Columba Oenas -	V. 498
	owante, Cimex eampestris	V2. 883
Otu	meste, Vespa campestris -	V 4. on)

	Th.	e.
Reuerbrenner, (Laterntrager) Fulgora flammea	V.	449
Reuerfliege, Mulca wituans -	V2.	
Kenerglut, (leuchtender Rafer) Lampyris lucida		302
Reuerglut, (Stintfafer) Buprestis ignita		335
Reuerfafer, (leuchtenber Rafer) Lampyris pyralis		301
Reuerfrote, Rana rubeta		18
Kenerpapillon, (Tagkom.) Papilio Virgauren	V.	629
Keuersalamander, Lacerta Salamandra	111.	117
Keuerschröter, Lucani -	V.	93
Reuerwange, Cimex calons -		102
Beuerwurmlein, (Dachtschmetterlinge) Phalæna		•
pyrales -	V.	<b>73</b> 1
Feuille, (fr.) l'orbeceblat —	VI.	313
Feuille de Choux, (fr.) Pferdefuß -	VI.	287
Feve, (fr.) Insestenpuppe -		13
Fezant, (engl.) Fasan -		472
Fiall racka, (schweb ) weister Buchs -		277
Fiatola, (Stromateus), Streifdede -	IV.	6τ
Fiber, (Castor) Enstor		326
Fiber, (Pelecanus) brauner Fischer -	II.	332
Ficedula, Braunkehlchen -	И.	609
Richtenkafer, (Rugelkafer) Curculio pini	V.	220
Kichtenlaus, Aphis pini -		518
Kichtenmotte, (Nachtschm.) Phalæna pinnetella		738
Richtenfauger, (Goldbabnchen) Chrysomela pini	V.	101
Kichtenwanderer, (Nachtschm) Phalmna pini	$\mathbf{V}_{\bullet}$	657
Richtenwanze, Cimex pini -	V.	٠, دون
Fico, (ital.) Steinbolk	IV.	83
Ficus, (Alcyonium) Seefeige	VI2.	787
Ficus, (Bulla) Reige —	VI.	410
Fidia, (Papilio) Glanzflugel -	<b>V.</b>	60 t
Field - fare, (engl.) Wachholberbroffet -	II.	528
Figojadka, (voln.) Feigeneffer -	II.	606
Figulus, (Sphex) Töpfer -	<b>V</b> 2.	867
Filacotona, (arab.) Haselhuhu -	II.	487
File fish, (engl.) Keilfisch -	III.	
	<b>72.</b> 1	
Fimbria, (Phalæna) Caumfled -		688
	K	inns

,		Th.	€.
Kifche, fliegende, Exocoeti -	IV. 354		
Fifcher, (Belefan) Pelecanus Piscator	-	II.	
Sischfang -		IV.	15
Fischfresser, (Toutan) Ramphastos pisciv	orus	11.	150
Rifchgeper, Vultur Albiulla	. G	H.	61
Sifchidger, (Dewe) Larus ichthyætus	•	G.	10
Fischlaus, (Childfioh) Monoculus pisci	กบร	V2. 1	
Kifchmeiberhaube, (Rlir pfleber) Patella e			
Fifchwurm, (Bindwurm) Falciola intestin			4
Fifchwurm, (Raubbarter) Myxina glutin		VĹ	54
Fish, (engl.) Fisch	•	1V.	1
Fiskebigern, (norm.) Ceewange	•	V2.	148
Fisklympen, (schweb) Donnerfrote	-	IV.	
Fissipes, (Sphex) Gralifus	_	V2.	
Fissipes, (Sterna) Eraltfuß	-	II.	
Fistularia, Pfeifenfisch -		٠ĮŲ.	333
— Chinenlis, Tromcetenfisch	•	IV,	
- tabacaria, Tobackspfeifenfisch	,	IV.	
Fisura, (Patella) Epalte		VI.	
Fisurella, (Strombus) Rielflügel	•	VI.	4%
Fitchet, (engl.) Iliis -		I,	269
Flabellum, (Gorgonia) Seefecher		\ I2.	•
Flachstügel, (Rachtschm.) Phalæna compl	ana	V.	
Flachsfint, Fringilla linaria	₹.	II.	
Flachsseidenkoralline, Sertularia cuscuta	•	V 12.	
Flair, (engl) Ragelroche. —	•	III.	
Flamand, (fr.) Klaminger	-		358
Flamboyante, (fr.) Kloppelfuffen	-	VĮ.	
Flameuco, (fpan.) Klaminger.	• .	II.	
Flaminger, Phoenicopterus ruber.	-	II.	
Flamingo, (engl.) Flaminger —	.: <i>(Ti</i> -	II.	
Flamme, (leuchtender Kafer) Lampyris la		\. \.	
Flammenflügel, (Nachtschm) Phalæna pyr	aillidea	٧.	701
Flammensturmhaube, (Kinkhorn) Buccinu meum	ın iisii)-	VI.	161
Flatterer, (Fledermans) Vespertilio spost	en e	I.	
Flavipes, (Chrysomela) Gelbschentel	WILL	<b>V</b> .	
Flavipes, (Cicindela) Bothenschild	<del>-</del>	V. 3	
		V • ;	".

Flie, Fly, (engl.) Fliege  Kliege, ameritanische, Musca æquinostialis  V2. 975  Fliegen, Muscæ  — bunnhaartge, mit bürstenartigen Kühlhör  — nern  — gerippte, Muscæ costatæ  — haarige, mit sederartigen Kühlhörnern  — mit sabensörmigen Kühlhörnern  — raube, mit sederatigen Kühlhörnern  — raube, mit federatigen Kühlhörnern  — v2. 969  — v2. 969  — raube, mit sederatigen Kühlhörnern  — v2. 969  — raube, mit sederatigen Kühlhörnern  — v2. 969  — raube, mit sederatigen Kühlhörnern  — v2. 969  — v2. 96  — v2. 96  — v2. 96  — v2. 96  — v2. 96  — v2. 96	•	<b>%.</b> €.
Fliegen, ameritanische, Musca æquinostialis  V2. 975  Fliegen, Muscæ  — bunnhaartge, mit bürstenartigen Kühlhörenern  — gerippte, Muscæ costatæ  — haarige, mit sederartigen Kühlhörnern  V2. 969  — mit sabensörmigen Kühlhörnern  — raube, mit sederigen Kühlhörnern  V2. 977  — raube, mit federigen Kühlhörnern  — raube, mit federigen Kühlhörnern  V2. 977  — raube, mit Kühlhörnern, welche Hürsten  baben  V2. 978  Kliegencesibri, Trochilus minimus  II. 271  Kliegende Elesanten, sliegende Rasenhörner, sliegenn  ge ttere. Bormalige Benennungen  ber sünst ersten Kästerarten  V. 49  Kliegende Läuse, Hippobosca equina  — pserbelaus, Hippobosca equina  — chaaslaus, Hippobosca avicularia  — bogeslaus, Hippobosca avicularia  V2. 1010  — chwalbenlaus, Hippobosca hirundinaria  — Bogeslaus, Hippobosca avicularia  V2. 1010  Kliegensende, (Eute) Conus stercus muscarum  Kliegensende, (Eute) Conus stercus muscarum  Kliegensende, (Eute) Conus stercus muscarum  V2. 1010  Kliegensende, (Weersage) Simia Beelzebul  Kliegensende, (Weersage) Simia Be	Flie, Fly, (engl.) Kliege -	
Stiegen, Muscæ  — bunnbaarige, mit burstenartigen Fühlhör  nern  — gerippte, Muscæ costatæ  — baarige, mit federattigen Kühlbörnern  — baarige, mit federattigen Kühlbörnern  — mit fadensörmigen Kühlbörnern  — raube, mit federigen Kühlbörnern  — raube, mit föderigen Kühlbörnern  — v2. 958  Kliegencesitöri, Trochilus minimus  — II. 271  Kliegende Lefanten, sliegende Rassenbörner, sliegenn  ge ettere. Bormalige Benennungen  ber fünst ersten Käserarten  — v2. 1009  — Psterdlaus, Hippobosca equina  — officalende, Hippobosca ovina  — officalende, Hippobosca ovina  — officalende, Hippobosca ovina  — officalende, Hippobosca ovina  — officalende, Hippobosca ovina  — officalende, Hippobosca ovina  V2. 1010  Kliegende säuse, Hippobosca avicularia  V2. 1010  Kliegendere, (Eute) Conus stercus muscarum  Kliegenfänger, (Reersage) Simia Beelzebul  Kliegenfänger, (Reersage) Simia Beelzebul  Kliegenfänger, Muscicapa fasciata  — officalentischer, Muscicapa emeria  II. 595. 6.168  — officaler, Muscicapa fasciata  — bunter, Muscicapa fasciata  — officaler, Muscicapa Cajanensis  II. 500  — officaler, Muscicapa Cajanensis  II. 500  — officater, Muscicapa Cajanensis  II. 500  — officater, Muscicapa Cajanensis  II. 500  — officater, Muscicapa Cajanensis  II. 500  — officater, Muscicapa Cajanensis  II. 500  — officater, Muscicapa coronata  — officater, Muscicapa coronata  — officater, Muscicapa coronata  — officater, Muscicapa grisola  II. 601  — officater, Muscicapa virens  II. 502  — officater, Muscicapa virens  II. 601  — officater, Muscicapa virens  II. 601  — officater, Muscicapa virens  II. 502	Kliege, amerifanische, Musca æquinoclialis	
- bunnbaarige, mit burstenartigen Fühlhörnern nern V2. 969 - gerippte, Musce costatæ - baarige, mit sederartigen Rühlhörnern - baarige, mit sederartigen Rühlhörnern V2. 966 - mit sadensormigen Rühlhörnern - raube, mit sederigen Rühlhörnern V2. 967 - raube, mit sederigen Rühlhörnern - raube, mit federigen Rühlhörnern - raube, mit fühlhörnern, welche Bürsten baben - V2. 958 Kliegencesitöri, Trochilus minimus - Riegende Elefanten, sliegende Rassenhörner, sliegend ge ettere. Bormalige Benennungen ber fünst ersten Rässerarten - V. 49 Kliegende Lefanten, sliegende Rassenhörner, sliegend - Pstebelaus, Hippobosca equina - Pstebelaus, Hippobosca equina - Chaasaus, Hippobosca avicularia - Chabasaus, Hippobosca avicularia - Chabasaus, Hippobosca avicularia - Ritegenderd, (Eute) Conus stercus muscarum - Ritegensted, (Eute) Conus stercus muscarum - Ritegensted, (Eute) Conus stercus muscarum - Ritegensteder, (Eute) Conus stercus muscarum - Milicapa — II. 595. 6. 168 - Mmeritantscher Muscicapa crinita - Hameritantscher Muscicapa emeria - Banditscher, Muscicapa fasciata - Hameritantscher, Muscicapa emeria - Bengalischer, Muscicapa meria - Caapscher, Muscicapa variegata - Caapscher, Muscicapa Cajanensis - Caapscher, Muscicapa Cajanensis - Caapscher, Muscicapa Cajanensis - Caapscher, Muscicapa Canadensis - Genadischer, Muscicapa Canadensis - Gestester, Muscicapa coronata - Gestester, Muscicapa coronata - Gestester, Muscicapa coronata - Gestester, Muscicapa grisola - Gestester, Muscicapa grisola - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Gestester, Muscicapa virens - Ge		
nern V2. 969  — gerippte, Muscæ costatæ — ©. 335  — baarige, mit sederartigen Kublbörnern V2. 966  — mit sabensörmigen Kublbörnern V2. 977  — raube, mit sübstörnern, welche Kursten baben V2. 958  Kliegencesibri, Trochilus minimus II. 271  Kliegende Elefanten, sliegende Rasenbörner, sliegende ge ttere. Bormalige Benennungen ber sünst ersten Käferarten V2. 1009  — Pferbelaus, Hippoboscæ V2. 1009  — Ostaasaus, Hippobosca equina V2. 1010  — Ostaasaus, Hippobosca vina V2. 1010  — Ostaasaus, Hippobosca vina V2. 1010  — Ostaasaus, Hippobosca vina V2. 1010  — Mogeslaus, Hippobosca avicularia V2. 1010  Kliegendred, (Eute) Conus stercus muscarum VI. 377  Kliegensänger, (Meersage) Simia Beelzebul II. 595  — Mmerisanischer, Muscicapa fasciata E. 172  — Bengalischer, Muscicapa fasciata E. 173  — Bengalischer, Muscicapa fusca E. 175  — brauner, Muscicapa variegata II. 597  — Eaarscher, Muscicapa Capenus II. 599  — Canadischer, Muscicapa Capenus II. 500  — Ganadischer, Muscicapa Capenus II. 500  — Canadischer, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 500  — Genediter, Muscicapa Capenus II. 601  — Genediter, Muscicapa coronata II. 601  — Gestenter, Muscicapa grisola II. 601  — Gestenter, Muscicapa virenz II. 501  — Gestenter, Muscicapa virenz II. 502		
— gerippte, Muscæ costatæ — baarige, mit sederartigen Kublbörnern — mit sabensörmigen Kublbörnern — raube, mit sederigen Kublbörnern — raube, mit substörmern, welche Kursten baben — v2. 958 Kliegencesibri, Trochilus minimus — seriuns ersten Kasendorner, stiegendogende Elefanten, sliegende Rasendörner, stiegendogende Elefanten, sliegende Rasendörner, stiegendogender Sussen, stiegendogender Sussen, stiegendogender Sussen, stiegendogender Sussen, stiegendogendogender Sussen, stiegendogendogender Sussen, stiegendogendogendogendogendogendogendogend		
— hadrige, mit federartigen Kühlhörnern — mit fadenförmigen Kühlhörnern — raube, mit federigen Kühlhörnern — raube, mit Kühlhörnern, welche Bürsten — baben — V2. 958 Kliegencestbri, Trochilus minimus — II. 271 Kliegende Elefanten, sliegende Rasenbörner, sliegende — ge ettere. Bormalige Benennungen — ber fünf ersten Käferarten — V. 49 Kliegende Läuse, Hippobosca equina — Pferdelaus, Hippobosca ovina — Chaasaus, Hippobosca ovina — Chaasaus, Hippobosca avicularia — Pogeslaus, Hippobosca avicularia — Pogeslaus, Hippobosca avicularia V2. 1010  Kliegendreck, (Eute) Conus stercus muscarum Kliegenfänger, (Meersase) Simia Beelzebul  Kliegenfänger, (Meersase) Simia Beelzebul  Kliegenfänger, Muscicapa — 11. 595. C. 168 — Mencritantscher Muscicapa erinita — Bandirter, Muscicapa fasciata — Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 — brauner, Muscicapa fusca — brauner, Muscicapa Variegata II. 601 — Caarscher, Muscicapa Capensis II. 602 — Caarscher, Muscicapa Capensis II. 603 — Carolinischer, Muscicapa Capensis II. 604 — Gestecter, Muscicapa maculata — gestecter, Muscicapa maculata — gestecter, Muscicapa petechia II. 605 — gestecter, Muscicapa petechia II. 606 — gestecter, Muscicapa grisola II. 607 — gestreifter, Muscicapa grisola III. 608 III. 609 III. 601	_ gerippte, Muscæ costatæ -	
— mit fabenförmigen Küblbörnern — raube, mit feberigen Küblbörnern — raube, mit Küblbörnern, welche Bürsten baben — V2. 958 Kliegencestöri, Trochilus minimus — II. 271 Kliegende Elefanten, sliegende Rasenbörner, sliegende ge tiere. Bormalige Benennungen ber fünf ersten Käserarten — V. 49 Kliegende Läuse, Hippobosca equina — Opterbelaus, Hippobosca ovina — Opterbelaus, Hippobosca ovina — Opterbelaus, Hippobosca ovina — Opterbelaus, Hippobosca ovina — Opterbelaus, Hippobosca avicularia — Opterbelaus, Hippobosca avicularia V2. 1010 — Opterbelaus, Hippobosca avicularia V2. 1010  Kliegendreck, (Eute) Conus stercus muscarum Kliegenfänger, (Meersase) Simia Beelzebul VI. 377 Kliegenfänger, Muscicapa — Muscicapa — Muscicapa — Opterbase, Muscicapa emeria VI. 595. C. 168 — Opterbase, Muscicapa fusca — Bengalischer, Muscicapa emeria VI. 597 — Donner, Muscicapa variegata VI. 507 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 509 — Canabischer, Muscicapa Capensis VI. 509 — Canabischer, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VI. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase, Muscicapa Capensis VIII. 500 — Opterbase	baarige, mit federartigen Rublhornern	V2. 966
— raube, mit feberigen Fühlbörnern — raube, mit Fühlbörnern, welche Bürsten haben  V2. 958 Kliegencesibri, Trochilus minimus  Kliegende Elefanten, sliegende Rasenhörner, sliegende ge tiere. Bormalige Benennungen ber fünst ersten Käserarten  V2. 1009  W2. 1009  W2. 1009  W2. 1009  W2. 1009  W2. 1009  W2. 1010  W3. 1009  W2. 1010  W3. 1009  W3. 1	mit fabenformigen Fublbornern	
haben V2. 958 Kliegencelibri, Trochilus minimus II. 271 Kliegende Elefanten, fliegende Rasenborner, fliegende gettere. Bormalige Benennungen der fünf ersten Käserarten V. 49 Kliegende Laus, Hippodoscæ V2. 1009 — Pserdelaus, Hippodosca equina V2. 1009 — Chaasaus, Hippodosca ovina V2. 1010 — Chaasaus, Hippodosca ovina V2. 1010 — Gomalbenlaus, Hippodosca avicularia V2. 1010 Kliegendreck, (Lute) Conus stercus muscarum VI. 377 Kliegenfänger, (Reersase) Simia Beelzebul I. 125 Kliegenfänger, Muscicapa II. 595. C. 168 — Marritantscher Muscicapa crinita II. 597 — Bondirter, Muscicapa fasciata C. 172 — Bengalischer, Muscicapa fasciata C. 172 — Bengalischer, Muscicapa fusca C. 170 — bunter, Muscicapa fusca C. 170 — Gaarscher, Muscicapa variegata II. 601 — Canadischer, Muscicapa Capensis II. 509 — Canadischer, Muscicapa Capensis II. 509 — Garslinischer, Muscicapa Capensis II. 509 — Gestecter, Muscicapa maculata C. 169 — gestecter, Muscicapa petechia II. 601 — gestecter, Muscicapa grisola II. 601 — gestreifter, Muscicapa grisola II. 601 — gestner, Muscicapa virens. II. 599		V2. 957
Fliegende Elefanten, fliegende Rasenhörner, fliegende Glefanten, fliegende Rasenhörner, fliegende ge ettere. Bormalige Benennungen der fünf ersten Käserarten V. 49 Fliegende Laus, Hippodosca V. 1009  — Pserdelaus, Hippodosca equina V. 1010  — Schaakaus, Hippodosca ovina V. 1010  — Somalbenlaus, Hippodosca hirundinaria V. 1010  — Bogeslaus, Hippodosca avicularia V. 1010  Kliegendreck, (Lute) Conus stercus muscarum VI. 377 Fliegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul I. 125  Fliegenfänger, Muscicapa II. 595. S. 168  — Mmerikanischer Muscicapa erinita II. 597  — Bengalischer, Muscicapa fasciata S. 172  — Bengalischer, Muscicapa fusca S. 170  — bunter, Muscicapa fusca S. 170  — bunter, Muscicapa variegata II. 601  — Caaroticher, Muscicapa Capensis II. 600  — Garolinischer, Muscicapa Capensis II. 600  — Garolinischer, Muscicapa Canadensis II. 699  — Carolinischer, Muscicapa Capensis II. 600  — gestecter, Muscicapa maculata S. 169  — gestecter, Muscicapa petechia II. 601  — gestecter, Muscicapa grisola II. 601  — gestenter, Muscicapa grisola II. 601  — gestenter, Muscicapa grisola II. 601  — gestenter, Muscicapa grisola II. 601  — gestenter, Muscicapa grisola II. 601  — gestenter, Muscicapa virens II. 601  — gestenter, Muscicapa virens II. 601		ten
Fliegende Elefanten, sliegende Rasenhörner, sliegende ettere. Bormalige Benennungen der fünf ersten Käserarten - V. 49 Fliegende Läuse, Hippodoscæ - V2. 1009 - Pserdelaus, Hippodosca equina V2. 1010 - Echaasaus, Hippodosca ovina V2. 1010 - Echaasaus, Hippodosca hirundinaria V2. 1010 - Bogeslaus, Hippodosca avicularia V2. 1010 Fliegendreck, (Eute) Conus stercus muscarum VI. 3.77 Fliegensänger, (Meertage) Simia Beelzedul I. 125 Fliegensänger, Muscicapa II. 595. E. 168 - Mmerikanischer Muscicapa erinita II. 597 - Bandister, Muscicapa fasciata E. 172 - Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 - Brauner, Muscicapa variegata II. 601 - Caarsticher, Muscicapa Capansis II. 509 - Eagennischer, Muscicapa Capansis II. 509 - Ganadischer, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 601 - gestester, Muscicapa grisola II. 601 - gestester, Muscicapa grisola II. 601 - gestinter, Muscicapa grisola II. 601 - grüner, Muscicapa virens II. 509		V2. 958
Fliegende Elefanten, sliegende Rasenhörner, sliegende ettere. Bormalige Benennungen der fünf ersten Käserarten - V. 49 Fliegende Läuse, Hippodoscæ - V2. 1009 - Pserdelaus, Hippodosca equina V2. 1010 - Echaasaus, Hippodosca ovina V2. 1010 - Echaasaus, Hippodosca hirundinaria V2. 1010 - Bogeslaus, Hippodosca avicularia V2. 1010 Fliegendreck, (Eute) Conus stercus muscarum VI. 3.77 Fliegensänger, (Meertage) Simia Beelzedul I. 125 Fliegensänger, Muscicapa II. 595. E. 168 - Mmerikanischer Muscicapa erinita II. 597 - Bandister, Muscicapa fasciata E. 172 - Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 - Brauner, Muscicapa variegata II. 601 - Caarsticher, Muscicapa Capansis II. 509 - Eagennischer, Muscicapa Capansis II. 509 - Ganadischer, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 509 - Gasester, Muscicapa Capansis II. 601 - gestester, Muscicapa grisola II. 601 - gestester, Muscicapa grisola II. 601 - gestinter, Muscicapa grisola II. 601 - grüner, Muscicapa virens II. 509	Kliegencolibri, Trochilus minimus -	
ge ttere. Bormalige Benennungen ber fünf ersten Käferarten - V. 49 Fliegende Läuse, Hippodoscæ - V2. 1009 - Psterdelaus, Hippodosca equina V2. 1010 - Chaasaus, Hippodosca ovina V2. 1010 - Chaasaus, Hippodosca hirundinaria V2. 1010 - Bogellaus, Hippodosca avicularia V2. 1010 Fliegendreck, (Eute) Conus stercus muscarum VI. 3.77 Fliegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul I. 125 Fliegenfänger, Muscicapa II. 595. C. 168 Ameritanischer Muscicapa crinita II. 597 - Bengalischer, Muscicapa fasciata C. 172 - Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 Brauner, Muscicapa variegata II. 601 Caarscher, Muscicapa Capansis II. 509 Carolinischer, Muscicapa Capansis II. 509 Carolinischer, Muscicapa Capansis II. 509 Garolinischer, Muscicapa Capansis II. 601 gestönter, Muscicapa grisola II. 601 gestinter, Muscicapa grisola II. 601 grüner, Muscicapa virens II. 509	Klicgende Elefanten, fliegente Rafenborner, flie	rgen.
Sliegende Laufe, Hippoboscæ  — Pferbelaus, Hippobosca equina — Schaasaus, Hippobosca ovina — Schaasaus, Hippobosca ovina — Chmasbenlaus, Hippobosca hirundinaria — Bogeslaus, Hippobosca avicularia — Bogeslaus, Hippobosca avicularia — V2. 1010 — Bogeslaus, Hippobosca avicularia — V2. 1010 — Sitegendrect, (Eute) Conus stercus muscarum — V1. 3,77 — Sliegenfänger, (Meertaße) Simia Beelzebul — II. 595. S. 168 — — Ameritanischer Muscicapa crinita — — Bandirter, Muscicapa fasciata — — Bengalischer, Muscicapa fasciata — — Bengalischer, Muscicapa emeria — — Bengalischer, Muscicapa emeria — — Bunter, Muscicapa variegata — — Bunter, Muscicapa Variegata — — Caapscher, Muscicapa Capansis — — Canabischer, Muscicapa Capansis — — Carolinischer, Muscicapa Canadensis — — Garolinischer, Muscicapa Canadensis — — Genediter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa petechia — — gestecter, Muscicapa grisola — — gesteister, Muscicapa grisola — — gesteister, Muscicapa grisola — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa grisola — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa grisola — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — gesteister, Muscicapa virens — — — gesteister, Muscicapa virens — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	ge Stiere. Vormalige Benennu	ngcn
— Spferbelaus, Hippobosca equina — Echaasaus, Hippobosca ovina — Comasbenlaus, Hippobosca hirundinaria — Bogellaus, Hippobosca avicularia — Bogellaus, Hippobosca avicularia — Bogellaus, Hippobosca avicularia — V2. 1010 — Ritegenbreck, (Litte) Conus stercus muscarum — V1. 377 — Ritegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul — II. 595. ©. 168 — — Amerikanischer Muscicapa crinita — — Bandirter, Muscicapa fasciata — — Bengalischer, Muscicapa emeria — — Bengalischer, Muscicapa emeria — — Brauner, Muscicapa fusca — — Brauner, Muscicapa variegata — — Bunter, Muscicapa variegata — — Caarscher, Muscicapa Capansis — — Carolinischer, Muscicapa Capansis — — Garolinischer, Muscicapa Canadensis — — Gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa petechia — — gestecter, Muscicapa grisola — — geströnter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens		• V• 49
— Spferbelaus, Hippobosca equina — Echaasaus, Hippobosca ovina — Comasbenlaus, Hippobosca hirundinaria — Bogellaus, Hippobosca avicularia — Bogellaus, Hippobosca avicularia — Bogellaus, Hippobosca avicularia — V2. 1010 — Ritegenbreck, (Litte) Conus stercus muscarum — V1. 377 — Ritegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul — II. 595. ©. 168 — — Amerikanischer Muscicapa crinita — — Bandirter, Muscicapa fasciata — — Bengalischer, Muscicapa emeria — — Bengalischer, Muscicapa emeria — — Brauner, Muscicapa fusca — — Brauner, Muscicapa variegata — — Bunter, Muscicapa variegata — — Caarscher, Muscicapa Capansis — — Carolinischer, Muscicapa Capansis — — Garolinischer, Muscicapa Canadensis — — Gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa petechia — — gestecter, Muscicapa grisola — — geströnter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa grisola — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens — — gestreifter, Muscicapa virens	Allegende Laufe, Hippobolcæ -	V2. 1009
— Echnalbenlaus, Hippobosca hirundinaria V2. 1010  — Bogellaus, Hippobosca avicularia V2. 1010  Rliegenbreck, (Lute) Conus stercus muscarum VI. 377  Rliegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul I. 125  Fliegenfänger, Muscicapa II. 595. ©. 168  — Mmerikanischer Muscicapa crinita II. 597  — banbirter, Muscicapa fasciata ©. 172  — Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597  — brauner, Muscicapa fusca ©. 170  — bunter, Muscicapa variegata II. 601  — Caapscher, Muscicapa Capansis II. 600  — Canabischer, Muscicapa Canadensis II. 699  — Ganabischer, Muscicapa Canadensis II. 699  — Garolinischer, Muscicapa Canadensis II. 699  — Garolinischer, Muscicapa Canadensis II. 699  — gestecter, Muscicapa maculata ©. 169  — gestecter, Muscicapa petechia II. 601  — geströnter, Muscicapa grisola II. 601  — gestriefter, Muscicapa grisola II. 601  — gestriefter, Muscicapa grisola II. 601  — grüner, Muscicapa virens II. 601	Pferdelaus, Hippobolca equina	V2, 1009
naria V2. 1010  — Bogellaus, Hippobosca avicularia V2. 1010  Rliegenbreck, (Lute) Conus stercus muscarum VI. 377  Rliegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul I. 125  Eltegenfänger, Muscicapa II. 595. 6. 168  — Mmerikanischer Muscicapa crinita II. 597  — banbirter, Muscicapa fasciata 6. 172  — Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597  — brauner, Muscicapa fusca 6. 170  — bunter, Muscicapa variegata II. 601  — Caapscher, Muscicapa Capensis II. 600  — Canabischer, Muscicapa Capensis II. 600  — Ganabischer, Muscicapa Canadensis II. 600  — Gestecter, Muscicapa maculata 6. 169  — gestecter, Muscicapa maculata 7. 169  — gestecter, Muscicapa petechia II. 601  — gestecter, Muscicapa grisola II. 601  — gesteister, Muscicapa grisola II. 601  — gesteister, Muscicapa grisola II. 601  — gesteister, Muscicapa grisola II. 601  — gesteister, Muscicapa grisola II. 601  — grüner, Muscicapa virens. II. 599	Chaaflaus, Hippobosca ovina	
—— Bogeslaus, Hippobosca avicularia V2. 1010 Kliegenbreck, (Lute) Conus stercus muscarum VI. 377 Kliegenfänger, (Meerkase) Simia Beelzebul I. 127 Kliegenfänger, Muscicapa — II. 595. ©. 168 —— Mmerikanischer Muscicapa crinita II. 597 —— Bandister, Muscicapa fasciata ©. 172 —— Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 —— Brauner, Muscicapa fusca ©. 170 —— Brauner, Muscicapa variegata II. 601 —— Caapscher, Muscicapa Capensis II. 600 —— Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 600 —— Garosinischer, Muscicapa Canadensis II. 600 —— Gestecter, Muscicapa maculata ©. 169 —— gestecter, Muscicapa petechia II. 601 —— gestecter, Muscicapa grisola II. 601 —— gesteister, Muscicapa grisola II. 601 —— gesteister, Muscicapa grisola II. 601 —— gesteister, Muscicapa grisola II. 601 —— grüner, Muscicapa virens. II. 599	<del>-</del> •	
Ritegenbreck, (Tute) Conus stercus muscarum VI. 3,77 Ritegenfänger, (Meerkage) Simia Beelzebul I. 125 Filtegenfänger, Muscicapa — II. 595. © 168 — — Amerikanischer Muscicapa crinita II. 597 — — Bandirter, Muscicapa fasciata © 172 — — Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 — — Brauner, Muscicapa fusca © 170 — — bunter, Muscicapa variegata II. 601 — — Caarscher, Muscicapa Capensis II. 602 — — Canadischer, Muscicapa Capanensis II. 599 — — Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 602 — — Gestecker, Muscicapa maculata © 169 — — gestecker, Muscicapa maculata © 169 — — gestecker, Muscicapa petechia II. 601 — — gesteister, Muscicapa grisola II. 601 — — gesteister, Muscicapa grisola II. 601 — — grüner, Muscicapa virens II. 601		
Kitegenfänger, (Meertage) Simia Beelzebul  Filtegenfänger, Muscicapa  Muscicapa  Muscicapa  Muscicapa crinita  Muscicapa fasciata  Muscicapa fasciata  Muscicapa fasciata  Muscicapa emeria  Muscicapa fusca  Musc	- Bogellaus, Hippobolca avicularia	V2. 1010
Fliegenfanger, Muscicapa — II. 595. ©. 168  — — Mmeritantscher Muscicapa crinita II. 597  — — bandirter, Muscicapa fasciata ©. 172  — — Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597  — — brauner, Muscicapa fusca ©. 170  — — bunter, Muscicapa variegata II. 601  — — Caapscher, Muscicapa Capensis II. 500  — — Canadischer, Muscicapa Cajanensis II. 500  — — Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 600  — — Garolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600  — — gestecter, Muscicapa maculata ©. 169  — — gestecter, Muscicapa petechia II. 601  — — gestecter, Muscicapa grisola II. 601  — — gestreifter, Muscicapa grisola II. 601  — — gestreifter, Muscicapa grisola II. 601  — — grüner, Muscicapa virens. II. 599	Kliegendreck, (Tute) Conus stercus mulcarun	
— — Amerifanischer Museicapa erinita II. 597 — — bandirter, Museicapa fasciata S. 172 — — Bengalischer, Museicapa emeria II. 597 — — brauner, Museicapa fusca S. 170 — — bunter, Museicapa variegata II. 601 — — Eagennischer, Museicapa Capensis II. 500 — — Eagennischer, Museicapa Cajanensis II. 500 — — Earabischer, Museicapa Canadensis II. 500 — — Earolinischer, Museicapa Carolinensis II. 600 — — gestecter, Museicapa maculata S. 169 — — gestecter, Museicapa petechia II. 601 — — gestecter, Museicapa coronata S. 168 — — gesteister, Museicapa grisola II. 601 — — gesteister, Museicapa grisola II. 601 — — gesteister, Museicapa grisola II. 601 — — grüner, Museicapa virens	Kliegenfanger, (Meertage) Simia Beelzebul	
— — banbirter, Muscicapa fasciata — — Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597 — — brauner, Muscicapa fusca — — Sangalischer, Muscicapa fusca — — Bunter, Muscicapa variegata — — Eagennischer, Muscicapa Capensis II. 600 — — Canadischer, Muscicapa Cajanensis II. 600 — — Carolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600 — — Gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa petechia II. 601 — — gestecter, Muscicapa grisola II. 601 — — geströnter, Muscicapa grisola II. 601 — — gestreifter, Muscicapa grisola II. 601 — — grüner, Muscicapa virens II. 601	Fliegenfanger, Muscicapa - II.	595. 😇. 168
Bengalischer, Muscicapa emeria II. 597  brauner, Muscicapa fusca S. 170  bunter, Muscicapa variegata II. 601  Caarscher, Muscicapa Capensis II. 500  Canadischer, Muscicapa Cajanensis II. 500  Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 600  Gestedter, Muscicapa maculata S. 169  gestedter, Muscicapa petechia II. 601  gesteister, Muscicapa grisola II. 601  geströnter, Muscicapa grisola II. 601  grüner, Muscicapa virens. II. 599	Ameritanischer Mulcicapa crini	
brauner, Muscicapa susca S. 170 bunter, Muscicapa variegata II. 601 Caarscher, Muscicapa Capensis II. 500 Casensischer, Muscicapa Cajanensis II. 500 Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 500 Carolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600 gestecter, Muscicapa maculata S. 169 gestecter, Muscicapa petechia II. 601 geströnter, Muscicapa grisola II. 601 grüner, Muscicapa grisola II. 601 grüner, Muscicapa virens. II. 599	bandirter, Mulcicapa falciata	<b>5</b> . 172
bunter, Muscicapa variegata II. 601 Eaarscher, Muscicapa Capensis II. 600 Eajennischer, Muscicapa Cajanensis II. 600 Earolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600 gestecter, Muscicapa maculata 5. 169 gestecter, Muscicapa petechia II. 601 geströnter, Muscicapa grisola II. 601 gestreister, Muscicapa grisola II. 601 grüner, Muscicapa virens II. 601	Bengalischer, Williciapa emeri	11. 597
— — Eaarscher, Muscicapa Capensis II. 600 — — — Eajennischer, Muscicapa Cajanensis II. 600 — — — Eanabischer, Muscicapa Canadensis II. 600 — — — Earolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600 — — — gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa petechia II. 601 — — — geströnter, Muscicapa coronata — — gestreister, Muscicapa grisola II. 601 — — — grüner, Muscicapa virens II. 699	brauner, Mulcicapa iulca	
— — Cajennischer, Muscicapa Cajanensis II. 699 — — Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 699 — — Garolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600 — — gestecker, Muscicapa maculata G. 169 — — gestecker, Muscicapa petechia II. 601 — — geströnter, Muscicapa coronata G. 168 — — gestreister, Muscicapa grisola II. 601 — — grüner, Muscicapa virens. II. 699	bunter, Mulcleapa variegata	
— — Canadischer, Muscicapa Canadensis II. 699 — — Carolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600 — — gestecker, Muscicapa maculata		
— — Earolinischer, Muscicapa Carolinensis II. 600  — — gestecter, Muscicapa maculata	Canadistan Massiana Canadi	nus II. 599
— — gestecter, Muscicapa maculata — — gestecter, Muscicapa petechia — — geströnter, Muscicapa coronata — — gestreister, Muscicapa grisola — — gestreister, Muscicapa grisola — — grüner, Muscicapa virens  II. 601  II. 601  II. 601  II. 601	Canalinistan Musiciana Canalin	entic II 600
— — gesteckter, Muscicapa petechia II. 601 — — geströnter, Muscicapa grisola II. 601 — — grüner, Muscicapa virens II. 691 II. 691	Qarolinijort, įviuicicapa Carolii	CAL TA
— — gefronter, Muscicapa coronata — — gestreifter, Muscicapa grisola — — grüner, Muscicapa virens  II. 601 III. 601 III. 609	genettet, ividiciona natachia	
gestreister, Muscicapa grisola II. 601 grüner, Muscicapa virens. II. 599	geneuter, iviuicicapa peterna	
gruner, Muscicapa virens. II, 599	gerronter, ivinicicapa corollata	
Beauties, street and a series	general Musicinena grinda	
	m Atmitt, tarmterenbe arreits	Kliet

	Fliegenfänger	Flossenmil	lleporé	159
_	, ,,			EH. S.
Fliegenfan	ger, Madagascarisd	er, Muscicar	oa mutata	II. \$96
<u> </u>	- Martinifscher,	Muscicapa N	/ //artinica	a II. 596
	— olivenfárbiger,	Muscicapa	olivacea	II. 599
<u>.</u>	- rother, Muscie		-	II. 598
	- schoner, Musci	capa nitida		<b>G.</b> 170
	– schwarzer, Mu	cicapa atra		<b>5</b> . 169
	- schwarzer, Mu	scicapa atric	apilla	II. 598
	— Senegallischer,	Muscicapa	Senega-	
	lenfis,	<b>.</b>		II. 600
	- Surinantischer,	Niulcicapa S	Surinam	
Œlian-sáu	— Birginischer, N	4	irginea	<b>©</b> . 168
	ger, (schwarze Mei		-	II. 573
Thegenina	be, Acarus muscar iber, (Kaubkäfer)	uni Saanbuliaus	-	V2. 1054
Dutheurar	rellus	Scapnymus -	cantna-	\$7 ana
Ellegenrie	fe, (Fliege) Musca	gtoffa	_	V. 393
	herschnepfe	- Bron-	11.	V2, 969 609, 610
Aliegentha	nge, Cimex person	atus		V. 493
Kliegenme	sve,(Raurentöder) I	chneumoti m	ulcarum	V. 493
Rlieger. (	Maus) Mus volar	1S	-	I. 354
	Reerpferd) Pegalu		-	111. 349
	ner, (Seehahn) T		5	IV. 278
	nle, (engl ) Fleder		_	I, 150
Albbe, Pu		•		2. 1040
Albbeafere	ben, (Rleintafer) De	rmestes puli	carius	V. 103
Rlobfaame	, (Kleinkafer) Der	mestes psylli	us	V. 108
Flotenfore	illine, Sertularia ly	ringa	. 1	/l2. 845
	(Langfuß) Tipuls		1	V2. 949
	hen, Chrysomela p		•	V. 169
Flobbahno	hen, Chrysomela p	ulicaria	-	V. 184
Flohmucke	, (Langfuß) Tipu	la pulicaris		V2. 946
	, (Mace) Culex p	oulicaris	•	V2. 992
	, (Stinkfliegen)	<b>.</b>		V2. 791
	, (Bange) Cimex	r loridanus	•	V. 484
Florus,		<b>-</b>		II. 554
Flos anim	alis, Eplinderfocher	; ut :/08=4=1		12. 816
	(marfeil.) Spigma			III. 243
Proficmitt	epore, Millepora	Биняся	- '	12. 71 <b>7</b> Floge

	ZŊ.	<b>G</b>
Alogruden, (Rableuden) Gymnotus Aliaticus	IV.	50
	V2. 1	047
Floy - Fisk, (norm.) fliegender Fisch -	ĮV.	69
Blucheing, (Fliege) Mulca transfuga -	V2.	963
Kluchtling, (Meeltafer) Tenebrio festinans		252
Flügelauge (Grashupfer) Gryllus ocellatus		429
Rlugelborn, (Chilbfafer) Caffida bicornis		139
Flügelfeder, (Rachtschm.) Phalæna pterodactyla		757
Rlugelfled, (Kliegenfanger) Muscicapa maculati		
Blugelfted, (Rachtschm) Phalmna triptera		692
Blugelhorn, (Rlugelfchnede) Strombus marginatu	s VI.	482
Blugelnabel, (Bludelfon ) blaue, Strombus lividu	s VĮ.	491
Blugeinadel, schwarze, Strombus ater -		49Ì
Rlugelmurmer, Cliones -	•	110
Flügelschnecken, Strombi - VI. 47		
breitflügelige - VI. 48-		
gethurmte - VI. 49 - mit Fingern ober Zacken	၀. ၠဇ္	. 378
mit Fingern oder Zacken		475
		479
Blunder, (Seitenschwimmer) Pleurone les Fleiu	\$ 1V	. 115
Blugbarbe, (Rarpfe) Cyprinus Barbus		379
Klufbarich, Perca fluviatilis		223
Fingbrachsem, (Rarpfe) Cyprinus Brama		398
Flusdelphin, (Bunffingerfisch)		588
Alugborn, (Schwinimschnede) Nerita Corona		
Bluftrebs, Cancer Astacus	V2.	
Flufindtter, Coluber hydrus		190
Blugnerite, (Schwimmichnede) Nerita fluviatili	27- 2 VI	. 589
Klufingmobe, (Jungfer) Libellula Virgo		773
Blufotter, Mystella Lutra -		, 262
Flufpabfttrone, (Schnirtelfdnede) Helix amarul	<b>a</b> ,VI.	, rxc
Bluffcbllbtrote, Testudo orbicularis III. 3	2.	138
Blufschwamm. Spongia fluviatilis -	VI2	
BluBipinbel, (Stachelichnede) Murex cariolus		ς <b>ς 10</b>
Flustra, Seerinde	VI2	
foliaces, Blatterrinde -	VI2.	
— — frondiculosa, Lambrinde -	Viz	
lineata, Streifrinde	VI2	. 113

Fludra	Formica .	161
***	• • •	<b>2</b> 6. S.
Flustra membranacea, Pautrinte	<b>–</b>	VI2. 812
- papytacea, Darierrinde	**	VI2. 812
pilosa, Daarrinde	•	VI2. 810
- truncata, Meiffelrinde	•	VI2. 816
Flying fish, (engl.) fliegender Gif	fd -	IV. 278
Foar, (fdweb.) Schaaf	· ·	I. 422
Foelie-Bladeren, (hon) Mustan	enblüb	VI. 289
Foemina, (Tanagra) Beibchen	•	6. 160
Foet, Fuut, (boil.) Daubentanche	r a	II. 34t
Foetta, (ital.) Jitis	•	1. 269
Foine, Fouine, (fr.) Marber	<b>~</b> ′	1. 267
Folega, (ital.) fcmarges Bafferhi	ubn 🏯	11. 427
Folium, (Oftrea) Lorbeerbiat	-	VI. 313
Folpo, (venet.) Achtfuß	•	VI. 113
Folto, (ital.) Bafferftaar		II. 525
Fomentator, (Ichneumon) Baber	<u> </u>	V2. 855
Fontynbak, (bell.) Bafcbeden	•	VI. 284
Foras Flebar, (egipt.) Rilpferd	7	L 457
Forelle, gemeine, Salmo Farid		IV. 317
Forellenigus, Pediculus Farionis		V2. 1038
Forficula, Ohrwurm	- V. ab	6. 6. 262
- auricularia, großer Dort	burin	V. 396
- minor, fleiner Ohrwurm		V. 398
- riparia, Uferobewurm	22	©. 262
Forktail, (engl ) vierfahriger Lacht	ė 🖫	IV 3.2
Formica, Ameise -	Va da	8. <b>©</b> . 330
- atrata, schwarze Ameise	¥ 2. 90	V2 915
	<u></u>	¥2. 915
— — barbara, Algierer — bidens, Doppelzahn	<u> </u>	V. 912
- coespitum, Rasenameise	• •	V2. 914
- coespitum, Rasenameise - foetida, Stinkameise	•	V2. 914
		V2. 916
	•	V2. 912
— — hæmatoda, Purpurameise — — herculéana, Oserdameise	-	V2. 916
		V2. 911
— nigra, schwarze Ameise	<del>-</del>	V2. 913
- obsoleta, graue Ametse	• .	V2. 913
- omnivora, Vielfraß	. •	V2: 914
- Pharaonis, Egipter	•	V2: 913
L.		For-

	Fregättvögel	Fringilla	163
Breagfigg	gel, (Peletan) Pelecanus	ອີກິກກໍ່ໄກ້ຮ້	₹b. 🛎
	el, Procellaria	-davina	II. 327 II. 314
	, (Rafer) Scarabæus æn	end :	11. 315 17. 8A
Frett, Vi	verra		V. 90 3. <b>S.</b> 31
— — niel	litte, Viverra tossana	- 44	©. 32
	Viverra narica	*	J. 250
	fr.) Saatfrabe	<b>~</b>	11. 173
Fricator,	(Canis) Mopsbund	-	I. 200
Ariefelflug	el, (Graßbunfer) Gryllus	s miliaris	V. 439
Friefelpor	sellane, weiffe, Cypres pi	oraria	VI. 40t
Kriefelfdle	inge, Boa Cenchria	<b>÷</b>	111. 149
Frigane,	(fr.) Baffereule	•	V2. 782
Fringilla.	Kinfé -	IL 576	G. 161
A بمنم شنة	Imandavá, Bengalischer	©pa <b>B</b>	11. 584
<u>۾ ت نه</u>	Ingolensis, Angolischer E	pag	IL 591
ءِ شد سنة	utumnalis, Berbftfint	<u>.</u>	II. 58¢
=== B	Bengala, Bengalischer Fin	ifė –	II. fot
⊷ .b	icolor, zwenfarbiger Kinl	ė =	II. 594
ب نا h	ruante. Bourbonifcher Fi	inte -	Si 164
— — b	ütyracea, Indianischer E	irunling	II. 587
	alcarata, Spornfinte	-	<b>G.</b> 161
	annabina, Danfling	÷	II. 590
∸ -= C	Canaria, Canarienvogel	<b>à</b>	II. 587
<u> (</u>	Capenlis, Caapschet Finke	_	S. 165
	Cardinalis, Scharlachfint	•	S. 163
	arduelis, Distelfint	-	11. 582
	erata, Braunrucken	<b>-</b> . 4	<b>5</b> . 164
	haly beata, stabifárbiger (	Sante .	<b>E.</b> 165
ئے شنہ نت ع	itrinella, Citronfinte		11. 586
č	oelebs, Buchfinke	. •	11, 580
c	derulea, Blaufinke	• ,	S. 167
	onchata, Muschelfinke	-	<b>9.</b> 166
	rlípa, Krausfinfe		11. 594
	ucullata, Sanbenfinke		<b>6.</b> 166
	Culensis, schwedischet Fink	ξ <u>4</u>	II. 582
	omestica, Sperling	i Bankinat	II. 592
_	dominicana, Domingifchet	Patoinar	<b>6</b> . 166
==	rythrophtalma, Rothaug	je -	11. 582
_ ~ n	aldinta, gelbbandirter Kin	æ, . . d	<b>6.</b> 165

	Th. S.
Fructura, (ital) Bastardmatrele -	IV. 264
Frucht der Mameebaume tft die Rahrung des groß	en
fliegenden Einhorns · -	V. 51
Krucht, ihre Entwicklung und Bachsthum	I. 83
Fruchttiege, Musca frondescentiæ -	V2. 981
Frühtifer, Searabæus vernalis -	V. 72
Brublingseule, (Nachtschmett ) Phalmna pyraust	S. 310
Frühlingsfliege, Musca grossificationis	V2. 976
Frublingefafer, Scarabæus Vertumnus	C. 217
Krublingsmucke, (Langfuff) Tipula relegationis	V2, 935
Frublingspogel, (Nachtschm) Phalena vernaria	V. 704
Frytertje, (holl.) Branbfinte -	II. 590
Buchs, Canis Vulpes	I. 224
Ceplonischer, Kwasje -	I. 244
Mexitanticher, Canis Mexicanus	I. 228
- Gurinamischer, Canis Thous -	I. 228
Fuche, (Porzellane) Cyprea carneola -	VI, 390
Fuchshecht, Elox Vulpes -	IV. 338
Kuchsthurm, (Walze) Voluta vulpecula	VI, 429
	V2. 1048
Fublichlange, (Blindschleiche) Cæcilia maculata	III. 213
Füller, (Raupentober) Ichneumon saturatorius	V2. 845
Kunfauge, (Lagicom.) Papilio Tulbaghia	V. 607
Fünfeck, (Seidenschwang) Ampelis maculata	<b>G</b> . 147
Kunffeder, (Nachtschm) Phalæna pentadactyla	V. 758
Kunffingerfisch, Polynemus quinquarius.	IV. 358
Bunffingerfisch, (Ctustopf) Coriphoena penta-	
dastyla •	IV. 119
Fünfloch, (Qualle)	VI. 156
Kunfpuntt, (Sonnentafer) Coccinella quinque-	
punciata -	V. 150
Fünf und swanziger, (Sonnenkafer) Coccinella	
vigintiquinquepunctata	V. 156
Fuselier, (Specht) Pieus Martius	II. 219
Fuliginator. (Cerambyx), Schlotfeger,	V. 268
Fulgora, Laternträger	V. 447
- candelaria, leuchter	V. 448
— Europæa, Regelstign	V. 459
L a	Fulgora.

167 Th. S.

Gaaper, (boll.) (Rlaffmuschel) Gienmusche	I VI. 218. 283
Gaasvliegen, (boll.) Stinffliegen	- V2. 791
Gaay, (hou.) Saber -	II. 176
Gabbeling - Crow, (engl.) Rebelfrabe in 9	
Gabelschnauße, (Mude) Culex bifurcatus	V2. 992
Gabelschmanz, (Colibri) Trochilus forficat	us II. 265
Gabelfcmans, (Rlirrfifch) Chætodon faxa	
Gabelschmanz, (Lippfisch) Labrus lunaris	IV. 199
Sabelschwang, (Merle) Tanagra Jacarina	II. 573
Sabelschwang, (Nachtschm.) Phalæna vinul	2 V. 699
Sabelfchwang, (Baffereulchen) Phryganea	
data -	V2. 784
Sabelmange, Cimex ornatus -	V. 490
Gabeljahn, (Benusmuschel) Venus rotund	ata VI. 278
Gabian, (fr.) Meme	II. 344
Gabilan, (Catalon) Kranich	- II. 372
Sabler, (Knorrhahn) Cottus scaber	- IV. 136
Gabriela, (Papilio) Affelpage -	<b>S.</b> 296
Gadfly, (engl.) Bremfe -	V2. 925
Gadrille, (fr.) Rothkehlchen	IL 618
Gadus, Rabeljau	IV. 78
æglesinus, Schelfisch -	IV. 79
barbatus, Steinbolt	. IV. 88
carbonarius, Kohlmund	IV. 93
cimbrius, Schnurrbart -	IV. 98
- luscus, Blobauge -	IV. 87
- mediterraneus, Seetrufche	- IV. 99
minutus, 3mergfabeljau	IV. 90
- virens, gruner Schelfisch	- ĮV, 90
Sansedistel, (Miege), Musca Sonchi	- V2, 979
Gansedistellaus, Aphis Sonchi	- V, 516
Ganselaus, Pediculus anseris -	V2. 1033
Gansemuschel, (Meereichel) Lepas anlerife	
Gartner, (Erdglanger) -	V. 315
Gartner, (Langfuß) Tipula hortulana	V2. 942
Gartner, (Gerpenk) Boa hortulana	- III. 151
L 4	Gagnola
•	_

- '	
	Eb E.
Gagnola, (marfeil.) Blindfifch -	III. 340.
Gal, (fran ) St. Petersfisch	IV. 144
Galadore, Galedra, (ital.) Wintermeme	11 345
Galanga, Meerfrosch, (Secteufel) -	HI. 280
Galathea, (Papilio) Mormorargus -	V. 604
Galaxia, Scheisisch -	IV. 79
Galbedro, (ital) Golddroffel -	II, 186
Galbula, (Oriolus) Golddroffel -	H. 185
Gale, (griech.) Rage, hermelin - 1	. 229. 274
Galea, (Buccinum) Schellenschnecke -	VI. 445
Galeege mit langem Berbeck, (Rahn) .	VI. 350
Galeetta, (ital.) Sristopf	IV. 105
Galera, (fpan.) Seegelqualle -	VI. 128
Galeran, (Bretagn.) Robrdommel -	U. 386
Galerida, Schelfisch -	IV. 79
Galerita, (Blennius) Ceclerche -	<b>İ</b> V. 100
Galeruque brunette, (fr.) Reinfagrenhahnchen	V. 166
Galeus, gemeiner Stor -	III. 287
Galla mareza, (fran.) Bafferralle -	LI. 436
Sallapfelwurmer, Cyniphes -	V2. 810.
Gallenbrut, (Rauventober) Ichneumon Cynipedi	s V2. 860
Sallenfliege, Musca cynipsea -	V2. 977
Gallenftecher, (Raupentober) Ichneumon gallaru	m V2. 859
Gallertforalline, Sertularia gelatinosa	V12. 848
Sallertmilbe, Acarus tremellæ -	V2. 1057
Sallerticheibe, Alcidia gelatinofa	VI2. 84
Gallina di Numidia, (ital ) Perlhuhn -	II. 476
Gallina rustica, Saselbubn	Ìl. 486
	4. C. 121
Gallinago, (Scolopax) heerschnepfe	II. 397
Galline, (fr.) Meerleuchte	IV. 276
Gallnuß, (Gallapfelmurm Cynips Glechomæ	V2. 812
Gallopavo, taletutischer Juli -	H. 461
	9. 623
Gallus, (Strombus) Zeiger -	VI. 480
Gallus, (Zeus) Meerhahn -	IV. 143
Gamal, (bebr ) Rameel -	I. 365
Gamarus, (Cancer) Summer.	V2. 1122
Commenced for an extra distribution	Gam-

Gambaro Gateau	169
•	Th. S.
Gambaro di mare, (ital.) hummer -	V2. 1122
Gambarello, (ital ) Equissentrebs -	V2. 1129
Gamma, (Papilio) bas weiffe & -	V. 610
Gamma, (Phalæna) golbner Buchftabe -	V. 688
Gangfisch, Salmo Lavaretus -	IV. 329
Gannet, (engl.) braune Mewe -	II. 347
Sans. Anas anser	II. 282
Ganlo, (span.) Sans	H. 282
Gaper, (engl.) Leberfisch - IV.	198. 202
Garfish, (engl ) Blinbfifch	III. 340
Garganello. (ital.) Tauchergans . II.	304. 306
Garnaul, Garnagt, (holl ) Garnale	V2. 1125
Garnale, (Rrebs) Cancer Crangon -	V2. 1124
Garrot, (fr ) Quatente	II. 291
Garrulus, (Ampolis) Geibenschwang -	H. 540
Bartenbeetchen, (Kinkhorn) Buccinum Areola	VI. 454
Bartenhupfer, (Goldhahnchen) Chrysomela ole-	
racea -	V. 18a
Gartenhummel, Apis hortorum -	V2. 904
Sartenschnecke, Helix nemoralis	VI. 576
Garkenwühler, (Langfuß) Tipula hortorum	V2. 932
Gieza, (fran.) grauer Reiher	11. 379
Garzetto, (ital.) Grunling -	IV. 215
Garzuola, (ital ) Elster	11. 179
Galcanet, (fr ) Bastarbmakrele	IV. 2/14
Gaselle, (Hirschbock) Antilope Dorcas -	S. 54
Gaselle, (Ziege) Capra Gazella -	I. 412
Saffentebrer, (Stintfliege) Hemerobius lutarius	V2. 797
Gasteropelecus, Beilbauch.	IV. 375
Gasterosteus, Stachelbarsch -	IV. 246
aculeatus, Stichling -	IV. 247
— — Canadus, Rahlafter -	EV. 25 t
Carolinus, Sichelflosse -	IV. 25 L
— — occidentalis, Streifschwanz	IV. 259
ovatus, Weichbauch -	IV. 250,
pungitius, Seestichling -	IV. 253
volitans, fliegender Barfc	IV. 253
Gateau feuillete, (fr.) Rusfatenblub.	VI. 289
L, s	Gatto-

Cottomoine (Discount) Other	₹b. €
Gattorugine, (Blennius) Didhals	IV10
Gattvils, (boll.) Jatob Evertsfisch -	IV. 23
Gaulding, (engl.) Reiher	II. 25
Gaufal, (hebr.) junge Tanbe -	II. 49
Gavia marina, (ital.) Meerschwalbe	II. 35
Gayo, (fpan.) Saher	II. 17
Gazam, (bebr.) Raupe -	V. 54
Gazella, (Capra) Gaselle -	I. 41
Gazola, (port.) Robrdommel -	II. 386
Gdi, (bebr.) Bodlein	I, 404
gebakert Kindie, (boll.) Bienenforbchen	_ VI. 554
gebandeerde Olyve-Toot, (boll.) Rloppelfu	
gebandeerde Posthoorn, (toll) Gurtelschned	
Gebieter, (Raurentober) Ichneumon mandate	
gebladerde Haanenkamm, (boll) Platterfan	
gebraden Peer, (boll) gebratene Birn	VI. 503
gebrande Billen, (boll ) Aleischschnecken	VI, 481
gebreide Kasket, (holl.) gehornte Sturmbau	be VI. 449
gebulde Kanary, (boll.) Sociereanari	VL 489
Sed, (Narr) Kischervogel	II. 331. 332
Secto, (Eidechse) Lacerta Gecko	111. 98
gedoornd Kapje, (boll ) Kornerschilb -	VI. 608
gedoornde Nageldubblet, (holl.) Ragelheri	VI, 247
gedoornde Snippekop, (boll.) gebornter Co	nee
pfentorf -	VI, 496
geele Aardbesje, (holl.) gelbe Erbbeere	VI. 251
geele Tappen, (boll.) Eichenholstuten	VI. 376
Geelsmetje, (boll.) Gelbschmut -	VI. 400
Geelftaart, (boll ) Gelbichmans -	IV. 228
Geep, (holl.) Meernadel	IV. 341
	I, 560. 563
Begenschein, (Lagschm.) Papilio Midamus	V. 595
Begranuleerd Katje, (boll.) granulirtes Ragd	48 VI. 270
segranuleerde Kuipers - Boor, (holl.) granulir	ter :
Botcherholter -	```VI. 378
Jehad, (perf.) Lome	I. 230
Behirnforalle, Madrepora labyrinthiformis	VI2. 679
sehuifde Leuwerik, (boll.) Haubenlerche	II. 520
A man suisce the	zehnifde
	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

gehuifde (Stloffugel	171
	Th. S.
gehuifde Mees, (holl.) Sanbenmeise -	11. 626
gehuifde Patelle, (boll.) Zadenfamm -	VI. 612
Seisblatschleicher, (Schlupfmespe) Tenthrede	
niceræ	V2. 836
Geistopf, (Schnepfe) Scopolax ægocephala	II. 402
Geismelfer, Caprimulgus Americanus -	II. 638
Geisvogel, (Riebig)	II. 406
Beift, mas er ift	1ĮI. `43
Beifterwelt ift in die Korperwelt vertheilt	V12. 956
Geit, (boll.) Geis -	I. 404
Geitenmelker, Ziegenmelter	II. 636
gekamd Laurierblad, (boll.) Rammblat	VI. 33Q
geknobbelde Band-Pen, geblooid Toorn	tje,
(boll.) knotige Bandnadel	VI. 439
geknobbelde Kasket, (holl.) Anotensturmba	1be VI. 450
gekorven Diertjes, (boll.) Insetten -	V, r
Gelbarsch, (Springtafer) Elater mesomelus	V. 325
Gelbband, (Ammer) Emberiza Moineau	<b>S.</b> 157
Belbband, (Bockfäser) Cerambyx succinetus	V. 264
Gelbband, (Tagschm.) Papilio Thallo -	V. 584
Gelbhinde, (Lagschm.) Papilio Aceste .	V. 615
Gelbblatter, (Erbfafer) Carabus quadripustu	latus V. 364
Gelbbusch, (Zeisig) Pipra rubetra -	II. 622
Selbbruft, (Bachstelse) Motacilla Hippolais	II. 605
Gelbbruft, (Erdflob) Mordella thoracica	V. 386
Belbfeld, (Rachtschm.) Phalæna flaveolata	V. 714
Gelbfeld, (Tagschm.) Papilio Ajax -	• V. 57 <b>5</b>
Selbfinke, Fringilla flaveola	11. 589
Gelbsisch, (Lippsisch) Labrus fulvus —	. IV. 214
Gelbsteck, (Bockfafer) Cerambyx ramphyge	us V. 274
Gelbsteck, (Grasbupfer) Gryllus flavus -	- V. 443
Gelbsteck, (Ofeilschwanz) Sphinx Polymena	V. 646
Belbsteck, (Stinkläfer) Buppeskis novemmas	lata V. 339.
Belbfleck, (Wasserkafer) Dytiscus cinereus	V• 348
Gelbstosser, (Baciching) Perca chrysoptera	IV. 236
Belbstoffer, (Meerbrachsem) Sparus Rhombo	ides IV. 187
Belbflügel, (Rachstelze) Motacilla chrylopte	LS II OIL
Belbflügel, (Cifabe) Cicada flava	V. 40Q
	Gelbe

1 72	Cholinan.	Caret mite.	•	
			₹b. €	j.
Belbañ	gel, (Droffel) Oriolu	s Cajanensis	II. 19	
Belbflå	gel, (Goldhabnch.) Chr	yfomela trimacu		
Gelbah	gel, (Jungfer) Libelle	ula flaveola	V. 7	17
Belben	gel, (Tagschm.) Papil	io Terplichore	V. 58	
Geibful	, (Goldhahnchen) Ch	rysomela Mode		
	, (Raubtafer) Staphy		V. 39	4
	, (Springtafer) Elate		V. 3	
Gelbfut	, (Stechfliege) Conor	s Flavipes	V2. 99	
Gelbfut	ter, (Lagichm.) Papil	io Acasta 🔹	V. 5	
	s, (Ammer) Emberiz		<b>E</b> , 10	
Gelbhal	ls, (Bastardwespe) Sp	hex collaris	V2. 8	73
Gelbhal	ls, (Citabe) Cicada fl	avicollis -	V. 40	53
Gelbhal	18, (Toutan) Rampha	stos flavicollis	€. {	33
Gelbher	z, (Wanze) Cimex C	almii -	V. 49	98
Gelbhoi	en, (Rachtschm) Phak Ichen, (Drossel) Turd	æna flavicornis	V. 70	
Gelbfeh	lchen, (Prossel) Turd	us gotturalis	<b>E</b> . 14	
Gelbteh	le, (Kernbeiffer) Loxi	a luiphurata	II. 5	
	le, (Papagen) Plittaci			}o
	le, (Louisen) Rampha		II. 11	7
Gelbkop	fcen, (Goldhabnchen)	Chrylomela ch	ryfo-	
	cephala	-	V. 18	
Gelbtor	per, (langfuß) Tipul	a Havelcons	V2. 9	
Gelbtop	f, (Bachstelle) Motac	illa kterocephal		
Gelbkop	f, (Bienenfreffer) Me	rops congener	II. 24	
Gelbtop	f, (Droffel) Oreolus	icterocephalus	И. 19	
Gelbtop	f, (Kernbeisser) Loxis	a Mexicana	II. 54	3
Gelbkop	f, (Machtschm.) Phalæ	na capitella	V. 74	19
Gelbeop	f, (Papagen) Plittacus	Carolinenfis	<b>E</b> . 7	
Gelbling	, (Ummer) Emberiza	flaveola	U. 56	
Gelbling	, (Bastardbock) Necy	dalis flavelcens	V. 29	
	, (Schilbtafer) Caffie		V. 13	
	3, (Tagschm.) Papilio		V. 59	
	in, (Rachtschm.) Palm		V. 73	
Gelblini	e, (Langfuß) Tipula?	Thomas -	V2. 94	
Gelbneg	, (Rachtschm.) Phaker	na Forskahleana	V. 72	
	, (Wassereulchen). Phr		V2. 79	
	(Goldhabuchen) Chr		V. 18	
Seipt nu	ft, (Schildkafer) Cassi	da leucophæa	V. 14	
•			હા છ	A

	<b>E.</b>
Belbrand, (Goldháhnch) Chrysomela marginella V.	177
	153
Gelbrand, (leuchtenberRafer) Lampyris marginata V.	30t
Gelbrand, (Papagen) Pfittacus marginatus	77
	1004
Gelbrand, (Raubkafer) Staphylinus flavescens V.	392
Gelbrand, (S. Joh. Fliege) Cantharis lateralis V.	309
Gelbraud, (Schildkafer) Cassida marginata V.	140
	64
	788
	183
	IŞĘ
Gelbrucken, (Ratter) Coluber Lutrix III	156
Gelbruden (Raubfliege) Alilus flavus V2.	1004
Selbruden, (Specht) Picus Senegalensis &	
	436
	347
Gelbschintel, (Goldhabnchen) Chrysomela flavipes V.	
Gelbschild, (Kitege) Musca solstitialis - V2.	989
Gelbschild, (Raubidfer) Staphilinus Caraboides V.	
	229
Gelbichleppe, (Stinffliege) Hemerobius marginalis Va	795
Selbschlupfer, (Schlupfwespe) Tenthredo lutea V2.	822
Gelbschmuß, (Porzellane) Cyprea spurca VI.	400
Gelbichnabel, (Finte) Fringilla flavirostris II. 590. C	. 162
Gelbschnabel, (Papagen) Plittacus pertinax II.	
Belbschnabel, (Raupentoder) Ichneumon luteus V2.	
Gelbschwanz, (Barsching) Perca punctata IV.	
Gelbschwanz, (Caube) Columba australis	132.
Gelbseite, (Erbstoh) Mordella humeralis V	386
Beibseite, (Baffereulchen) Phryganea flavilatera V2.	
Gelbspecht, Picus flavus - S.	
Gelbspige, (S. Job. Kliege) Cantharis biguttata V.	310
Selbstirn, (Erdfich) Mordella frontalis V.	386
Gelbstirn, (Langfuß) Tipula pratensia V2.	933
Gelbfilin, (E. Joh. Fliege) Cantharis albicans V.	310
Gelbstrich, (Rachtschm.) Phalæna striatoria V.	704
	484
· .	Beld,

	Th.	Č,
Geib, guineisthes, (Porjell.) Cyprea moneta		399
Selomuschel, Venus mercenaria		269
Gelenkrunkt, (Gelbhabuch.) Chrysom sexpunctai	a V.	192
Gelinotte blanche, (fr.) Schnerbuhn -	ÌL	482
— — de bois, Haselbuhn —		486
— de Senegal, Genegalisches Berghuhn	G.	127
- hupét, Penfilvanischer Fasan -		484
Gelve, (turf.) Nohrdommel –		386
Gemeinstrich, (Rachtschm.) Phalatha ameriana		728
Gems, (Dirichbout) Antilope Europea	<b>S</b> .	
- afrifanische, Antilope Dama -		53
Gemfe, (Biege) Capra rupicapra	Įi	409
- amerifanische, Capra reverla -	Į.	411
Gemuswanze, Cimex oleraceus	V.	<b>49</b> 0
Genetia, (Viverra) Genetifațe	I.	256
Benettfage, (Frett) Viverra Genetta	Į.	256
Gentleman, (engl.) schottische Gans	ıII.	33t
Geoffron's Eintheilung ber Bliegen -	V2.	949
Geographus, (Conus) Rronenback	VI.	383
Geometræ (Phalana) Spannentieffer V. 703.70	7.711	713
geplekte Bel-hoorn, (holl.) Fas	VI.	446
geplekte Bezoar, (holl.) unachtes attalisches Rieit	VI.	452
geplekte, (geruite) Bezoar, (boll ) Gartenbeetchen	VI.	454
geplooide Komkomers, (boll.) Bobnen	VI.	423
geblooide Schroef, (boll.) gefaltene Schraube	VI.	518
geplooide Starmhoed, (Kasket) (holl.) gefalten	£	
Sturnthande —	VI	449
gepluinde Tor, (boll.) Elefantenrüßel - Gerabib, (grab.) Raabe	11	213
Gerabio, (arav.) Raave Gerabschnäbel, (Colibri)		168
Gerabichmente, (Cauben) Columba cauda aqual		268
		495
Geranos, (griech.) Reiber - Gerber, (Bocklafer) Cerambyn Coriarius	77	372
Gerbuah, (drab.) Bergmaus -	V.	254
Gerfault, (fr.) Geperfalfe —	II.	353 87
geribde Dolphyn, (boll.) gerippter Delphin	VI.	76
geribde Venus - dubblet, (holl.) gerippte Benus	VI	
geribde Zilvermond, (holl.) gerippter Silbermuni		
Barrama carran trigger / Admit Stricking Cantillitie		747 ritti:
		I mile

gerimpelde	getakte	*	175
•		Tb.	C.
gerimpelde oude Wyf, (boll) bas	alte Weib		265
gerimpelde Tulband, (boll ) Runge	lbund	VI.	546
Germon, (fr.) Bonnetfisch	•	JV.	259
Gerres, (fr.) Rothflosse	_	IV.	181
Gerroli, Giroli, (ital.) Rothflosse	-	IV.	181
Gerftenfliege, Musca Frit	•	V2.	
Gerftenfreffer, (Rernbeiffer) Loxia l	iordace <b>à</b>	II.	55I
Gerstenwurm, (Maulmurfgrille)	-	V.	422
Geruch und Seschmack ber Thiere	•	I.	17
Gerzah, (illyr) Kranich	-	II.	372
Geschichte ber Insetten	•	V.	I
Geschichte der Korallen	-	VI2.	643
Geschichte ber Bogel		II.	1
Geschichte des Hundes	<u></u>	L	210
Gefcmeiß, (Rliegenmaben)	_ =	<b>V2.</b>	967
geschubde Bezoar, (boll.) Schupper		VI.	453
Geselle, (Rachtschm.) Phalæna comit	ata	V.	715
Gefeufchafter, (Springtafer) Elater		€.	244
Gesellschaftspolppe, Hydra socialis	<b>-</b> '	VI2.	893
gesleufde Kousdubblet, (boll.) Rri	immrippe	VI.	267
Gefpenft, (holzwefpe) Sirex Spettru	m	٧2,	838
Gespenst, (Eute) Conus spettrum	_	VI.	382
Sefpenstfafer, Mantes -	V• 408.		
Befpenfttbier, Lemur -	L 140	s. S.	12
Geftalt ber Kifche		IV.	3
Gesticularius, Laumlertaube	- -	<u>II</u> .	502
gestoorte Kikvorsch, (boll.) Bastar		III.	65
gestreepte Kousdubblet, (holl.) Be	aftardvenus	VĮ.	266
Get, (schweb.) Bock	a '	I.	404
getakte Bezaanknoop, (boll.) gejad	ter Bejaanse		
thopf -	- halmbin	VI.	523
getakte Dolphyn, (boll.) gezacter D	eiphin	VI.	550
getakte Lazarusklapp, (holl) gezac	rie talatus,	T 7\$	
flappe -	inad Olimen of .	VI.	280
getakte Noote-moskaat, (holl) flet	mes shuther	<b>178</b>	
getakte Padden, (boll.) Rentenschne	Aen	VI.	508
getakte Pieramied, (boll.) knottge \$		VI. VI.	500
Gamera Transment (han.) suptile #	MINHAR	<b>▼ 1.</b>	527
		geta	WF

• 1			
		Tb.	Ġı
getakte Vyg, (boll.) gejadte Beige	-	VI.	514
getande Rudolphus, (holl.) Rudolphus	schnecke	VI.	462
getepelde Patelle, (boll ) Knopfplatte		VI.	Git
Getraidwurm, (Nachtschm.) Phalæna fr	umentalis	V.	734
getraliede Kousdubblet: (hoff.) Gitter	bening	VI.	267
Setroogde Peer, (boll.) getrocknete Bir getygerd Schild, (boll.) Schilbfrotensc	n	VÌ.	504
getygerd Schild, (boff.) Schildfrotenfe	hilb	VI.	613
Geut-auddiet, (gou ) Kinnendudiet		Vį.	
Gevarai, (perf) hirsch	-	I.	39ò
gevlerkd Vogeltje, (boll.) Bogelchen	~	VI.	339
gevoord Bultje, (hou.) Treppe		VI.	464
Gewachehauferschild, (Schildlaus) Cocci	us Helpe-		
ridum	-	.V.	528
Gewitterfliege, Musca meteorica	• 	<b>V</b> 2.	972
gewolkte agazte Kliphoorn, (holl.)	Achatpor,		
gellane -	4: 4:4	٧.,	392
Semurinagelforalle, Madrepora falcicu	iaris VI2.		
Generfalle Gercalas	•.	II.	48
Generfalte, Gyrfalco Generfalte, (Lauchergane)		ÌĮ.	87
Ghiandaja, (ital.) Saber	<b></b>	II.	304
Giacomo, (ital.) Jatobitermufchel	<del>-</del>	11. \$7\$	176
Giadda, (schweb.) Hecht	_	Vİ.	303
Giano; (ind.) Feuerglut, (Stintfafer)	ž.	<b>1</b> V.	335
Giarolo, (ital) punttirter Stranblaufer	-		411
Giazana, (arab.) Beufchrecke	<u>.</u>	V.	437
Gibbus, (Tenebrio) Sochruden		v	977 373
Gibeciere, (fr.) Jagertafche, (Rammufe	bel'i	vį.	206 206
Giboya, (meftind.) Ronigefchlange	4	IIÍ.	147
Gidde, (ban.) Decht	•	IV.	\$40 -41
Gideon, (Scarabæus) fleines Einhorn	* <b>*</b>	V.	5ŧ
Gienfifch, (Lippfifch) Labrus Hiatula	-	IV.	
Gienmufcheln, Chame -	VI. 283.	Ġ.	367
Gier, (boll.) Gener 4		II.	48
Giefer, (Raupentober) Ichneumon fusor		Vz.	
Siestanne, (Robrenschnecke) Serpula Po		VÌ.	
Giftbarich, Perea venenosa		IV.	
Bifteibechfe, Lacerda Chalcides	<b>÷</b>	III.	112
	• • • • •		Bifti

The state of the s	Eb.	<b>5</b> .
Bifitrabbe, Cancer Dorma	V2.	1107
Giftsthange, (Natter): Coluber Atropos		155
Giftfpinne, (Rrebefrinne) Phalangium Bychor	go E.	345
Gigas, (Mantis) Riefengefpenft	V.	409
Gigas, (Mantis) Riesengespenft	V.	. 69
Gigas, (Sirex) Riesenwest	V2.	837
Gigas, (Strombus) gezactte Comeigerhofe	VI.	485
Gigas, (Tenebrio) Eurinamischer (Evanist	ber)	J
Riefe Gildhead, (engl.) Goldbrachfem Ginfish, (engl.) Leberfisch	∕. 36 <b>8</b> .	372
Gildhead, (engl.) Golbbrachfent -	· IV.	177
Ginfish, (engl.) Leberfisch	7. 198.	202
Giock, Geeka, (schwed.) Guckguck —	II.	205
Girardello, (meilan.) Regenvogel, Regenfchnepfe	II. 395	-399
Girardin, (engl.) fleine Bafferralle -	H.	437
Girelle, (fr.) Meerbrachfem, Meerjunker 11	7. 194.	204
Grol, Spistattel Sitter, (Ruppfieber) Pateila græca	VI.	421
Since, (Rippfieber) Patella græca -	y VI.	616
Gitterbauch, (Jungfer) Libellola cancellata	V2.	769
Gitterfügel, (Rachtschm.) Phalæna clathrata		
Guterhorn, (Kinkhorn) Buccinum reticulatum		
Gitterfafer, (Erdfafer) Carabus clathratus	<b>V.</b>	354
Gitterfoealle, Millepora clathrata -	VI2.	719
Gitterfoealle, Millepora ciathrata Sitterfoild, (Schildfafer) Cassida clathrata Sitterfomanun, Spongia cancellata	<b>V.</b>	141
Sillerschwamm, Spongia cancellata —	V12.	798
— — fchwarzer, Spongia cancellata nig	ra VI2.	799
Sitterpenus, Venus cancellata - Sitterpolite, Voluta cancellaria -	V1.	207
Constitution of the contract o		7-7
gladde Knoopie, (hou) glattes Andpschen	VI.	403
gladde Kuipers-Boor, (boll.) Pomerangentintho		
Gladius, (Xiphias) Degenfisch, Schwerdfisch	IV.	
Glama, (Camelus) Schaaffameel —	L 371.	
Glanis, Wels - IV	/• 2XX•.	290
Glans (Russinum) limited Pintharn	1V.	290
Manafal Scolonendra electrica	V 4.	457
Company (Medicinan) Sphing acellete	. V 2. 1	1159
Glano, (turt.) Wels Glans, (Buccinum) limites Rinthorn Slangeffel, Scolopendra electrica Glanguage, (Pfettichwant) Sphinx ocellata Glanguagel, (Tagfom.) Papilio Fidia	, <b>V</b> .	66.
Clangrasschild, (Schildlaus) Coccus Phalari	die V	525
M		
10. U(e)	10	lany

	Σħ.	<b>B</b> i
Glanghabneben, Chrysomela nitens	ίν.	
Glangborn, (Kinthorn) Buccinum nitidulum	VL.	
Glangfafer, Lampyris fplendidula -		306
Glangruden, (Golbhahnchen) Chry fomela nitidula		183
Glangfdilb, (Ctinffafer) Bupreftis nitidula		339
Glangfchlupfer, (Schlupfmefpe) Tenthredo nitens	٧ž٠	
Glanimespe, Vespa galbula -		325
Glanzwurm, (Stachelruden)	VI	
Glareola, punttirter Stranblaufer	ħ.	4Iİ
Glariana, Florentinifche Lerche	II.	520
Glasband, (Rachtschm.) Phalana perspicua		614
Glasbetterfchilb, (Chilblans) Coccus Aonidum	V.	529
Glafer, (Bafferbure)	Ų۷	768
Glassliege, Musca illucens	<b>V</b> 2i	950
Glasflugel, (Jungfer) Libellula vulgata	V.	767
Glasflugel, (Lagfchm.) Papilio Piera	V.	582
Glashaft, (Lagthierchen) Ephemera bioculata	<b>₹2</b> 2	780
Glasigel, (Blutigel) Hirudo heteroclita	٧I.	52
Glastoralle, Cellepora hyalina	VI2	728
Glaspatelle, Patella pellucida -	VI.	613
Glasschnirfel, Helix perspicua	11	ŝ82
Glasspinne, Aranea quadrilineata -	<b>72.</b> 1	
Glattflugel, (Erbfafet) Carabus testaceus		365
Glattflugel, (Rachtfchm.) Phalæna glaucinalis	· Vs	732
Glatthorn, (Kinthorn) Buccinum lævigatum	VI.	469
Glatthorn, (Schlupfmefpe) Tenthredo enodis	<b>₹2.</b>	825
Glatttopf, (Rogfisch) Blennius Phycis	IV.	104
Glattnabel, (Rorbmufchel) Maftra glabrata	VL	255
Slattruden, (Erbtafer) Carabus ferrugineus	V.	362
Glattruden, (Geefchnede ohne Saus) Doris lævis	VI.	70
Glattruden, Spinner, (Rachtschin.) Bombyces	V.	663
mit abhangigen Flugeln -	٧.	674
Glattruden, (Bange) Cimex levigatus	[ <b>V</b> .	€02
Glattfchild, (Grashupfer) Gryllus carinatus	V.	421
Glattichild, (Meelfafer) Tenebrio lævigatus	V.	376
Glattstral, (Geeftern) Afteria levigata	VI.	133
Glaucion, (Anas) Brettichnabel		293
Glaucippe, (Papilio) Schwarzstrich		490
Maple of the second of the sec	Gi	ead,

Glead	Gobio	179
	•	b. <b>6</b> -
Glead, (engl.) Beibe		II. 71
Glean, (engl ) Rragenlerche	A STATE OF	S. 137
Bleditschferchen, (Gaamentafer)	Bruchus Gle-	-
ditfiæ -		V. 208
Gleifing, (Rudenschwimmer)		V. 469
Gliederforalle, Ifis dichotoma	- v	I2. 737
rothe, Isis ochracea	• v	I2. 739
Gliero, (ital.) Baldmaus	AND IN THE PARTY OF	1. 350
Glimmertje, (holl) Spigdattel	THE STEP IN	71. 421
Glimmworm, (hoff.) Johannismur	m -	V. 298
Glires, nagende Thiere -	I. 311.	G. 37
Glis, (Sciurus) Manseeichhorn		1. 358
Glitschfuß, (Nachtschm.) Phalæna lu	bricipeda	V. 675
Globator, (Volvox) Balger	_ VI	2. 913
Globulus, (Cyprea) glattes Anopfo	hen V	1. 403
Globulus, (Echinus) Geefugel	-	I. 148
Glodenblumenfauger, (Rufelt.) Cur	culio campa-	14/1/11/4
nulæ -	THE STREET, MISS	V. 216
Glodentocher, Tubularia campanul:	ata V	2. 819
Glodenwirbel, Vorticella convallari	ia VI	2. 877
gloejende Oven, (boll) Goldmund	- V	I. 544
Glow-worm, (engl.) Johannismur	m - v	V. 298
Bludevogel, (Reumoder) Lanius fa	uftus 1	I. 119
Bludsvogel, (Pfeilfcmang) Sphinx		V. 647
Glut, (boll.) Regenschnerfe		I. 300
Glutpapagen, Pfittacus Aurora	- (	5. 76
Glutmeipe, (Goldmeipe) Chrylis ign	ita V	2. 875
Gnakobisch, bebr.) Grinne	- V2	1066
Gnakrabh, (hebr.) Scorpion	- V2	1088
Gnemoe - Hoorn, (boll.) Gnemonich	mecfe V	1. 516
Onemonschnecke, Murex Pulio	- v	1. 516
Goat, (engl.) Geiß	MICHAEL 100	I. 404
Goathead, (engl ) Geiffopf, (Schne	pfe) I	. 402
Goatfucker, (engl.) Ziegenmelfer	- · · · · · · I	1. 636
Gobela, (ind.) Rafenhorn		I. 460
Gobh, Chogobh, (hebr.) Beufchrede		- 427
Gobio, (Cottus) Raulfopf	- 1	1. 137
Gobio, (Cyprinus) Grundling	• 11	. 383
M 2	of Antiques Supplied	obius

,	Th.	E.
Gobius, Grundel -	įv.	126
- anguillaris, Aalgrundel -	ÌV.	132
- barbarus, Bastardgrundel -	IV.	131
- elotris, dinesische Grundel -	IV.	129
- niger, Meergrundel -	IV.	127
- paganellus, Ctinbt	IV.	128
- pettiniroftris, Kaimnflefer -	IV.	131
Godwall, (engl.) Schnatterente	11	29I
Godwitt, (engl.) Pfulschnepfe	II.	401
Gortan, (Specht) Picus Goertan	ੴ.	91
Bottin, (Eisvogel) Alcedo Dea -	İİ.	243
Sogenlampe, (leuchtender Rafer) Lampyris Chinen	lis V.	303
Bogelbopflein, (Arche) Arca glycymeris	VΙ,	298
Cogeta, (venet.) Grundel	IV.	126
Gohla, (poln.) Taube	Π.	
Goiland, (fr.) Mewe - 11,	344.	
Goirfugel, (fcweb.) Penguin -	п.	139
Goirou, (fr.) Bienenfresser, (Falte) -	II.	88
Solbabler, Falco Chrysaëtos -	II.	65
Goldafter, (Nachtschm) Phalæna chrysorhoca		565
Solbammer, Emberiza citrinella	II.	563
Solbauge, (Meerbrachfem) Sparus Chrysops	1V.	
Soldauge, (Stinffliege) Hemerobius marginalis	<b>١</b> 2.	
Goldband, (Rachtschm.) Phalæna Sulzella	ν.	7\$ t
Boldband, (Lagfchm.) Papilio Nireus	V.	574
Goldbarsch, (Kaulbarsch)	IV.	242
Boldbauch, (Goldwespe) Chrysis aurata	V2.	876
Goldbauch, (Stinffafer) Bupreftis aurata	₾.	247
Golbbod, (Bodfafer) Cerambyx auratus	V.	277
Soldborfe, (Rammmufchel) Oftrea flavicans	VI.	311
Goldbogen, (Rachtschm.) Phalæna albinella	V.	753
Goldbarte, (Lagschm) Papilio Philea -	V.	594
Goldbrachfen, Sparus auratus -	IV.	
Golddroffel, Oriolus Galbulæ -		185
Golbeibechse, Lacerta aurata	III.	109
Golden-Crown-Wren, (engl.) Saubentonig	٠,	1620
Golden Eye. (engl) Quatente	H	292
Gold-finch, (engl.) Distelfinke		582 010
	40	will,

Goldfink Goldregenpfeifer		181
As as	Th.	€.
Goldfinf, Loxia pyrrhula –		547
Colofico, dinesischer, (Rarpfe) Cyprinus auratus	IV.	386
Coldfisch, (Stugtorf) Corriphens Hippurus	IV.	116
Goldfish, (engl.) dinesischer Goldfisch		386
Coldfled, (Tagschm.) Papilio Helena -		57I
Coloflect, (Lagichm.) Papilio Thysbe -	V.	624
Goldflitter, (Erdfafer) Carabus auratus	V.	355
Goldflügel, (Cifade) Cicada aurata -	V.	466
Soldfligel. (Krammerevogel) Turdus auratus		140
Coldflugel, (Rachtschm) Phalmna bractella		749
Soldflügel, (Papagen) Plittacus chrysopterus		149
Soldflugel, (Specht) Picus auratus -		223,
Goldforelle, Salmo Carpio -		319
Goldgener, (Bartgener) -	II.	
Goldhahnchen, Chrysomela . V. 163		
- asiatisches, Chrysomela aliatica	<b>G</b> .	
- langgedebntes -		20Q
- mit enrundem Korper -	<b>Y.</b>	164
mit langlichen Korper und schmaler	<b>T</b> ,	
Bruft -		194
mit rundem Korper -		186
wenfarbiges, Chrysomela bicolor		181
Colbharnisch, (Stinktafer) Buprestis gigantea	V.	333
Goldfafer, Scarabæus auratus —	V.	
- westineischer, Scarabæus Chrysis -		74 560
Goldfehle, (Colibri) Trochilus colubris		268
	S.	
Goldfopf, (Kernbeisser) Loxia aurata - Goldfopf, (Zeisse) Pipra erythrocephala		622
Coldicific, (Erdfafer) Carabus violaceus		355 .
	IV.	
Goldling, (engl.) Goldstrich —	VI.	
Soldmaus, (Stachelrucken)		544
Soldmund, (Mondschnede) Turbo chrysostomus Soldpage, (Lagschm.) Papilio Telemon		297
Colopunit, (Stintfafer) Bupreftis Chryfostygmi		
Coldrand, (Rachtschm.) Phalæna Reaumurella		751
Goldrand, (Stinffafer) Buprestis aurulenta		337
Coloregenpfeifer, Charadrius aureus		118
M 3		Bolbi
er er er	_	

	Eb.	€.
Solbruden, (Stinffafer) Bupreftis aurata	6.	249
Soldruftet, (Riffeltafer) Curculio regalis	V.	236
Solbschlager, (Bodtafer) Cerambyx auricomus	V.	267
Goldschrang, (Matrele) Scomper chrysurus	IV.	266
Goldfprentel, (Rachtschm.) Phalena scopolella	V.	753
Coldftrich, (Soldbabnchen) Chryfomela speciola	V.	170
Soibfteich, (Meerbrachjem) Sparus Salpa	IV.	187
Softerager, (Baftardwefpe) Sphex lemizuratz	V2	873
Solbtuch, (Spigenrolle)	VI.	38 t
Colbrogel, (Eigrogel) Alcedo aurea -	€.	94
Softwespen, Chrysides -	V2.	875
Soldwirbel, (Bachftelze) Motacilla aurocapilla	11.	613
Soldwolf, Canis aureus -	i.	227
Goldwurm, (Ctachelruden) -	VI.	72
Soldjahn, (Candfocher) Sabella Chrysodon		636
Soliathsfafer, Scarabæus Goliatus -	S.	216
Golok, (engl.) Langarm, (Affe) -	€.	
Condel, (Arche) Arca Modiolus -	VI.	
Gondole, (fr.) Kiebiten -	VI.	408
Gongylodes, (Mantis) Zipperlein -		410
Gonostigma, (Phalæna) Ecfsect -		671
Goosander, (engl.) Tanchergans -		304
Goole, (engl.) Gans		282
Gorais, (fr.) Karausche	IV.	384
Gordius, Kabenwurm -	VI.	
- aquaticus, Bassersaden -	VI.	
- argillaceus, Thonfaden -	VI.	31
— — lacustris, Sumpfrourm -	VI.	
- marinus, Ceewurm -	VI.	•-
— — Medinensis, Hautwurm	VI.	•
Gorfau, (fr.) schwimmender Phaeton -		337
Gorge bieue, (fr.) Blautehlchen —	II.	
- rouge, Rothfehlchen -		<b>618</b>
Gorgonia, Pornforalle -	VI2.	748
- acerosa, Seceiche -	VI2.	766
- mea, Seebimse	VI2.	757
	VI2.	
— — ceratophyta, Sechorn —	۷ <b>b</b> .	
•	U	0T-

Gorgonia	<b>grazuwe</b>	183
•	,	Th. S.
Gorgonia elongata, Sectanne	-	VI2. 759
flagellosa, Seepeitsche	-	VI2. 761
lepadifera, Seerefeba	•	VI2. 752
— — muricata, Stachelbesen	. –	VI2. 760
ppilinata, Geefamm	-	Vl2. 767
- potechizans, Petechien	focatle	VI2. 767
pinata, Seefichte	'- × • .	VI2. 765
- porosa, Löcherhesen	-	VI2. 761
setola, Geeriche	-	VI2. 766
Spiralis, Seeftric	-	VI2. 756
Ventalina, Seewebel	-	VI2. 768
- verrucofa, Seebesen	•	VI2. 759
- vertigillaris, Seefeber	•	VIe. 753
Sothlander, (Schnirkelichnede)		VI. 582
Sothlanber, (Bange) Cimex Go	othicus -	V. 495
Gottesackerbiene, Apis tumuloru	ım —	V2. 891
Sottesackerfliege, Musea coemit		V2. 971
Goud - Brasem, (holl.) Solbbras		IV. 178
goude Tong-dubblet, (boll.)	půldne Zunge	VI. 236
gouden Tor, (boll ) Goldtafer		V. 88
Goud Haantje, (boll.) Daubenl		II. 620
Goud - Haantjes, Gouden Engel	ijes, (holl.) Sc	
hahnden	-	V. 163
Goud-Laaken, (boll.) Spigent		VI. 381
Good Merel, (holl.) Goldmerle	-	II. 185
Goud-Mand, (boll.) Solbmunt	)	VI. 544
Goudsmid, (holl.) Goldarbeiter,	(-Sobibmitt)	V. 353
Goud-Streep, (holl) Goloftrich Goud-Vink, (holl) Thumrfaffe	•	IV. 187
Goujon, (fr.) Grundel, Grundli	na IV	II. 547
Gourgandine, (fr.) Brauntippe	my tv	126, 383
Gournard, Gournet, (engl.) Rie	unkaka	VI. 271
Goveken, (boll.) Meergrundel	ctgagu —	IV. 275
Govje, (holl.) Laulkopf	-	IV. 128
Gozam, (bebr.) Seufchrecke		IV. 137
Graafzwyn, (schwed.) Dachs		V. 437 I. 281
Graate, (schweig.) Doble	~	11. 175
graeuwe Mol, (holl.) grauer D	aulmurf	VL 391
M		
. 747	•	graauwe

•		
	Th.	
Braauwe Monnik, (holl.) grauer Mind	VI.	
Granuwzwingertje, (holl) grane Bachstelje		606
Graber, (Bastardwespe) Sphex fossoria	V2.	
Graber, (Biene) Apis cunicularia -	V2.	
Graber, brauner, (Tobengraber) Sylpha opaca		128
Graber, (Rafer) Scarabæus Fossor -		67
Graber, (Raurentoder) Ichneumon fossorius	V2.	849
Grabsliege, Musca sepulchralis -	V2.	969
Gracuja, fleine Doble -	· II.	192
- barita, Pifangboble -	IL.	194
- calva, Kahlbacken -	II.	194
cristatella, Saubenmerke		195
foetida, Stinkvogel -		194
- quiseula, Raupentoder -		196
- religiola, Plapperer -		193
faularis, Bengalifche Deble -		195
Graculus, Schottische Gans -		330
Graberrauber, (Raubfafer) Staphylinus Silphoide		
Graja, (fpan ) Doble -		175
Grallæ, Stelgenlaufer -	II.	357
Granzatappel, (holl.) Granatarfel -	VI.	CO
Granatapfel, (Stachelichnecke) Murex Erinaceus		
Granatblutenforalline, Sertularia polyzonia	VI2.	
Granatvogel, (Finte) Fringilla granatina		584
Granbestia, (ital.) Elendthier -		381
	V2. 1	
	V2. 1	-
Grand - Diable, (fr.) das Obr, (Cifade)	. —	454
	I. 93.	
Grand Gibbon, (fr.) Laugarm, (Uffe)	ී ලි.	_
Grand Gosier, (fr.) Mexitanische Kropfgans		<b>4</b> 324
Grand Pilulaire, (fr.) Stinklafer -		72
Granum, (Nautilus) Korn	VI.	
	V2. 1	
Grasbreme, Tabanus bromius -	V2.	
Grascifade, Cicada prasina -	<b>S</b> .	
Grashabuchen, Chrysomela graminis -		167
Graehupfer, Grylli - V. 416		
Centanties orline - 4. 410		rods

<b>Grashüpfer</b>	Green	•	185
	, <del>-</del>	Th.	€.
Grasbupfer, einfarbige, Grylli u	nicolores		419
Grashummel, Apis muscorum	_		905
Grasie, (boll.) Muge	•		607
Grastafer, (Schaafgarbenhabnet,	en) -		166)
Grasmaber, (Rachtschm.) Phala	na graminis		676
Grasmosch, (engl.) Grasmice	-		605
Grasmotte, (Rachtschm.) Phalær	na mesomella		738
Graemude, Motacilla Calidris		604.	
Graspferd, (Seufchrede)	• '	-	437
Grassauger, Chermes graminis	•		522
Grasscheibe, Solen virens	-	Vł.	230
Grasschmetterling, [Tagvogel] Pa	pilio Hyperan	•	-
thus		V.	599
Grasschnepfe, [Scecichnepfe]	. •	11.	397
Grasspecht, Picus minor	•	II.	227
Grasmange, Cimex pralinus	٠		489
Graswurm, [Spulmurm] Ascari	s.sesquipedalis	Œ.	354
Gratilla, [Echinus] Secfastante	<del>-</del>	VI.	449
Grauflugel, [Grasburfer] Grylli	ıs rufus	V,	444
Graufügel, [Nachtichm.] Phalen	a cinerella	V.	744
Graufingel, (Pfeilschwang) Sphin	x Alecto	V.	641
Graufug, (Rugelfafer) Curculio	chloropus		238
Graubupfer, Empis livida	<b>-</b> `	V2.	
Grauflapre, (Rafermufchel) Chit	on cinereus	VI.	200
Granling, (Bastarbbod) Necyda	ilis glaucescens	V.	295
Graumonch, (Waffereulchen) Phr	yganea grifea	$V_2$ .	786
Graupfau, (Tagschm.) Papilio L	emonias		601
Graurand, (Rachtschm) Phalæna	Algira -	V.	683
Graurand, (Papagen) Plittacus !	Philippensis	€.	80
Gravidator, (Ichneumon) Schn	pángerer	V2.	855
Gray, (engl.) Dachs	-		281
Gray, (engl ) Schnatterente	-	II.	29 i
Graye, (fr.) Caattrabe	•	II.	173
Grayling, (engl.) Aesche	_	ľV.	326
Great gogle-eyed Beetle, (engl.)	Soldharnisch .		334
Grebe, (fr.) Saubentaucher	-	II.	341
Greenfinch, (engl ) Grunfint	_	II.	554
Green - Wren, (engl.) gruner Ha	ubenfónig	11.	62O
M	5	<b>G</b>	reif,

		Th.	€,
Greif, (Cuntur) -		II.	50
Greif, (Meertage) Simia Seniculus	-	I.	126
Greif, (Rufeltafer) Curculio quinques	maculatu:	8 V.	223
Greif, (Todengraber) Sylpha grifea	-	V.	
Greiß, (Bange) Cimex grifeus	-	V.	488
Greifflugel, (Rachtfchm.) Phalæna prun	ata	V.	716
Grenadier, (Retubeiffer) Loxia Orix	•	E.	148
Grenadier, (Specht) Picus principalis	-	11.	220
Grenouille, (fr.) Frosch	-	III.	48
— a queue, Bastardfrosch	•	Ш.	69
- de mer, Meerfrosch	,—	Ш.	280
- de S. Martin, Laubfrosch	- 🕳 🐪	III.	69
Grey, (fcottl.) grauer Lachs	•	ĮV.	316
Greygame, (engl.) Birtbubn	- '	II.	481
Greyling, (engl.) Grundling -	-	IV.	383
Griechisches A. (Benusmuschel) Vonus ca	aftrenfis	Vi.	
Grieks A-dublet, (holl.) bas griechisch	e A	VL.	
grieksche Patelle, (boll) Gitter		VI.	
Griel, (boll ) Dictfug, (Regenrfeifer)	-	II.	420
Griesbede, (Connenfafer) Coccinella co	onglobata	<b>V.</b>	157
Sciesbahnchen, Chrysomela punctatistis	ma	V.	19
Sriesnatter, Coluber miliaris	-	Ш.	177
Sriestohre, Sabella granulata	•	VI.	
Griet, (holl.) Biered, (Plattfisch)	-	IV.	155
Grigry, (engl) Grerber	-	IL.	82
Grillen mit zwo Schwanzburften, Achets	2	V.	
Grillenwanze, Cimex Grylloides	-	V.	
Grillvogel, (Regenpfeifer) Charadrius			419
Srillvogellaus, Pediculus Charadrii	. 1	/2. 1	
Grimace, (fr.) Grimaffe -	•	VI.	506
Grimas-Hoorn, (boll.) Grimaffe	• ,	VI.	
Grimaffe, (Stachelschnede) Murex anu	\$	VI.	
Grimperau, (fr.) Baumlaufer	-	- II.	
Grinson, (fr.) Kinte -		II.	580
Grifard, ('r.) bunte Deme	-		348
Grifette, (fr.) grane Bachstelle	•	11.	
Orisiagine, (Cyprinus) Augustioner	•	IV.	
Grison, (fr.) braune Meme	•		347
		G-	ive

,	Th.	E.
Grive, Grivette, (fr.) Krammetsvogel IL 52	7. 528.	
groene Fluweel Kapell, (boll.) gruner Samm	et,	•
vogel -		566
Groening, (schweb.) Golbammer		563
Groenting, (boll.) Grunfint		514
Große und Rleinheit vieler Thiere -	Ī.	10
Große und Schwere. Begrif von berfelben VI		
Grolle, (fn.) Saattrabe -	II.	173
Grondel, (boll) Grundling -	IV.	383
groot hol Zee-oor, (boll.) Poblehr -	VL.	597
Groot-oog, (boll.) Grosange -	IV.	
Grosauge, (Meerbrachfem) Sparus boops	IV.	
Grosange, (Rachtschm.) Phalæna maerops	G.	
Grosange, (Raubidfer) Staphylinus biguttatus	V.	
Grosbec, (fr.) Elstertoutan, Dickschnabel II.		
Grosbeck, (engl.) Didicmabel -	II.	
Grosfuß, (Rliege) Musca Grossipes -	V2.	
Grosborn, (Rachtschm) Phalæna Swammerdan	<b>n-</b>	<b>,</b> - <b>,</b>
mella -	V.	75 I
Groetlefer, (Raubtafer) Staphylinus Sylphoide	es V.	301
Grostorf, (Bledermans) Vespertilio Cephalote	s <b>5</b> .	19
Grostopf, (langfuß) Tipula macrocephala	V2.	939
Grostorf, (Meerasche) Mugil Cephalus	1V.	352
Grostopf, (Rachtschm) Phalæna dispas	V. (	
Grustopf, (Stechfliege) Conops macrocophala	V2.	998
Grostopf, (Toutan) Ramphastos Momota	11.	158
Groefreut, (Erbfafer) Carabus Crux major	<b>V</b> .	365
Grosmani, Bucco - II. 20	94. C.	
Grosmaul, (Stachelsau) -	JV.	
Grospuntt, (Golbhahnchen) Chrysomela quinque	;-	•
punctata -	<b>V.</b>	165
Grosfdwang, (Raupentober) Ichneumon macrour		
große Pferdefrabbe, (gemeiner Tafcenfrebe)	V2. 1	108
Groffipes, (Cancer, Dicfuß -	V2. 1	134
Grossipes, (Musca) Grossus -	V2.	
	V2. 10	019
Grossahnforalline, Sertularia polyzonia	VI2.	<b>B</b> 52
Grottenrohre, Sabella scruposa -	VI. 6	34
	Grot	

•	•		
		Th.	G,
Grotto, (ital.) Kropfgans	-	11.	324
Groulard, (fr.) Thumpfaffe	•	II.	547
Ground - Dove, (engl.) Sperlingtaube	, <del>-</del>	II.	512
Gru, Grua, (ital.) Kranich	<del>-</del>	II.	372
Grue, (fr.) Kranich -		Ų.	372
Grues capite calvo, Rraniche -	II. 371	, E.	109
Grunaber, (Tagschm) Papilio Napi	•		588
Grunauge, (Fliege) Musca flava	•	$V_2$ .	978
Grünband, (Tagschni) Papilio Sarpedo	n	V.	570
Grunbauch, (Golowefre) Chrysis viride	ila	$V_2$ .	877
Grunbocklein, (Solzbock) Leptura virei	15	V.	286
Grundling, (Karpfe) Cyprinus Gobio	•	IV.	383
Grunfint, (Kernbeiffer) Loxia Chloris	•		554
Grunfint, europaischer, Fringilla Sering	1S		586
Grunflect, (Tagfchm) Papilio Aeneas	. •		570
Grunfled, (Tagfchm.) Papilio Jafon	_		577
Grunflugel, (Cifabe) Cicada viridis	-		466
Grunflugel, (Rachtichm.) Phalæna virid	ata		711
Grunflugel, (Pfeilschm.) Sphinx Megæ	га		642
Grunflugel, (Raupentoder) Ichn. glauce		V2.	
Grunfuß, (Wafferhubn) Fulica chlorop	rus		428
Gruntehlchen, (Baumlaufer) Certhia gu			258
Grunteblchen, (Fliegenfanger) Muscicap		G.	
Gruntopf, (Droffel) Turdus Philippen	fis .	چر ا	140
Gruntopf, (Merle) Tanagra viridis	_		158
Grunling, (Bocffafer) Cerambyx viren	S		264
Grunling, (florentinifche Lerche)			520
Grunling, indianifcher, (Finte) Fringilla !	outvrace:		587
Grunling, (Rernbeiffer) Loxia virens	-		553
Grünling, (Lippfisch) Labrus viridis	_	IV.	210
Grunling, (Merle) Tanagra virens	-		578
Grunling, (Pflangenflob) Podura viridis		V2. 1	)/0 ^17
Grunling, (Bange) Cimex viridulus	_		487
Grunruden, (Colupfmefpe) Tenthredo	viridis	V2.	
Grunruden, (Certaufendbein) Nerels vi	ridis	VI.	81
Grunruden, (Taube) Columba Javanen	fis	G.	
Grunrugel, (Rugeltafer) Curculio viric	lis	V.	
Grunfchild, (Fliege) Musca glaueia		V2.	
Transport Company			พ์เช

Granschilb	Gryllus	189
	1976 personale	Th. G.
Grunfchild, (Schildtafer) Caffida		V. 135
Grunfpecht, Picus viridis	Subdist some	II. 224
Grunforentel, (Tagfchm.) Papilie	Acgiftus	\$7 -0-
Grunwickler, (Rachtschm.) Phalæ	na viridana	V. 723
Grulla, Gruz, (fpan.) Kranich	ad. sudammen	II. 37
Grumpel, (ban.) Grundling	taliens, "Indie	IV. 383
Grundel, Gobius mighting	mollofus. @@	IV. 126
chinesischer, Gobius Eleot	rise sufferme	IV. 129
Grundskorfwa, (oftbothn.) Spie	swurm \	72. 1149
Grunter, (engl.) Grunger	unus türlifcher	IV. 186
Grus, (Ardea) gemeiner Kranich	selenoutorus.	II. 372
Grygallus, Auerhahn	of suivoternos	II. 479
Grygallus, Auerhahn Grylle, (Colymbus) gronlandisch	e Taube	II. 338
Gryllo, (ital.) Sausgrille	Man Santainin	V. 424
Grylloides, (Limex) Ormenium	conducts and	V. 481
Gryllo-talpa, Maulmurfgrille	W inhallidana	V. 422
Gryllus, Grasbupfer	- V. 416.	S. 266
acuminatus, Spigwirbel	C Letoluling	V. 430
apricarius, Schwede	astinia Postque	V. 444
- aquilinus, Breitflugel	obferens Will	V. 431
Barabenfis, Barabeischer	scellarus, Fluit	G. 272
biguttulus, Langpunkt	9 Juladussizo	V. 444
bipunctatus, Stugtorper	sedefirls, Pante	V. 421
brevicornis, Kurshorn	pertincilla us. 2	V. 419
	uiu., Grandia	V. 425
carinatus, Glattschild	agolas, Kungel	V. 421
Carolinus, Caroliner	alinus, escile	V. 443
cinerarius, Gentflugel	Page 9 Publication	V. 433 V. 427
citrifolius, Citronblat	ibideus, (Fible	V. 442
- coerulans, Klingenspringe	thirticus, Eigh	
- coerulescens, Schwarzba	biunioins? Doc	V. 441 V. 428
convolutus, Wickelflügel	does transcribed	V. 427
coriaceus, Leberdecke	iridules, Katri	V. 431
- coronatus, Kaiser	idak sutapda	V. 430
- cristatus, Kammbenschreck	decinflut, tota	V. 437
- Danicus, Dane	or mannenny.	V. 445
domesticus, Hausgrille	alaricus, Earla	V. 424
Tally or a constant of the same of the constant of the constan	dolingue ferraigs	Gryllus

Gryllus	Guepier 191
	₹b. G.
Gryllus triops, Drenauge	· V. 430
umbraculatus, Rlappe	ngrille - V. 426
variabilis, Buntflugel	- E. 270
variegatus, Charafterfi	tien - V. 441
variolofus, Wargenftire	V. 420
verucivorus, Wargenfr	effer - V. 433
verucivorus, Warzenfr viridiffimus, Degenffin	ge - V. 432
viridulus, Weigrand	· V. 444
Grynzert, (boll.) Rafenrumpfe	r, (hornfifch) III. 301
Gryp, (hou.) Cuntur	- II. 50
Graphit, (Baftard) Anomia Gi	ryphus - VI. 321
Gryphoides, (Chama) Felfendi	
Gryphus, (Anomia) Grophit	- VI. 321
Gryphus, (Vultur) Cuntur	• II. 49
Gryps, (griech.) Cuntur	record II. 50
Guacari, (braf.) Rungelmaul	- IV. 309
Guacu-euja, (braf.) Einhornter	ufel — III. 283
Guadalajara, (mer.) Ronigsfchl	
Guainumbi, (brafil.) Colibri	- II. 262. 268
Gualle, (fran.) Bachtel	- II. 492
Guan, (braf) Truthahn	- II. 462
Guanicoe, (Camelus) Schaafb	romedar - G. 51
Guaperua, (braf.) Geetrote	- III. 284- 300
Guara, (inbian.) Brachvogel	· II. 392
Guaracapema, (braf.) Sprente	elfisch - IV. 118
Guaratebera, (braf.) Breitfifd	- IV. 262
Guatto Muscaralo, (ital) Ces	hundchen III. 265
Guatucupa, (braf.) Carolinisch	er Lippfifc IV. 213. 221
Guaza, (Labrus) brauner Lipp	fifth - IV. 206
Gudgude, Cuculi	· II. 205. © 90
Sudgudefliege, Musca cucular	is - V2. 975
Guecubu, (amerit.) Degenfifch	- IV. 64
Guepard, Bolfstiger	©. 30
Guenons, (fr.) fleine Uffen	I. 118
Guepe, (fr.) Wefpe	- V2. 878
Guepe-Frelon, (fr.) horniffe	V2. 880
Guepes - Ichneumons, (fr.) &	affardweipen V2 863
Guepier, (fr.) Bienenfreffer	11. 245
	Guiaru,

;* <i>7.</i> ~	- A DIMI C	Buris.	•
,	,		₹b. €.
Guiaru I	Nheengeta, (braf)'M	cuntóber -	II. 111
Guignar	d, (fr.) Regenpfeifer	•	II. 417
Guignett	te, (fr.) Candpfeifer	-	11, 411
	or, (fr ) Papagentaud	ber, Ceetaube	
	(friedl.) Steinbolt	•	IV88
Guinaer,	(Mange) Cimex coll	aris —	V. 492
Guinees	Bigetje, (boll.) Meer	schweinchen	L 331
Guinees	Reetje, (holl.) guineis	ches Reh -	I. 378
	guara, (braf.) Eperfre		III. 193
Guiny 1	Duc, (engl) guineische	Bifamente .	11. 288
	Ien, (engl.) Perlhubn		11. 476
Guiny - I	ig, (engl.) Meerschwe	inchen –	I. 335
	reba, (bras.) blauer s		256. 261
	uainumbi, (bras.) Gr		
Guira Ju	enoina, Cajennische M	erle –	II. 576
Guira-T	angeima, (amerif.) D	rossel –	II. 187
Guira T	inga, (braf.) Reiher	<b>→</b>	II. 388
	ca, (bras.) Kernbeisser	•	II. 548
	ne, Apis Zonata	•	V2. 895
	h, (Pflanzenfloh) Podi		V2. 1020
Gurteling	, (Nachtschm) Phalæ	na tricinctaria	V. 711
Burtelfin	fhorn, Buccinum cing	rulatum S.	375. 376
Gürtelfor	alline, Sertularia poly	zonia ,	VI2. 852
Surtelnad	el, (Ctachelschnecke) !	Vlurex tortulola	VI. 523
Gartelfpr	inger, (Springtafer) E	later balteatus	V. 323
	ger, (Todengraber) Sy	Ipha luccincta	V. 131
Gürtelma	nge, Cimex balteatus	المدائر والمرا	<b>€.</b> 277
	Bodiofer), Cerambys		V. 275
Guldente	ead, (engl.) Geerapag	sery •	II. 311
Guldiwe	ed, (fowed.) Goldkaf	CE ALL	V. 88
Gull, (en	gl.) Mewe (engl.) Steinbolt		II. 344 IV. 88
Cullack,	(schwed.) Goldfisch	* The same	IV. 88 IV. 386
Culo (N	lystella) Bielfraß	•'	I. 265
Gunharma	mn, (Gallapfelwurm) (	Cynips Glechoma	B V2.812
Cur. Cheb	r) junger Lowe	• ′,	I. 230
Sturfe, Ad	mmiggewolfte. (Jung	fer)	VI. 423
ala	tte, (Walse) Voluta g		VI. 423
·		ने समिति । अस्ति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास स समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास समिति । विकास	Gurten

Gurkenkern	Haarqualle	193
		Th. <b>5.</b>
Surfenfern, (Scheibe) Solen mit	nutus -	VI. 230
Gurnardus, (Trigla) Rirrhabn	-	IV. 274
Guftard, (fcottl.) Trappgans	-	II. 44E
Spfis, (fchweiz.) Riebig	-	II. 406
Gymnista, (Cancer) Uffer,	. •	V2. 1128
Gymnotus, Rablrucken	•	IV. 45
- Aliaticus, Rlogruden	•	IV. 50
- electricus, Zitternal	•	IV. 46
- roftratus, Spiffiefer		IV. 49
Gynogaster, Spisschwanz	•	IV. 52
Gyps, (griech.) Gener	-	II. 48
Gyraffa, (ital ) Rameelparber	* •	I. 379
Gyrfalco, Geperfaite	•	11. 87
Gyrini, Bassertafer		V. 343
Gyrinus, Drebtafer	• , ,	V. 117
Americanus, ungestreifte	er Drehkäfer	V. 118
` <b>~</b>	•	
\$.		
Haae - Kiaring, (nortv.) Menfche	nfresser	III. 266
Haae Mæren, Pferdhasp	•	III. 265
Hazgedis, (holl.) Eldechse		IIL 77
haarige Oor, (boll.) Grimaffe	•	VI. 505
Haair - Korallyn, (boll ) Dedelto	ralline	VI2. 834
Haair-Pypje, (boll.) Aftfocher	-	VI2. 816
Haair-Schnepje, (holl.) Paarfc	nepfe -	II. 412
Haanekam, (boll.) Sahnenfamm	-	VI. 328
Saarcifabe, Cicada ciliaris	-	V. 454
Daarflugel, (Rachtschm.) Phalæns		V. 746
Saarborn, (Schlupfmespe) Tenth	redo ciliaris	V2. 825
Saartocher, Tubularia splachnea	•	VI2. 819
haartoralline, Sertularia ciliata	lin Lifnida	VI2. 860
Saarlode, (Schnirtelschnede) He		VI. 569
Daarmaul, (Seebaafe) Tethys leg	orina	VI. 92
Dagrmilbe, Acarus vegetans		<b>6.</b> 340
Haarmuschel, (Bastard) Anomia p		VI. 323
Paarnase, (Spihmans) Sorex cri	irstus =	I. 300 VI. 126
Paarqualle, Medula capillata	N	Dagre

•		
	Th.	€.
Saarrinde, Flustra pilosa -	VI2.	810
Saarschenkel, (Grasbupfer) Gryllus hæmatopus	V.	439
	<b>V</b> 2i 1	
Haarschuppe (Klippfisch) Chætodon ciliaris	IV.	
Dagricmans, (Geeftern) Afteria ciliata	VI.	140
Baarjelle, (Zellenforalle) Cellopora ciliata	VI2.	727
Saase, Lepus - L 31	B. S.	
- caapider, Lepus Capenfis		324
- ungeschwänzter, Lepus Brasiliensis		325
Saasenbalg, (Citade) Cicada leporina -		465
Saafenfuß, (Sunt) Canis lagopus -		226
Saafentopf, (Ctachelbauch) Tetrodon lagocephalu	s III.	313
Saafentunlein, (Raninchen)	I.	3 <b>22</b>
Spafenmaul, (Geitenschwimmer) Pleuroneltes de	n-	
tatus -	IŲ.	
Saasenmans, Mus leporinus	ı.	338
Saafenfcharte, (Fledermans) Vespertilio leporinus	, <b>6</b>	15
Haafenschwani, (Affelwurm) Scolopendra lagura	V2, 1	1110
Daan, blauer, Squalus glaucus	Ш	
glatter, Squalus Mustellus -		271
Hanfische, Squalt		252
- mit glattem Ruden -	III.	
- mit tornigen 3abnen	III.	270
mit stachelichem Rücken	III.	
Hagin Raja Rhinobatos	IH.	
Haazewind, (boll) Bindhund		208
Sabicht, Accipiter - II. 43	7. O. II.	
Blauer, Falco cyaneus	IL.	- ,
— — Carolinischer — — fleiner Bengalischer, Falco coorulescens	IL.	86
of Lifewis Springarypet, Pater Contactories	<b>6</b> .	-,
Habichteule, Strix accipitrina - Sabichtebobrer, (Gallapfelwurm) Cynips hieracii	Va	9.2
	72. 72. I	
Habichtshahnchen, Chrysomela hypocharidis		171
Hadock, (engl.) Schelfisch	IV.	
Hæger, (schwed.) grauer Reiher	11.	379
Hähnchen, imenfarbiges Chrysomela bicolor		19t
Haftein, (Rachtschm.) Phalisma Comma		695
S. meterni Mandeladem Z mannen Commen		elg-

Hælghundra	<b>Sainflieger</b>		195
	Ē.	Th	. <b>E</b> .
Hælgflundra, (fcmeb.) Sillbut	te -	IV.	150
Hæmatodes, (Cicada) Shifting	}	V.	456
Hæmatopus, Meerelster	<b>24</b>		424
oftralegus, Austerfi	ficter =		424
Hæmastoma, (Buccinum) Roth	munb -	VI.	463
Punning, Fringilla canabina	<b>`</b>	II.	590
Pateling, (Karpfe) Cyprinus Do	bula 🖫 🕖	ìv.	39t
riæit, (sowed.) Pferd	<b>`</b>	F.	446
Patring, (Aefche) Salmo oxyrin	chus =	ÌV.	327
112th podde, (heild.) Limpfifch		111	330
Pant, gelber, (Tagthierchen) Ep	hemera lutea	V2.	779
Hafs Nahl, (fcweb.) Ceenatter	•	m	343
Hals Timder, (fchweb.) Rormor	án 🕳	11	345 328
Haft-oeveraas, (boll.) Tagibier	rdien -	VA.	776
Dagundenschild (Schilding)	ogenie dermini	17	770
Sagedornmotte, (Nacheschm.) Pha	ilens crategelle	V.	532
Pagebornschild, (Schildlaus) Coo	spirate cratcherity	<b>₩</b> •	737
Hahn, (Haushabn) Gallis	11. 469.	#SX	530
- englandischer	- 11, 409,	Ø.	123
— — Pamburger	•	O.	123
- mit funf Zehen		@	123
- mit umgetehrten Rebern		0	124
ohne Purgel, aus Perfien	_	9.	124
- [chwarzet, aus Java	_ (	Ø.	124
bon Caur :	•••	9.	124
- bon Canfevare		0.	124
- milder affatifcher		5	124
— - türfischet =	_	9.	123
Sabnenkamm, (Diesmuschel) My	tilus crifta dalli	171	123
Daibetrautforalline, Ericoides, (C	Burtelforolling	71.	327
Paivelerche, Alauda cristata	-	12.	852
Paidestreifer, (Fliege) Musca sal	Itiium – j	\$70	520
Haje, (Coluber) Rropfnatter	,	111	977
Painbuttenlecket, (Schlupfwefpe)	Tenthredo co-	1414	202
nosbati		Va.	833
Painbuttenwefpe, (Raupentober)	Ichneuman be-	7 2.	<b>0</b> 5\$ .
deguaris		٧a	859 Î
Duinflieger, (Bliege) Musca sylv	zarum	V2.	
	N 2		ifana

-70	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Th.	Ġ,
Datenflugel,	(Rachtschm) Phalæna hamata		724
Datenborn,	(Eagfchm.) Papilio Thrax -		631
Hakik. (be	br.) Pelikan —		324
Salbbeder,	(Kleinkafer) Dermestes hemipterus		110
Salbbeder.	(Mante) Cimex Rolandri -		501
Salbfloffer,	(Rossisch) Coriphoena hemiptera (Jungfer) Libellula dimidiata	IV.	124
Salbflugel.	(Mungfer) Libellula dimidiata	V2.	
Salbflugel,	(Rafer) Scarabæus hemipterus	V.	83
Dalbflugel,	(Rugeltafer) Curculio hemipterus		215
Dalbfugel, (	Goldhahnchen) Chrysomela hemispha	<b>}</b> -	-
•	rica 👛	V.	185
Salbfugel,	(Rugelthierchen) Volvox dimidiatus	VI2.	914
Halbkugel,	(Qualle) Medula hemilphærea	VI.	127
Palbfugel,	(Secapfel) Echinus atratus	VI.	152
Palbmond,	(Machtschm) Phalæna Luna	V.	652
Palbmond,	(Raubfafer) Staphylinus lunatulus	V.	390
	(Saamentern) -		623
	(Tagfont.) Papilio Amphitrion		282
	(Tagicom) Papilio Xanthus		598
	weiffer, (Schnirfelfcnede) Helix an	<b>1</b> •	-
4 44	bigua 🛥	VI.	583
Halbohr, (!	Rammuschel) Ostrea semiaurita	Vı.	315
Palbpofaun	e, Nautilus semilituus –		358
Salbringel,	(Rachtschm) Phalæna Listerella	<b>V</b> .	752
Palbfäge, (	Lellmuschel) Tellina balaustina	VI.	239
Palbschnabe	el, (Specht) Picus semirostris		225
Palbschwan	8, (Tagschm.) Papilio Actorion		631
	(Waffertafer) Dytiscus semistriatus		347
Halcyon,			236
	e, (engl.) Weißfragen, (Abler)		67
Halec, Ser			363
Haleur, (f	r.) Geismelter -		638
Half-fish,	(engl.) fünfjähriger Lachs -		312
	Meeradler, (Beinbrecher) -		
Haliotis, I			596
	nina, Langobr -	VI.	599
	armorata, Marmorohe -		199
- $ M$	lidæ, Hohlohr •		597
		Hali	otis

<b>Haliotis</b>	Haring		197
•	. •	Th.	C.
Haliotis parva, Dehrlein	• ,	VI.	600
— — Ariata, Rungelohr	•	VI.	598
tuberculata, Anotenob	t -	VI.	598
— — varia, Buntohr	- "	VI.	599
Sallers Mennung von der Empf		e I.	25
Palmenmotte, (Rachtschm) Pha			739
Paloor, (Golobabnchen) Chryf			170
Salsfloffer, Jugulares, (Pisces	)	IV.	
Salsforper (Stechfliege) Cono	ps petiolata		999
Halv - Bazuin, (holl.) Salbpo	faune -		359
Halvmaans - Hoorens, (boll.)			
Hamadryas, (Simia) Waldunn			124
Hamdubbletten. (holl.) Eteck		VI.	340
Sammaufter, (Rammnuschel)	Oftrea perna	VI.	315
Dammerfisch, (Haan) Squalus?	Zygæna		258
Ham - Oester, (holl.) Sammau	ster -		315
Hamfter, Mus cricetus	. •		344
Samstermans, Mus sungorus	` -	€.	
Sangflügel, (Nachtschm.) Phali			309
Sangförrer, (Bastardwespe) Sph		V2.	807
Hanglippe, (Monbschnecke) Tu		VI.	
Hangnostje, (boll.) Beutelmeise			629
Hangvogel, (Papagen) Plittacu	s galgulus		149
Hanneton, (fr.) Mantafer	A A . Calladana /		18
hannswurft, (Springkafer) Ele	iter tellellatus	V.	324
Hanse, (schweb.) Dachshund			209
raphor-Eberoth, (bebr.) Ma	miconel .		295
Harang, (fr.) Bering	Colffiance)	1V.	303
Harbaji, (arab.) Hornträger, (	starledräuße)	III.	
Harcha, (ofterreich) Wels	-	IV.	290
Harder, (boll) Meerasche	e Church	IV.	
Hardlooper, (holl.) athiorische	s Schwein	III.	464
Hardun, (turf) Dorneidechfe			
Hardy schrew, (engl.) Spign	naus -	I. T	303
Hare, (engl) Saafe	ine -	IV.	318
Harengus, (Clupea) Phatelher		VI.	3 <sup>U</sup> 3
Parfe, Harpfenschnecke, (Notens	with .	IV.	262
Haring, (holl.) Pering	N a	Hai	

	~.	_
Thata the Continue	Th.	€.
Harle, (fr.) Lauchergans		304
- ctoile, Pfeilschwanzente		307
kupé, weisse Taucherente		306
Harlekyn, (boll.) Arlequin		398
Parlequin, (Porzellane) Cypres cribraria		398
Parlequin, (Tagschm.) Distelnnmphe -	-	606
Parlequin, (Mange) Cimex Histrio		480
Harnasman, (boll.) Steinpicker, Pangerfisch IV.	134.	307
Hanna (Progringeria cataphracta -	IV.	
Harpa, (Buccinum) Davidsharpfe -	VL.	
Harpagn, (boll.) Bnotchafe	VI.	
Harpyja, (Vultur) Rauber	II.	23
Harr, (schwed) Aesche	ĮV.	327
Hart, (boll) Hirsch	Į.	390
Hartdubblet, (boll.) herzmuschet	IV.	244
Harte hoorens, (boll.) Krausschnecken -	VI.	498
Harteigel, (Pfeilschwanz) Sphinx ligustri.		63\$
Partschild, (Citade) Cicada coleoptera		4/1
Hartshoorenkoraal (boll.) Dirschgeweihkoralle	). 	_
	698.	
Harzmotte, (Nachtschm.) Phalsena refinella	<b>V</b> •	747
Parzmottenwespe, (Raupenidder) Ichn. refinellæ		854
Paseleule, (Rachsschm.) Phalæna coryli		667
Saselhabnchen, Chrysomela coryli -		191
Hafelbubn, Tetrao Bonaho -		48 <u>Ş</u>
Sascimans, Mus avellanarius -	Į.	316
Haselnascher, (Eitabe) Cicada coryst -	V.	467
Haselschild, (Schildlaus) Coccus coryli -	V.	534
Hasclwanze, Cimex coryli -	V.	507
Haselwickler, (Nachtschm.) Phalæna avellana	_ <b>V</b> ,	726
Saspel, (Arche) Arca tortuosa -	٧ı.	29]
Haspeldubblet, (host.) Haspel -	VI.	
Hathera Duck, (engl.) Bahamische Ente		299
Saube, alte, (Klippfleber) Patella antiquata	VI.	
Saubenadler, Falco coronatus -	IL	
Haubenblutfink Loxia Cardinalis -	II.	547
Saubencolibri, Trochilus cristatus -		270
Squbençolion, (Rernbeisser) Loxia caudata	<b>5.</b>	
•	Dan	bene

<b>Saubeneisvogel</b>	Paussimmalbe		199
•	9	Eb.	€.
Daubeneisvogel, Alcedo Alegon			240
Daubeneisvogel, Alcedo Galerit		€.	94
Daubenenten, Anates cristatæ	4		301
Daubenfafan, indianifcher, (Rror	ientaube)	II.	505
Daubenfafan, Phasianus nyether		II.	474
Paubenfint, Pringilla cucullata			166
Paubengudgud, Cuculus cristat			214
Saubenhaber, Corvus cristatus			176
haubenhuhn (Saushuhn)	•	€.	123
Paubenkernbeiffer, Loxia criftat	<b>4</b> •	II,	549
Daubentonig, (Bachftelje) Motao	illa dumenterum	II.	614
Saubenlerche, Alauda cristata	• ,	IL.	520
Saubenmeise, Parus cristatus	•		626
Daubenmerle, Gracula cristatelle	<b>)</b> —		195
Daubenmerle, Tanagra cristata	-		578
Daubenmerle, Tanagra mitrata			159
Daubenpapagen, Psittacus corons	atus -		139
rother, Chaubent	Lutfin <b>L)</b>		548
Saubenpershuhn, Numida cristat			126
Saubenreiber, Ardea cristata			111
Saubenspecht, Picus pileatus			221
Saubentaube, Columba cucullata		ĮI.	500
Saubentaucher, Colymbus cristat	- ·		34¥
haubenseisig, Pipra cristata	. •		622
Sauchforelle, Salmo Hucho,			318
Sausen, Huso -			<b>29</b> [
hausgrille, Gryllus domekicus	<b>–</b>		424
Sausbund, Canis domesticus	•		207
Saushund, Canis familiaris		<b>3</b> .	27
Sauskaferchen, (Rleinkafer) Derm	eftes domosticus	V.	105
Danskage,. Felis Cattus	•		240
Dausmaus, Mus musculus	-	I.	344
Dausmotte, (Rachtschm.) Phalæn		V.	748
Hausmutter, (Rachtschm.) Phalen	na pronuba.		687
Hausrage, Mus Rattus	•		347
Dausschaben, (Meeltafer)			36,7
Hausschlange, (Ratter) Coluber			206
hausschwalbe, Hirundo urbica	· •		632
	N 4	Ŋ	us.

\$	<b>6.</b>	<b>6</b> .
		073
		497
		493
Haut, (amerif.) Faulthier -		178
Hautin, (flandr) Hauting, Ansjovis IV. 32		
	_	812
Sautschander, (Raupentober) lehneumon Lubeu-		U-2
taneus -	72.	<b>8</b> 6 1
		503
	<b>/I</b> .	
	IL.	295
Hav-hæft, (nord.) Ballroß, Geepferd I. 172.		
	II.	419
Hayma, (chin ) Scepferd -		457
Hayopolin, Philander -		294
	II.	48 t
		663
		150
		377
	νī.	366
	V.	592
Sectet, Esox	V.	336
- gemeiner, Esox Lucius - I	V.	339
Bechtbarsch, Lucio perca - I	V.	225
		714
Bedenkriecher, (Nachischm.) Phal. dumeti	V.	658
Bedenferinger, (Bachftelje) Motacilla dumetorum	II.	614
Hecta, (Phalæna) Puntiband -	V.	6.9
Hector, (Murex) fnotiger Delfuchen -	<b>∕</b> 1.	501
Hector, (Papilio) großer Page -	V.	566
Hecuba, (Tagichm) Papilio Hecuba -	S.	279
Hedge-Chafer, (engl.) Mantafer -		81
Hedge - Hog, (engl) Igel -	I.	304
Hedonia, (Papilio) Rethauge -		605
heerschnerfe, Scolopax Gallinago -	II.	397
Heidefrautforalline, Ericoides - V		852
Beibelbeereule, (Rachtschm.) Phalæna vaccinii	V.	697
Deibelerche, Alauda cristata		520
्राच्या विकास के किया है। जिल्लाहरू के किया के किया के किया के किया किया है। किया किया किया किया किया किया किय जिल्लाहरू	Ŋ	cibce

6 1 6 16		
Seidestreifer	Helix	201
		Th. S.
Beibestreifer, (Miege) Musca syl	varum .	V2. 960
Heilbot, (hou) Hubutte	•	IV 140
Beiligbutte, (Gettenschwimmer) Pl	leuronectes hy	p-
pogloffus	-	IV. 149
Beiligenspinne, Aranea speciosa	_	<b>S</b> . 343
heimchen, (hausgrille)		V. 424
Heire, (norm) grauer Reiher	_	II. 379
Heirth, (schoul.) Schaaf	•	L 422
heiklander, (hummel) Apis æstu	ians -	V2. 906
Deiflander, (Biebbreme) Tabani	us calens	V2. 985
Helcita, (Papilio) Ciebengeftirn	•	V. 591
Helegug, (engl.) Seepapagep	,	IL 311
Helena (Murana) Murene		IV. 32
Helena, (Papilio) Goldfied		V. 571
Helenus, (Papilio) Trauerpage		V. 567
Helic, (Papilio) Bifchauge	_	V. 605
Seliconerin, (Rachtschm) Phalær	na Halicania	V. 685
heliconia, (Tagfchm.) Papilio Di	do	
Helix, Schnirfelichnede	uu -	V. 615
- albella, Scharfranb	• _	VI. 561
- Algira, Cechswinber		VI. 564
amarula, Flufpabstrone	<b>-</b> ,	VI. 564
- ambigua, weisser Salbmon		VI. 580
ampullacea, Dchsenauge	-	VI. 583
- arbustorum, Baumschneck	,	VI. 569
- auriculata, Manseohr		VI. 571
- Balthica, Gothlander		VI. 581
	•	VI. 582
barbara, Algierer	•	VI. 579
— — carocolla, Bastardlampe — — citrina, Rabelschnirfel	•	VI. 566
- Complenes Ymmandi San	of also	VI. 570
- complanata, Ammonshorn - contorta, Kohlsaame	itein -	VI. 565
— cornea, Waldhorn	•	VI. 568
— decollata, Schnirfelnadel	. •	VI. 567
- fragilis, Dunnschaale	_	VI. 578
—— glauca, Kuhange	•	VI. 580
— Gothica, Rostband	•	VI. 570
- Orines, Auftoand	•	VI. 567
grisea, Erbschnecke	NT .	VI. 577
,	N <sub>s</sub>	Gual-

	Th. S.
Helix Gualtheriana, Repfcmirfel -	VI. 567
— — hæmakima, Nothmund -	VI. 577
- haliotoidea, Milchaale -	VI. 582
- Hilpana, franische Landschnecke -	VI. 573
- hispida, Saarlode	VI. 569
- janthina, Quallenboot	VL 574
- Itala, italienische Landschnecke -	VI. 572
lævigata, Erbsenschnirka -	VI. 581
- lapicida, Steinbider	VI 563
- limosa, Morastriecher .	VI. 581
- lucorum, Baloschnede	VI. 577
- Lusitanica, portugtefifche Landfchnede	VI. 572
lutaria, Moraftschnirtel -	VI. 573
- mammillaris, Warzenschnirtel	VI. 172
- nomoralis, Gartenfcnede	VI. 576
- Neritoidea, Meritschnirket	VI. 582
- octona, Achtkonirtel	VI. 579
- perspicua, Glasschnirtel	VI. 582
- perversa, Wirbelschnirkel -	VL 573
- planorbis, Scheibenschnecke -	VI. 565
- pomaria, Beinbergichnede	VI./569
- putris, Amshibienschnede	VI. 581
- ringens, oftindische gampe	VI. 565
- Cabra, Braunband	VI. 567
— — spirordis, Lillsaame —	VI. 568
stagnalis, Schwimmer -	VL 578
- ftagnalis, Bafferschnecke -	VL 589
- Ariatula, Streiffiel	VI. 564
- Gubcylindricz, Enlinderschnirkel	VI. 578
- tentacula, Hornerschnirkel	VI. 581
- ungulina, gelbes Pofthorn -	VI. 578
- vivipara, Jungwerfer	VI. 579
- zonaria, Gurtelfcnede	VI. 571
Helle-Flinder, (ban.) Hillbutte	IV. 150
Hellica, (Papilio) Canpfcher Beigling -	V. 588
Helmet, (holl.) Pelmtaube -	II, 502
Pelmfopf, (Bels) Silurus galeatus .	IV. 297
Pelmlerche, (Geelerche)	IV. tor
•	Belme



, •		Th.	€.
Herisson de mer, (fr.) Secapfel	•	VI.	
Herix, Herinaceus, Igel	•		304
Hermann, (fdweij.) Schaaf	-		422
Dermaphrobit, (Großtopf)	· · · ·		665
Dermelin, (Gabelfcmang)	-		659
Dermelin, Mustella erminea	-		240
Hermiga, (span.) Ameife	<b>-</b> ,	<b>V</b> 2.	
Hermione, (Papilio) deutscher Atlas	-		604
Hero, (Papilio) Cechsauge	-	V.	629
Herodias, (Ardea) Riese, (Reiber)	-	II.	381
Horodias, (griech) graner Reiber	•	II.	379
Heron, (fr ) Reiher -		II.	379
Herring-Gull, (engl ) braune Meme	-	II.	347
Herse, (Papilio) Bloletvogel	•	€.	291
Hersensteen, (boll ) Gebirnstein	•	VI2.	679
Herumlaatscher, (Meeltafer) Tenebrie	erraticus	V.	371
herzbiene, Apis cordata		V2	895
Beriffed, (Rufelfafer) Curculio melan	ocardius		219
herstrabbe, Cancer cordatus	•	V2. 1	000
hermuschel, Cardium	VI. 244	. <b>(</b>	26.
Bergtrager, (Goldhabnchen) Chrysomela	cordigera	ı V.	192
Detiute, Conus marmoratus	-	VI.	364
Herstute, Conus nobilis	<b>.</b>	VI.	372
Hesione, (Papilio) Braunflugel	-	S.	292
Hesperus, (Phalæna) Spiegesträger	-	V.	651
Heumotte, (Nachtschm.) Phalsena foenel	Ia .		739
heuparillon, (Tagichm.) Papilio Pamp	hilus	V.	626
Beufchrede, barbarifche, Gryllus Barab	enfiş	E.	
- braune, Gryllus fuscus	-	G.	271
- gemeine, Gryllus Locusta	-	V.	434
- raube, Gryllus muricatus	• .	€.	269
— fibirische, Gryllus Sibiricus	-	S.	
Berenmeister, Trochus Magus	- '	VI.	
Heyhoe, (nord.) Grunspecht	•	. Il.	
Hey-Korallyn, (boll.) Gurtelforalline	•	VI2.	
Hiam Chamfu, (din.) Bisamthier	•,		375
Hjarpe, (schweb.) Haselbuhn	•		486
Hiaticula, (Charadrius) Strandpfeifer		II.	_
		List	nu.

	Eb.	Č.
Hirondelle, (fr.) Bogelchen, (Miesmufchel)		<b>3</b> 39
	79. 🕏	
— — Canadischer, Cervus Canadus =		394
- Corsicanischer, Cervus Corsicanus	I.	394
genteiner, Cervus Elaphus -	ı I.	389
- " Stönlandischer, Cervus Groenlandicus	I,	391
Sirfc, (Porzellane) Cypřez Cervuš -	S.	373
Pirschbott, Antilope	☻.	52
hirschbod, (Bodfafer) Cerambyk vervicornis		252
Hitschool, Capra cervicapra -		414
Hirscheber, (Schmein) Sus Babyrussa -		467
Hirschgeweihbod, (Bodfaf.) Ceramby's Damicorn		
hirschgeweihkoralle, Madrepota Damicornis	VI2.	-
hirschgeweihschwamm, Spongia dichotoma	VI2.	
hirschahnthen, Chrysomela cervina -		200
Hirschhornkafer, (Rußelf.) Curculio cervinus		235
hirschlaus, Pediculus cervi	V2. 1	• •
hirschscher, Lucanus Cervus	- V.	94
hirsentorn, (Balge) Voluta miliaria -	VI.	
SirBbede, (Connentifer) Coccinella conglomera		
Hirudo, Blutigel -	VI.	47
complanata, Breitbauch -	VI.	51
- geometra, Grannueffer -	VI.	52
heteroclita, Glasigel	VI.	52
— — indica, Dornstrich —	VI.	49
medicinalis, Aberlasset -	VI.	44
- muricata, Seeigel	VI.	53
- octoculata, Warzenmaul -	VI,	50
sanguifuga, gemeiner Blutsauger	VI.	50
stagnalis, Sumpfigel	VI.	• .
Hirundo, (Cyprea) Schwalbe, (Porzellane)	VI.	397
Hirundo, (Mytilus) Bogelchen, (Diesmufchel)	VI.	338
Hirundo, Schwalbe - II: 630		
Alpestris, sibirlice Bergichwalbe	<b>5</b> .	180
- Daurica, rußische Schwalbe -	₭.	179
— — esculenta, chinesische Schwalke	II.	<b>63</b> 1
— melba, spanische Schwalbe		634
— pelasgia, carolinische Schwalbe		634
<del>-</del>	Hiru	ınde

Hirundo	Дофриn <b>i</b> t	207
		Th. E
Hirundo pratineola, Wiefenfchn	palbe —	IL 635
🛨 — purpurea, Purpurschw	albe, -	II. 633
- riparia, Uferschwalbe	•	II. 632
— — rustica. Raubschwalbe	•	II. 630
- Senegalenlis, senegatife	be Schwalbe	II. 634
— — ludis, canadijoje Some	albe -	II. 633
- Tapera, amerikanische	Schwalbe	IL 634
- urbica, Hausschmalbe	<b>.</b>	II. 632
Hirundo, (Sterna) europaische I	Reerfchwalbe	II. 352
Hirundo, (Trigla) Meerschwelf	x, (Geehahn)	IV. 277
Hupa, Dornfafer .	V. 201	<b>S.</b> 228
— — atru, Schmärzling	<b>•</b>	V. 203
bihamata, Doppelhafen	• • •	V. 204
- — mutica, Kadenhorn	; ) •-	V. 209
— — sanguinicollis, Bluthals	-	S. 228
- testacea, Rothling	<b>4</b>	V. 204
Hister, Dungkafer	•	V. 114
bimaculatus, Zwenflect		V. 116
— major, Afrikaner	•	V. 115
maximus, Indianer	, •	V: 114
— — pygmæus, Zwerg	-	V. 116
- quadrimaculatus, Bierflee	#	V. 116
— unicolor, Europáer	•	V. 115
Histrio, (Cimex) Arlequia	***	V. 480
Histrio, (Columba) Scheck	-	<b>6.</b> 34
Histrio, (Lophius) Sectrote	<b>~</b>	lli. 284
Histrio, (Nerita) gefurchte Schi	necte –	VI. 593
Histrio, (Psittacus) Arlequin	<b>—</b> ,	€. 76
Hoazin, (Kafau) Phalanius Hoaz	in 🗻	S 124
Hobby, (engl ) Baumfalte	. 📥	IL 78
Sobelmante, Cimex dolabratus	•	V 502
Hobereau, Hobreau, (fr.) Bdu	mfalle +	II 78
Hocco de Peru, (fr.) peruviants	her Pauwis II.	465, 466
Pochfileger, (fliegender Kisch) Exc	coetus evolans	IV. 356
<b>Pochmaul, (Salmbrachsem)</b> Salm	io anostomus	IV. 322
Sochnacken, (Grasbüpfer) Bullæ	-	V. 419
hochpunkt, (Meelkafer) Tenebrie	o variabilis	V. 276
hochpunkt, (Rachtschm.) Phalsons	t chonopodiata	V. 711
•	-	Jody.

	₹b. €.
hochruden, (Meelkafer) Tenebrio gibbus	V. 373
Dochruden mit weiffen Anopfchen, (Jambus)	VI. 406
hochruden, (Calmbrachsem) Salmo gibbosus	IV. 328
Hochschauer, Cobitis	IV. 281
Sochfcmans, (Stachelfchnede) Murex truncule	17. 201 20. 377 406
Sochschwanzenle, (Rachtschm.) Phalæna Oxya	15 <b>V 1. 49</b> 0
canthæ —	V. 697
Sochstern, Madrepora acropora	VI2. 689
Soder, (Fliege) Musca gibbofa	V12. 963
Höcker, (Raubstiege) Afilus gibbosus	Va root
Hodercanari, (Flügelschnede) Strombus urçeus	VI. 489
Soderflügel, (Golbbabnchen) Chrysomela obscur	ra V. 193
Societoralle, Madrepora porites	VI2. 696
Soderfcbilb, (Chilbfafer) Caffida inæqualis	V. 142
Hoedus, junger Bod	I. 404
Höllendrache, Furia	VI2. 915
Hoen, (boll.) Henne, Subn	II. 469
Sornerforalline, Sertularia antennia	VI2. 843
hornermoos, Corallina corniculata	VI2. 828
hornerschnaust, (Krabbe) Cancer cornutus	V12. 828 V2. 1114
Sornerschnirkel, Helix tentacula	VI. 581
Hofdame, (Rachtschm) Phalæna aulica	V. 675
Hofjunter, (Adfer) Scarabæus aulicus	V. 84
hofjunter, (Natter) Coluber aulicus -	III. 182
hoftrauer, (Springtafer) Elater sanguineus	V. 322
Hogfish, (engl ) Schweinssisch	IV. 202
Hoggrel, (engl.) Lamm	I. 422
Hohlbanch, (Fliege) Musca inanis	V2. 966
Hohlbauch, (Gallapfelwurm) Cynips inanits	V2: 817
Sohlbeckel, (Baffard) Anomia reticularis	VI. 322
Sohlkehle, (Benusmuschel) Venus succinsta	<b>6.</b> 364
Sohlohr, (Meerohr) Haliotis Mide -	VI. 597
Sohlpunkt, (Erdkafer) Carabus hortensis	V. 353
Sohlpuntt, (Spinne) Aranea bipunstata	V2. 1073
Soblichnabel, Cancroma -	II. 368
Soblstern, Madrepora cavernola	VI2. 689
Hoitzitzil, (meg.) Baumlaufer -	IL 256
Hoitztlacuatzin, (amerif.) Stachelschwein	I. #R
	Hot

Holzanatl	. Ponigbieb	209
	,	<b>2h.</b> S.
Hoizanath, (mer.) Elftet	•	11, 179
Polftermufchel, (Gredmufchel)		VI. 340
Pollerlaus, Aphis Sambuci	-	V. 513
hollunderbock, (Bockfafer) Cera	mbyx ebulinu	V. 282
Holosteon, Rofferfisch		III. 310
Holothuria, Geeblafe		VI. 94
caudata, Schwan	blafe -	VI. 98
denudara, Ceegal		VI. 98
frondola, Ceebeul		VI. 94
tremula, Zitterbla	le -	VI. 96
Solfteinet, (Goldhabnchen) Chry	rfomela Holfati	ca V. 184
Polibode, (Bocffafer)		V. 249.
Solibode, weiche, Lepturæ	- V. 28	3. 6. 243
Polibobret, (Bohrfafer) Ptinus		V. 112
Solibobrer, (Gectausendbein) N	ereis gigantea	VI. 81
Solzbobrer, (Sectausendbein) N Solzbobrer, Toredo	-	VI. 631
Polidieb, (Raubfafer) Staphylin	us lignorum	V. 391
Bolifreffer, (Colibobrer)		VI. 631
Solsbaber, (Rabe) Corvus glan	darius	U. 175
Polispindel, (Ctachelichnede) M	lurex lignarius	VI. 519
Polifpringer, (Springtafer) Ela	ter ligneus	V. 319
Politaube, Palumbus		II. 506
Polimefpen, Sirices		V2, 837
holzwurmfliege, (Stintfliege) He	merobius pedi	• •
culàrius	-	Va. 707
Holybutt, (engl.) pillbutte	•	IV. 149
Homacka, (fcwed ) graue Derve	<b>t</b> •	II. 345
Homarus, (Cancer) Geeheuschri		V2. 1129
Hommel, (boll.) Dummel	-	V2. 902
Homo, Menfch	· i.	61. 6. 3
diurnus, sapiens, Tagmer		61. <b>6</b> . 3
nocturnus, Machtmenfch	· ·	I, 109
— — fylvestris, Waldmensch	•	I, 114
Hond, (holl.) Hund -		I. 206
Hondsluis, (boll.) Kühmilbe		V2. 1047
Sonigbiene, Apis mellifica	•	V2. 896
Sonigbushart, (Fafte) Falco api	vorus -	II. 87
Donigdieb, (Rachtschm.) Phalæns		V. 722
0		Honig.

	_
	Th 'È.
Honigstiege, Musca mellina -	V2. 964
Ponigleder, (Rachtschm) Phalæna mellonella	V. 741
Ponigmotte, (Rachtschm.) Phalæna sociella	V: 735
Ponigsauger, (Celibri) Trochylus mellisugus	II. 269
Hoogkyker, (holl) Schmerling -	IV. 282
Hoogruggetje, (holl.) Bulft -	VI. 407
Hoop, Hoopoe, (engl.) Wiedehopf -	II. 249
Hooping - Crane, (engl.) amerifanischer Rranic	
Hoornslangetje, (holl.) Cornschlange -	VI. 626
Hoorn- varken, (holl.) gehörntes Schwein	I. 468
Hoornwier, (holl) Banbforalle -	Vl2. 718
Hooywagen, (boll ) Beberknecht -	V2. 1060
Hoosenbek, (boll ) Bafferschaufelmaul	III. 280
Hopfeneule, (Rachtschm) Phalæna humuli	V. 679
Dopfenfliege, (Stintfliege) Hemerobius humuli	V. 679
Hoppe, (holl.) Wiedehopf	II. 249
horn, (Citabe) Cicada cornuta -	V. 454
Hornaar, (boll.) Corniffe -	V2. 880
Hornbiene, Apis bicornis	V2. 893
horned Coney - Fish, (engl.) gehornier Raninche	in.
Beinfisch .	III. 309
Hornet, (engl.) horniffe -	V2. 880
Horneule, kleine, Strix Otus	II. 98
Hornfisch, Balistes -	III. 294
Hornfish, (engl ) Blinbfifch	III. 340
Hornfish, (engl.) Meernabel, (Secht)	ĮV. 341
Horngial, (fcmed.) Meernabel, (Decht)	IV: 341
Dornissliege, Musca ostracea -	V2. 959
Borniffe, (Befpe) Vespa Crabro -	V2. 880
Borntopf, (Rameelhale) Raphidia cornuta	V2. 806
Horntoralle, Zoophyta Gorgonia	VI2. 748
hornfrautsauger, Chermes cerastii	V. 522
Pornlerche, (Roufisch) Blennius cornutus	IV. 101
Hornschlange, (Malschlange) Anguis Cerastes	III. 214
hornschlange, (Natter) Coluber Cerastes	III. 158
Hornschlange, (Abhrenschnecke) Serpula lumbri	
calis -	VI. 626
hornschuchtel, (Gerpent) Boa Hipnale -	III. 146
	T107754

£). S.
Pornschnauße, (Rredsspinne) Phalangium cor-
nutum - V2. 1061
hornschnede, (Stachelschnede) Murex corneus VI. 518
Hornsimpna, (schweb.) Knorrhahn - IV. 135
Porntrager, (brafil. Kranich) Palamedea cornuta II. 364
Porntrager, (Frosch) Rana cornuta - III. 63
Porntrager, (Rugeltaf) Curculio cornutus V. 241
Porntrager, (Befpe) Vespa cornuta - V2. 885
hornvigel, Buceri – II. 160
hornzahn, (Meerzähnchen) Bentalium corneum VI. 620
Horsgjoeck, (fchmeb.) punktirter Strandlaufer II. 415
Horse, (engl.) Pferd - I. 446
Horseleech, (engl.) Blutigel - VI. 47
Horse-Makrell, (engl.) Bastardmatrele IV. 264. 265
Horsematch, (engl.) Weißschmanz - II. 609
Horse Schoebat, (engl.) Pufeisennase - S. 20
Horta, (Papilio) Rothflugel - V. 582
Horticola, (Scarabæus) S. Johanniskafer V. 80
Hortybel, (Bair) Rohrdommel - II. 386
Horzel. (hoff.) Bremfe - V2. 925
hottentot, (Bliege) Musca Hottentotta V2. 953
hottentot, (Manfafer) Meloë Capensis V. 382
Sottentottin, (Wespe) Vespa Capensis V2. 886
Hottentotsfisch, (Rothschuppe) - IV. 184
pottentotegoge, (Gefpenftfafer) Mantis precaria V. 413
Houndfish, (engl ) Saanfisch - III. 252
Houtluisen, (boll.) Holzwurmer, Waldmilben V2. 1022
1046
Hualfisk, (norw.) Walfisch - I. 480
Hucho, (Salmo) Hauchforeste – IV. 318
Huette, (fr.) Faumeule — II. 09
Sufeisennase, (Fledermaus) Vespertilio equinus S. 20
Hugg-Orm, (schweb.) hedennatter - III. 154
Hügelgraber, (Meeltafer) Tenebrio fossor V. 370
Dubnerartige Bogel, Aves Gallinæ II. 454. C. 121
Subnerbarm, (Robrenschnecke) Serpula anguina VI. 628
O 2 Hühnere
• •

,	Th.	€.
Hyperanthus, (Papillo) Grassametterling		599
Hyperbius, (Papilio) 3mentern -		599
Hypermnestra, (Papilio) bunter Mantel		616
Hypolean, (Musca) Zwenstrich -		952
Hypoleucus, (Tringa) Sandpfeiser —	u.	411
Hypolitus, (Papilio) Amboinesee -		283
Hyppelaphus, Dieschpferd, Clendthier, Remthier,		
Oprfanier, (Dude) Culex Hyrcanus	<b>6</b> .	
Hysse, (norw.) Schelfisch -	IV.	79
Onfterit, (Baftard) Anomia hyfterica	VI.	
Hyftrix, (Dindon) großer Stachelkich .		326
Hystrix, Igelfisch		323
Hystrix, (Murex) gejacte Maubeere		507
Hystrix, Stachelschwein -		311
criftata, afrifanifches Ctachelichmein		312
dorfata, Stachelructen -		315
- macroura, Langschmanz -		316
- prehensilis, geschmangtes Stachelschweit	t I.	312
<b>3.</b>		
J, langes, (Rachtschm.) Phalæna Jota	V.	689.
Jabantau, (turf.) Pafelbuhn -		486
Jaboya, (westind.) Ronigsschlange -	III,	147
Jacarina, Gabelfdmang -	IL	573
Jacchus, (Simia) Bisamaffe	I.	132
Jac - Daw, (engl.) Doble -	II.	175
Jachmur, (hebr.) Dambirfc, afrifanische Biege	I. 200.	416
Jacob Evertefisch, (Barfching) Perca guttata	ĬV.	
Jacobaerin, (Rachtschm.) Phalæna Jacobæa	V.	
Jacobatrug, (Walje) Voluta Cymbium	VI.	
Jacobakruik, (boll.) Jacobatrug -	VI.	420
Jacobin, (Kernbeiffer) Loxia Jacobin -	<b>6</b>	151
Jacobinentaube, Columba cucullata -	II.	500
Jacobitermuschel, (Rammunschel) Oftrea Jacobæ	VI.	2002
Jacobsdubblet, (boil.) Pilgrimsmuschel	VI.	203
Jacoenlaus, Aphis Jacese	v.	203
Jacove, (braf.) Arotodill .	Ш.	70
A Stand & management		iah.

Jacuah	Java	218
		Th. S.
Jacuah, (bebr.) Straufvogel	2 To 10	II. 447
Jaculator, (Ichneumon) Pfeiltrager	-	V2. 856
Jaculator, mexitanischer bunter Specht	-	II. 228
Jaculatrix, (Coluber) Pfeilfchoß	1.016	III. 181
Jaculus, (Anguis) Burfichlange	-	III. 212
Jaculus, (Mus) Springer	-	I. 352
Jacupema, (braf) Truthahn	_	II. 462
Jager, (Baftardrugeltafer) Attelabus	ormicari	us V. 246
Jager, (Raupentober) Ichneumon ven	ator	V2. 852
Jager, (Schlupfmefpe) Tenthredo fal	tuum	V2. 834
Jager, (Spinne) Aranea venatoria	-	V2. 1081
Jagermantel, (Rammuschel) Oftrea pl		VI. 306
Jagertasche, (Rammuschel) Oftrea rad	ula	VI. 305
Jagervogel, Buceros Rhinoceros	0-1	II. 163
Jagdhund, Canis fagax		I. 207
Jahaka, (arab.) geftreifter Stachelbau	f)	III. 315
Jahiru Guacu, (ind.) Rahlfopf	-	-II. 366
Jairus, (Papilio) Umbervogel	-	S. 289
Jamaiter, (Regenpfeifer) Charadrius	[amaicen	fis S. 117
Jambetta, (ital.) Sammerfifch	-	III. 258
Jamble, (fr ) Klippfleber	-	VI. 602
Jambon, (fr.) Stecknuschel	45	VI. 340
Jambus, weiffer, Bulla verrucofa	-	VI. 406
Jan Potagie - Eend, (boll) Rragenent		II. 297
Jan van Gent, (boll.) schottische Gane	-	II. 331
Janaffa, (Papilio) Blaufeld	-	V. 614
Janira, (Papilio) braunes Sanbauge	-	V. 606
Janschuph, hebr.) Horneule		II. 95
Janthe, (Papilio) fibirifcher Papillon		©. 292
Janus, (Nachtschm) Phalæna Janata	400	V. 717
Janus, (Tagfchm.) Papilio Mineus	-	V. 598
Jaquacati Guacu, (braf.) Saubeneist	ogel	II. 241
Jars, (fr.) Ganfer -	•	II. 282
Jarzabec, (poln.) Hafelhuhn	92	II. 486
Jafius, (Papilio) Charafterpapillon	-	V. 573
Jason, (Papilio) Grunfled	-	V. 577
Jatebucu, (braf) Blutsauger	-	V2. 1046
Java, (Papilio) Batavier	-	C. 287
0 4		Javaer,

		•		
			Eb.	€.
Java	ier, (	Wange) Cimex nobilis -	V.	478
		(Goldhahnchen) Chrysomela undulati	ı V.	175
Jay,	(engl	.) Häher – -	II.	176
		(roln) Dachs —		281
Ibex	, (Ca	pro) Steinbock -	I.	407
Ibibo	poca		. 190.	
Ibija	ram,	(bras) Fühlschlange —	Ш	226
Ibis,	(Ta	ntalus) egiptischer Brachvogel -	II.	391
Ichne	eumo	n, Raupentbber — V2. 84		
·—		aphidum, Pfionzenlauszwicker	V2	
_		atomus, Milbenwespe -	V2.	
-		bedeguaris, Painbuttenwespe	V2.	859
-		bedeguaris, Rosenbohrer -	٧2.	811
-		bicolorus, Schwarzspitz -	V2.	858
•	_	cerali, Kirschwühler -	€.	
	-	einstus, Schwarzgürtel -	V2.	858
		circumflexus, Sichelbogen	V2.	
-	-	coccorum, Schildlausbohrer	V2.	860
_		constrictarius, Anetscher .	Va.	845
-	-	trispatorius, Kraußler	V2.	
-	-	culpatorius, Tabler -	V2.	845
-		cynipedis, Gallenbeut -	V2.	860
	-	deliratorius, Phantastrer -	V2.	848
	-	designatorius, Zeichenbeuter	<b>V2</b> .	
-	-	edictorius, Befehlshaber -	V2.	848
		extensorius, Dehner -	V2.	845
		formicatus, Wespenameise	٧2.	848
	<u>.</u>	fossorius, Graber -	V2.	849
		fusorius, Giefer -	V2.	849
	_	gallarum, Gallenftecher -	V2.	959
_		glaucopterus, Grunflugel -	V2.	847
	_	globatus, Wollensack -	V2.	361
		glomeratus, Zotenbalg	V2.	
•	-		V2.	846
		juniperi, Wachholberstecher	V2.	
-	-	larvarum, karventoder -	V2.	
-	-	lituratorius, Etrichwespe -	V2.	
-	-	luctatorius, Kampfer -	V2.	
		•	Ichr	icu-

	Ichneumon	Jgel	217
	,		<b>E</b> h. <b>S</b> .
Ichneumon	luteus, Gelbichnabel	_ `	V2. 857
	macrourus, Groffchw	anı —	S. 319
	molitorius, Muller	,	V2. 846
	mulcarum, Bliegenme	ipe —	V2. 859
	ovulorum, Enerbruter		V2. 861
	pectinicornis, Federh	orn -	V2. 862
	persuaforius, Berführ	er –	V2 847
	pisorius, Erbemefpe	•	V2. 846
	puparum, Puppenmoi	ber -	V2. 860
	quælitorius, Forscher	•	V2. 845
	ramidulus, Edwarjas	ter -	V2. 857
	raptorius, Rauber	-	V2. 844
<b>-</b>	relinellæ, Parzmottent	vefp <b>e</b>	V2. 854
	sarcitorius, Blicker	•	V2. 844
	saturatorius, Buller	•	` V2. 84₹
	secalis, Rornwurmstech	er -	V2. 861
	strobinellæ, Tannenwe	rspe -	V2. 853
	subcutaneus, Pautscha	nber	V2. 861
	lugillatorius, Schande		V2. 843
	turionellæ, Mottenwe	fre -	V2. 853
	vaginatorius, Scheiber	nsteder	V2. 847
	volutatorius, Walser	•	V2. 847
Ichneumon	(Viverra) Pharaora	ge —	l. 244
Ichtis, Icht	hyon, (griech.) Fisch	•	IV. 2
	lus, Gelbtopf, (Bienen	fresser)	~ II. 247
Icterus, Go		•	II. 185
Idbarus, (	Cyprinus) Blutflosser	•	IV. 39t
Idea, (Papi	ilio) indianischer Weißli	ng -	V. 587
Idmone, (t	Papilio) Doppelband	•	V. 613
	, (Papilio) fleiner Atle	a <b>s</b> -	V. 579
Idus, (Cyp.	rinus) Spigfloffer	-	IV. 392
Jean le blas	nc, (fr) Blenfalte	•	II. 70
Jeheras, Eg	siptischer Brachvogel	-	11. 392
Jelvé, (tůrf	.) Heerschnepfe	•	II. 397
Jentling, (6	fter.) Bratfifch	-	IV. 399
Jerfalco, (e	ngl ) Geperfalte	•	II. 87
Jeles, (Cyp	rinus) Bratfisch	-	IV. 394
Igel, Erina	ceus	•	I. 304
	^ O	5 .	- Jgel,

	Th.	Œ,
Igel, europaischer, Erinaceus Europæus		305
- malaceischer, Erinaceus Malaccensis -	I.	308
Jeelfisch, Diodon	III.	323
Igelkot, (schwed) Igel -		304
Igithalos, (griech.) Meise -		625
Ignavus, Faulthier		177
Jiratazin, (abpffin.) Kamcelparber -	ı,	379
	V, 60,	
Ikan-Kapelle, (ind.) Meerhahn -	IV.	143
Ikan - Kaskasse, (ind.) Saasentopf -	HI.	314
Ikan - Pilau, (ind. ) Mefferfifth -	HI.	334
Ikan-Setang, (ind.) Hornfisch -	HJ.	309
Ikan-Sowangi Bezar, (ind.) Zauberfisch	ĮV.	141
Ikorn, (schwed) Eichhorn	I.	355
Iktis, (griech) Biesel	I.	271
I. L. (Rachtschm.) Phalæna Lecheana -	V.	727
Ilirias, (Phalæna) grune Eule -	ි ලි.	311
Illas, (griech.) Zipbcoffel —	II.	530
Iller, (schwed) Itis	I.	269
Itis, Mustella putoria	I.	269
Immen, (boll.) Larven großer Muden -	V.	931
Immenwolf, (Bienenfresser) Merops apiaster	· II.	245
Immer, (Colymbus) Abventsvogel -	11.	340
Incubitor, (Ichneumon) Bachter -	V2.	810
Inculcator, (Ichneumon) Stampfer -	V2.	855
Indianer, (Bastardwespe) Sphex Indica	V2.	871
Indianer, (Dungkafer) Hilter maximus	<b>V.</b>	114
Indianer, (Jungfer) Libellula variegata	V2.	772
Indianer, (Rafer) Scarabæus Indus -	V.	86
Indianer, (Ctachelschnecke) Murex Cochlidius		
Indianer, (ungeflugelte Biene) Mutilla Indica	V2.	
Indianer, (Bielfuß) Julus Indus -	V2. 1	165
Indianerin, (Baffermange) Notonetta Indica	Œ.	
Indianische Subner		461
indisch Posthoorn, (boll.) gelbes Postborn	VI.	
Indoftaner, (Baftardwefpe) Sphex Indoftana	V2.	
Infusionethierchen, Chaos infusorium -VI2	. 917.	
Ingwerforalle, Madrepora digitata -	ÝΙ <sub>2</sub> .	•
Audio accountation and accountation and		nk-

4	Inkhoorn	Inseften"	219
	× .	4	eb. S.
Inkhoo	rn, (holl.) Eichhorn	-	L 355
	rnvils, (holl.) Blautopf	-	IV. 245
Inmifel	n Baluk, (turt.) Kornabren	filch -	IV. 349
	12, Lachs -	-	IV. 312
annlan	ber, (Goldhabuchen ) Chr	vsomela duode-	,
J	cimpunctata	•	V. 199
Inquifit	tor, (Carabus) Raupenjag	er -	V. 356
Inquifi	tor, (Cerambyx) Stanfer	er –	V. 269
	, Infetten -	- V. 1.	S. 213
	aptera, Insetten ohne Flu	gel V2. 1040.	G. 339
	coleoptera, Infeften mit	ganten Klügele	- 333
	decken -	V. 40-	€. 213
	diaria, Lagthierchen		V2. 776
	diptera; menflugelige In		
			C. 333
	hemiptera, Insetten mit		æ
	becken -	V. 399.	C. 203
	hymenoptera, Insetten	Rill hautigen	æ
	Flügeln -	V2. 819.	
	lepidoptera, Schmetterli		C. 279
	neuroptera, Insetten mit	averigen Flui	<b>6</b>
Q., C. 24.	geln -	V2. 761.	C. 315
Injecte	n, Insecta —		G. 213
	Begattung und Unterschied b	६५७६१कास्करम् ०६४	
<del>-</del>	2900	. <b></b>	V. 11. V. 1
	Einleitung in die Geschichte		
	Körperbau der	- •	7. 3—10 V. 12
	Larven der	- Do	-
	mit aderigen Ffügeln, Insei	ta neuroptera	V. 761
	mis a ansantilis all artan Ind	-Os salasantans	<b>©.</b> 315
	mit gangen Flügelbecken, Inf	ects coreobters	
	mie kaueiaan (Bläasla, Ta-Ca-O	- Lumanantana	©. 213
	mit hautigen Blugeln, Inle&	a nymenoptera	
	mit halfem Gländhaden Int	Calla Lamintona	<b>6.</b> 313
	mit halben Flügelbeden, Ini	ecta nemiptera	
	mit Stankelastn InCo	a lamidamea	<b>©.</b> 263
_ ,	mit Staubflügeln, Insect	a rebigobiera	V. 542
_	nhua (BISAA) Infaste anton	. V	€. 279
-	ohne Flugel, Insecta apter	2 V2. 1040.	
			°Yn4

	Th.	€.
Infetten, Buppen ber -	Ÿ.	13
- find in ber Arzneywiffenschaft , Sandlm	R	- 0
und Aarbetunft nüglich -	v.	15
Verwandlung ber -	V.	12
- wober fie ibre Benennung baben -	. V.	I
- imenflügelige, Insocta diptera V2, 94		-
Jufettenfanger, (fliege) Mulca triagraria	V2.	
Inftinet bes Lebens	III.	28
- Des mechanischen Lebens -	III.	20
- bee organischen Lebens -	III.	34
Interpres, (Tringa) Dolmetscher -	II.	407
	8. 11	
Inuus, (Simia) Buschgott .		121
Invalide, (Rrebs) Cancer emoritus -	V2.	
Io, (Papilio) Pfauenange		600
Jocasse, (fr.) Miftelbroffel -		528
Jody (Blase) Bulla spelta -	VĮ.	
Jolle, (Arche) Arca Pella -	VI.	
Sobannisaffel. Scolopendra phosphorea	V2, 1	
Johannisbeerfliege, Musca ribelii -	V2.	
Tobamiebeerland. Aphis rihis -	V.	512
Sohannisbeermilbe, Acarus baccarum	V2. 1	1054
Johanniebock, (Bockfafer) Cerambyx cantharinu	s V.	28I
Johannisbrodkafer, Scarabæus Ceratonia		91
Johannissliege, (Langfuß) Tipula Joannis	V2.	
Johanniefliegen, Cantharides -	V.	306
Johannistafer, Scarabæus horticola -	V,	
Johannismurm, Lampyris noctiluca —		297
Jokje, (holl) Joan —	VI.	
Iole, (Papilio) Reujorfischer Diftelvogel		292
Joli, (Colibri) Trochilus Thaumantias		26 <b>6</b>
Jon, Jonah, (bebr.) Taube -	Ц.	497
Jonas - Haay, (boll.) Menschenfresser -	III.	
Joppedublet, (Kammuschel) Ostrea Ziczac	VI.	
Jord-Humbla, (schwed.) hummel -	V2.	
Jota, (Phalæna) langes I	V.	689
Jo-Tyf, (norw) Struntjäger —	II.	
Joy - Owl, (engl.) Brandeule -	II.	95
	10	ZQ.

jozo	Julis	221
18		Th. S.
Jozo, (Gobius) Geeftindt		IV. 130
Ipeca-Guacu, (brafil.) Bifamente	-	II. 289
Ipecu, (braf.) Specht	. 11	II. 220
Iperuguiba, (braf.) Sauger		IV. 114
Iphicle, (Papilio) Beifband	4	V. 613
Ireos, (Apis) Schwertelbummel		G. 329
Ireos, (Curculio) Comertelfafer	-	€ 230
Iris, (Papilio) Chillervogel	- 4	V. 607
Irrganger, (Kliege) Mufca erratica		V2. 962
Irrgarten, Madrepora mæandrites		VI2. 680
Irrmange, Cimex erraticus	400	V. 503
Irus, (Donax) Bettlermuschel	· ·	VI. 261
Ifabelle, (Porgellane) Cyprea Ifabel	la	VI. 396
Ifis, eble Roralle .	1 1	VI2. 735
- afterias, eternftamm	the	VI2. 742
- dichotoma, Gliederforalle	-	VI2. 739
- entrocha, Raberforalle	•	VI2. 741
- hippuris, Konigeforalle		VI2. 736
- nobilis, Blutforalle		VI2. 743
- oehracea, rothe Gliederforalle	-	V12. 739
Aslander, (Schnirfelschnede) Helix	Pella	VI. 579
Blander, (Strandlaufer) Tringa Ist	landica	II. 113
Mocardia, (Cardium) Biegelrippe	-	VI. 249
Mogonum, (Oftrea) Winfelhafen	Char	VI. 315
Ispida, Eisvogel -		II. 236
Italiaans Vloertje, (holl ) Tiger	-	VI. 366
Staliener, (Grashupfer) Gryllus Ital	icus	V. 442
Judelle, (fr ) schwarzes Bafferhuhn		II. 427
Jubenfisch, Squalus Zygæna	-	111. 258
Juffers, (boll.) Jungfern, (Infeften	) -	V2. 763
Juffer - Slang, (boll.) Schoosschlange		III. 160
Juffertje, (boll ) Jungfer, (Balje)		VI. 423
Jugargen, (turt.) Saube	-	II. 497
Jugras, (fcmed.) Brandgans	-	11. 280
Jugulares, Saleflosser	-	IV. 65
Jujubenfrausel, Trochus Zizyphinu		VI. 535
Julie, (fr ) Riefin, (Baffernymphe)		V2. 770
Julis, (Labrus) Meerjunter	m Tall	IV. 204
Nistra 2		Julius

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	Th. E.
Julinstüfer, Scarabæus Fullo -	V. 77
Julus, Bielfuß .	V2. 1162
complanatus, Plattrucken -	V2. 1164
crassus, Dictiact	V2. 1163
— — fuscus, Braunring	V2. 1165
- Indus, Indianer -	V2. 1169
- maximus, Amerifener -	V2. 1165
ovalis, Geevielfuß -	V2. 1162
fabulosus, Sandwühler -	V2. 1164
— — terrestris, Erdvielfuß -	V2. 1163
Jumarra, Ochsenesel -	. L 455
Tument, (fr.) Stutte	L #45
Jungefrau, (Nachtschm.) Phalæna nupta	V. 687
Sungfer, (Solibod) Leptura virginea -	V. 288
Innafer, (Machtschm.) Phalæna Dominula	V. 681
Stungfer, (Nachtschm.) Phalama Virgo V. 66	3. 🖲. 314
Jungfer, (Mayagen) Psittacus Domicella	11. 142
Jungfer, (Tellmufchel) Tellina incarnata	VI. 238
Jungfer, (Benusmufchel) Venus virginea	VI. 278
Jungfer, (Balge) Voluta pallida -	VI. 423
Jungfern, (Infeften) Libellulæ -	V2. 763
- mit ausgebreiteten Flügeln rubend	V266
- mit weitauseinander ftebenden Augen	V2. 773
Jungfernbock, (hirschbock) Antilope Grimmia	S. 55
Jungfernberg, Cardium virgineum -	VI. 253
Jungfernfind, (Rachtschm.) Phalæna Parthenia	V. 682
Jungferntoralle, Madrepora virginea -	VI2. 705
Jungheffer, (Schwimmschnede) Nerita pulliger	a VI. 590
Jungwerfer, (Schnirfelschnede) Helix vivipara	VI. 575
Juniper - Titmoule, (engl ) Saubenmeife	H. 626
Anniugfafer, Scarabæus solstitialis -	V. 77
Junter, (Stinttafer) Buprestis nobilis -	V. 340
Jupatiima, (amerit ) Balbrage -	I. 292
Jupujuba, ameritanische Droffel -	II. 188
Jurar, (ital.) Haubentaucher -	II. 341
Jurtina, (Papillo) gelbes Sanbauge -	V. 606
Juvencus, (Cerambyx) Bollenbod	V. 271
Juvencus, (Sirex) Kurjangel -	V2. 839
Interest January marketing	Juweller,
	~~~~

<b>Ž</b> uwelier	@lfan	
Juivellet	Kafer	213
		Th. G.
Juwelier, (Matter) Coluber monisis	_	III. 182
Jwensk-Papegoja, (ichmed.) Rernbei	ffer	II. 546
Ixion, (Sphinx) Beigpuntt	-	V. 643
Jynx, Wendehals —	•	II. 216
Izanatl, (mex.) Raupentoder	•	II. 196
<b>Ŝ.</b>		
Kaanafa, (bebr.) Spigmaus		•
Kaap-hoorn, (boll.) Raapschnecke	•	I. 303
Kaapiche Heefter, (holl.) Seefiche		VI. 388
Kaaprene Heetter, (hou.) Geening	•	VI2. 765
Kaauu, (boll.) Doble	•	V2. 1049
Kabeljau, Gadus -		II. 175
- gemeiner, Gadus Morhua		IV. 78
- mit bren Rudenfloffen und eine	m Manaa	IV. 81
- mit bren Ruckenflossen und obn	n Succe	IV. 79
- mit einer einzigen Ruckenfloffe	e Sutt	IV. 90
- mit zwo Ruckenflossen	•	IV. 99
Rabeljauwurm, Lernæa branchialis	_	IV. 94 VI. 104
Kabje, (holl.) Rlippfleber	_	VI. 602
Rabinetsfafer, Byrrhus Mulworum	_	V1. 002 V. 120
Rachelot, Phyleter -		I. 497
Raderlad, (Perzellane) Cyprea helve	ola	VI. 401
Raderladen, (Infetten) Blattæ		. <b>C</b> . 263
Kaczka, (poln) Ente -	40	II. 299
Rafer, Scarabæus -	V. 49	3. <b>S.</b> 213
carolinifcher, Scarabeus Maria	nus	V. 68
- gruner, Scarabæus nitidus	•	V. 75
- beiliger, Scarabæus facer	-	V. 62
- leuchtenber, Scarabæus Lampyi	ris	V. 297
- mit geborntem Bruftftude	-	V. 49
- mit geborntem Copfe	•	V. 56
- magende, Byrrhi	•	V. 119
— — nagende, Byrrhi — — furinamischer, Scarabæus Surin:	amus	V. 75
— — sprischer, Scarabæus Syriacus	•	V. 77
- ungehörnte -		V. 69
— — vierfingeriger, Scarabæus tetra	dactylus 🕆	<b>6.</b> 216
•		Rafer,

· 1	₹6. <b>€.</b>
Rafer, weiffer, Scarabæus albus	· 6. 218
Westindischer, Scarabæus occiden	talis V. 83
Raferfliege, (G. Job. Fliege) Cantharis	Derme-
stoides -	V. 314
Rafetfliege, (Stechfliege) Conops fubcoleo	
Raferbahnchen, Chrysomela Caraboides	V. 201
Raferlaufe, (Rafermilben) -	V2. 1055
Rafermilbe, Acarus colcoptratorum	• V2. 1055
Rafermilbe, Acarus coleoptratus -	- V2. 1049
Rafermuscheln, Chitones -	VI. 196
Raferschnecke, Helix Scarabæus	• VI. 562
Raferschröter, Lucanus Caraboides	- V. 98
Rafermange, Cimex Searabæoides	• V. 478
Ralberlaus, Pedicalus vituli -	V2. 1032
Rampfer, (Raupentober) Ichneumon lucta	torius V2. 847
Rangurub, Mus Canguru -	<b>5</b> . 62
Rafemilbe, Acarus Siro -	V2. 1049
Rasetute, Conus Capitaneus	VI: 368
Káuplein, (Eule) Strix ulula	→ II, 104
Randen, geflectes, (Tute) Conus Magus	VI. 380
- granulirtes, (Tute) Conus granul	latus VI. 379
Raffer, (Summel) Apis Caffra	- V2. 903
Rafferin, (Bespe) Vespa Çaffra	- V2. 885
Rablafter, (Stachelbarfch) Gasterosteus C	
Rabibaden, (fleine Doble) Gracula calva	IL 194
Rabibauche, Apodes -	IV. 31
Rablbart, (Meerbarbe) Mullus imberbis	lV. 271
Rablbart, (Meerfage) Simia apella	`- l. 136
Rahlbart, (Schlangenfisch) Ophidium im	berbe IV. 59
Rahlflugel, (Graebupfer) Gryflus fubula	tus V. 421
Rabinugel, (Ruffeltafer) Curculio apteru	S V. 242
Rahlfuße, (Berghuhner) Tetraones pedibu	
Kahlfuß, (Schuhu)	II. 95
Rabibals, (Gener) Vultur Papa	- IL 54
Rablbaut, (Klippfisch) Chætodon alepido	
Rahltopf, (Gener) Vultur Monachus	- II. 56
Rabitopf, (Decht) Elox gymnocephalus	1V. 343
Rabifopf, Mycteria -	11. 366
	Rabb

220	Municipatore	Ab alesses   sa s.	<del>-7</del>	٠.
			Th.	Ġ,
Sameelpari	der, Cervus camelo	pardalis		379
Sameelran	ne. (Ridiad)	-	. V.	672
Sameelicon	ede, (Flugelfchnede)	Strombus Luc	cifer VL	484
Rameelftra	uß, Struthio Camel	us -	. IL	446
Kamelos.	(griech.) Kanteël	<b>~</b>	I	365
Kamkoraa	l, (boa.) Sectainmi	· · -		767
Kamleeuri	ik, (holl.) Rammler	de ÷	IV.	101
Samme (93	aftard) Anomia pel	Rinata -	VI	. 318
Sammanfte.	er. Oftrea diluviana	l -	VI	313
Santmblafe	; (Ceeblase) Holot	huria Thalia	VI.	, 98
<b>Ramm</b> blat:	: (Driesmuschel) M	ytilus itons		330
Rammdubl	et. (Beramuschel) C	ardium edule	. VI	. 251
Kammerbit	mer, (Eaglabin,) Pal	pilio Pamnon		. 568
Rammerbe	rr, (Tagidhn.) Papi	Mo Loilice		. 567
<b>Cammieriu</b>	nafer, (Rachtschm.)	Phalæna anci	lia V	682
<b>Cammeriu</b>	nter: (Tagicom.) Pa	pilio Trollus	<b>V</b>	. 567
Rammfliea	e, (Stintfliege) Her	merobius pes	tini	
	cornis	<del></del>	,V2	i 792
Kammfuß.	(Baftardivefpe) Sp	hex pettinipe		. 849
Rammbeuf	chrecke, (Grasbupfe	r) Gryllus cri	status V	• 437
Rammborn	, (Langfuß) Tipula	pectinicornis	5 V2	930
Rammborn	, (Saamentafer) Bri	nchus pettinic	ornis V	209
Kammborn	i (S. Joh. Kliege)	Cantharis po&	tinata V	, 311
Rammfiefe	r, (Grundel) Gobit	s pectinirostri	s ty	. 13 <b>i</b>
	an, (Eidechse) Lace		iic	103
Rammlerch	e, (Nosfisch) Blenn	ius cristatus	IV	iot .
Rammusche		J VI	: 300i <b>E</b>	, 368
	mit gleichseitigen £			; 301
	mit Schiefen Ohren		vi	. 31t
	mit ungleichen Dhi			306
	taube, (Austern)	_	, VI	, ##
Rammirade	m, (Cibechfe) Lacei	ita fuperciliof	a III	. #
Rammeude	n, (Nachtschm.) Phi	ilænæ Bomby	ces V	. 669
	till abhängigen Bli	igeln -	• •	. 677
Rammfcheil	de, Solen bullatus	<b> </b>		. 259
Kammfchna	uge, (Krobbe) Cano	er cristatus	Vs.	
Kammfchre	anj, (Seeftern) Afte	ria pettinata	-	10
	, (Rachtschm.) Pha			. 44
			\$	ampl

Rammodinge	Karmosamame		227
_		ŶŊ.	. <b>.</b>
Rammoanje, Cimex cristatus	•		494
Kampes (griech) Raupe	<b>.</b>	V.	544
Rampfhabn, (Strandlaufer)	Tringa bugnak	Ħ:	404
Randberin; (Weipe) Sphex C	anadenfis	V2	886
Kanaritie, (boll.) Ranarienfc	nede =	VI.	483
Kaneelwafelen, (holl:) Binin	nesmaffelit	Vi	408
Ranguruh; (Daus) Mus Can	girii 🛎	€.	
Kanin, (fcwed.) Kaninchen			322
Raninchen; (Hunfe) Lepus Eu	niculus 🚤		322
Raninchenhaut, (Citabe) Cica	da ćimičijar <b>ia</b>	v.	455
Rdninchenmaus, Mus Paca	-		34t
Raninthenwiefel, Muftella Fut	· 6	Ť.	27 i
Kannewaffer, (Boll.) Buften	foratrius	VI2.	272
Ranlitevogel, Tringa Canutu	ė .	TÌ.	412
Rarduniaus, Pediculus capor	nid =	<b>V2</b> :	412 201
Kapellen, (boll.) Schmetterit	ino -	\$7.	1030
Rapet; (Pfeilschwang) Sphing	ngt t Cashard	47.	55 <b>\$</b> 54 <b>\$</b>
Kaphtar, (perf.) Taube	r cerpera	it	040
Raputar, (Pett) Laube	tallicaemia	₹ħ.	497 320
Remarked Origins sucial	etije ireliiioliiii	V 1.	320
Rappengrille, (Grasburfer) G	atus tita::::	9.	07
Rappenmerle, Turdus Madag	rynus umoraculatu Albatikaika	* × ·	420
Kappennierte, Juraus waarg	alcalicims.		139
Rappenschlange, (Brillenschlan	ء ڏمد	111	Še0
Rappentaucher, Mergus cucul	gr) Natilė a	II.	185
A. American Perusanting	ratus —	11.	303
Rappentrager, (Rernbetfer) L Kappentrager, (Nachtschil.) F	oxia cucullata	Æ.	152
Kapuziner, (Meertage) Simil	riaizena umpratica Contriba	Y,	693
Karamis, (neu griech:) Rrebe	Cahnsing -	ti. li	136
Ratailis, Cyprinus Cafassu	ė s	V2. 1	1123
Rardulite, Cypinius Caraniu Rarduliteniuurii, Lerniea cyp		įv.	354
Adroinal, (Merle) Tanagra n	rillacea -	VĮ.	105
Karet-hoorn, (holl.) Schilds		11. \$7\$	177
Sareischilderote, Testudo care	cotemborfemme	Vİ.	390
Kargos, (perf.) Haafe	icia —	1114	30
Karides, (neu griech.) Squid	antická i	 	318
Sartat, (Schnirtelfchiecke) He	tuttos Necesia	V2. i VI	
Ademosinivanje, Cimen Kern	alitini militare	V I. Šj	,
anticologicality office werit	iemiųs –		₹Ô∦ Atal
•	<i>F</i> 9	- 32	ares

		24
	Th.	
Raroliner, (Summel) Apis Carolina	V2.	
Rarolinerin, (Wefpe) Velpa Carolina -	V2.	
Rarpfe, Cyprinus - IV. 378		
Caapscher, Cyprinus gonorynchus	IV.	
- gemeiner, Cyprinus Carpio -	IV.	
- mit gabelformigem Schwanze -	IV.	
- mit ungetheiltem Schwanze -	IV.	
Rarpfenmurmel, Mormyrus Cyprinoides	IV.	
Racpfensalm, Salmo Cyprinoides -	IV.	
Kartelhoorntje, (boll ) Rerbenfcnede	VI.	
Rartenvogel, (Nachtschm.) Phalæna dipsacea		702
Karthageensch-Dubblet, (boll.) Biegelrippe		249
Karthageensche Klipphoorn, (holl.) farthagent	•	
sche Porzellane –		394
	V2.	
Raftanienvogel, (Rranmetsvogel) Turdus caftaneu		
Rasuar, Struthio Casuarius		450
Kasuarius, (boll.) Rasuar	II.	450
Kat, (boll.) Rage		229
Ratermels, Silurus Catus	IV.	
Katje, (boll.) Larve ber großen Duden	V2.	931
Ratondieb, (Fliegenfanger) Muscicapa Paradili		195
Katodon, (Physeter) Witsish	I.	497
Katrakas, peruvianischer Sabn	II.	472
Katte-poot, (boll) Ragenfuß	VI.	308
Katte-tong, (hold) Rakenjunge +	VI.	
Kat - Vil, (holl.) Rageneule		92
Kat - vis, (boll) Raterwels .		298
Kaukai-kann, (chin.) Scaffvogel		118
Kaulbarsch, Perca cernua	IV.	
Raultopf, (Knorrhabu) Cottus Gobio	IV.	137
Kauwoerde Zaatsworm, (boll.) einmundiger		
	VI2.	-
	9. 🥌	
— — brasilianische, Felis concolor —	<b>6</b> .	
- fliegende, (Gefrenftthier) Lemur volans	L	149
- milbe, Felis Pardalis		239
Lageneule, (Rachtschm.) Phalæna processionen		663
	20	Bem

	ŹÞ.	6
Rennzeichen ber Gefchiechter ber zwepten Claffe	Ц.	39
- ber Ordnungen und Gefchlechter ber fai	N.	
genden Thiere		- 54
- ber vier und zwanzig Geschlechter ber A		
phibten	ĮII.	9
ber imenten Claffe ber Thiere -	Ħ.	27
Kephir, (hebr.) balbgemachsener Lome -	. <b>L</b>	<u> 230</u>
Keratophyta, Dornforallen - VIa.	642.	748
Kerbenaffel. Oniscus crenulatus	<b>.</b>	349
Rerbenmaul, (Ceebaafe) Tethis fimbria	VI.	93
Rerbenmuschel, (Miesmuschel) Mytilus exustus	VI.	
Kerbenschnecke, Turbo crenellus	VĮ.	551
Kermes, (arab) Burm -	V.	539
Kermesbeer, (Schilblaus) Coccus ilicis -	V.	
Rernbeiffer, Loxia - II. 544	, <b>S</b> .	148
Rernbeiffer, (Saamentafer) Bruchus Baftris	V.	208
Kernell, (clfaff.) Binterbalbente -	II.	296
Rernfresser, Loxia enucleator ==	ĬΪ	
Rernwachter, (Ruffelfafer) Curoulia pericarpic	ış V.	223
Kerthion, (griech.) Baumlaufer -	IĮ.	253
Kervari, (morgent ) Regenpfeifer	ĮĮ,	420
Keschr, (arab.) Rilbarsch =	ĮV,	230
Keschr, (arab.) Risbarsch Kestrell, (engl.) Thurmfalts	II.	go
Rettenforgle, Tubipora catenularia -	VI2,	
Rettenvogel, (Rachtichm.) Phalmna mituata	V,	
Reule, (Flügelschnecke) Strombus clavus	Œ,	
Reulfuß, (Bastardwefoe) Sphex clavipes	V2.	
Reulfuß, (Rliege) Musca clavipes -	<b>V</b> ą.	
Reulfuß, (G. inne) Aranea clavipes -	V2, 1	107
Reulbornchen, (Golbbabnchen) Chryfamela ela-		
vicornis 🖶	V.	173
Reulhorn, (Biene) Apis clavicarnis -	V2.	801
Reulhorn, (Bange) Cimex clavicornis	V.	489
Reulmanie. Cimex clavatus	Υ,	501
Keurslyf-Korallyn, (boll.) Pangerforalline	VI2.	859
Kevel, afrifanisches Schmarzborn, (Dirschest)	€,	54
Kianhia, guajquischer Papagen -		
Kiankis, (guojan,) Menchentesse -	II. Kic	<b>56</b>
· ·	- KIC	TIP.

Kichla	Kinkhorn	231
		Eb. C.
Kichla, (griech.) Trammetsvogel		II. 527
Kichli, (hebr.) Krammetsvogel	•	11. 127
Kid, (engl.) Geiff	•	I. 494
Riebig, (Strandlaufer) Tringa V	anellus	II. 496
- gebornter, (Spornflugel) P	Parra •	II. 430
Riebigen, (Blafe) Bulla ampulla	-	VI. 408
Riebisporjellane, Cyprea vanelli	<b>₹</b>	VI, 392
Riefenfuß, (Schilbflob) Monoculi	as apus	V2. 1141
Rieferbiene, Apis maxillosa	* -	V2. 894
Rieferwurm, (Pride) Petromyzon	n branchialis	III. 234
Rielbod, (Bodfafer) Cerambyx	carinatus	<b>5.</b> 239
Rielfafer, (Rugelfafer) Curculio o		<b>E.</b> 233
Rielruden, (Ratter) Coluber cari	natus	IIL 192
Rielrucen, (Wels) Silurus carina	tus -	IV. 298
Rielschild, (Schildfrote) Testudo	carinatá	III. 45
Rielträger, (Schröter) Lucanus ci		V 97
Riemendeckel, (Stugtopf) Coriphe	oena branchio;	
flega	<b>-</b> `	IV. 125
Riemenfleck, (Lippfisch) Labrus ope	étenjaris	IV. 200
Riemenmurmer, Lernæs	-	VI, 104
Kieuw worm, (boll.) Kiemenwur	:m -	VI. 104
Kievit, (boll.) Kiebis	₩.	II. 406
Kievits - ey, (hou.) Riebisen		VI. 408
Kievits-hoorn, (holl.) Riebispors	euane	VI. 392
Kik, (bebr.) Kropfgans	Cinal Cin	II. 324
Kik, Kikker, Kikvorsch, (holl.)	Qtolm .	III. 48
Kikvorsch, (boll) Sommersproffe Kill-deer, (engl.) virginischer Sch	— <u> </u>	VL 479
Killer (Delahima) Minhan	hreher –	II. 416
Killer, (Delphinus) Morber	_ 7	I. 107 III. 79
Kimbula, (çingal.) Krofobill	<b>—</b>	III. 79
Kimfak, (turf.) Krofodill	e nuerners	©. 363
Rindbetterin, (Benusmufchel) Vont	de hotethers	ĮV. 386
King-Jo, (javan ) Goldfisch Kingsfisher, (engl.) Eisvogel	_	II. 236
Kinkhoorens, (holl.) Kinkhorner		VI. 442
Kinkhoorn, (holl.) Gitterhorn	7	VI. 468
Rinkhorn, Buccinum	VI. 442.	
- arvanisches, (gezackte Beige		VI. 514
P " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	4	Rinte
•	▼	Six sixial.

Klappernatter	<b>High and St.</b>	233
$\mathbf{x} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$		Th. S.
Rlappernatter, Coluber crotalinu	i <b>s</b> - 1.	<b>E</b> . 189
Klapperschlange, Crotalus	-	III. 133
Klauenflugel, (Rachtschm.) Phalæ	na uncana	V. 723
Klauenfuß, (Kliege) Musca ungu	lata –	V2. 974
Klauenhorn, (Bocktafer) Ceramb	yx batus (	V. 249
Rlebaufter, (Baftard) Anomia E	phippium	VI. 319
Riebforalline, Sertularia parasitio		VI2. 860
Rlebwurm, (Bartwurm)	•	VI. 44
Ricebiatnafe, (Fledermaus) Vefp	erțilio hastatus	6. 14
Rleidermotte, (Nachtschm.) Phalæ	na sarcitella	V. 741
Rleinauge, (Rachclot) Physeter m	icrops	I. 501
Rleinauge, (Matter) Coluber Ty	phlus 💂	III. 170
Kleinauge, (Tagschm.) Papilio O	enone	V. 601
Rleinkafer, Dermestes		V. 99
- furinamischer, Dermeste	s Surinamenfis	V. 109
Rleintorn, (Stinftafer) Bupresti	s granularis	V. 342
Kleinfreus, (Erbfafer) Carabus	Crux minor	<b>V.</b> 366
Kleinling, (Nachtschm.) Phalæna	puſaria	V. 710
Rleinschwang, (Tagschm.) Papilio	Polydorus	V. 568
Rleinschreiber, (Rleintafer) Dorn	aestes microgra	١-
phus		V, 104
Aleinforinger, (Springfafer) Elate	er Dermestoide	
Rleinspringer, (Springf.) Elater	minutus	V. 325
Rieisteraale, Chaos redivivum	•	VI2. 917
Rlepper, (fchweig) eine Urt Rernt	seister -	II. 546
Rletteumotte, (Rachtschm.) Phalæ	ina lapella	V. 742
Klieft, (seeland.) Lumpfisch	-	III. 330
Klipklever, (holl.) Klippfleber	-	VI. 602
Klipkousen, (boll.) Porzellanen		VI. 38₹
Rlippenfpringer, (Grasbupfer)	Gryllus coeru	•
lans	_	V. 442
Rlippenmurm, (Rellerwurm) Onife	cus icopularum	V2. 1151
Klippfich, Chætodan	•	IV. 162
banbirter, Chetodon ft	riatus 🖚	IV. 171
- dorniger, (Leberfich)	•	IV. 305
- gestreifter, Chætodon li	ineatus	IV. 159
- großschuppiger, Chætoe	don macrolopi	•
dotus	•	IV. 170
•	Pr	@linna

		Şb.	<b>Ģ</b> ,
Klippfisch, (gefaliner und an ber Luft g Rabeljau)	etroffnete -	r IV.	84
Alippfifch, (Meerwolf)	· •	IV.	55
Alippfleber, Patelle -	VI. 60	2, <b>G</b> .	
mit durchbohrtem Wirbel	97	VI.	615
- mit einer Lippe	-		603
- mit glattem Ranbe	•		613
mit fpigigen gefrummtem	dirbel `		610
mit jackigem Umfange			606
Rlippichnede, große, (Ligerporzellane)	•		395
Rloppeltuffen, (Tute) Conus Generalis	3		367
Kloet plevier, (boll.) Sturmfegler	~		410
Kloet plevier, (boll.) Sturmfegler Kloot-diertjes, (boll.) Rugeltbierchen		Vl2.	
Rlopfer, (Dolsmurm) Termes pullaton	rius	V2. 1	
Kloptoretje, (boll.) Daustaferchen	4		105
Rlofterpogel, (Rachtidm) Phalæna tri	<b>Stata</b>		7.16
Rloftermengel, (Bachftelge) Motacilla a	tricapilla		610
Kluit, (boll ) Bafferfabler			422
Knabbelviffch, (boll ) Inotenfifc	٠ ـــ		493
Knarrhoenderen, (boll.) Rnarthubner	•	II.	440
Snarrbuhner, Pfophiæ -	,	II.	440
Anebelbart, (Baftarbivefpe) Sphex my	<b>Staces</b>	V2.	870
Aneiffer. (Servent.) Boa contortrix	-	ĮĮI.	144
Aneticher, (Raupentober) Ichneuman	:onstricto	•	• •
rius		V2,	845
Knipa, (fcmeb.) Quatente	· 3	IJ.	292
Knipologos, (griech.) weiffe Bachftelje	_	II.	607
Knip-toren, (boll.) Opringrater	-	V,	315
Anicider, (Grasbupter) Grylius icrial	alus	V.	442
Knobbel-hogren, (boll.) Garmaner, Mi	esenobe VI	. 547.	548
Knoppel-pen, (boll.) Körnernadel	_	VI.	524
Endpfchen, glattes, (Porgellane) Cypres	globulus	VΙ,	403
forniges, (Porgellane) Cyprea	cicercula	VI.	403
Knoll, Knoll, hoorn, Knolletje, Choff.	) Rube	γı,	4IE
Anopf. (Rrausel) Trachus modulus	• ,	VI.	530
Anopfplatte, (Rlippfleber) Patella mam	millaris	VI,	611
Anorrbarich, Perca Cattoides	•	<b>1V.</b>	
Anorrhadn, Cottus	IV,	133.	
च्चारित प्रकृष्य करिक्र विक्रा राज्य । प्र			IOTTO

2	Th.	G,
Enprebahn, vierborniger, Cettus quadricornis	IV.	135
Knot, (engl.) Kanutsvogel	II,	412
Anotenbandnadel, (Balge) Voluta plicaria	VL	439
Anotenbund, (Prausel) Trochus tuber	VI.	534
Anotenfisch, (Ballfisch) Balmna Musculus I, 49	13. S	69
Anotenfuß, (Milbe) Acarus geniculatus	V2, 1	1053
Anotenkette, (Kinkhorn) Buccinum manile	₭.	376
Ruotenforalle, Madrepora truncata -	VI2.	69I
Anotennabel, (Schwimmichnecke) Norita cannen	a VI.	585
Anptenobr, (Meerobr) Haliotis tuberculata		598
Anotenpatelle, (Alipptieber) Patella tuberculata	VI.	610
Ruptenructen, (Rafermufchel) Chiton tuberculatu		197
Rnotenscheite; Ascidia vagabunda -	€.	358
Anetenfchelle, (Rinfhorn) Buccinum echinophorup	n VI.	447
Anotenformenim, Spongia nodoja	VI2.	803
Anotenstern, Asteria nodosa -	VI,	136
Anotenfturmbaube, (Rinthorn) Buccinum tube-		
rolum -	VI.	410
Knyp - Oog, (hou.) Bibbauge -		88
Robet, (Balte) Faico vespertinus -		83
Kobios, (griech.) Grundel - IV.	126,	129
жоф, (Bocklefer) Cerambyx coquus -	V.	268
Kochlios, (griech.) Erdschnecke vone Saus	VI.	59
Rocherkoralle, caspische, Tubularia Caspia		382
Rochernafe, (Barfching) Perca argentea		243
Köcherthierchen, (Robrenpolypen) —		635
Kochermurm, (Solihobrer) -		631
Robier, (Mecle) Tanagra atrata		575
Robler, (Rugelfafer) Curculia aterrimus		217
Sobjer, (Schlupfwespe) Tenthredo atra		829
Sablerbarich, Perça atraria		235
Roblerin, (Biene) Apis carbonaria -	V2,	
Roblerebod, (Bodtofer) Cerambyx Kachleri		270
Kockkock, (boll.) Seeguckguck, Beinfisch	-Щ,	308
Koekkoekvisschen, (host.) Guckgucksiche	III.	308
Sonts, (Logichm.) Papilio Priamus .	V.	568
König der Woumpawen, (Rablhals) -	II.	54
Konig, fleiner, (Halfe) Falco Regulus -	5.	
, ±	~	Rônie
•	•	44.64

## 236 Königinnennatter Kokerdiertje

• •	Eħ.	Q
Roniginnennatter, Coluber Regins	Ш.	
Koniginnenpage, (Tagichm) Papilio Machaon	V.	579
Konigsammer, Emberiza regia -	II.	570
Konigefisch, (Breitfisch) -	IV.	262
Ronigstoralle, Isis hippuris -	VI2.	
Konigsmantel, (Rammmuschel) Oftrea pallium	VI.	300
Ronigsschlange, (Gerrent.) Boa constrictor	III.	146
Ronigsvogel, (Paradiesvogel) Paradisea regia	II.	199
Ronigsweihe, Milvus regalis -	H.	72
Koe-Oogen, (boll.) Ruhaugen -	¥I.	
Rorbeifreund, (Rachtichm ) Phalæna chærophy		•
lata -	V.	713
Rornerdede, (Rugelfafer) Curculio granulatus	V.	
Rornerflappe, (Lajarustlappe) Spondylus antique	<b>1</b> -	
tus	Œ.	366
Rornernabel, (Stachelichn.) Murex granulatus	· VI.	524
Rornernautilus, Nautilus crispus -	VL	356
Rornerrohre, Serpula granulata -	VI.	625
Rornerschild, (Rlippfleber) Patella granatina	VI.	608
	V2. 1	107
Kornerwarje, (Erdfafer) Carabus granulatus	V.	353
Rorperbau der Infeften -	V.	3
Koet, (holl.) schwarzes Wasserhuhn -	II.	427
Koete-laoet, (holl.) Geelaus, Sauger	IV.	113
Roffersich, Ostracion tubereulatus -	III.	
Kofferhoorntje, (holl.) weiffes Rufferhornchen	VI.	
Roble, (leuchtender Rafer) Lampyris ignita	V.	
Roblenstaub, (Rachtschm.) Phalæna logiana	<b>V.</b>	
Robleule, (Rachtschm) Phalena braffice	V.	
Sohlans, Aphis brassicæ -	V.	
Rohlmeife, Parus major -		626
Rohlmund, (Rabeljau) Gadus carbonarius	IV.	93
Roblfaame, (Conirfelichnete) Helix contorta	VI.	
Roblstrunt, Madrepora fastigiata	VI2.	
Kohltraft, (fcwed ) Amfel -		536
Roblweißling, gemeiner, (Lagfchm.) Papilio braffic		
Robiwurm, (Nachtschm.) Phalæna forficalis	V.	
Kokerdiertje, (holl.) Robrenpolypen .	VI.	635
2 v dv »	Ko	_

Rorallie

• -	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	20.10010000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Ýħ. Č.
Korallinen,	Sertularise	<b>.</b>	VI2. 83t
Korallynen	, (holl.) Korallinen		V12. 831
	be) Arca granosa	<b>÷</b>	VI. 296
Rorbmufche	In, Mactræ	/ -	VL 254
Korf-dubl	bletten, (bolt.) Kork	imufebelia	VI. 254
	(boll.) Birkbahn	=	11. 481
Korhoende	rs, (hou) Spigenro	deni =	VI: 38t
Koris, (gti	ech) Wange	-	V. 475
Kortbaunt,	Alcyonium arboreu	im 🛥	VI2: 774
Corfniere,	Alcyonium agaricum	a <u> </u>	VI2, 771
20rff@wam	im, Alcyonium ipon	giolum	VI2. 788
Portmarie.	Alcyonium mammil	latum -	VI2 781
Pormoran,	(Peletan) Pelecarius	s Carbo =	ÌI. 328
Corn. (Rai	utilus) Nautilus Gra	anum -	VI. 360
Pornabre: (	(Rachtschm.) Phalæn	a tritici -	V. 100
Pornabrenfi	ico, Atherina		iV. 349
	facolinischer, Athe	rina Menidia	IV. 351
	mittellandischer, A	therina Hepfel	
Pornfreffer.	(Golbhahnchen) Ch	ryfomela cere	i.
*orniceller)	lis	_	V. 198
Bardfreffer.	(Reinbeiffer) Loxis	i panicivora	11, 550
	(Saamentafer) Bru		
	en, (schwed) Wacht		IL 436
Population	(Waffertafer) Dytile	rne <del>öráll</del> ísfað	V. 350
Baendiirrit	(Rachtichia) Phale	ma esanella	V. 742
	tother, (Rugeltafer		
20 timentini	mentarius	, curcum ac	• V. 218
<b>ć</b>	podrzer, Curculia a	rdán apine	V. 219
	lechet, (Raupentober		~
Watmantude	cális	X remiensor.	V2. 861
Körp, (ján			11 ids
Korrelige H	Snopje, (Boll) terni	الاستأثارية فالمتراف	
Kottenge 1	Ten, (holl.) Seering	Men winhinken	V12. 801
	Korydalos, (gricch.)		11. 519
	(griech.) Stußköpfe	ctitye	IV. No
	Amfel, Merle	<u>.</u>	11. 436
	(poln.) Dachs	•	I. de
	Musca tedax	•	V2. 94
enthine Rel	TATING CASING	<b>.</b>	<b>C</b> oth

- - puntitrte, Trochus punctatus

- werfehrte, Trochus perversus

Kranterdieb, (Bohrtafer) Ptimes fur

Rraußler, (Raupentober) lehneumon crifpatorius Va. 846

Digitized by Google

VL 438

VI. 537

V. 113 **L**eagen

Reebs, Cancer  - cassischer, Cancer trixapus - mit dornigem Rückenschilde - mit glattem Rückenschilde - mit böckerichem Rückenschilde - mit böckerichem Rückenschilde - mit böckerichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - mit länglichem Rückenschilde - v. 1139  Rrebssschessenschaftliche, (Schildsoh) Monoculus Polyphemus - lyphemus - v. 1139  Rrebsscherenschaftline, Sertülaria loricata - v. 1139  Rrebsscherenschaftline, Sertülaria loricata - v. 1139  Rrebsscherenschaftline, Sertülaria loricata - v. 1050 - 341  Kreest, (host.) Rrebs - v. 1050 - 341  Kreest, (host.) Brissen - v. 1050 - 341  Kreest, (host.) Brissen - v. 1050 - 341  Kreest, (host.) Brissen - v. 1050 - 341  Kreest, (host.) Bibder - v. 1050 - 341  Kreest, (host.) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Dicada Crux - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Cicada Crux - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Cicada Crux - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Cicada Crux - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Cicada Crux - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1050 - 341  Kreusträger, (Eistabe) Bibder - v. 1	<b>Ārebs</b>	Krojestein	241
Reche, Cancer  — cafpischer, Cancer trixapus — mit dornigem Rückenschilde — mit glattem Rückenschilde — mit böckerichem Rückenschilde — mit fürzem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — mit langlichem Rückenschilde — wit langlichem Rückenschilde — wit langlichem Rückenschilde — wit langlichem Rückenschilde — wit langlichem V2. 1139  Rechesschenschilden, Parasitici — v2. 1139  Rechesschilden, Parasitici — v2. 1139  V2. 1139  V2. 1139  V2. 1139  V2. 1139  V2. 1139  V2. 1139  V2. 1139  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1059. 341  V2. 1		area follows:	
— caspischee, Cancer trixapus — 6. 346 — mit bornigem Ruckenschilde — V2. 1126 — mit shockerichem Ruckenschilde — V2. 1126 — mit shockerichem Ruckenschilde — V2. 1126 — mit shockerichem Ruckenschilde — V2. 1131 — mit langlichem Ruckenschilde — V2. 1131 — mit langlichem Ruckenschilde — V2. 1139 — moluftischen, (Schildshob) Monoculus Polyphemus — V2. 1139 Rrebsfressen, (Poblichnabel) Cancroma Camero.  phaga — V2. 1139 Rrebsfrabben, Parasitici — V2. 1039 Rrebsfrabben, Parasitici — V2. 1088 Rrebsschinnen, Phalangia — V2. 1059. — 341 Kreest, (boll.) Brebs — V2. 1059. — 341 Kreest, (boll.) Bristen — V. 415 Rrengbod, (boll.) Bristen — V. 415 Rrengbod, (Sirschobod) Antilope scripta — V. 453 Rrengsicge, (Einstelege) Hemerobius cruciatus — V. 453 Rrengssche, (Sirschobod) Antilope scripta — V. 453 Rrengssche, (Cisabe) Cicada cruciata — V2. 1070 Rrengsschee, (Cisabe) Cicada cruciata — V2. 1070 Rrengsschee, (Cisabe) Cicada cruciata — V2. 1070 Rrengsschee, (Müßeltäser) Curculio Cruciser — Rrengstager, (Ruchestichen) Phalæna Xylostam — V. 453 Rrengstager, (Ruchtschu) Phalæna Xylostam — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) Elater cruciatus — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser) — V. 453 Rrengstrager, (Springsäser)	Rrebe, Cancer -	Ve ran	
mit bornigem Ruckenschilde  mit glattem Ruckenschilde  mit höckerichem Ruckenschilde  mit höckerichem Ruckenschilde  mit furgem Ruckenschilde  mit furgem Ruckenschilde  mit furgem Ruckenschilde  mit furgem Ruckenschilde  v2. 1131  mit langlichem Ruckenschilde  molutsischer, (Schildssoh) Monoculus Poliphemus  Rebesschescher, (Doblichnabel) Cancroma Carrero  lyphemus  Rebesschen, Parasitici  Rebesscherenscrassine, Sertularia loricata  Rebesscherenscrassine, Sertularia loricata  Rebesschinnen, Phalangia  V2. 1059. ©. 341  Kreels, (boll.) Rrebs  Kreels, (boll.) Bristen  Kreng-rave, (engl.) Menschenscriftet  Rrespecifisting, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rrespecifisting, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rrespecifisting, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rrespecifisting, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rrespecifisting, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rrespecifisting, (Cistabe) Cicada Crux  Rrespecifisting, (Cistabe) Cicada cruciata  Rrespecifistic, buckliche, Rana gibbosa  Rrespsträger, (Cistabe) Cicada cruciata  Rrespsträger, (Cistabe) Cicada cruciata  Rrespsträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylostoana  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Curculio Crucifer  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Curculio Crucifer  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Cotilbsafer) Cassida cruciata  Rrespsträger, (Coti	cafrifcher, Cancer trixat	0ù5 -	~
mit glattem Ruckenschilde  mit höckerichem Ruckenschilde  mit furgem Ruckenschilde  mit furgem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  v2. 1131  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1129  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1059  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1093  V2. 1086  Rrebschpinnen, Phalangia Pallinenscheshcheshcheshcheshcheshcheshcheshc	- mit bornigem Ruckenschil	de 🗕	~ JT-
mit hockerichem Ruckenschilde  — mit furgem Ruckenschilde  — mit furgem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — mit langlichem Ruckenschilde  — wit langlichem Ruckenschilde  — langlichem Ruckenschilde  Rrebsfresser, (Doblischnabel) Cancroma Cancrophaga  Rrebsfressen, Parasitici  — Phaga  Rrebsschen, Parasitici  — V2. 1139  Rrebsschenschine, Parasitici  — V2. 1139  Rrebsscherenschaften  — V2. 1139  Rrebsschenschine, Sertularia loricata  — V2. 1086  Rrebsschinen, Parasitici  — V2. 1086  Rrebsschinen, Phalangia  — V2. 1086  Rrebsschinen, Phalangia  — V2. 1093  Rrebsschinen, Phalangia  — V2. 1093  Rrebsschisting, (Cagschm.) Papilio Cardamines  — V2. 1093  Rreugsschisting, (Cagschm.) Papilio Cardamines  Rreugsschisting, (Cagschm.) Papilio Cardamines  Rreugsschisting, (Casschinen) Papilio Cardamines  Rreugsschisting, (Cistabe) Cicada Crux  Rreugsschisting, (Cistabe) Cicada Crux  Rreugsschistinge, (Cistabe) Cicada cruciata  Rreugsträger, (Cistabe) Cicada cruciata  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen) Phalæna Xylostoan  Rreugsträger, (Ruckschinen)  Rreugsträger, (Ruckschinen)  Rreugsträger, (R	mit glattem Ruckenschild		V2. 1123
mit furjem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  mit langlichem Ruckenschilde  lyphemus  Rebesfresser, (Dobsschilde) Cancroma Cancrophaga  Rebesfresser, (Dobsschilde) Cancroma Cancrophaga  Rebesfressen, Parasitici  Rebeschecknessenschilder, Sertularia loricata  Vl. 1688  Rebeschinne, Aranea cancriformis  V2. 1088  Rebeschinnen, Phalangia  V2. 1089  Kreest, (bost.) Bristen  Kreest, (bost.) Bristen  Kreng-rave, (engl.) Menschenschschilder  Responsisting, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rengliche, (Eisabe) Cicada Crux  Rengbock, (Dirschbock) Antilope scripta  Rengsschie, (Eisabe) Cicada Crux  Rengsschie, (Eisabe) Hemerobius cruciatus  Rengsträger, (Eisabe) Cicada cruciata  Rengsträger, (Eisabe) Cicada cruciata  Rengsträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteane  V. 453  Rengsträger, (Ruckstschm.) Phalæna Xylosteane  Rengsträger, (Ruskstscher) Curculio Crucifer  Rengsträger, (Ruskstscher) Curculio Cruciata  Rengsträger, (Ruskstscher) Cassida cruciata  Rengsträger, (Ruskstscher) Elater cruciatus  Rengsträger, (Epringsäser) Elater cruciatus  Rengsträger, (Epringsäser) Elater cruciatus  Rengsträger, (Pringsäser) Elater cruciatus  Rengsträger, (Pringsäser) Elater cruciatus  Rengsträger, (Rusc) Culex reptans  Reichente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas Erecca  Rriechente, Anas	- mit boderichem Rudenfo	bilde -	
mit langlichem Kudenschilde  moluffischer, (Schildssoh) Monoculus Polyphemus Rrebssresser, (Pohlschnabel) Cancroma Cancrophaga Rrebsscheften, Parastici Rrebsscheerensoraltime, Sertularia loricata Rrebsscheerensoraltime, Sertularia loricata Rrebsscheerensoraltime, Sertularia loricata Rrebsscheerensoraltime, Sertularia loricata Rrebsschinnen, Phalangia V2. 1059. ©. 341 Kreest, (host) Rrebs Kreest, (host) Bristen Kreng-rave, (engl.) Menschenstresser Kreest, (host.) Gristen Kreng-rave, (engl.) Menschenstresser Rrespecifising, (Tagschm.) Papilso Cardamines V. 493 Krengbock, (Histophoof) Antilope scripta Rrengssche, (Eitsche) Cicada Crux V. 453 Rrengssche, (Eitsche) Rana gibbosa Rrengsträger, (Eitsche) Rana gibbosa Rrengsträger, (Eitsche) Cicada cruciata Rrengsträger, (Eitsche) Cicada cruciata V2. 1070 Rrengsträger, (Eitsche) Cicada cruciata V2. 1070 Rrengsträger, (Edtildssche) Phalæna Xylosteans Rrengsträger, (Edtildssche) Curculio Cruciser Rrengsträger, (Budscham.) Phalæna Xylosteans Rrengsträger, (Edtildssche) Cassida cruciata V. 139 Rrengsträger, (Edtildssche) Curculio Cruciser Rrengsträger, (Edtildssche) Cassida cruciata V. 139 Rrengsträger, (Epringsscher) Elater cruciatus V. 320 Rrengsträger, (Emex Andrete V. 497 Rriechende Anhybibien, Reptiles Rriechende, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Culatra reptans Rriechente, Culatra reptans Rriechente, Culatra reptans Rriechente, Tubipora servens Rriechente, Tubipora servens Rriechente, Madrepora areola Rriechente, Madrepora areola VI. 2682	- mit furgem Ruckenfchitbe		
Rebsfresser, (Ochsichnabel) Cancroma Cancrophaga Rebsschefter, (Ochsichnabel) Cancroma Cancrophaga Rebsschefters, (Ochsichnabel) Cancroma Cancrophaga Rebsscheftersben, Parasitici Rebsschefterensoraltime, Sertularia loricata Rebsscherensoraltime, Sertularia loricata Rebsschefternen, Parasitici Rebsschinnen, Phalangia V2. 1059. © 341 Kreest, (boll.) Rrebs V2. 1059. © 341 Kreest, (boll.) Bristen Kreng-rave, (engl.) Menscheftester Respecifiss, (Engl.) Menscheftester Respecifiss, (Engl.) Menscheftester Respecifiss, (Engl.) Menscheftester Respecifiss, (Eisabe) Cicada Crux Respecifiss, (Eisabe) Cicada Crux Respecifiss, (Eisabe) Antilope scripta Respecifiss, (Eisabe) Rana gibbosa Respschinne, Aranea Diadema V2. 1070 Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Cicada cruciata Respschinger, (Eisabe) Curculio Crucifer Respschinger, (Editobisscher) Cassida cruciata Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Cassida cruciata Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschinger, (Epringsaser) Curculio Crucifer Respschin	💳 🛶 mit langlichem Ruckenschi	lbe –	U2 Tim
Rrebsfresser, (Hochschabel) Cancroma Cancro- phaga Rrebsscherenforastici Rrebsscherenforastime, Sertularia loricata Rrebsscherenforastime, Sertularia loricata Rrebsscherenforastime, Sertularia loricata Rrebsschimen, Aranea cancriformis V2. 1088 Rrebsschimen, Phalangia V2. 1059. C. 341 Kreest, (host) Rrebs V2. 1093 Kreest, (host) Breisen V2. 1093 Kreekels, (bost) Gristen V2. 1093 Kreeme, rave, (engl.) Menschenfresser V2. 1093 Kreeme, rave, (engl.) Menschenfresser V3. 1093 Rrengweißling, (Lagschm.) Papilio Cardamines V3. 1093 Rrengheißling, (Lagschm.) Papilio Cardamines V3. 1093 Rrengheißling, (Lagschm.) Papilio Cardamines V3. 1093 Rrengheißling, (Gistabe) Cicada Crux V3. 115 Rrengssche, (Gistscher) Hemerobius eruciatus Rrengsträger, (Gistscher) Hemerobius eruciatus Rrengsträger, (Gistabe) Cicada cruciata V3. 160 Rrengsschießling, (Eisabe) Cicada cruciata V3. 160 Rrengsträger, (Budschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Krengsträger, (Rudschim.) Phalæna Xylosteans Kr	moluttischer, (Schildflob	) Monoculus Pa	0•
Rrebektabben, Parafitici Rrebektheerenkordkine, Sertularia loricata Rrebektheerenkordkine, Sertularia loricata Rrebektheerenkordkine, Sertularia loricata Rrebekthinnen, Phalangia Rrebekthinnen, Phalangia Rrebekthinnen, Phalangia Rrebekthinnen, Phalangia Rrebekthinnen, Phalangia Rrebekthinnen, Phalangia Rreekthinnen, Phalangia Rreekthinnen, Phalangia Rreekthinnen, Phalangia Rreekthinnen, Phalangia Rreekthinnen, Phalangia Rrebekthinnen, Phalangia Rreiktheefthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthinnen, Phalangia Rreikthi	lyphemus	-	Va ttra
Rrebeschben, Parasitici Rrebescheerenforalsime, Sertularia loricata Rrebeschinne, Aranea cancrisormis V2. 1086 Rrebeschinnen, Phalangia V2. 1059. ©. 341 Kreest, (host.) Rrebes Krekels, (host.) Gristen Kreng-rave, (engl.) Menschenfresser Rrespecifism, (Tagschm.) Papilio Cardamines V. 473 Rrengbock, (Hirschbock) Antilope scripta Rreughsce, (Citade) Cicada Crux V. 473 Rreughsce, (Citade) Hemerobius cruciatus Rreughsce, (Citade) Hemerobius cruciatus Rreughsche, (Hinschlege) Hemerobius cruciatus Rreughsche, (Gitade) Cicada cruciata Rreughsche, (Rachtschm.) Phalæna Kylostean Rreughscher, (Rachtschm.) Phalæna Kylostean Rreughscher, (Rachtschm.) Phalæna Kylostean Rreughscher, (Rachtschm.) Phalæna Kylostean Rreughscher, (Chilotescher) Curculio Cruciser Rreughscher, (Chilotescher) Cassida cruciata Rreughscher, (Chilotescher) Elater cruciatus Rreughscher, (Chilotescher) Elater cruciatus Rreughscher, (Chilotescher) Elater cruciatus Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Chustescher, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, An	wisselfellett (Tobilitalianst) C	incroma Cancro	)•
Rrebsschinne, Aranea cancrisormis  Rrebsspinne, Aranea cancrisormis  Rrebsspinnen, Phalangia  Kreest, (holl.) Rrebs  Kreest, (holl.) Britten  Kreng-rave, (engl.) Menschenfrester  Rresmeißling, (Lagschm.) Papilio Cardamines  Rreng, (Eisabe) Cicada Crux  Rrengbock, (Hirscheock) Antilope scripta  Rrengfricze, (Eintstlege) Hemerobius cruciatus  Rrengfrinne, Aranea Diadema  Rrengfrinne, Aranea Diadema  Rrengtrager, (Eisabe) Cicada cruciata  Rrengtrager, (Eisabe) Cicada cruciata  Rrengtrager, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteana  Rrengtrager, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteana  Rrengtrager, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteana  Rrengtrager, (Springtaser) Curculio Cruciser  Rrengtrager, (Springtaser) Elater cruciatus  Rrengtrager, (Springtaser) Elater cruciatus  Rrengtrager, (Springtaser) Elater cruciatus  Rrengtrager, (Springtaser) Elater cruciatus  Rrengtrager, (Springtaser) Elater cruciatus  Rriechenbe Ambribien, Reptiles  Rriechente, Anas crecca  Rriechente, Anas crecca  Rriechente, Anas crecca  Rriechente, Cular reptans  Rriechente, Cular reptans  Rriechente, Tubipora serpens  Rrieches, (griech.) Bibber  Rrios, (griech.) Bibber  Rrossessing der versus  Rriechente, Madrepora areola  VI2. 682	Rrebefrabben, Parafitici		11. 368
Rrebsspinne, Aranea cancriformis Rrebsspinnen, Phalangia V2. 1059. ©. 341 Kreest, (holl.) Krebs Krekels, (holl.) Grillen Kreng-rave, (engl.) Menschenfrester Rresweißling, (Lagschm.) Papilio Cardamines V. 475 Rreng, (Cifade) Cicada Crux V. 473 Rrengbock, (Hirschenge) Hemerodius cruciatus Rrengspinne, Aranea Diadema Rrengtröte, buckeliche, Rana gibbosa Rrengträger, (Eisade) Cicada cruciata Rrengträger, (Eisade) Cicada cruciata Rrengträger, (Bachtschm.) Phalæna Kylosteana V. 453 Rrengträger, (Müsclicher) Curculio Cruciser Rrengträger, (Küsclicher) Cassida cruciata Rrengträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rrengträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rrengträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rriechende Anas crecca Rriechende Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Tubipora serptans Rriechforalline, Sertularia reptans Rriegsschiffvogel, (siegender Pengnin) Rrios, (griech.) Widder Rross, (griech.) Widder Rross, (griech.) Widder Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rrios, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rrios, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rross, (griech.) Widder Rrossession der Pengnin) Rrossession der Pengnin		ia loricata	Via 062
Rrebsspinnen, Phalangia Kreest, (holl.) Krebs Kreest, (holl.) Gristen Kreng-rave, (engl.) Menschenfrester Rresweißling, (Lagschm.) Papilio Cardamines V. 415 Rreng, (Cisabe) Cicada Crux V. 453 Rrenghoef, (Hirschboch) Antilope scripta Rrenghoef, (Hirschboch) Antilope scripta Rrenghiege, (Ciintstiege) Hemerobius cruciatus Rrenghinne, Aranea Diadema V. 1070 Rrengträger, (Eisabe) Cicada cruciata Rrengträger, (Bachtschm.) Phalæna Xylostean V. 453 Rrengträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylostean V. 1370 Rrengträger, (Küßeltäser) Curculio Cruciser Rrengträger, (Springtäser) Cassida cruciata V. 1370 Rrengträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rrengträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rrengträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rriechenbe Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Culex reptans Rriechente, Tubipora serptans Rriechforalline, Sertularia reptans Rriechente, Tubipora serpens Rriegsschiffvogel, (siegender Pengnin) Rrios, (griech.) Widder Rrossessen Andrepora areola V. 1070 V. 453 V. 453 V. 453 V. 1070 V. 453 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V. 1070 V.			V2 108
Kreeft, (holl.) Krebs  Krekels, (holl.) Grillen  Kreng-rave, (engl.) Menschenfresser  Rrespeißling, (Lagschm.) Papilso Cardamines  Kreng, (Eisabe) Cicada Crux  Rrengboek, (Hirschbock) Antilope scripta  Krengstege, (Einkstiege) Hemerobius cruciatus  Krengssiege, (Einkstiege) Hemerobius cruciatus  Krengssiege, (Eisabe) Cicada cruciata  Krengspinne, Aranea Diadema  V2. 1070  Rrengträger, (Eisabe) Cicada cruciata  V3. 1070  Rrengträger, (Eisabe) Cicada cruciata  V4. 453  Krengträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteana  V5. 1070  Rrengträger, (Küßelksfer) Curculio Cruciser  Rrengträger, (Küßelksfer) Curculio Cruciser  Rrengträger, (Echildsfer) Cassida cruciata  V5. 1070  Rrengträger, (Küßelksfer) Curculio Cruciser  Rrengträger, (Küßelksfer) Cassida cruciata  V6. 231  Rrengträger, (Echildsfer) Cassida cruciata  V6. 139  Rrengträger, (Küßelksfer) Cassida cruciata  V6. 139  Rrengträger, (Küßelksfer) Cassida cruciata  V6. 139  Rrengträger, (Echildsfer) Cassida cruciata  V6. 139  Rrengträger, (Echildsfer) Cassida cruciata  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Küßelksfer) Curculio Cruciser  Rrengträger, (Echildsfer) Cassida cruciata  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  Rrengträger, (Echildsfer) Cassida cruciata  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 130  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V6. 231  V7. 255  Rrengträger, (Echildsfer) Curculio Cruciser  V7. 2			
Krekels, (boll.) Grillen  Kreng-rave, (engl.) Menschenfresser — II. 56  Rressweißling, (Tagschm.) Papilso Cardamines V. 590  Rreuß, (Cisabe) Cicada Crux  Rreußhock, (Hirschbock) Antilope scruciatus Rreußfliege, (Ciinkstege) Hemerobius cruciatus Rreußfliege, (Ciinkstege) Hemerobius cruciatus Rreußfliege, (Ciinkstege) Hemerobius cruciatus Rreußfliege, (Minkstege) Hemerobius cruciatus Rreußfliege, (Cisabe) Cicada cruciata V. 1070 Rreußträger, (Cisabe) Cicada cruciata Rreußträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteans Rreußträger, (Mikstschsen.) Curculio Crucifer Rreußträger, (Küßeltäser) Curculio Crucifer Rreußträger, (Springtäser) Cassida cruciata V. 139 Rreußträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rreußträger, (Springtäser) Elater cruciatus V. 320 Rreußträger, (Springtäser) Elater cruciatus Rriechenbe Anhrhibien, Reptiles Rriechenbe Anhrhibien, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Culæx reptans Rriechente, Tubipora serptans Rriechforete, Tubipora serptans Rriechente, Tubipora serptans Rriegsschiffvogel, (stiegender Penguin) Krios, (griech.) Widder Rrosseries Andrepora areola V. 463 V. 267 V. 463 V. 463 V. 267 V. 139 V. 2682		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Kreng-rave, (engl ) Menschenfresser 11. 56 Rressweißling, (Tagschm.) Papilio Cardamines V. 590 Rreuß, (Cisabe) Cicada Crux V. 453 Rreußbock, (Hirschbock) Antilope scripta E. 316 Rreußlicge, (Einkstlege) Hemerobius cruciatus E. 316 Rreußlicge, (Einkstlege) Hemerobius cruciatus E. 316 Rreußlicge, (Einkstlege) Hemerobius cruciatus E. 316 Rreußlicge, (Einkstlege) Hemerobius cruciatus E. 316 Rreußlicge, (Eisabe) Cicada cruciata V. 1070 Rreußlicger, (Eisabe) Cicada cruciata V. 1070 Rreußlicger, (Müßeltäser) Curculio Crucifer E. 231 Rreußlicger, (Müßeltäser) Cassida cruciata V. 139 Rreußlicger, (Echildsafer) Cassida cruciata V. 139 Rreußlicger, (Emex Andrew V. 497 Rriechenbe Aniphibien, Reptiles III. 13. E. 183 Rriechente, Anas crecca E. III. 13. E. 183 Rriechente, Anas crecca V. 497 Rriechente, Anas crecca E. III. 13. E. 183 Rriechente, Chiaco Culex reptans V. 992 Rriecher, (Müße) Culex reptans V. 992 Rriecher, (Tubipora serpens VI. 859 Rriechforalline, Sertularia reptans VI. 859 Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Widder I. 421 Rrossessen Madrepora areola VI. 682	Krekels, (boll.) Griffen	أ المنافقة	
Rresmeisting, (Eaglam) Papilio Cardamines Rreug, (Eifabe) Cicada Crux Rreughof, (Hirschboat) Antilope scripta Rreughsiege, (Einkstege) Hemerobius cruciatus Rreughrote, buckeliche, Rana gibbosa Rreughrote, buckeliche, Rana gibbosa Rreughrinne, Aranea Diadema V2. 1670 Rreugträger, (Eifabe) Cicada cruciata V. 453 Rreugträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteans Rreugträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteans Rreugträger, (Küßeltäser) Curculio Cruciser Rreugträger, (Springtäser) Cassida cruciata V. 139 Rreugträger, (Springtäser) Elater cruciatus V. 320 Rreugträger, (Springtäser) Elater cruciatus V. 320 Rreugträger, (Springtäser) Elater cruciatus V. 497 Rriechenbe Anthebisen, Reptiles Rriechenbe Anthebisen, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, CWücke) Culex reptans V2. 992 Rriecher, (Wücke) Culex reptans V2. 992 Rriecher, (Wücke) Culex reptans V2. 992 Rriecher, Tubipora serpens VI. 879 Rriegsschiffvogel, (stiegenber Penguin) Krios, (griech.) Widder Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 321 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 322 Rrossessing VI. 323 Rrossessing VI. 323 Rrossessing VI. 323 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 324 Rrossessing VI. 325 Rrossessing VI. 325 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326 Rrossessing VI. 326	Kreng - rave, (engl ) Menichen	freffet :-	·
Rreuß, (Cifabe) Cicada Crux Rreußbock, (Hirschbock) Antilope scripta Rreußlicge, (Gintstiege) Hemerobius eruciatus Rreußlicge, (Gintstiege) Hemerobius eruciatus Rreußlicge, (Gintstiege) Hemerobius eruciatus Rreußlicge, (Gintstiege) Hemerobius eruciatus Rreußlicge, (Gifabe) Cicada cruciata Rreußlicger, (Eifabe) Cicada cruciata Rreußlicger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteans Rreußlicger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylosteans Rreußlicger, (Rußeltscher) Curculio Cruciser Rreußlicger, (Springtsfer) Cassida cruciata Rreußlicger, (Springtsfer) Elater cruciatus Rreußlicger, (Springtsfer) Elater cruciatus Rreußlicger, (Springtsfer) Elater cruciatus Rriechenbe Anhopeie Rriechenbe Anhopeie Rriechenbe Anas crecca Rriechenbe Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, (Müce) Culex reptans Rriechen, (Müce) Culex reptans Rriechendente, Sertularia reptans Rriechfore, Tubipora serpens Rriechfospel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Bibber Rrossessing Andrepora areola V. 453 V. 316 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V	Rrefmeifling, (Tagichm.) Papil	io Cardamines	
Rreuhfliege, (Glinkfliege) Hemerobius eruciatus Rreuhfliege, (Clinkfliege) Hemerobius eruciatus Rreuhfliege, (Clinkfliege) Hemerobius eruciatus Rreuhfliege, (Clinkfliege) Hemerobius eruciatus Rreuhfliege, (Clifabe) Clicada cruciata Rreuhflieger, (Clifabe) Clicada cruciata Rreuhträger, (Rachtlichm.) Phalæna Xylostoana Rreuhträger, (Rachtlichm.) Phalæna Xylostoana Rreuhträger, (Childschefer) Curculio Crucifer Rreuhträger, (Childschefer) Cassida cruciata Rreuhträger, (Childschefer) Cassida cruciata Rreuhträger, (Childschefer) Elater cruciatus Rreuhträger, (Childschefer) Elater cruciatus Rriechende Anhybibien, Reptiles Rriechende Anhybibien, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, (Nücke) Culex reptans Rriechente, (Nücke) Culex reptans Rriechente, Tubipora serptans Rriechente, Tubipora serptans Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rriecheshuhn aus Java Rri	Rreug, (Cifabe) Cicada Crux		
Rreuhfliege, (Ciinkfliege) Hemerobius eruciatus Rreuhfliege, buckeliche, Rana gibbosa Rreuhfliche, buckeliche, Rana gibbosa Rreuhfliche, Aranea Diadema V2. 1670 Rreuhtliger, (Cisade) Cicada cruciata Rreuhtliger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteana V. 453 Rreuhtliger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteana Rreuhtliger, (Rühclichsch) Curculio Cruciser Rreuhtliger, (Childscher) Cassida cruciata Rreuhtliger, (Springkaser) Elater cruciatus Rreuhtliger, (Springkaser) Elater cruciatus Rreuhtliger, (Springkaser) Elater cruciatus Rreuhtliger, (Springkaser) Elater cruciatus Rriechenbe Anhobiten, Reptiles Rriechenbe Anhobiten, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, Anas crecca Rriechente, (Rücke) Culex reptans Rriechente, (Rücke) Culex reptans Rriechtoralline, Sertularia reptans Rriechtoralline, Sertularia reptans Rriechtofte, Tubipora serpens Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Widder Rrossessing de de de de de de de de de de de de de	Rrengbock, (hirschbock) Antilog	de feripta	(C)
Rreuhtröte, buckeliche, Rana gibbosa Rreuhspinne, Aranea Diadema Rreuhträger, (Eikabe) Cicada cruciata Rreuhträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylostoana Kreuhträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoana Kreuhträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoana Kreuhträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoana Kreuhträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoana Rreuhträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoana Rreuhträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoana Rreuhträger, (Ruchtschm.) Curculio Cruciser Rreuhträger, (Springkäser) Cassida cruciata Rreuhträger, (Springkäser) Elater cruciatus Rreuhträger, (Springkäser) Elater cruciatus Rreuhträger, (Springkäser) Elater cruciatus Rriechenbe Andrew V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 453 V. 4	Rreutfliege, (Glintfliege) Heme	robius cruciatus	· · ·
Rreußträger, (Eifabe) Cicada cruciata  Rreußträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylosteans  Rreußträger, (Rußelkäser) Curculio Cruciser  Rreußträger, (Schildkäser) Cassida cruciata  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Rreußträger, (Springkäser)  Rriechenbe Andrew  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 453  V. 450  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V. 457  V.	Rreutfrote, buckeliche, Rana gil	obola :	\
Rreußträger, (Eifabe) Cicada cruciata  Rreußträger, (Rachtschm.) Phalæna Xylostoans  Kreußträger, (Ruchtschm.) Phalæna Xylostoans  Kreußträger, (Rußelkäser) Curculio Cruciser  Rreußträger, (Schildkäser) Cassida cruciata  Rreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus  V. 320  Rreußträger, (Springkäser)  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriechende Andrew  Kriech		•	V2. 1070
Kreußträger, (Rachtchm.) Phalæna Xylosteans Kreußträger, (Rüßelkäser) Curculio Crucifer Kreußträger, (Schildkäser) Cassida cruciata Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus Kreußträger, (Springkäser) Elater cruciatus Kriechende Andrew V. 139 Kreußträger, (Springkäser) Kriechende Andrew V. 497 Kriechende Andrew V. 497 Kriechende Andrew V. 497 Kriechende Andrew V. 497 Kriechende Andrew V. 183 Kriechende, Anas crecca Kriechende, Anas crecca Kriechende, Anas crecca Kriechende, (Müce) Culex reptans Kriechende, (Müce) Culex reptans Kriechende, Sertularia reptans Kriechende, Tubipora serpens VI2. 859 Kriegsschiffvogel, (stiegender Penguin) Krios, (griech.) Widder Kross, (griech.) Widder Kross, (griech.) Madrepora areola	Rreuftrager, (Citabe) Cicada o	ruciata	
Reugträger, (Rugeltäfer) Curculio Crucifer Recugträger, (Schildkäfer) Cassida cruciata Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträger, (Springkäfer) V. 320 Recugträ	Mreugträger, (Rachtichm.) Phal	æna Xylofteans	V. 725
Rreußträger, (Springkäfer) Elater cruciatus V. 320 Rreußwanze, Cimex Andrew V. 497 Rriechende Andrew V. 497 Rriechende Andrew V. 497 Rriechende, Anas crecca III. 13. E. 183 Rriechente, Anas crecca V. 297 Rriecher, (Mücke) Culex reptans V. 2992 Rriechbuhn aus Java E. 123 Rriechforalline, Sertularia reptans VI2. 859 Rriechforder, Tubipora serpens VI2. 670 Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Widder I. 421 Rroseffein, Madrepora areola VI2. 682	nteutträger, (Rubelkafer) Cur	culio Crucifer	₾. 23 <b>1</b>
Rreuhwanze, Cimex Andrew Rriechende Andrhibien, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriecher, (Muce) Culex reptans Rriechbuhn aus Java Rriechforalline, Sertularia reptans Rriechforalline, Tubipora ferpens Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Widder Rroseffein, Madrepora areola  V. 497 III. 13. © 183 III. 297 V2. 992 V12. 859 VI2. 859 VI2. 670 III. 321 VI2. 682	Arrugirager, (Smilotafer) Call	lida cruciata	
Rriechende Antiphibien, Reptiles Rriechente, Anas crecca Rriecher, (Mücke) Culex reptans Rriecher, (Wücke) Culex reptans Rriecher, (Wücke) Culex reptans Rriechforalline, Sertularia reptans Rriechforalline, Sertularia reptans Rriechfohre, Tubipora ferpens Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Widder Rroseffein, Madrepora areola  11. 13. © 183 11. 297 12. 879	Reugirager, (Springtafer) Ela	ter cruciatus	
Rriechente, Anas crecca  Rriechente, (Núcle) Culex reptans  Rriechen, (Núcle) Culex reptans  Rriechtoralline, Sertularia reptans  Rriechtoralline, Sertularia reptans  Rriechtofre, Tubipora serpens  Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin)  Krios, (griech.) Widder  Rroseffein, Madrepora areola  11. 297  V2. 992  V12. 879  V12. 879  V12. 682	Briefenda Winkilian 11	<u>.</u>	V. 497
Rriecher, (Mücke) Culex reptans  Rriechbuhn aus Java  Rriechbuhn aus Java  Kriechforalline, Sertularia reptans  Rriechfore, Tubipora ferpens  Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin)  Krios, (griech.) Widder  Rroseffein, Madrepora areola  V2. 992  V12. 899  V12. 879  V12. 689	Griechente Ange Angen	· 111. 1	3. 😂 183
Kriechhuhn aus Java Kriechtuhn aus Java Kriechtoralline, Sertularia reptans Kriechtore, Tubipora serpens Kriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) Krios, (griech.) Widder Krios, Madrepora areola  VI2. 859  VI2. 670  II. 321  Kriefsschin, Madrepora areola		· •	
Rriechforalline, Sertularia reptans  Rriechforalline, Sertularia reptans  Rriechfohre, Tubipora serpens  Rriegsschiffvogel, (fliegender Penguin)  Krios, (griech.) Widder  Rrosesschiffen, Madrepora areola  VI2. 859  VI2. 859  VI2. 682	Priechlulu and Vana	ns •	
Kriechtöhre, Tubipora serpens VI2. 670 Kriegsschiffvogel, (fliegender Penguin) II. 321 Krios, (griech.) Widder I. 421 Krosestein, Madrepora areola VI2. 682	Atienforalline. Sertularia conce		
Krios, (griech.) Widder Penguin)  Krios, (griech.) Widder  Krose, (griech.) Widder  Kroseftein, Madrepora areola  Vl2 682	Stiedrichte. Tuhinnes Gernens	ins •	V12, 859
Arios, (griech.) Widder I. 421 Arosestein, Madrepora areola VI2 682	Stiegsschiffpagel. (flicgenber Gen	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	V12. 070
atosestein, Madrepora arcola VI2 682	Krios, (griech.) Ribber	gmin <i>j</i>	
Q Trôte	Profestein, Madrepora arenta	_	
	A COMMITTER OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE	Q	

		Eb.	₫,
Rrote, gemeine, Rana bufo	• 0.500	III.	50
furinamische, Rana pipa		III.	48
Rrotenfifch, (Rabeljan) Gadus Tan		IV.	96
Rrotenfalamander, Lacerta orbicularis		IIL	
Rrotenfcnecke, Murex rana		VI.	500
Krokodielos, (griech) Rrofobill		III.	78
grofodill, Lacerta Crocodilus		III.	78
Kromme-hoorn-tor, (boll.) Birtelfopf		V.	56
Rrone, (Rachtichm.) Phalæna militaris	120	· <b>V</b> .	654
Rronenback, (Tute) Conus Geographus		VI.	383
Rronenbroffel, Turdus coronatus	-		144
Kronenfliege, Musca Diadema	• 20	V2.	955
Kronentafer, (Mantafer) Meloë Schaf	eri	. V.	383
Rronenforalline, Sertularia faitigiata		V12.	856
Rronenlampe, (Laterntrager) Fulgora D	iadema	$V_{\bullet}$	448
Rronenneffel, Actinia felina	•	VI.	89
Gronenperlbubn, Numida coronata	-	II.	105
Rronenvogel, (Rachtichm ) Phalæna can	nelina	V.	678
Kronenwidler, (Rachtichm.) Phalæna H	leraclea		
Kron-hiort, (fcmeb.) hirfc			390
Krontaube, Columba coronata		Π.	505
Rrontute, Conus imperialis	-	VI.	
Rronvogel, Arden criftate		II.	369
Kroon-hoorn, Kroon-toot, (holl.) &	rontuté	VI.	365
Kroon-hoorn, (boll.) Schmeiterhofe		VI.	485
Kroon-tepelbak, (holl.) gefronte Bati	enbacke	VI.	438
Kroos-slakken, (boll.) Ceemoosfchned	en	VI.	107
Kroosvisschje, (boll.) Moossisch		111.	284
Rropfer, (Laube) Columba gutturalis		€.	131
Rropfer, (Taube) Columba gutturola	-	II.	500
Propfgans, (Mimmerfatt)	- 152		390
Kropfgans, (Peletan) Pelecanus onocre	otalus	II.	323
Rropfnatter, Coluber Haje	-	111.	201
Rropffalamanber, Lacerta strumosa			108
Kropftrager, (Befpenftfafer) Mantis fti	rumaria	V.	414
Rropfvogel, fleiner, (Brachvogel) Tan	talus m	þ	•
nutus -		11.	391
Kropper, (hon.) Kropfer, (Taube)		11.	500
		Kr	otof

Q s

Rugel

	26. €.
Augelfisch, Diodon Atringa -	III. 324
Angelstoh, (Schildstoh) Monoculus Telemus.	V2. 1145
Rugelnuschel, (Gienmuschel) Chama fatiata	VI. 289
Rugelscheibe, Ascidia quadridentata —	VI. 85
Rugelthierchen, Zoophyta: Volvox	VI2. 910
Rugelvenus, Venus tumidula	<b>⑤</b> . 364
Ruchengast (Meelkafer) Tenebrio culinarius	V. 370
Kuif - leeurik, (holl.) Rammlerche —	IV. 104
Kühauge, (Schnirfelschnecke) Helix glauca	VI. 570
Rubbarm, (Benusschaft) -	VI. 627
Rubborn, (Robrenschwamm)	VI2. 796
Rublein, (Rafer) Scarabæus Vacca -	V. 65
Ribmilbe, Acarus ricinus -	V2. 1047
Rubnfreffer, (Schlupfmefpe) Tenthredo pini	V2. 826
Kuikendief, (holl.) Weihe -	II. 71
Kuipers - boor. (boll ) Botteberbobter -	VI. 412
Rurschner, (Rleinkafer) Dermestes pellio	V. 101
Rüzler, (Raupentoder) Ichneumon titillator	V2. 852
Kuk, (arab.) Kropfgans -	II. 324
Kukulka, (polnisch) Guckguck -	II. 205
Kun, (bohm.) Pferd	i. 446
Kuna, (poln.) Marber -	I. 267
Sunferbauch, (Kliege) Mulca cupraria -	V2. 973
Rupferbauch, (Schlupfmefpe) Tenthredo ferices	V2. 824
Rupferbiene, Apis enea -	V2. 896
Aupferbruft, (Jungfer) Libellula enea	V2. 769
Aupferfliegel, (Rachtschm.) Phalæna chrysitis	V. 688
Rupferbahnchen, Chrysomela ænea -	V. 167
Rupfertafer, (Ruffeltafer) Curculio eupreus	V, 220
Rupfertafer, (St. Joh. Bliege) Cantharis mea	<b>V</b> . 309
Rupferkafer, (Rater) Scarabæus orichaicus	<b>S.</b> 216
Aupfertrabbe, Cancer eneus -	V2. 1116
Aupfernatter, Coluber lebetinus -	III. 170
Supferructen, (Erdfafer) Carabus cupreus	V. 363
Rupferschild, (echitotafer) Cassida Jamaicensis	V. 149
Rupferschild, (Springtafer) Elater æneus -	V. 321
Rupferschild, (Stinttafer) Buprestis cupres	V. 340
Aupferschnid, (Goldleifte)	V. 355
	Rupfer

Kwalle, (holl.) Qualle

Kwalle - bootje, (holl ) Quallen

Kwikstaart, (boll ) Bachftelte.

Kwartel - Koning, (boll ) Bachtelfonig

Kwasje, (Viverra) Ceplonifcher guchs I. 244 II. 602 Kyknos. Digitized by Google

VI. 120

VI. 575

II. 435

	Eb. 6.
Kyknos, (griech) Schwan	11, 276
Kynos (griech.) Hund -	1. 206
Kyon, Karcharos, (griech.) Seeburd .	111, 266
Kyuffe, (norm.) Struntjager =	H- 349
	4.0
<b>&amp;</b> .	•
L. album, (Phalmna), meiftes &.	V. 694
2. bebraifches, (Bocktafer) Cerambyx Lamed	V. 24
L. weißes, (Rachtschm.) Phalæng L. album	V, 694
Labbi, Laisch (hebr.) Lome -	- I. 230
Labec, (poin.) Schwan .	II. 274
Labeo, (Mugil) Dicklippe	ĮV, 352
Laberdan, (eingefalzener Rabeljau) -	IV. 84
Labio, (Trochus) turfifcher Bund	VI. 531
Labrax, (Perca) Salmbarsch -	IV. 228
Labrus, Lippfisch	IV. 198
- auritus, Langobr	IV. 201
bimaculatus, Porrelfied .	1VF. 208
— — Chinensis, Chinesischer Lippfisch	IV, 212
- Cretenlis, Eretenfer	IV. 197
- cromis, Carolinischer -	IV. 213
- cynædus, Steinfisch	IV 216
exoletus, blakfarbiger Lippfisch	<i>IV</i> . 212
- falcatus, Sichelftoffe -	IV. 201
- ferrugineus, rostfarbiger Lippfisch	IV. 204
fulvus, Gelbfifch	IV. 214
- grifeus, graner Lippfifch	IV. 199
- hepatus, Leberfifc	IV. 198
linearis, indianischer Elppfisch -	[V, 21]
- livens, blepfärbiger -	IV. 218
lunaris, Gabelfcmang -	IV. 199
- luscus, Blingler .	IV, 211
- marginalis, Saumfloss -	IV. 203
— melaps, Schwarzauge	IV. 209
- mixtus, marmorleter Lippfisch .	117, 219
- Niloticus, Wolfenflosse	IV. 209
- acellaris, Pfancuange -	IV. 207

Labrus	Lacerta	247
		Sb. G.
Labrus onitis, Comusbauch	•	IV. 210
opercularis, Riemenflet	<b>#</b>	IV. 200
offifagus, Europäer	• .	IV. 209
paroticus, Blauobe	• •	IV. 205
- punctatus, punctirter &	ippffd -	IV. 208
rufus, Sauruffel	•	IV. 208
rupoltris, Bellentrieche	t •	IV. 210
scarus, Springer	.ets	IV. 196
ftriatus, geftreifter Lipy	नाम्	JV. 206
fuillus, Schweinsrucker	11 •	IV. 206 IV. 215
— — varius, bunter Lippfisch		VI 2. 680
Labyrinthica, (Madrepora) Labyrinthschnede, (Krausel) I	Trochus hybridus	
Laccia, (róm) Alse	thereal thereal	VI. 372
Lacerta. Cidente	- III. 7	7. 6. 186
- agama, Stackelleguan	•	III. 106
sgilis, Springer		111. 92
- Algira, Algierer		III. 93
ameiva, Marmeleibech	<b>.</b>	III. 92
anguina, Manleibechfe	• .	III. 120
angulata, Bieled	•	ML 94
- aquatica, Wafferfalam	ander -	III. 114
arguta, Reblfalte	•	<b>6.</b> 188
- aurata, Golbeibechfe	•	III. 109
- azurea, blaueCidechfe	, •	III. 91
bicarinata, Doppelfiel	•	III. 88
- bullaris, Blafentrager	, <b>•</b>	<i>][]</i> , 108
caudiverbera, Schleub		III. 83
chalcidica, brepfingerl	ge Eidechfe -	III. 110
— — cruents, Blutschwang	•	<b>5.</b> 187
- dragma, Drachentopf		III. 85
- fasciata, bandirte Elber		III. 112
helioscopa, Sonnensch	anet .	5.186
— — iguana, Kammleguan	46.	111. 10;
lemniscata, linirteEide	cole •	III. 111 IIL 107
marmorata, bunter Les	Draw .	III. 91
- Mauritanica, Barbar	_	lii, 110
— — Nilotica, Rileidechse	0.4	Lacerta
	<b>~ 7</b>	

1.0		
	9	th. Sette
Lacerta orbicularis, Rrotenfalamander	-	III. 100
- paluftris, Cumpffalamanber	•	III. 114
- principalis, Burgermeister	•	III. 88
- punctata, Arguesalamander	•	111, 117
punctata, runftirte Eidechfe		- III. 111
- quatuorlineata, vierfach gestreifte	Pibechf	è III. 117
- quinquelineata, funffach gestreifte	Cideo	bo ·
fe —		Ш, 101
- Gutata, Perlentrager -		III. 86
- lexlineata, sechemal gestreifte Eid	edife	III. 94
— — Arumola, Kropfsalamander	•	III. 108
supercitiola, Kammrucken	-	- III. 86
- turcica, Turk		III. 92
- velox, Pfeileidechfe -		<b>E</b> . 187
- vulgaris, Erdfakamander	-	III, 113
Lacerto, (neap) Mactrele -		IV. 257
Lacertns, Seceibechse	-	IV. 324
Lachirosch, Rana ridibunda	-	C. 183
Larus ridibundus -		II. 348
Lache, (Salm) -		IV. 310
Lachs, gemeiner Sahno Salar -		IV. 316
- grauer, Salmo Eriox	• •	IV. 311
Lachsforelle, Salmo Trutta -		IV. 317
	IV. 3	11. 6.208
Lachestore, -		III. 288
Lachemurm, Lernæa salmonea	•	VI. 105
Lachtaube, Columba risoria	-	II. 512
Lacke, Laoke Comed ) Beberfnecht		V2. 1060
Lady capricorn, (engl.) Grunling	-	V. 264
Lady-cow, (engl.) Connentafer	•	V. 145
Laerka, (schweb) Lerche -		II. 517
Laufer, (Bachstelje) Motacilla Trochilu	lS	II. 620
Laufer, (Bockfafer) Cerambyx curfor	•	V. 268
Laufer, (Grashupfer) Gryllus pedeftris		V. 445
Laufer, (Krabbe) Cancer curfor		V2. 1098
Laufer , (Sandlaufer) Cicindela hybrida	ì	V. 328
Laufefreffer, (Stintfliege) Hemerobius P	erla	V2. 793
Laufestinter, (Stintfliege) Hemerobius fi	avican	8 V2. 797
	** *.	Lævipes

Tiss. ibcs	Lampyris	249
	3	th. Geite
Lævipes, (Aranea) Buntfuß	•'	V2. 1086
Levi-Raja, Spismaul,	-	11L 243
Lagervogel, (Nachtschm.) Phalæi	na eastrensis	V. 661
Lagoos, (griech.) Saafe		J. 318
Lahul, (lappland.) Poffenreißer		II. 417
Lake, (schweb.) Trusche	-	IV. 96
Lamb, (engl.) Lamm -	~	I. 421
Lamed, (Cerambyx) hebraisch	es 2.	V. 269
Lamentin, (fr.) Geefuh	•	I. 175
Lamia, Menfchenfreffer	-	<i>III.</i> 266
Lamie, (fr.) Menschenfreffer	•	III. 266
Lamiola, (ital.) Meersau (Bac	an) –	III. 260
Lampas, (Murex) fnotiger D	ehituchen .	VI. 501
Lampe de Pagode, (fr.) gerin	ppter Delphin	VI. 550
Lampe, oftindische, (Schnirkelse	con) Helix rin-	
gens	. · · -	VI. 564
Lampe, romifche (leuchtender Re	áfer) Lampyris	ita-
lica –		V. 303
Lampe, turfifche (leuchtenber &	ater) Lampyris	
Mauritanica	` <b></b>	V. 303
Lampetia, (Papilio) Sechsaug	je -	V. 607
Lampreda, (ital) Lamprette	• , 	III. 230
Lamprette, (Price) Petromyzo		III. 230
Lamprettenfisch, (Rossisch) Blen		IV. 106
Lamprey, Lamprey-eel, (engl Lampreyon, Lamprillon (fr.)		III. 230
Lamproye, (fr.) Lamprette	aceunguge	III. 233
Lampugo, (span ) Goldfisch	-	III. 230
Lampyris, leuchtender Rafer	•	IV. 117 V. 297
- bicolor, Luftfeuer	-	
Chinensis, Gogenlampe		
- coccines, Morgenrothe		V. 303 V. 305
- corusca, Schimmertafer	_	V. 300
- — hespera, Nachtlicht	_	`
- ignita, Kohle	•	
- italica, romische Lamre		
latiflima, Flamme	_*	
- lucida, Fenerglut		
Control Courtsins		V. 302 Lampyris.
V	7	∟amovris.

1	Eh.	€,
Lampyris marginata, Gelbrand -		301
- Mauritanica, turfische Lampe -		302
- minuta, Funte -		303
- noctiluca, S. Joh. Wurm		297
— — phosphorus —	V.	302
- pyralis, Reuertafer -	V.	301
- rostrata, glimmender Tocht -	V.	304
- fanguinea, Abendrothe -	V.	305
splendidula, Glanztafer -		301
Lamus, Lemmender, Lumik, (norm.) Remnting	ı L	339
Lamvier, (schwed.) Seetaube	11,	312
Laneifer, (Scarabæus) Spiesträger -	V.	17
Landchartentute, (granulirtes Ragchen) -		379
Landfrosch, brauner, Rana temporia .	Щ	65
	V2. 1	
Landsalamander, (Beuerfalamander)		117
Lanbfchilbfrote, Testudo scabra -	IIL	34
Landfchnede, (Chnirtelfchnede) italienifche, Helin		
ltala	VL	572
- portugiesische, Helix Lustanica	VI.	572
- fpanische, Holix Hispana -	VI.	
Landsmann, (Rachtschm.) Phalmna distinis	V.	693
Landstreicher, (Grasbupfer) Gryllus desertus	Œ.	266
Lanbstreifer, (Schlupfwesre) Tenthredo rustica	V2.	826
Land wulp, (boll.) Didfug, (Regenpfeifer)	-11.	420
Landzeiger, (Sturmvogel) Procellaria Capenlis	11.	316
Langafter, (Benusmuschel) Venus petulca	VI.	268
Langarm, (Golbhabnchen) Chrysomela longimana	E.	224
Langarm, (Rafer) Scarabæus longimanus	V.	70
Langarm, (Krabbe) Cancer longimanus	V2, 1	
Langarm, (Krebsspinne) Phalangium renisor.		•
me -	V2. 1	064
Langarm, (Mensch) Homa Lar -	G.	4
Langbart, (Bele) Silurus Clarias -	IV.	299
Langbruft, (Rugeltafer) Curculio Anchorago	V.	
tangoecte, (Wange) Cimex triguttatus	V.	500
Langfinuc, (Klippfisch) Chætodon pinnatus	IV.	165
Langstoffe, (Meerhaafe) Cyclopterus rariox	III.	332
*	9.	11164

<b>Langfühler</b>	Langnafe	251
•	, ,	₹b. €.
Langflügel, (Sagfchmett.) Pa	piliones Heliconii	V. 581
Langfübler, (Rachtschm.) Pl	palerna tentacularis	V. 732
Langfüße, Tipulæ	- V2. 929	Pr € 334
— — Kliegenartige	<b>→</b> •	V2. 936
Mudenartige	• (	V2. 930
- vielmannige, Tipule	e polygamæ	G. 334
Langfuß, (Goldbahnchen) mana	Chrysomela longi-	V. 193
Langfuß (Rafer) Sparabæus	longipes -	V. 84
Langfug, (Rrabbe) Cancer le		V2. 1114
Langfuß, (Mans) Mus long		I. 352
Langfuß, (Maus) Mus mer	dianus -	6. 42
Langfuß, (Raubfliege) Allus	Tipuloides	V2, 100#
Langfuß, (Regenpfeifer) C	haradrius himanto	•
pus	• '	IL 420
Langfuß, (Bange) Cimex lo		V. 493
Langgestaarte Knol, (hou)	geschwänzte Rübe	VI. 513
Langhais. (Meereichel) Leps	s aurita 🕝	VI. 209
Langbals, Plotus	-	IL 333
Langhand, (Socttafer) Cera	mplx jougimenas	V. 251
Langborner, (Wangen)	-	V. 502
Langborn, (Gaftarbjungfer)	Myrmeleon longi	, 32
corne	ricornia -	V2. 799
Langhern, (Biene) Apis long Langhern, (Golbhabuchen)	Charlemala himna	V2. 944
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	critatient bibitut	
Eangborn, (Rrabbe) Cancer	foncierenie	V. 188
Langhorn, (Langfuß) Tipula	longicornie	V2. 1102
Zangoen, (Eanglay) Liputa	inificatiff	V2. 944
Langhorn, (Milbe) Acarus l'Eanghorn, (Rachtschun.) Phal	nitition in	V2. 1056 V. 749
Langhorn, (Baffereulchen)	Bhanasura Jouai. Eile hottectelle	V+ 749
cornis	Ettt   Carren sande.	V2. 788
Langivie, (norm.) Sectaub		II. 312
Langforper, (Spinne) Arane		V2. 1077
Langicevende Tol. (boll)	Baaobenfonede	VI. 545
Langlinie, (Pfeilschmang) Spl		<b>6.</b> 302
Langnafe, (Grashupfer) Gry	llus nafutus	V. 417
Langnase, (Seehahn) Trigla		IV. 277
Amidically (Cashada) voide		Langa

<u></u>			
•	•	Th.	6,
Lango, (	schwed.) Long -	IV.	95
Langohr,	(Fledermane) Vespertilio auritus	I.	154
Langobr,	(Lirefisch) Labrus auritus -	IV.	
Langohr,	(Meerfage) Simia Midas -	l.	135
Langohr,	(Meerohr) Haliotis alinina	VI.	599
Langosta	, (span) Heuschrecke -	V.	437
Langpoo	t, (hoft.) Weberfnecht - V	<sup>7</sup> 2. 1	
Langpunt	t, (Eref fer). Carabus sexpunctatus		364
Langpunk	t, (Grashupfer) Gryllus biguttulus		444
Langrüber	weißling, (Tagschm.) Papilio napi		588
Langfchen	tel, (Nachtschm), Phalæna seratella		745
Langschild	(Raubfafer) Staphylinus elongatus		392
Fangschlei	der, (Gefrenstthier) Lemur tardigradu	s 1.	147
· Langfchna	bel, (Gudgud) Cuculus vetula		209
Langschna	bel, (Rugeltafer) Curculio purpureus		218
Langschna	bel, (Lauchente) Mergus ferrator	И,	305
Langschnä	bel, (Rugeltafer) mit einfachen ober bun-	•	
	ven Schenkeln -	_	211
Langschna	bel, mit gezähnelten Schenkeln		211
	- fpringende, mit biden hinterschenkeln		226
Langichna	uge, (Rachtschm.) Phalæna rostralis		733
Langichwa	inje, (Papagenen) Plittaci macrouri IL 12	يم. و	2.73
Langschwe	mi, (Aalfchlange) Anguis Eryx	III.	
<b>Langichma</b>	m, (Anmer) Emberiza serena		569
Langschwe	ang, (Baumlaufer) Certhia pulchella		259
Langschwe	ans, (Colibri) Trochilus polytmus		265
	ms, (Falte) Falco furcatus	IL.	86
Langschwa			148
Langschwe	m, (Igel) Histrix macroura -	Į.,	316
Langichwe	ans, (Reuntoder) Louissanischer, Lanius	**	
	Ludovicianus –	Ц.	111
	- Senegallischer, (Reuntober) Lanius	**	
	macrourus -		111
	ing, (Papagen) Plittacus Peruvianus	<b>S.</b>	80
Langichma			184
Langidima	ing, (Raupentober) Ichn. manifestator	V2,	
Langschwa			353
<b>Langschwa</b>	int, (Tagschur.) Papilio Antilochus		576
*		£	angi

<b>Langidywant</b> Lan	nius	253
•		th. S.
Langschwang, (Taube) Columba maceron	<b>a</b>	<b>G.</b> 134
Langspriet, (holl.) Rothbock -		V. 262
Langstachel, (Grashupfer) Gryllus fastigi	atus	V. 431
Langtropf, (Sonnenkafer) Coccinella ob	longo-	
guttata -		V. 159
Languetti, (ital.) Mefferhefte -	,	VI. 226
Langzabe, (Wafferhubn) Fulica Martinica	Í	II. 429
Lanibao, (ind.) Feuerglut	•	V. 335
Lanio, (Cicada) Fleischer	<b>-</b>	V. 464
Lanio, (Culex) Dchfentober		<b>6</b> . 336
Lanipes, (Tenebrio) Bollfuß	• . (	O. 252
Lanius, Reuntober	II. 108.	G. 71
- albus, weiffer Reuntoder	'	S. 71
auriculatus, Schwarzohr	~	S. 71
barbarus, ichmarger Meuntober	<b>L</b>	II. 116
Bicolor, swenfarbiger Reuntober	.•	S. 71
Canadensis, canadifcher Meyntober		Įli 110
- Cajanus, cajennischer Neuntoder	•	II. 117
- Cajennensis, Schwarzforf	'	S. 72
	caapscher	
Scheerschwang -		II. 109
- coeruleus, blauer Reuntober		<b>ලි.</b> 72
collaris, caapscher Reuntober	٠. ٤	II. 112
oristatus, gehaubter Reuntober	-	II: 110
curvirostris, Krummschnabel	<del></del>	II. 112
doliatus, gereifter Meuntober		II. 116
faustus, Glucksvogel	•	II. 119
- fortificatus, africanischer Scheerschi	wanz	II. 109
- infaustus, Ungludevogel		II. 119
jocosus, Spaßvogel	•	П. 118
- garrulus, Seibenschwang	•	II. 541
- leucorinus, Beißburgel		S. 71
- Lucionensis, lucionischer Reuntobe		II. 113
- Ludovicianus, Louisianischer Langs	coman <sub>i</sub>	U. 116
- macrourus, Genegalischer Langichn	vanz	II. 115
- Madagascariensis, madagascarische	r venn-	11
töder —	,	11.117
- rufus, rother Meuntober .		11. 116
		Lanius

		Th.	Ĕ.
Lanius Senegalus, afchgrauer Reuntobet	•	II.	117
- Gulphuratus, gelber Reuntober	-	II.	116
- vicidis, gruner Reuntober	•	Ç,	72
Langennabel, (Rintborn) Buccinum lance	eatom	VI.	472
Langertenfchwang, (Gibechefifch) Elops lau	rus	iv.	344
Laobice, (Lagiom.) Papilio Laodice	-		295
Laomedia, (Papilio) Relbargus	•		60)
Lapathlaus, Aphis rumicis	•		513
Lap-hoorens, (holl.) Groslappen	, <b></b> -	VI.	
Lapillus, (Buccinum) Cteinchen	•	VL	463
Lapin, Laperesu, (ft') Raninchen	-		321
Lapis manati, Cectubfteln	-		176
Laplysia, Seelunge		VI.	
- depilans, Berhaarer .		VI.	
Laprenalcyonium, Alcyonium lobatum	•	VI2.	779
Lappenbiene, Apis centuncularis	-	¥2.	891
Lappentafer, Scarabeus bilobus	• ,		56
Laprenschinke, (Stedmuschel) Pinna loba		VI.	
Lappenschnede, (Flügeischnede) Strombu	s latissi-	•	
mus —		VI.	486
Lappenschnecke, (gejackter Delphin)	•	VI,	550
	Volata		
Lapponica •		VL	437
Lapplander, (Rliege) Mulca Lappona	•	<b>V2.</b>	957
Lapplander, (Golbh.) Chrysomela Lapp	onica	V.	175
Lapplander, (Raderlad) Blatta Lapponi		V.	406
Lapsche Lap-hoorn, (boll.) sapplandifc	e Zappen		
schnede —		VI.	437
Lapplyk, (schwed.) Lavaretfisch	<b>-</b>	IV.	325
Lapwing, (engl.) Riebly, Dornflügel	ш.	106.	431
Lar, (Homo) Langarm	L	Ę.	
Lara, (Papilio) Eins und zwen	•	<b>V</b> .	
Lark, (engl.) Lerche	•• .		517
Larus, Meme	II, 344.		
- albus, weiffe Meme - canus, kleine grave Meme		6.	
- cinerarius, große aschgraue Weive	-	ii.	
- fuscus, beame bunte Meme	_	11.	
- THEAT AND AND AND MANAGE	_		197 <i>(</i>

Larus	Laufekafer	255
		<b>26.</b> S.
Larus ichthyætus, Fischjäger	•	<b>6.</b> 108
- marinus, Seememe	•	II. 346
- mavius, geflectte Deeme	•	11. 346
- paraliticus, Gtruntjager	وناع ا	II. 348
ridibandus, Lachmeme	-	IL 348
tridactylus, Wintermeme	•	II. 345
Larus piscator, fleiner Fifcher, (	Reerschwalbe)	II. 353
Larvæ, Larven ber Infetten	_	V. 12
Larven der Insetten	•	V. 12
larven der Tagthierchen	•	V2. 777
Larven ber Bafferjungfern	•	V 764
Larvenfcnede, (Mondfcnede) Tu	rbo perfonatus	VI. ca2
tarbentoder, (Kaupentoder) lehneu	mon Larvarıın	1 V2. 860
Laska, Lalika, Lolna, (poln.) 28	Biefel -	L 271
laftrager, (Bodtafer) Ceramby:	k bajulus	V. 279
taterntrager, Fulgoræ		V. 447
Lathonia, (Papilio) Perlenmutter	pogel	V. 621
Latipes, (Tenebrio) Brettfuß		V. 376
Latro, (Cancer) Beutelfrabbe	• • •	V2. 1117
Lattichlaus, Aphis lactucæ	•	V. 515
laubfrosch, Rana arborea	•	III. 69
laubforalle, Elchara frondipora	-	VI2. 719
Edubrinde, Flustra frondiculosa	•	VI2. 812
laubfchild, (Citade) Cicada frond	itia .	V. 453
laufer, (Bachftelge) Motacilla Tr	ochilus	II. 620
laufer, (Bocklafer) Cerambyx cu		V. 268
laufer, (Grashupfer) Gryllus ped		V. 445
laufer, (Rrabbe) Cancer curfor		V2. 1098
laufer, (Sandlaufer) Cicindela h	vhrida	V. 328
Langenfreffer, (Rugelfafer) Curcu	ilio acridulus	V. 217
Laughing Gull, (engl.) Spotter,	(Meme)	11 240
Launces, (engl.) Schmelte		II. 348
Laurey, moluftischer Parkit	_	IV. 57
Laurier-blad, (holl.) Lorbeerblat		II. 141
land, (Infett) Pediculus		VI. 313
gans, (Portellane) Cypres pedicu	 	V2. 102/5
Somfosione (S. Sah Gliege) Comb	uus —	VI. 402
Laufefliege, (S. Joh-Fliege) Canthi Laufefreffer, (Stintfliese) Haman	aris pediculari	E V. 309
Eaufefreffer, (Stintfliege) Hemerc	IDINA LELIE	V2. 793
		Paufer

Lebré

	E6. S.
Lausetaferchen, (Rleintafer) Dormestes pedicularie	18 V. 10 <b>9</b>
	V2. 4:15
Lauser, (Rüßelkafer) Curculio pedicularius	V. 234
Laufestinter, (Stinffliege) Hemerobius flavicans	V2. 797
Laute, (Feige)	VI. 410
Lavacra, Buichbecken, (Giennuschel)	VI. 284
Lavandiere, (fr.) weisse Bachstelje -	II. 607
Lavaretfifch, (Salm) Salmo lavaretus	IV. 327
Laverne, (fr.) Feuersalamanter	III. 118
Lavoir, (fr.) Waschbecken	VI. 284
Lax, (schwed.) Salm —	IV. 310
Laxierfifch, (Meerbrachsem) Sparus Mæna	IV. 181
Laxmannegrille, Gryllus Laxmanni	Ġ. 268
Lax Oring, (norm.) grauer Lachs	
Lax. Offing (notion) granter ends	IV. 316
Lazarus, (Chama) Mustatenbluh -	VI. 289
Lazarustiappe, Spondylus —	VI. 279
gezacte, Spondylus gæderopus	VI. 280
— — oftindische,	¥I. 281
— — westindische —	VI. 280
<b> </b>	
Leben, animalisches, gehet nur allein durch ba	
Thierreich —	VI2. 953
Thierreich — Leben ist die Bewegung	VI2. 953 III. 17
Thierreich — Leben ist die Bewegung — Leben ist dreperlen —	VI2. 953 III. 17 III. 26
Thierreich — Leben ist die Bewegung	VI2. 953 III. 17 III. 26
Thierreich — Leben ist die Bewegung — Leben ist dreperlen —	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953
Thierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreperlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drep Reiche	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreperlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drep Reiche Leben, organisches, gehet nur durch das Pflanzen und Thierreich	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben, ist dreperlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drep Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches L. 23.	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreperlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drep Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Kische	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Fische Lebensart der Honigbienen	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 V2. 908 IV. 17 V2. 896
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben, ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Fische Lebensart der Honigbienen Lebensgiel des Menschen	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 963 IV. 17 V2. 896 I. 84
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Fische Lebensart der Honigbienen Lebensgiel des Menschen Lebersgiel des Menschen Lebersgrebe, (Rachtschm.) Phalæna hepatica	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 I. 84 V. 698
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben, ist dreyerley Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Neiche Leben, organisches, gehet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Fische Lebensart der Honigbienen Lebenshiel des Menschen Lebenshiel des Menschen Lebersfarde, (Nachtschm.) Phalsena hepatica Leberssich, (Kelsensisch) Teuthis hepatus	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 I. 84 V. 698 IV. 306
Thierreich Leben ist die Bewegung Leben, ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Hische Lebensart der Honigbienen Lebensziel des Menschen Lebersziel des Menschen Leberssiel, (Rachtschm.) Phalæna hepatica Leberssich, (Kelsenssich) Teuthis hepatus Leberssich, (Lippsisch) Labrus hepatus	VI2. 953 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 I. 84 V. 698 IV. 305 IV. 198
Thierreich Leben ist die Bewegung Leben, ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Honigbienen Lebensziel des Menschen Lebensziel des Menschen Leberfarbe, (Rachtschm.) Phalæna hepatica Leberssich, (Lippsisch) Labrus hepatus Lebers, (Coluber) Schlangenbalg	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 IV. 698 IV. 306 IV. 198 III. 156
Thierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Honigbienen Lebensziel des Wenschen Lebensziel des Wenschen Leberssiel, (Rachtschm.) Phalsena hepatica Leberssisch, (Elsensisch) Teuthis hepatus Leberis, (Coluber) Schlangenbasg Lebersrabbe, Cancer hepaticus	VI2. 953 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 II. 84 V. 698 IV. 306 IV. 198 III. 156 V2. 1116
Ehierreich Leben ist die Bewegung Leben, ist dreyerlen Leben, mechanisches, gebet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Honigbienen Lebensart der Honigbienen Lebensgiel des Menschen Leberssiel des Menschen Leberssisch (Rachtschm.) Phalwna hepatica Leberssisch (Elsensisch) Teuthis hepatus Leberis, (Coluber) Schlangenbasg Lebers, (Cancer hepaticus Leberwurm, (Bindwurm) Fasciola hepatica	VI2. 953 III. 17 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 IV. 698 IV. 306 IV. 198 IV. 198 IV. 198 IV. 198 IV. 198 IV. 198 V2. 1116 VI. 42
Thierreich Leben ist die Bewegung Leben ist dreyerlen Leben, mechanisches, gehet durch alle drey Reiche Leben, organisches, gebet nur durch das Pflanzen und Thierreich Leben, thierisches Lebensart der Ameisen Lebensart der Honigbienen Lebensziel des Wenschen Lebensziel des Wenschen Leberssiel, (Rachtschm.) Phalsena hepatica Leberssisch, (Elsensisch) Teuthis hepatus Leberis, (Coluber) Schlangenbasg Lebersrabbe, Cancer hepaticus	VI2. 953 III. 26 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 953 VI2. 968 IV. 17 V2. 896 II. 84 V. 698 IV. 306 IV. 198 III. 156 V2. 1116

Leccia	Leone	257
		Th. G.
Leccia, (ital.) Streitthunfifch		1V. 267
Leefsteinchen, (Mondschnede) Tur	ho politus	171 200
Lectrix, (Phalæna) Schedenle	be pontus	VI. 559
Leda, (Papilio) Querect	For V.F.	V. 680
Lederdecke, (Grashupfer) Gryllu	corioceure	V. 605
Ledertafer, (Erdfafer) Carabus co	oriogens	V. 431
Lederforalle, Madrepora coriace	oriaceus	V. 353
Lederschild, (Schildfrote) Testude		VI2. 721
Leech Out (and) Chanter	Corracea	III. 16
Leech-Owl, (engl.) Brandeule	4	II. 103
Leedjeskoraal, (holl.) Gliederfor	ralle -	VI2. 737
roode, (boll.) roth	e Guedertorall	
Leervisschen, (boll.) Decksiche	5 (12)	IV. 61
Leeuw, (boll.) Lowe	T-300.54	I. 230
Leenwenhofs Beobachtung ber Sa	amentpierchen	I. 78
Leeuwenkoppen, (holl.) Lowent	opte -	VI. 504
Leeuwkrabb, (holl.) Kahnfrebs	All the state of the state of	V2. 1126
Lefzendublet, (Tigerzunge)		VI. 240
Leglek, (furt.) meiffer Storch	-	II. 375
Leguan, bunter, Lacerta marmor	ata -	111. 107
Legumen, (Nautilus) Erbfenfcho	fe -	VI. 361
Legumen, (Solen) Saubohne	-	VI. 227
Leheras, egiptischer 3bis		II. 39t
Leilus, (Papilio) furinamifcher Po	age -	V. 575
Leiobatos, Spigmanl, (Roche)	STEEL STEEL	III. 243
Leiobatus, Pfeilfchmang, (Roche)	-	III. 247
Lemming, (Maus) Mus Lemmus		I. 339
Lemonias, (Papilio) Graupfan	-	V. 601
Lemur, Gefpenftibier	- I, I	15. G. 12
flavus, Widelschwang	Pay	S. 13
tardigrades, Langichleicher		I. 147
- volans, fliegende Rage		I. 149
Lena, (Papilio) ameritanische Mi	gmphe	V. 618
Leng. (Rabeljau) Gadus Molva	,m- n -	IV. 95
Lenof, (Lachsforelle) Salmo Lenol	K	S. 208
Lentillade, (fr.) Spigmaul, (Ro	the) —	III. 243
Leo, Lowe	196	1. 230
Leon, (span.) Lowe	77.75	I. 230
Leone, (ital.) Lome	<b>→</b> 7 Tu	1. 230
(disp.)	*	Leopard!

## Leptura

6		Th.	€.
Leopard, Felis Pardus -		I.	237
- guineischer, Felis Leopardus	-	<b>S</b> .	29
Leopardus, (Felis) guineischer Leopard	• • •	<b>E</b> .	29
Lepas, Meereichel -	<b>VI. 20</b> 1		
anatifera, Entenmuschel	•	VI.	208
anlerifera, Sansemuschel	•	VL	207
— — aurita, Langhals' -		VI.	209
- galeata, Pelimpocke	٤	G.	
testudinaria, Schildfrotenpocke	ن ن	VI.	206
Lepelaar, Lepelgans, (hoff.) Loffelgant	ì II.		
Lepidoptera, (Insecta) Schmetterlinge	2		542
Lepilma, (Sciena) Blatterschuppe	-	IV.	
Lepilma, Buderleder -	•	V2. 1	
- polypoda, Dornring		V2. 1	
- faccharina, Buckergaft		V2. 1	
- terrestris, Erdmotte		V2. 1	
Lepra, (ital.) Paase -			318
Leptura, weicher Polibock -	V. 283	<b>5</b> .	245
- alni, Erlenbodlein	-	$\nu$ .	
- aquatica, Wafferschwimmer	4	$\boldsymbol{\mathcal{V}}$ .	284
- arcuata, Wogenstrich	-	V.	
- arietis, Widber -		$\nu$ .	290
- attenuata, Schmalhals	-	V.	
— — collaris, Rothhals	4	<b>v</b> .	
detrita, Querftrich	- ,	V.	
interrogationis, Fraggelchen	•	V.	
— — linearis, Schmalbauch	-	V.	<b>2</b> 91
Massiliensis, fleiner Scheck	•	<b>6.</b> 2	143
— — melanura, Schwarzarsch	•	V.	<b>84</b>
- mystica, Scheck		Vi	<b>288</b>
- nigra, Kameelbocklein	•	K 2	
præulta, Zwergbocklein	_	V. 1	
quadrifasciata, Bietbanb	•	V. 2	
- quadrimaculata, Schwariffect	•	V.	
— — revestita, Schmarzbecke	•	V. 1	
rubra, Purpurschild		V. 1	
— — rustica, Bauernbocklein	<b>~</b>	V. 2	
- Ganguinolenta, Blutstügel	<b>-</b>	V. 2	85
	•	Lepto	112

Leptura Leucorodias	219
	₹b. <b>G</b> .
Leptura sericea, Seibenbocksein -	V. 286
- fexmaculata, Punttrand	V. 287
- testacea, Ziegelbach .	V. 285
- verbalci, Wolfrautbocklein -	V. 290
- violacea, Rosenbock	<b>6</b> . 243
- virens, Grunbocklein .	V. 286
virginea, Jungfer -	V. 288
Lepturus, (Trichiurus) Spikschwam	IV. 52
	3. <b>E</b> . 37
- Alpinus, Berghaafe	S. 38
- Brasiliensis, ungeschwänzer Daase	I. 325
- Capenlis, caapscer Saase	1. 324
cuniculus, Kaninchen	I. 322
— marinus, Berhaarer —	VI. 67
pufilius, Zwerghaase	S. 37
- timidus, Feldhaase	I. 318
yerche, Alauda — II. 517.	<b>5.</b> 136
- caapide, Alauda Capeniis	II. 521 II. 520
- florentinische, Alauda spinoletta	G. 137
- fenegallische, Alauda Senegalensis	II. 78
Lerchensperber, (Baumfalte)	VI. 104
Lernæa, Kiemenwurm  — asellina, Osschwurm	VI. 106
- branchialis, Kabeljauwurm	VI. 104
_ cyprinacea, Karauschemvurm -	VI. 105
- Galmonea, Eachswurm	VI. 105
Lerot, (fr.) Eichelmaus	I. 351
Lerzmachi, (pers.) Krampffisch	III. 237
Letaga polatucha, (most.) fliegendes Eichhorn	I. 359
Letterschulp, (boll.) achtes Strictbublet	VI. 277
Leucas, (Helix) Purpurstrich -	VI. 564
Leuchte, (l'aterntrager) Fulgora laternaria	V. 447
Leuchte, (Seefeber) Pennatula phofphorea	VI2. 897
Leuchter, (Laterntrager) Fulgora candelatia	V. 448
Leuciscus, (Cyprinus) Beißsisch -	IV. 390
Leucocypha, (Falco) rußischer Abler -	G. 65
Leucomelas, (Phalæna) Beifmolte	V. 701
Leucorodias, weiffer Reiber	II. 38t
R 2	Leuco.

,3		•		or R.
t		oe, (Papilio) Muftercharté		Th. & V. 612
		is, (Chætodon) Weißschwanz		IV. 169
		ik, (holl.) lerche	_	II, 517
		(Papilio) Reg	<u> </u>	V. 617
		er, (Scorpionfliege) Panorpa	Chá	V2. 804
		12, (neap.) Regenschnepf	·	II. 399
		an, (hebr.) Krokodill	_	111. 79
		notte, (Nachtschm) Phalæna X	viostella	V. 744
Lev	vrier.	(ft.) Windhund	-, .0.04.1	I. 208
Pen	er voi	n harwich, (Schelfischteufel)	-	JV. 68
T.e	yon,	(schwed.) Lowe	1	1. 230
Lez	zard,	(fr.) Eidechse	•	III. 77
Lh	ma,	(fpan.) peruvianisches Schaaf	fameel	I. 372
Lit	ane,	(brab) Rropfgans	÷	ÌI. 324
Lit	atri	c, (Phalæna) Rascher	4	V. 677
Lib	ella,	Balansfifth		III. 258
Libe	Nenju	mgfer, (Bastarbjungfer) Myrn	neleon Li	• .
	•	belluloides	-	V2. 798
Lib	ellul	i, Jungfer , -	V2. 76	. <b>S.</b> 315
<u> </u>			, •	V2. 769
<b>-</b>		Americana, Ameritanet	7	V26 771
		cancellata, Gitterbauch	<b>.</b> ,	V2. 769
<b>-</b>	<u> </u>	Capenfis, Afrifaner	· 🔞 📄	V2. 772
_		Carolina, Caroliner	-	V2. 772
		Chinensis, Chineser	-	<b>V2.</b> 771
-		depressa, Plattbauch	· •	V2. 768
<u>ت</u>	-	dimidiata, Salbflügek	۵	V2. 771
_	· <u>-</u>	fasciata, Banbfingel	, <del>-</del>	V2. 770
-	-	flaveola, Gelbflüget	<b>-</b>	V2. 767
-	-	forcipata, Schwanzhaken	-	V2. 770
<u></u>	<u> </u>	grandis, Riesin	<b>.</b>	V2. 769
<u></u>	Ī	juncek, Schmächtling	ان اند	¥2. 770
_	_	quadrimaculata, Schwarifin	âct	V2. 766
		rubicunda, Rothbrust		V2. 768
_			•	V2. 770
 		variegata, Indianer vulgata, Glasstügel	<u>.</u>	V2. 772
<u>-</u>				V2. 767
		vulgatissima, Dure	-	V2. 768
		• •		Libel-

A JE	₹b. €.
Libelluloides, (Myrmeleon) Libellenjungfe	
Libye, (Papilio) Silbertern	V. 603
Licetta, (ital.) Streifdedfifch -	IV. 61. 63
Lichenastrum, (Sertularia) Moosforalline	VI2. 853
Lichenoides, (Millepora) Moosmillepore	VI2. 716
Lichtflieger, (Nachtschm) Phalmna Lucernea	
Liczuda, (turf.) Summer	V2. 1122
Liebe der Thiere fur ihre Jungen -	I. 14
Liebesfactel, (Giestanne)	VI. 630
Liebling, (Rachtschm.) Phalæna amatoria	V. 705
Liebre, (fpan.) Saafe	I. 318
Liebftodeltafer, (Rugelf.) Curculio liguftici	V. 234
Lier van Harwich, (boll.) Schelfischteufel	IV. 68
Liereman, (bott.) gemeine Citabe -	V. 458
Lieven Heers - Haantje, (boll ) Sonnenfafe	V. 145
Lievre, (fr.) Saafe, Meerhaafe 1.	318. 111, 329
Ligea, (Papilio) Milchflect	V. 603
Light - horfeman, (engl ) Postfaube -	11. 103
Ligniperda, Larve der Etricheule	V2. 785
Ligarinus, Beifig	11. 589
	VI. 385
Liksteenties (holl.) rectitetucett	VI. 559
Lilienbahuchen, Chryfomela merdigera,	V. 194
Lilienforalline, Sertularia rofacea -	V12. 835
Lima, (Offrea) Reile	VI. 311
Limaces, Limaçons, (fr ) Erdichneden ohne &	ous VI. 59
Limacon, (fr ) Schnirtelschnecke	VI. 561
Limanda, (Pleuronectes) Schuppenbuttfich	IV. 156
Limax, Erdschnecke ohne Saus	VI. 59
agreftis, Aderichnede	VI. 65
albus, Gelbrand	VI. 64
ater, Waldschnecke	VI. 63
flavus, Bernfteinschnecke	VI. 65
hyalinus, Moosschnecke -	VI. 64
maximus, Bufchschnecke	VI. 64
papillofus, Wargenschnede -	VI. 65
rufus, Bergichnede -	VI. 64
Limax, (Madrepora) Steinschnedenforalle.	VI2. 678
R 3	Limo

	- 6 4 . 6 . A	•	
		Th.	€.
Limone di mare, (ital.) Barjenfcheibe		VI.	
Limpet-fish, (engl ) Klippfleber	-		603
Lin-ahl, (fomeb.) Rieferwurm, (Pride	<b>:</b> )	Ш,	234
Lincina, (Turbo) Breitbanb	•	VI.	555
Lindenlaus, (Pflanzenlaus) Aphis tilim	•	V.	514
Lindensauger, (Pfeilschw.) Sphinx tilim	•	V.	636
Lindenschild, (Schildlaus) Coccus tilim		V,	\$14
Lineola, (Chrysomela) Dintenlinie	-	V,	179
Lineola, (Cimex) Querlinie	-	V.	490
Lineola, (Loxia) gestreifter Rernbeiffer	2	II.	553
Lineola (Scarabæus) Etrichfafer	-	$\mathbf{V}_{\bullet}$	- 76
Ling, (engl.) Leng -			95
Lingua folis, (Tollina) Kagengunge	-	VI.	232
Linguatula, (Pleuronectes) Scharre	. 🕳	IV.	158
Lingulaco, Zungenfisch -		IV.	157
Itnie, (Meelfafer) Cenebrio linearis	•	V.	374
Linie:thabnchen, Chrysomela bilineata	•	V.	190
Lintifche Feige, (Stachelfchnecke) Murox p	erverlus	VI.	514
Lintsschraube, (Monbschnecke) Turbo p	erverius	VI.	558
Linnare, (fcmeb.) Schleiche	-		383
Linneifche Gintheilung ber Ordnungen ber	Infetten	V.	23
Linneifche Eintheilung ber Ordnungen bes I			
Linneifche Gintheilung ber Schmetterlinge			563
Linnet, (engl.) Flachefint	•		165
Linnotte, (fr.) Flackfint	•	II.	591
Linotte, (Fringilla) Rothbruft	•		165
Linfenfieh, (Schildfieh) Monoculus lont	icularis '	V2.	1149
Lint-koraal, (boll) Bandforalle		VI2.	718
Lint-worm, (holl) Bandwurm Lion, (engl.) Love	-	VI2.	902
Lion, (engl.) lowe -		I.	230
Lion, (fr.) tome	-	I.	230
Lion des pucerons, (fr.) Lausefresser	•	V2,	793
Lipdubblet, (holl.) Tiegerjunge	-	VI,	240
Lippoublet, (Benuemuschel) Venus fimb	riata	VI.	273
Lippenhahnchen, Chrysomela labiata	-	V.	191
Lippfisch, Labrus -			195
blaffarbiger, Labrus exoletus			213
— — bleyfärbiger, Labrus livens			311
	•	Lipi	ofilo

Lippfisch	Locke	all a	263
40		26.	G.
Lippfifch, brauner, Labrus Guaza	-	26	206
bunter, Labrus varius			215
Carolinifcher, Labrus Cromis			213
Chinefifcher, Labrus Chinensis			212
Eretenfischer, Labrus Cretensis		IV.	197
geftreifter, Labrus ftriatus		IV.	206
- grauer, Labrus grifeus	-	IV.	199
Indianischer, Labrus linearis	-	IV.	213
- marmorirter, Labrus mixtus	-	IV.	214
mit gabelformigem Schwange	-	IV.	195
mit gleichlangen Schwanzfloffen		IV.	202
- mit unbefannten Ruckenfinnen		IV.	214
punftirter, Labrus punctatus	-	IV.	208
roftfarbiger, Labrus ferrugineu	S	IV.	204
Liriope, (Papilio) Trauerrect	owlide	G.	288
Lithodendron, Steinbaum	-	VI2.	641
Lithophyta, Korallen	Lauren	VI. 10	. 23
Cellepora, Cellenforalle		VI2.	724
Madrepora, Sternforalle		VI2.	672
Millepora, Punftforalle		VI2.	709
Tubipora, Robrenforalle	711-10	VI2.	667
Litorne, (fr ) Bachholderdroffel		II.	528
Little - Buftard, engl.) fleine Trappgar	18		445
Little-Horn-Owl, (engl.) Baumenle	00 7		99
Litura, (Phalana) Drenftrich	0000	V.	703
Livane, (brab.) Kropfgans	10832		324
Livree d'ancre, (fr.) banbirter Blument	afer		86
Livreefcnede, (Stachelfchnede) Murex r	ubecu		504
Livrey - hoorn, (boll.) Lipreefchnede	1000	VI.	
Lixula, (Echinus) Ceefnotchen	Sug.	WI.	
Lobbetje, (boll.) gegadter Delphin	400	VI.	
Lobkoraal, (boll.) Dratforalle	•	VI2.	
Lobo, (span) Bolf	galaki	1.	
Lobo marino, (fpan.) Geefalb	63505	I.	
Lobster, (engl.) Hummer	668	V2. 1	
Loche de mer, (fr.) Seegrundel	Casan	IV.	
Loche franche, (fr.) Bartgrundel		IV.	
locke behauptet die Vernunft der Thiere R 4	N. T.	1.	den.

-	
Professiblence ( Barristian )	Th. C.
Loculator, (Tantalus) Rimmerfatt	VI. 627
Locust, (engl.) Deuschrecke	II. 389
Locusto (Conser) Services	V. 437
Locusta, (Cancer) Springer	V2. 1135
Locusta, (Gryllus) gemeine Deuschrecke	V. 434
Locusta marina, Seeheuschrecke	V2. 1129
Lodola, Lodora, (ital) Perche	II. 517
Lodra, Lodria, (itak) Klufotter -	L. 262
Lods, (schwed) Lootsmann	IV. 249
Lichetbesen, (hornsoralle) Gorgonia porosa	V12. 761
Zoffelente, Anas clypeata	II. 290.
Loffeldnabel, (Sohlfdnabel) Cancroma cochlear	ia II. 368
Löffler, Platalea	IL 361
Lofflerlans, Pediculus Platalez.	V2. 1034
Loehoensche Hooren, (boll.) Luboneserschnecken	VI. 482
Foice, Leo	I. 230
Lowenaffe, Simia Oedipus —	I. 133
Lowenhaut, (Nachtschm) Phalmena fulvia	V. 682
Lowentopf, (Stachelichnecke) Murex Pyrum	VI. 504
Lowenschwang, (Affe) Simia Faunus -	I. 125
Powentute, Conus varius —	VI. 378
Logger-Head, (engl.) Riesenschildfrote	III. 20
Lokong, arabifche Trappgans .	II. 444
Lohs, (finnl) lachs, Salm -	IV. 310
Loja, (schwed) Restling	IV. 396
Loir, (fr.) Waldmaus	I. 350
Loligo, (Sepia) Scefage -	VI. 117
Lombriros, (fpan.) Erdwürmer -	VL 38
Lomvia, Caucherhuhn —.	H. 339
Longarmed-Ape, (engl.) langarm -	<b>€</b> . 4
Longipes, (Cancer) Langfuß	V2. 1114
Longipes, (Cimex) langfuß -	V. 493
Longipes, (Mus) rangfuß -	L 352
Longipes, (Scarabæus) langfuß	V. 84
Longustin, (fr.) Garnale	V2. 1125
Loopertje, (holl) Läufer	II. 620
Lovismann, (Stachelbarid) Gafterofeus ductor	IV. 248
Lophius, Seetenfel	III. 279
# A Property And A Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co	Lophius

Lophius	Loxia	269
Y		Th S.
Lophius piscatorius, Meerfrosch	<del>-</del>	III. 279
Lorbeerblat, (Grasburfer) Gryllus	laurifolius	V. 428
Lorbeerblat, (Rammmufchel) Oftre	a folium	VI. 313
Loricaria, Pangerfisch	• '	1V. 307
- cataphrafta, harnischfis	d) -	IV. 307
Loricatus, Pangerthier, Armadia		I. 188
Loriot, (fr.) Goldbrossel	• _	ĮI. 186,
Lorri, Lory, Moluttischer Partit	- II.	
Lory, (Paragei) Plittacus Lory	•	II. 142
Los, (holl) tuchs.	₹ '	I. 241
Lota, (Gadus) Trusche	7	IV. 96
Loren (Univer Carette) Certhia	Lotenia -	II. 261
Lotor (Urlus) Coati	<b>-</b>	I. 284
Lotorium, (Murex) gebratene Bi	tu .	VI. 503
Louoldek, (ungr.) Schmetterling	-	V. 555
Loup, (fr.) Bolf	•	1. 219
Loup - cervier, (fr.) Luchs	_	I. 241
Loupha, (gricch.) schwarzes Wasse	Loudu	II. 427
Loup - marin, (fr.) Seemolf Loule, (engl.) Laus	•	ĮV. 54
		/2. 1026
Loutre, (frang) Flufotter. Louva Dios, (port.) Sottentottego	., =	I. 262
Louvazzo, (ital.) Seemolf	j£ -	V. 413
Loxia, Rernbeisser	- 17	ĮV. 54
Angolantis Mudalithan 6	11. 5.44.	C. 148
- Angolensis, Angolischer & - aurata, Golbforf	ernoether.	11, 553
Dancalantia Changalich	Campbell	C. 152
hisalam Omantinkia	Mernoeillet.	II. 555
— Bourbonnensis, Bourbonec	uókillsé	II. 559
- butyracea, Buttervogel		C. 154
	-	11. 554
- cana, grauer Rernbeiger - Canadentis, Canadifcher B	crnheißer	И. 556
Capenlis, Caapfcher Rern	beiter	II. 555
Cardinalis, Saubenblutfind	1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	II. 557
çaudata, Saubencoliou,	•	II. 547 S. 149
coerulea, himmelblauer Re	rnbeißer	II. 558
collaria, Rragenvogel		II. 555
conchata, Muschelvogel	• "	E. 154
<b>9</b> . 5	•	
सर दे		40xis

	Th.	E.
Loxia Coromandela, Gelbruden -	€.	151
crispa, Kraußbauch -		154
- cristata, Cacatufint .	ල.	149
- criftata, Daubenfernbeißer -	II.	549
cucullata, Kappentrager -		152
- curvirostra, Kursschnabel -	11.	544
- cyanea, bellblauer Rernbeißer, -		552
- Dominicana, Domingifcher Kernbeißer	II.	548
- erythrocephala, Rothforf -	II.	549
— — erythrophthalma, Rothauge -		153
fimbriata, Gelbrand -		.153
- flavicans, gelber Kernbeiger, -		550
fusca, brauner Kernbeiffer -		559
- groffa, grofer Rernbeißer -		558
- hæmorrhoidalis, Rothfeder -		153
- hordeacea, Gerftenfreffer -	11,	551
laticauda, Breitschwang .	€.	151
- lengura, Weißburgel -	<b>E</b> .	150
Liturata, Steifbruft -	Ø.	153
- Ludoviciana, Louiffanischer Rernbeißer	II,	557
- maculata, geflecter Rernbeißer -	€.	150
- Madagascaria, Madagastarifcher Rernbe	if. II.	558
- Madagascariensis, Mabagastarischer Rerr		
- Maja, Blaffcnabel - Maja, Beiftopf	Œ,	150
- Maja, Weißtopf	Ц.	549
Malabarica, Malabarifcher Rernbeißer	: II.	555
Malacca, Malactischer Kernbeißer		551
- melanocephala, Schwarzfopf II, 550		
- melanura, Schwarischwanz -	Θ.	153
- Mexicana, Gelbtopf	, 1I.	223
- Mexicana, Mexicanischer Reenbeißer	11.	548
- minima, fleiner Rernbeiffer .	11,	559
- minuta, 3mergfernbeißer -	IL	559
- Molucca, Moluctischer Rerubeiffer		551
- nigra, schwarzer Kernbeißer -	11.	557
- nigra, Trauervogel -		152
- motata, Weißband		152
- oryzivora, Reißfresser -		550
	L	xia,

Loxia	Lumbricus	267
187.42	9 8	Th. E.
Loxia panicivora, Rornfreffer	-	II. 550
Philippina, Philippinis		II. 556
- punctulata, gefprenfelte	er Rernbeiffer	II. 551
pyrrhula, Thumpfaff		II. 547
rubricollis, Rethbals	_	G. 151
fanguiniroftris, Blutsch	nabel -	11. 552
Sibirica, Cibirier	-	G. 148
- ftriata, braungeftreifter	Rernbeiffer	II. 556
fulphurata, Gelbfeble	4,0015	II. 555
undulata, gewolfter Re	enbeiffer -	G. 151
- violacea, violetfarbiger		II. 558
virens, Grunling	_	II. 553
Lubin, (fr.) Calmbarich		IV. 228
Lucanus, Feuerschroter		V. 93
- carinatus, Rieltrager		V. 97
- interruptus, Doppel	fahild -	V. 97
- tridentatus, Drengad	f -	V. 97
Lucerna, (Trigla) Meerleuch	te -	IV. 276
Lucerna, (venet ) Sternfeber	• 4	IV. 72
Luche, Felis Lynx	- Galtanian	I. 241
Lucifer, (Strombus) Rameelfe	hnecke -	VI. 484
Lucina, (Papilio) Bledenbant		V. 617
Lucinda, (Papilio) Ctablflug	1 - 102 -	C. 288
Lucius, (Efox) Secht	· IV.	336, 330
Lucula, Johanniswurm		V. 298
Lucunter, (Echinus) Enerigel	₩ 1933	VI. 151
Luftfeuer, (leuchtender Rafer)	Lambyris bicolor	V. 304
Luftvogel, (Paradisvogel) Par	adilea apodia	11. 197
Lugarno, Lugarino, (ital.)	leifig —	11. 190
Lubenefer, (Flugelichnede) Stro	mbus Luhuanus	VI. 482
Lujer, (dan) Reftling		IV. 396
Lufeling, (Beifig) Pipra feren	a -	II. 624
Luis, (holl) Laus	-	V2. 1026
Luit, (boll.) Beige	- 1	VI. 410
Lukzo, (griech.) Becht	-	IV. 339
Lumagotto, (ital,) Erdichnede	ohne Haus	VI. 59
Lumbricoides, (Afcaris) Day	mwurm -	VI. 36
Lumbricus, Regenwurm		VI. 38
		Lum-

## M.

AN CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO		1
M, (Rachtschm.) Phalæna Mi	. 4	V. 684
Maagd, (holl.) Thurmwalze		VI. 427
Maagde-koraal, (holl.) Jungferntora	tle	VI2. 705
Maagdelyke Kousdubblet, (boll) 31	ıngfer	VI. 278
Maage, (norm ) Meme	1 34 5	II. 344
Maandubblet, (boll.) Romrasmufchel		VI. 304
Maanhoorens, (boll.) Mondichnecken		VI. 539
Maansoog, (boll.) Riefenobr		VI. 548
Maanvisschje, (boll.) Mondfisch	4	IV. 143
Macaco, (Lemur) Bartfragen	_	I. 147
Macao, (Plittacus) westinbischer Rabe		II. 126
Macaquo, angolischer Uffe	4	I. 127
Macarell, (engl.) Mafreele	_	IV. 257
Macareux, (fr ) Papagentaucher	2 II.	308. 311
Maccao, (engl.) langfchwanziger Pape		II. 129
Maceau, (ind.) gruner brafilianifcher 9		II. 130
Machaon, (Papilio) Roniginnenpage	-	V. 575
Machlis Plinii, Rennthier	-	I. 395
Madrill, (Rafenfifd)		IV. 394
Macreuse, (fr.) fchwarze Ente	-	II. 281
Macroule, (fr ) fcmarges Bafferhuhr		II. 427
Maetra, Rorbmufchel -		VI. 254
corallina, Milchschaale		VI. 256
glabrata, Glattnabel	4	VI. 255
lutraria, Schlamminufchel	_	VI. 256
- plicatoria Rungelforb		VI. 255
- folida, Strandmuschel		VI. 256
Sprengleri, Sprenglermufchel		VI. 254
ftriatula, Streifforb	- 4	VI. 255
ftultorum, Strafferb		VI. 256
Maeucagua, (braf) Karger, (Anarrhui	bn)	II. 440
Madenfreffer, Crotophaga	-	II, 165
afrifanischer, Crotophag	a ani	II. 165
furinamifcher, Crotophag		or II. 165
Madrepora, Sternforalle	1 16,20	VI2. 672
- acropora, Sochftern	VI2.	689, 696
100	W.	Madre-

Mæandrites, Gehirnforalle

Mæna, (Sparus) Larierfisch

Meandrites, (Madrepora) Irrgatien

VI2. 579

VI2. 680

JV. 181

Manen

Manenpapagey	Makreele	27 <b>t</b>
		£6. €.
Manenpapagen, Alca cirrata		<b>S.</b> 104
Manenreiher, Ardea comata	•	6. 11t
Mantel, (Rammmufcheln mit ungl	leichen Ohren	VI. 306
Mantelchen, (Kammmuschel) Oft	rea Pulio	VI. 309
Mantelden, (Rachtschmetterl.) Pl	halæna incanats	V. 718
Mæz, (arab) Bock	-	I. 404
Mag-aal, (boll.) Aalmutter	•	IV. 106
Magpy, (engl.) Elftet	•	II. 177
Maguari, (braf.) Storch	. •	II. 377
Magus, (Conus) geflectes Rage	hen 4	VI. 380
Magus, (Trochus) Derenmeister	•	VI. 530
Mablermufchel, (Rlaffmufchel) M	ya pictorum	VI. 219
Mablerichild, (Stinttafer) Bupre	estis picta	G. 249
Mahltrager, (Baftardmefpe) Sph	ex stigma	V2. 871
Maja, (Cancer) Teufelsfrabbe	•	V2. 1113
Maiauge, (Maitafer) Meloë oce	ilata -	E. 258
Maibock, (Maikafer) Meloë Nec	ydale <b>s</b>	S. 256
Maitafer, Meloë -	V. 378	S. 256
- geflügelt, mit Flügelbede	in so lang als der	;
Körper	-	V. 380
- gelber, Meloë lutea	-	<b>6. 259</b>
- geschwärzter, Meloë atr	ata .	<b>S. 260</b>
- ungeflügelt, mit furgen I		V. 379
— Utalischer Meloë Urale		S. 260
Maifafer, Scarabæus Melolonth	ia —	V. 80
Maimon, (Simia) Teufel		Î. 123
Main de lardre, (fr.) Grindhan		VI2. 775
Main de larron, (fr ) Seehand	•	VI2. 775
Main de mer, (fr.) Seehand	•	VI2. 647
Main-Parrot, (engl.) ebler Papa	iRed —	ll. 129
Maipouri, (Suajan.) Elendthier Maivogel, (fcmarge Meerfcmalb	<b>~</b>	J. 389
Maimurm, (Maitafer) Meloë N	la au ter	II. 352
Maki, Eichhornaffe	Tajatib V.	378. 380
Matreele, Scomber	_	L 149
blaue, Scomber glaucus		IV. 256
- gemeine, Scomber	_	IV. 263
- mit einzelnen Baftarbftoff	en –	IV. 257
and and and Anisagaliali	-	IV. 257 Mate
		w(qt/

	Th.	À
Dafrecle, mit in einander verwachfenen Baftarb,		<b>O</b> .
flossen -	IV.	263
Matreelftore -	-	283
Makrill, (ichweb.) Matreele -	IV.	
Mal, (schwed.) Bels	IV.	
Malacopterigii, Meichflosser -	ĮV.	<u>,</u> 3
Malarmat, (fr.) Pangerhabn -	ĪV.	273
Mallemokke, (gronl.) bunte Metve	II.	347
Malleus, (Oftrea) rolnischer hammer -	VI.	312
Mallinæppa, (ichwed.) Bafferschnepfe -	II.	397
Malma, (ruff.) Lachs	IV:	3 i 2
Malosche Hoorn, (boll.) frangbische Schellen	١.,	
schnecke -	VI.	
Malpolon, (cenlan ) Bischernatter -	111.	
Malvenpapillen, (Tagschm.) Papilio Malvæ		632
Malvigio, (ital.) Bipbrossel -	· II.	σξį
`Mameebaume, die Frucht derfelben ift die Nahrun	9	
bes großen fliegenden Ginhorns	Ų.	51
Mamilla, (Nerita) Warzendotter -		187
Mammotovacost, was es seh		172
	623.	
Manacus, (Pipra) Beifinaden -		624
Manche de couteau, (fr ) Scheide -		225
Mancinella, (Murex) gelbes Maulbeer	VI.	548
Mandator, (Ichneumon) Gebieter	٧ <u>2</u> .	
Manbelfrabe, Coracias garrula -		183
Manbelfrabe, Merula saxatilis -		177
Manga; (afrik.) Paradiesfisch	_	359
Mange-fourmis, (fr.) Atneisenbar		180
Manicou, (fr.) Waldrage		192
Manifestator, (Ichneumon) Langschwang	73.	
Manis, Schulppthier		185
- pentadactyla, fünffingeriges -		186
— tetradactyla, bierfingeriges —		186
Mannshand, Alcyonium digitatum - tode, Mannstehen, alte Mannsbaus	VI2.	779
men, (Mannshand)	VI2.	418
		500
Mansart, (fr.) Ringestaube		بننده

Manschetten	Maringoins	273
410		₹b. €.
Manfchetten, (gezactter Delphi	n) =	VI. 550
Manstacembelus, Schlangenfi	do -	IV. 60
Mantean Ducal, (fr.) Roning	mantel -	VI. 307
Mantel, bandirter, (Tagichin)	Papilio Cinxia	V 618
- bunter, (Lagichin) Papi	lio Hypermnestra	V. 616
- glatter, (Rammufchel)	Offrea glabra	VI. 310
Mantelhuhn, (Berghuhn) Teti	ao togatus	II. 485
Mantelmeme, (Geememe)	addison to	II. 347
Mantis, Gefpenftfafer	- V. 408	G. 264
Africana, Langnafe, (6	Brasbupfer)	V. 417
bicornis, Spaltmirbel	-	V. 414
- brachyptera, Kuriffug	el -	G. 264
	nft 3	V. 414
irrorata, Sprenfelgefp	enft -	V. 413
- oratoria, Betpfafchen		V. 412
- pectinicornis, Chinefer		V. 414
nannicamic Cahankan	n 🛎	G. 264
manhelmhen	Grengel -	
DEBCORIO Dattantated	24.	V. 409 V. 413
religiosa, europaischer ciccifolia, mandelndes ftrumaria, Kropftrager	Blatmanberer	V. 411
- ficcifolia, mandelndes	Blat :	V. 410
- ftrumaria, Rropftraget	A STATE OF THE STATE OF	V. 414
- tricolor, Augenobr	4/20	V. 414
Manto, (Phalæna) Drepedfiu	iel 2	C. 312
Manucodiata, Paradisvogel		11. 198
Manus Diaboli, (Alcyonium)	Teufelebanb	VI2. 788
Mapach, Coati -		1. 284
Mappa, (Cyprea) Caapichned	ė i	VI. 388
Mapurit, (Stett) Viverra Ma		C. 32
Maquereau, (fr.) Mafrecle	1 2	IV. 257
Maracana, gruner brafilianifch	er Managen	II. 130
Maracello, (rom.) Mafrecle		IV. 257
Marail, (Fafan) Phalianus M.	arail a	G. 125
Martustafer, (Mattafer) Mel		V. 383
Marbet, Mustela Martes		1. 267
Mareca, Moreca, (amerif.)	Bahamifche Ente	II. 289
Margan, (Rage) Felis Margay		S. 29
Maringoins, (fr.) ameritanifch		V2. 989
de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de la company de	S	Maring
	-	WANTED TO

• •	Th.	Ä
Affection materials (Martinette		
Marino pelcatore, (ital.) Meerfrosch	III. 2	
Maripola, (span.) Schnetterling	V. 4	
Mariscus, (Sirex) Schwarzafter -	V2. 8	
Marte, (Bockfefet) Cerambyx ftigma		
Martsauger, (Schlupswespe) Tenthredo nigra	V2. 8	
Marlpriem, (holl.) Stricknabel -	VI. 4	
Marmeleidechse, Laccerta dineiva		92
Marmor, grauer, (Tagschm.) Papilio Demophon Marmorargus, (Tagschm.) Papilio Galathea		
Marmoren, (Rufteltaffer) Curculio ovalis	V. 6	
Marmorfutter, (Lagicom) Papilio Cyclippè	V. 2	
Marmorhoorn, (boll.) Herztute -	Vi 6	4
Marmorohr, (Meerohr) Haliotis marmorata	VI, 3 VI. 5	od
Marmola, (brof.) Bufdrage -	I. 2	177
Marmota, (Mus) Murmelthice -	1. 2	73
- monax, amerifanisches Murmelthier	I. 3	41
Marmotte; (Vespertilio) Spikohr –	€. 1	45
Maroekevisch, (boll.) Leberfisch —	IV. 3	20
Marouette, (fr.) fleine Bafferralle -	II. 4	3
Marribous, (furin ) carolinifche Befre	V2. 8	37
Marripola nigra, (span.) schwarzer Reinbeisser	II. 5	چ
Marsbanker, (hoff.) Bastardmatrecle -	IV: 2	) / Kà
Marshoorn, (boll.) gerippter Delfuchen	VI. 50	03 04
Marsicone, (venet.) Grundel -	IV: 1	30
Marsouin, (fr.) Delphin -	I. 5	
Marspitt, (gothl.) Aufterficher	II. 4	24
Marfwin, (fcmet.) Meerschweinchen, Delphin I.	324. 50	
Mariyas, (Papilio) Doppelschwang -	V. 6	23
Martaro, Martarello, (ital.) Marber -	I: 20	-3 64
Marteau, (fr.) Hammerfisch -	III. 2	cgi
Martello, (ital.) hammer fich -	III. 2	
Martensvogel, (holl.) blauer Habicht -	II.	
Martes, (Muftela) Marber -	I. 2	
Martin, (engl.) Saubenmerle -	II. 19	95
Martin, (engl.) Soneschwathe -	II. 6	, <u>,</u>
Martin, (engl.) Marber -	I. 26	
Martinazzo, (venet ) bunte Metve	II. 34	
Martinet, (fr.) hausschmalbe	H. 6	<b>3</b> 2
	Ma	

Martinet Maulmurf 275
26. S.
Martinet - pecheur, (fr.) Eiswogel 11. 236. 237
Martre, Marte, (fr.) Marber 1. 267 Marplander, (Stinffafer) Bupreftis Mariana V. 336
Marjander, (Stinttafer) Bupreitis Mariana V. 336
Malarino, (port ) Dimmerfatt
Mafer, weiffe, (Porzellane) Cyprea Exanthema VI 387
Mafernfleck, (Grashupfer) Gryllus morbillolus V. 439
Magninorgellane, Cyprea Lynx - VI. 396 Magnitherlane, Aphls aceris V. 519
masheloctians, Aprils aceris
Masfarin, (Papagen) Plittacus mascarius 76
Maste, (Krabbe) Cancer personatus W4 1991 V2. 1111
Maffifch, (Rachelot) Physeter Turlio A A 1911 I. 503
Mastochse, Bos Taurus - phili & 57 Mastochen, Sus Scropha - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
wantamen, Sus Scropna
Mater perlarum, Perlennuttet and all - 1 . 330
Materie fann nicht benfen - VI2. 934
Mathoen, (boll.) Langfuß, (Regenpfeifer) 11. 420
Matin, (fe.) Bullenbeiffer, Wachthund of 1 - 11 1. 208
Matronula, (Phatena) Dame (Mary - 17 V. 68t
Matrofe, (E. Joh Fliege) Cantharis navalis V. 314 Matrofenmuge, (Navrentappe) - VI. 610
Matuicui; (amerit.) kleiner Kropfvogel - II. 391
Matuitui, (Braf.) Strandpfeifer — 11. 415
Matthing (Denities) Ottomorphical
Managaratic Onitone mideralis
Maturna, (Papilio) Purpurflugel - V. 618 Maueraffeli Oniscus ruderalis - S. 349 Mauerbienen V. 246: V2. 907
Mauernachtigall; (Schwarzfehichen) - II. 615
Mauerschivalbe, Hirundo apus - II 633
Mauerspecht, (Baumlaufer) Certhia muraria II. 254
Mauerfrinne Aranea frenica - V2. 1083
Mauerfrinne, Aranea scenica - V2. 1083 Maugo, (Trochilus) Riese - II. 267
Maulheer (Stachelschnede) Nurex richius VI. 506
- gelbes, Murex Mancinella - VI. 508
generated Marey Hystrix - VI. 507
- meiffes, Murex Neritoideus - VI. 507
— gelbes, Murex Mancinella - VI. 508  — gesacttes, Murex Hyftrix - VI. 507  — teiffes, Murex Neritoideus - VI. 507  Maulefel, Equus Mulus - I. 454
Maulesel, Equus Mulus I. 454 Manlwurf, Talpa I. 295. © 35
- attatticher Taing Hilarica
- europaicher. Talpa Europæa - 1: 205
- geflecter, Talpa Frilia - 6. 36
S 2 Mauls

-, -			
600 and more a	office (Mantallana P		£6. G.
Manitonet, g	elber, (Porsellane) C 1er, (Porsell.) Cypre	yprez 1 zipa	VI. 391 VI. 391
— — glau	er, Talpa Americana	a Media	<b>€</b> . 36
Manimuriari	lle, (Grashupfer) Gr	vilo-talna	V. 422
	fpe) Velpa muraria	, 110-carpa	V2. 882
	mex) Afrikanet	<b>.</b>	V. 479
Maus, Mus	-	I. ea	4: 🖲. 39
	anische, Mus Cabiai	3	<b>5</b> . 40
- brafilie	anische, Mus aperea	, <b>÷</b>	<b>5</b> . 40
- gefellig	ge, Mus socialis	÷	S. 45
- geftrei	fte, Mus striatus	7	I. 352
	he, Mus Bobak	<b>±</b>	. 😇. 40
— — polnife	pe, Mus citellus	•	l. 339
- wilde,	Mus barbarus	<u>.</u>	5. 47
Mans, (Por	ellane) Cyprea luric	la -	VI. 392
Mausbornsch	ild, (Schildlang) Coc	eus ruici	V. 432
Maufeadler,	Falco lanarius	· 🚣	11. 84
Maufebeiffer,	(Pajeling)	7	17. 391
Mauseeichbor	n, Sciurus Glis		1. 358
Maufetanger,	(Serpent ) Boa mu	rina	III. 149 V. 201
Manlepapuc	en, Chrysomela muri	nafrác muminus	
Maufetaferco	en, (Kleinfafer) Dorr	nerces marmas	I. 302
Manietopt,	Spi <b>h</b> mans) Sorex 17 ishild, (Schildlaus) (	oceus pilofelli	e V. 535
Manlephrien	Klebermans) Vesperi	ilio murinus	I. 154
Mondape, (	Schnirkelschnecke) He	liv surienlate	VL 581
Manuel (Cr	ammetsvogel) Turch	ie Maiivis	É. 141
Mauvis, (fr.	) Rindroffel	•	II. 530
Manaude. (A	Raifafer) Meloë oce	llata 4	S. 258
Manhod. (1	Rattafer) Meloë Nec	ydalea	€. 256
Mantafer, N	Ieloë -	V. 378	. G. 259
- gefi	ügelt, mit Blugelbede	n so lang als de	et .
	Rotver	•	V. 380
gelb	er, Meloë lutea	<b>.</b>	G. 259
gefd	prargter, Meloe atre	ita -	<b>5.</b> 260
- unge	eflügelt, mit furgen D	ectatilden	V. 379
— — Ura	lischer, Meloë Urales	nus -	<b>5.</b> 260
Mapfafer, Sc	carabæus Melolontha	• •	V. 80 II. 353
Maywogel, (	schwarze Meerschwalb	•	Ray.
			- NA

Manwurm, (Maifafer) Meloë Majalis  Mazelen, (boll.) Mafernporgellane  Meander, (Papilio) Plauband  Meandrite, (fr.) Gebirnforcalle  Mechanismus der Materie  Medon, (Papilio) Beißfrige  Medon, (Papilio) Beißfrige  Medufa, (Pielifchwani) Sphinx Medufa  Medufa, Qualle  — æquorea, Rothsirtel  — aurita, Dhrqualle  — brachiata, Armqualle  — ciliata, Harmqualle  — cruciata, Paarqualle  — cruciata, Recutgqualle  — cruciata, Recutgqualle  — hyloscella, Drepet  — hyloscella, Drepet  — pelagica, Geeschwermer  — pilearis, Geemuge  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velella, Geegelqualle  — velelfact, (Bitprtleber) Patella laciniofa  Medusentopf, (Ripptleber) Patella laciniofa  Medusentopf, (Geestern) Asteria Caput Meduse  Welfact, (Boctfafer) Cerambyx farinosus  Meeraal, Muræna Conger  Meeraal, Muræna Conger  Meeraal, (Bitteraal)  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerabler, (Roche	Maywurm	Meerbrachfem	277
Marvern, (Maifafer) Melos Majalis Mazelen, (boll.) Mafernporgellane Meander, (Papilio) Plaubanb Meandrite, (fr.) Gebirnforalle Mechanismus ber Materie Medon, (Papilio) Beißfrige Medon, (Papilio) Beißfrige Medufa, Qualte — wquorea, Rothgirfel — aurita, Dbrqualle — brachiata, Anarqualle — ciliata, Hamqualle — ciliata, Kafernqualle — cruciata, Rreubqualle — hemisphærea, Palbfugel — hysoscella, Dreped — marsupialis, Meertasse — pelagica, Geeschwermer — pilearis, Geemüge — velella, Geegelqualle — velella, Geegelqualle — velella, Geegelqualle — velella, Geestenn) Asteria Caput Meduse  Medusa-hoofd, (bost ) Meousentopf Medusa-hoofd, (Biprtleber) Patella laciniofa Mebusentopf, (Riprtleber) Patella laciniofa Meelsafer, Tenebriones — gestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — v. 363  Reeraal, (Bitteraal)  Reerasile, (Roche) Raja aquila  Reerasile, (Rippssch) Labrus Turdus  Reerasile, (Rippssch) Labrus Turdus  Reerbarben, Mulli  Reerbarben, Mulli  Reerbarben, Mulli  Reerbarben, Sparus — banbirter — banbirter — banbirter — banbirter — banbirter — banbirter — banbirter — banbirter — banbirter	95 J.C.	,	7
Mazelen, (boll.) Masernporzellane Meander, (Papilio) Blaubanb Meander, (Papilio) Blaubanb Meandrite, (fr.) Gebirnforalle Wl2. 679 Mechanismus der Materie Wl2. 937 Medon, (Papilio) Beißspiße Webusa, (Pseilschwans) Sphinx Medusa Medusa, Qualle Wl. 120. ©. 356  — æquorea, Rothsirtel — aurita, Dhrqualle — brachiata, Armqualle — ciliata, Basernqualle — ciliata, Fasernqualle — cruciata, Recutqualle — cruciata, Recutqualle — hemisphærea, Dalbtugel — hysoscella, Drened — wl. 127 — hysoscella, Drened — vl. 127 — pelagica, Eeschwermer — pilearis, Ecemüge — velella, Scegelqualle — velella, Scegelqualle — velella, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velella, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelqualle — velesla, Gegelquall	Manmurn, (Maifafer) Melod	Maialis .	
Meander, (Papilio) Blaubanb Meandrite, (fr) Gebirnforalle Medon, (Papilio) Belßfpiße Webusa, (Pfeilschwans) Sphinx Medusa Medusa, Qualle Wil. 120. ©. 356  — æquorea, Rothsirtel — aurita, Dhrqualle — brachiata, Armqualle — ciliata, Haerqualle — ciliata, Fasernqualle — cruciata, Recutqualle — cruciata, Recutqualle — hemisphærea, Dalbtugel — hemisphærea, Dalbtugel — marsupialis, Meertasche — pelagica, Eeeschwermer — pilearis, Eceniuge — porpita, Etemqualle — vil. 127  Medusa hoofd, (bost.) Meousenbopf  Medusa hoofd, (bost.) Meousenbopf  Meeltaser, Tenebriones — v. 367, ©. 252 — gestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelt	Mazelen, (boll.) Mafernrorsel	None -	
Meandrite, (fr.) Gehirnforalle  Wedanismus der Materie  Wedon, (Papilio) Beißfriße  Wedon, (Pfeilschwans) Sphinx Medusa  Medusa, Qualle  — aguarea, Rothsirfel — aurita, Dhrquasse — brachiata, Armquasse — capillata, Daarquasse — ciliata, Fasernquasse — cruciata, Rrentguasse — hemisphærea, Dalbfuget — hysoccella, Drenect — hysoccella, Drenect — pelagica, Geeschwermer — pilearis, Geemuse — velella, Gregelquasse — velella, Gregelquasse — velella, Gregelquasse — velesse, Gestern) Asteria Caput Medusæ  Weetsafe, (Stippfleber) Patella laciniosa  Weetsafe, (Seeffer) Cerambyx farinosse  Weetsafe, (Sitteraal)  Weetsafe, Murgena Conger  Weeraal, Murgena Conger  Weetsafe, Murgena Conger  Weetsafe, (Roche) Raja aquila  Weetsafe, Mugil  Weetbarben, Musil  Weetbarben, Musil  Weetbarben, Musil  Weetbarben, Musil  Weetbarben, Sparus — bandirter — bandirter — bunter	Meander (Papilio) Blaubant		
Medon, (Papitio) Beißfriße  Medon, (Papitio) Beißfriße  Medufa, (Pfeilschwans) Sphinx Medusa  Medufa, Qualle  — equorea, Rothsirtes  — equorea, Rothsirtes  — brachiata, Druguss  — capillata, Daarquass  — ciliata, Rasernquass  — cruciata, Rreunguss  — hemisphærea, Dalbtuges  — hysoscella, Drened  — hysoscella, Drened  — pelagica, Eeschwermer  — pelagica, Eeschwermer  — porpita, Eteinquass  — velella, Ecegelquass  — velella, Ecegelquass  — veless, Eesten Asteria Caput Medus  Weetsfer, Tenebriones  — gestügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — gestügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — ungefügeste  — weeraal, (Bitteraal)  Meeraal, Muræna Conger  Meeraal, (Bitteraal)  Meeraal, (Bitteraal)  Meeraaler, (Roche) Raja aquila  Meeraaler, (Roche) Raja aquila  Meeraaler, (Roche) Raja aquila  Meeraaler, Mugil  Meeraaler, Mugil  Meeraalfie, Meeriges, (Eeeapsel)  Meerbarben, Musli  Meerbarben, Musli  Meerbarben, Musli  Meerbarben, Sparus  — bandirter  — bandirter  — bunter	Meandrite (fr ) Gehirnforolle		
Medon, (Papitio) Beißspiße  Medusa, (Pseilschwans) Sphinx Medusa Medusa, Qualle  — aurita, Dhrqualle — brachiata, Armqualle — capillata, Daarqualle — ciliata, Kasernqualle — ciliata, Kreutgaualle — cruciata, Kreutgaualle — hemisphærea, Dalbtugel — hysoscella, Drened — pelagica, Seeschwermer — pelagica, Seeschwermer — pilearis, Seemuse — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — welcha choofd, (bolk.) Medusentopf — Wi. 123  Medusa hoofd, (bolk.) Medusentopf — Wi. 124  Meelsifer, Tenebriones — v. 367. S. 252 — gestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — vi. 123  V. 368  Weeraal, (Sitteraal)  Weeraal, (Sitteraal)  Weeraaler, (Roche) Raja aquila  III. 245  Meeraaler, (Roche) Raja aquila  Reerafiche, Mugil  Weerabern, Mulli  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Sparus — bandirter  LV. 180  LV. 187	Mechanismus her Materie		
Medufa, (Pfeilschwans) Sphinx Medusa Medufa, Quasse  — æquorea, Rothsirfet — aurita, Dhrquasse — brachiata, Armquasse — capillata, Daarquasse — ciliata, Kasernquasse — cruciata, Rreutquasse — hemisphærea, Dalbtuget — hysoscella, Drenect — marsupialis, Meertasse — pelagica, Eesschwermer — pilearis, Eesschwermer — porpita, Eteinquasse — velella, Eesgelquasse — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — velessa, Eesschwermer — veles		A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	
Medufa, Qualle — æquorea, Rothsittel — aurita, Dhrqualle — brachiata, Armqualle — capillata, Daarqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — ciliata, Fafernqualle — cruciata, Rreutqualle — hemisphærea, Dalbtuget — hysoscella, Drened — VI. 123 — hemisphærea, Dalbtuget — pelagica, Ceeschwermer — VI. 127 — pelagica, Ceeschwermer — vi. 127 — pilearis, Ceemuse — vi. 128 — porpita, Cteinqualle — velella, Ceegelqualle — velella, Ceegelqualle — velella, Ceegelqualle — velella, Ceegelqualle — velella, Ceestern) Asteria Caput Meduse — vi. 123 — velesses, (Rippsteber) Patella laciniosa  Weelsafer, Tenebriones — v. 367, C. 252 — gestügelte — ungestügelte — ungestügelte — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — v. 372  Weeraal, Muræna Conger — v. 367 — v. 368 — v. 372  Weeraal, (Sitteraal)  Weeraal, (Sitteraal)  Weeraal, (Sitteraal)  Weeraaler, (Roche) Raja aquila — ill. 245  Weeraasses, Mugil  Weeraasses, Mugil  Weeraasses, Mugil  Weeraasses, Mugil  Weeraasses, Mugil  Weeraasses, Mugil  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Sparus — banbirter — banbirter — bunter	Medula (Meillehman) Sphin	Modulo	6 205
— æquorea, Rothsitel VI, 124 — aurita, Dhrqualle VI, 125 — brachiata, Armqualle VI, 126 — capillata, Harqualle VI, 126 — ciliata, Fafernqualle VI, 126 — ciliata, Fafernqualle VI, 123 — hemisphærea, Halbtuget VI, 127 — hysoscella, Drepect VI, 127 — hysoscella, Drepect VI, 127 — marsupialis, Meertasche VI, 127 — pelagica, Seeschwermer VI, 127 — pilearis, Seemuse VI, 126 — porpita, Steinqualle VI, 127 — velella, Seegelqualle VI, 127 Medusa-hoofd, (bost) Medusentopf VI, 606 Medusentops, (Rippstleber) Patella laciniosa VI, 606 Medusentops, (Seestern) Asteria Caput Meduse VI, 142 Meelsasch, (Boctsasch) Cerambyx farinosus V, 367 — gestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — ungestügelte V, 368 — v, 367 — Seeraasi, (Sitteraal) IV, 47  Meeraasi, (Sitteraal) IV, 47  Meeraasi, (Sitteraal) IV, 47  Meeraasi, (Sitteraal) IV, 352  Meeraasich, Mugil IV, 352  Meeraasich, Mugil IV, 269  Meerbaachsen, Mulli IV, 269  Meerbaachsen, Sparus IV, 176 — buntet IV, 180  IV, 180	Medufa Duone		S. 356
- aurita, Dhrqualle VI. 127 - brachiata, Armqualle VI. 127 - capillata, Harqualle VI. 126 - ciliata, Kafernqualle VI. 126 - ciliata, Kafernqualle VI. 123 - hemisphærea, Halbugel VI. 127 - hysoscella, Dreneck VI. 127 - hysoscella, Dreneck VI. 127 - marsupialis, Meertasche VI. 127 - pelagica, Seeschwermer VI. 127 - pilearis, Seemuge VI. 126 - porpita, Steinqualle VI. 123 - velella, Seegelqualle VI. 123 - velella, Seegelqualle VI. 127 Medusa-hoofd, (hoss) Meousentops VI. 606 Mebusentops, (Rippstleber) Patella laciniosa VI. 606 Mebusentops, (Sippstleber) Patella laciniosa VI. 606 Mebusentops, (Seesteen) Asteria Caput Medusæ VI. 142 Meelsafer, Tenebriones V. 367. S. 252 - gesügelte V. 368 - ungestügelte V. 368 - ungestügelte V. 368 Meeraal, (Bockfaser) Cerambyx farinosus V. 261 Meeraal, (Bitteraal) IV. 47 Meeraaler, (Roche) Raja aquila III. 245 Meerapsel, Meerigel, (Seeapsel) VI. 144 Meeraschen, Mugil IV. 352 Meeramsel, (Sippsich) Labrus Turdus IV. 269 Meerbachsen, Mulli IV. 269 Meerbachsen, Mulli IV. 269 Meerbachsen, Sparus IV. 176 - bandirter IV. 180 IV. 180		VE. 120	VI 124
- brachiata, Armqualle VI. 127 - capillata, Harmqualle VI. 126 - ciliata, Kasernqualle VI. 126 - cruciata, Kreutqualle VI. 123 - hemisphærea, Palbtuget VI. 127 - hysoscella, Drenect VI. 124 - marsupialis, Meertasche VI. 127 - pelagica, Seeschwermer VI. 127 - pilearis, Seemuse VI. 126 - porpita, Steinqualle VI. 123 - velella, Seegelqualle VI. 127 Medusa-hoofd, (both) Meousentopf VI. 606 Medusa-hoofd, (both) Meousentopf VI. 606 Medusentopf, (Rispfleber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Seesteun) Asteria Caput Medusæ VI. 142 Meeltaser, Tenebriones V. 367, S. 252 - gestügelte V. 368 - ungestügelte V. 368 - ungestügelte V. 368 Meeraal, (Boctsaser) Cerambyx farinosus V. 261 Meeraal, Muræna Conger IV. 42 Meeraal, (Sitteraal) IV. 47 Meerabler, (Roche) Raja aquila III. 245 Meeraschen, Mugil IV. 352 Meeramsel, (Sippsisch) Labrus Turdus IV. 144 Meeraschen, Musli Meerbachsen, Mulli Meerbachsen, Sparus IV. 176 - banbister V. 180 - bunter IV. 180 - bunter			VI. 125
— capillata, Harquaile — ciliata, Kasernquaile — ciliata, Kasernquaile — cruciata, Kreutsquaise — hemisphærea, Palbtuget — hysoscella, Drened — hysoscella, Drened — wil. 127 — hysoscella, Weertasche — marsupialis, Meertasche — pelagica, Eeschwermer — vil. 127 — pilearis, Eesmuse — vil. 126 — porpita, Etetaquaise — vil. 123 — velella, Eesgelquaise — vil. 127 Medusa-hoofd, (bost) Medusentopf — vil. 606 Medusentopf, (Klipptseber) Patella laciniosa — vil. 606 Medusentopf, (Ripptseber) Patella laciniosa — wil. 606 Medusentopf, (Eesstern) Asteria Caput Meduse — ungestügelte — gestügelte — ungestügelte — ungestügelte — v. 367, S. 252 — gestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — ungestügelte — v. 368 — v. 372 Meeraal, (Bitteraal) Meeraal, (Bitteraal) Meeraal, (Bitteraal) Meeraal, (Bitteraal) Meeraaler, (Roche) Raja aquila Meerafche, Mugil Meerafche, Mugil Meerafche, Mugil Meerafche, Mugil Meerafchen, Sparus — bandister — bandister — bandister — bunter			
— ciliata, Fasernqualle — cruciata, Rreutqualle — hemisphærea, Dalbtugel — hysoscella, Drened — hysoscella, Drened — vl. 127 — hysoscella, Drened — vl. 124 — marsupialis, Meertasche — pelagica, Seeschwermer — pilearis, Seemuse — porpita, Steinqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — velella, Seegelqualle — vi. 127  Medusa-hoosel, (bost) Medusentoops — vi. 606 Medusentoops, (Ritprsteber) Patella laciniosa — vi. 606 Medusentoops, (Seesteen) Asteria Caput Medusæ — gestügelte — gestügelte — ungestügelte — vi. 367 — gestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — ungestügelte — vi. 368 — vi. 369 — vi. 369 — vi. 42  Meeraal, (Bitteraal) — iv. 42  Meerabler, (Roche) Raja aquila — iv. 42  Meerabler, (Roche) Raja aquila — iv. 352  Meerafsche, Mugil — vi. 144  Meeraschsch, Mugil — vi. 144  Meeraschsch, Mugil — vi. 144  Meeraschsch, Mugil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 144  Meeraschsch, Musil — vi. 145  Meeraschsch, Musil — vi. 146  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, Musil — vi. 148  Meeraschsch, M			
- cruciata, Kreukquasse VI. 123 - hemisphærea, Dalbtuget VI. 127 - hysoscella, Drepect VI. 124 - marsupialis, Meertasche VI. 127 - pelagica, Seeschwermer VI. 127 - pilearis, Seemuse VI. 126 - porpita, Steinquasse VI. 127 - velella, Scegelquasse VI. 127 Medusa-hoofd, (bost) Medusentopf VI. 606 Medusentopf, (Ripptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Ripptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Seesteen) Asteria Caput Medusæ VI. 142 Meelsase, Tenebriones V. 367. S. 252 - gestügelte V. 368 - ungestügelte V. 368 - ungestügelte V. 368 Meeraal, (Boctsaser) Cerambyx farinosus V. 261 Meeraal, (Boctsaser) Cerambyx farinosus V. 261 Meeraal, (Sitteraal) IV. 47 Meerabler, (Roche) Raja aquila III. 245 Meerasses, Mugil IV. 352 Meerasses, Mugil IV. 352 Meerasses, Mugil Meerabsen, Mulli IV. 269 Meerbarben, Mulli IV. 269 Meerbarben, Sparus IV. 176 - bandirter IV. 180 - bunter		1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	
- hemisphærea, Dalbtugel - hysoscella, Drepect - hysoscella, Drepect - marsupialis, Meertasche - pelagica, Seeschwermer - pilearis, Seemuse - porpita, Steinquasse - velella, Scegesquasse - velella, Scegesquasse - velella, Scegesquasse - velesse, (Stipptleber) Patella laciniosa Medusa-hoosel, (bost) Medusentops - VI. 606 Medusentops, (Stipptleber) Patella laciniosa - VI. 606 Medusentops, (Seesteun) Asteria Caput Medusæ - velestaser, Tenebriones - V. 367, S. 252 - gestügelte - ungestügelte - ungestügelte - ungestügelte - velestaser, (Boctsäser) Cerambyx farinosus - W. 368 - ungestügelte - V. 368 - ungestügelte - V. 368 - ungestügelte - V. 368 - ungestügelte - V. 368 - velsasses - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velssäselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 367 - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - V. 368 - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - velesselte - veless			VI. 122
— hysoscella, Drepect VI. 124 — marsupialis, Meertasche VI. 127 — pelagica, Seeschwermer VI. 127 — pilearis, Seemuse VI. 126 — porpita, Steinquasse VI. 123 — velella, Seesesquasse VI. 127 Medusa-hoofd, (host) Medusentopf VI. 606 Medusa-hoofd, (host) Medusentopf VI. 606 Medusa-hoofd, (slipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Medusa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber) Patella laciniosa VI. 606 Meersa-hoofd, (Sipptseber)		tel .	VI. 127
— marsupialis, Meertasche — pelagica, Seeschwermer — pilearis, Seemuse — porpita, Stetnquasse — velella, Seesesquasse — velella, Seesesquasse — velesta, Stetnquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta, Seesesquasse — velesta			VI. 184
— pelagica, Seeschwermer — pilearis, Seemuse — pilearis, Seemuse — porpita, Steinquasse — velella, Seegelquasse — velella, Seegelquasse — velella, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seegelquasse — veless, Seege		e	VI. 127
— pilearis, Seemüße — porpita, Steinquasse — velella, Seegelquasse — velella, Seegelquasse — velella, Seegelquasse — velella, Seegelquasse — VI. 127  Medusa-hoofd, (both) Medusentopf — VI. 606  Medusentopf, (Ripptleber) Patella laciniosa  Wedisentopf, (Seestern) Asteria Caput Meduse  Wi. 142  Meelsäfer, Tenebriones — V. 367. S. 252 — gestügelte — V. 368 — ungestügelte — V. 368 — ungestügelte — V. 368  Weeraal, (Boctsäfer) Cerambyx farinosus  Meeraal, (Sitteraal)  Meeraal, (Sitteraal)  Meerabler, (Noche) Raja aquila — IV. 47  Meerabler, (Moche) Raja aquila — III. 245  Meerafiche, Mugil  Meerafiche, Mugil  Meerafiche, Sparus — bandirter — bandirter — bunter  VI. 128  VI. 130  VI. 144  VI. 144  VI. 144  VI. 144  VI. 144  VI. 145  VI. 144  VI. 144  VI. 144  VI. 156  VI. 144  VI. 156  VI. 180  VI. 180			VI. 127
— porpita, Steinquasse — VI. 123 — velella, Scegesquasse — VI. 127 Medusa-hoofd, (bost.) Medusentopf — VI. 606 Medusa-hoofd, (stippfleber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Rippfleber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Scestern) Asteria Caput Meduse VI. 142 Meelsäfer, Tenebriones — V. 367. S. 252 — gesügeste — V. 368 — ungestügeste — V. 368 — ungestügeste — V. 368 Meeraal, (Boctsäfer) Cerambyx farinosus V. 261 Meeraal, Muræna Conger — IV. 42 Meeraal, (Sitteraal) — IV. 47 Meerabler, (Roche) Raja aquila — III. 245 Meerafsche, Mugil — IV. 352 Meerafsche, Mugil — IV. 352 Meeransel, (Sippsisch) Labrus Turdus IV. 212 Meerbarben, Mulli — IV. 269 Meerbrachsen, Sparus — IV. 176 — bandirter — LV. 180 — bunter IV. 187	pilearis. Ceemuse		VI. 126
Medusa-hoofd, (both) Medusentopf VI. 606 Medusa-hoofd, (both) Medusentopf VI. 606 Medusentopf, (Ripptieber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Eesteen) Asteria Caput Meduse VI. 142 Meeltaser, Tenebriones V. 367. S. 252 — gestügelte V. 368 — ungestügelte V. 368 — ungestügelte V. 372 Meelsas, (Bostaser) Cerambyx sarinosus V. 261 Meeraal, Muræna Conger IV. 42 Meeraal, (Sitteraal) IV. 47 Meerabler, (Roche) Raja aquila III. 245 Meerassel, Meerigel, (Seeapsel) VI. 144 Meerassel, (Sipptisch) Labrus Turdus IV. 352 Meerbarben, Musli IV. 269 Meerbarben, Musli V. 269 Meerbrachsen, Sparus IV. 176 — bandister IV. 180 — bunter	porpita, Cteinqualle	17 (15 ) (1 ) (2 ) (2 ) (2 )	
Medusa-hoofd, (host) Medusentopf  Wedusentopf, (Rippfleber) Patella laciniosa  Wedusentopf, (Rippfleber) Patella laciniosa  Wedusentopf, (Seestern) Asteria Caput Meduse  VI. 142  Weelsafer, Tenebriones  — gestügelte — V. 367. ©. 252  — gestügelte — V. 368  — ungestügelte — V. 368  V. 372  Weelsaf, (Boctaser) Cerambyx farinosus  Weeraal, Muræna Conger — IV. 42  Weeraal, (Sitteraal)  Weerabler, (Roche) Raja aquila — III. 245  Weerafsel, Mugil — VI. 144  Weerassel, (Sippsisch) Labrus Turdus  Weerassel, (Sippsisch) Labrus Turdus  Weerbarben, Mulli — IV. 269  Weerbrachsen, Sparus — bandister — bunter  VI. 180  IV. 187	velella. Scegelqualle	-	
Medusentopf, (Rippfleber) Patella laciniosa VI. 606 Medusentopf, (Seestern) Asteria Caput Meduse VI. 142 Meelkaser, Tenebriones — V. 367. S. 252 — gestügelte — V. 368 — ungestügelte — V. 368 — ungestügelte — V. 372 Meelsas, (Bostsaser) Cerambyx sarinosus V. 261 Meeraal, Muræna Conger — IV. 42 Meeraal, (Sitteraal) — IV. 47 Meerabler, (Roche) Raja aquila — III. 245 Meerasses, Mugil — VI. 144 Meerasses, Mugil — VI. 144 Meerasses, Mugil — IV. 352 Meeramsel, (Sippsisch) Labrus Turdus IV. 269 Meerbarben, Mulli — IV. 269 Meerbrachsen, Sparus — IV. 176 — — bandister — IV. 180 — — bunter IV. 187		fentopf —	VI. 606
Medusentops, (Seestern) Asteria Caput Meduse VI. 142  Meelsafer, Tenebriones — V. 367. S. 252  — gestügelte — V. 368  — ungestügelte — V. 368  Meersas, (Bocksafer) Cerambyx farinosus V. 261  Meersas, (Muræna Conger — IV. 42  Meersas, (Sittersas) — IV. 47  Meersabler, (Roche) Raja aquila — III. 245  Meerafsche, Meerigel, (Seeapsel) — VI. 144  Meeraschen, Mugil — VI. 144  Meeraschen, Mugil — IV. 352  Meerbarben, Mulli — IV. 269  Meerbarben, Mulli — IV. 269  Meerbrachsen, Sparus — IV. 176  — bandister — IV. 180  — bunter — IV. 187	Debufentopf, (Rlippfleber) Pat	ella laciniofa	
Meeltáfer, Tenebriones — V. 367. ©. 252  — gestügelte — V. 368  — ungestügelte — V. 372  Meelsas, (Bostáser) Cerambyx farinosus V. 261  Meeraal, Muræna Conger — IV. 42  Meeraal, (Sitteraal) — IV. 47  Meerabler, (Roche) Raja aquila — III. 245  Meerafse, Meerigel, (Seeapsel) — VI. 144  Meerasses, Mugil — VI. 144  Meerasses, Mugil — IV. 352  Meerbarben, Multi — IV. 269  Meerbarben, Multi — IV. 269  Meerbrachsen, Sparus — IV. 176  — bandirter — IV. 180  IV. 187	Medufentopf, (Geeftern) Afteria	a Caput Medufæ	
— gestügelte V. 368  — ungestügelte V. 372  Meelsad, (Bockfaser) Cerambyx farinosus V. 261  Meeraal, Muræna Conger IV. 42  Meeraal, (Bitteraal) IV. 47  Meerabler, (Roche) Raja aquila III. 245  Meerafsel, Meerigel, (Seeapsel) VI. 144  Meerassel, (Sippsist) Labrus Turdus IV. 212  Meerbarben, Mulli IV. 269  Meerbrachsen, Sparus IV. 176  — bandirter IV. 180  IV. 187			and the second second
—— ungestügelte  Weelsach, (Bockfaser) Cerambyx farinosus  Weeraal, Muræna Conger  Weeraal, (Bitteraal)  Weeraaler, (Roche) Raja aquila  Weerabler, (Roche) Raja aquila  Weerassel, (Seeapsel)  Weerassel, (Seeapsel)  Weerassel, (Sippsisch)  Weerassel, (Sippsisch)  Weerassel, (Sippsisch)  Weerbarben, Musil  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Mulli  Weerbarben, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardssel, Sparus  Weerbardss			A LAND WATER
Meelsach, (Bockfaser) Cerambyx farinosus  Meeraal, Murwaa Conger  Meeraal, (Bitteraal)  Meeraaler, (Roche) Raja aquila  Meerafich, Meerigel, (Seeapsel)  Meerasich, Mugil  Meerasich, (Sippsich) Labrus Turdus  Meerbarben, Mulli  Meerbarben, Mulli  Meerbarbsen, Sparus  — bandirter  bunter  V. 261  IV. 42  IV. 42  IV. 47  III. 245  VI. 144  IV. 352  IV. 352  IV. 269  Meerbarbsen, Mulli  IV. 269  IV. 176  — bunter		-	
Meeraal, Muræna Conger  Meeraal, (3itteraal)  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meerapfel, Meerigel, (Seeapfel)  Meerafche, Mugil  Meerafche, Mugil  Meerafche, (Sippfich) Labrus Turdus  Meerbarben, Mulli  Meerbarben, Mulli  Meerbarben, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus  Meerbachfem, Sparus		x farinofus	
Meeraal, (3itteraal)  Meerabler, (Roche) Raja aquila  Meeraplet, Meerigel, (Seeapfel)  Meerafche, Mugil  Meerafche, Mugil  Meerarben, (Sippfich) Labrus Turdus  Meerbarben, Mulli  Weerbarben, Mulli  Meerbarben, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Sparus  Meerbrachsen, Mulli		The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
Meerabler, (Roche) Raja aquila — III. 245 Meerapfel, Meerigel, (Seeapfel) — VI. 144 Meerafche, Mugil — IV. 352 Meeramsel, (Sippsisch) Labrus Turdus IV. 212 Meerbarben, Mulli — IV. 269 Meerbrachsem, Sparus — IV. 176 — — bandirter — IV. 180 — — bunter IV. 187			IV. 47
Meerapfel, Meerigel, (Seeapfel) VI. 144 Meerafche, Mugil IV. 352 Meeramsel, (Lippsisch) Labrus Turdus Meerbarben, Mulli IV. 269 Meerbrachsem, Sparus IV. 176 — — bandirter IV. 180 — — bunter IV. 187		a	III. 245
Meerassche, Mugil  Meeramsel, (Lippssche)  Meerbarben, Mulli  Meerbrachsen, Sparus  - bandirter  - bunter  IV. 352  IV. 269  IV. 176  IV. 176  IV. 180  IV. 187	Meerapfel, Meerigel, (Seeapfe	0 -	VI. 144
Meerdansel, (Labrus Turdus IV. 212) Meerbarben, Mulli IV. 269 Meerbrachsem, Sparus IV. 176 IV. 180 IV. 180 IV. 187		_	
Meerbarben, Mulli — IV. 269 Meerbrachsem, Sparus — IV. 176 — — bandirter — IV. 180 — — bunter — IV. 187		Turdus	IV. 212
Meerbrachsem, Sparus — IV. 176 — — bandirter — IV. 180 — — bunter IV. 187			
— — bandirter — IV. 180 — — bunter IV. 187		See House State	
bunter - IV. 187	ACCOUNTS AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	T WORKS	
		-W-	
		S 3	

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s		
	Th.	€.
Meerbrachsen, Galileischer, Sparus Galileus	ĮV.	194
gestreifter -		185
- mit einem schwarzen Flecken	IV.	177
rother -	IV.	183
virginischer, Sparus Virginicus	IV.	
Meereicheln, Lepades - VI. 20		
Meerefiter, Hæmatopus -		424
Meerengel, (Hanyfisch) Squalus Squatina		256
Meerengel, (Roche) Raja thinobatos	III.	250
Meerfrosch, (Seeteusel) Lophius piscatorius	ĹΙΓ	279
Weergeiß, (Squillentrehs)	V2.	1125
Meergrundel, Gobius niger -		127
Meerhaasen, Cyclopteri	HH.	329
Meethahn, (Griegelfisch) Zens Gallus -		143
Mecthuhn, (Regenschnerke)		399
Meerjunter, (Lippfisch) Labrus Julis -		204
	123.	<b>5.</b> 9
Meerlener, (Geehahn) Trigla Lyra -		273
Meerlerche, (Stranblaufer) Tringa cinchis		413
Meerleuchte, (Seehahn) Trigla Lucerna		276
Meerlimonie, (Warzenscheide)		83
Meerminnewayer, (boll.) Ecefecher	Vb.	345
Recruadel, (Decit) Esox Belone	JV.	341
Recrnadel, (Radelfisch) Syngnathus æquoreus	. 426. . 371	343 408
Mecenus, (Kiebisen)	¥ 44 771	596
Meerahren, Haliotes Meerahren, (Biefel) Mustella Lutris		259
Merrpfau, (Lippfisch) Labrus Pavo	IV.	
Meerpfan, (marmorirter Lippfisch) -	iv.	
Meerpferde, Pegali -		347
Meerpinfel, (Sandtocher) Sabella pennicillus	VI.	637
Mecronappe, (Rabelian) Gadus Mustella	ÌV.	98
Mecrouappe, (Rabeljau) Gadus Mustella Meerrettignager, (Golbhahnchen) Chryfomela a	[·	
moraciæ	V.	169
Mecreobren, (Robrenfcfnecken)		622
Meerfau, (Haanfisch) Squalus Galeus		960
Meerschaft, (Sechlase) Holothyria Priapus		99
Meerschauten, (Umberfische)		217
	ឡ	Reete

Meersc	Hene	Mel	eagris		279
, , ,	· · ·			Th.	҈.
Meerschlene, (Lippfis	d) Lab	rus Tinca		IV.	207
Meerschwalbe, (Sce	babn) T	rigla Hiru	ndo	IV.	277
Meerschwalbe, Stern	a	<b>—</b>		11.	351
Curopail		rna Hirund	lo	IĮ.	352
fcmarje,			•		353
Meerschmann, Spor		<del>-</del>		VI2.	
		pongia Cey	lonica -	VI2.	801
Meerschweinchen, (D	Raus) N	lus Porcell	us		334
Meerschweinlaus, Pe	diculus	porcelli.	`	V2. 1	
Meerscorpione, Scor			•	IV.	
Meerfieb, (Geeneffel			•		89
Meerspinne, (Blacff		oia media	•		117
Meerspinne, (Dinten	fisch)	-	-	VI.	
Meerftern, (Geeftern	)				129
Meerstint, (Calm)	Salmo E	perlanus	. •	IV.	
Meertasche, (Qualle.)	Medui	a marlupial	is .		127
Meertulpe, (Meereid				VI.	
Meerwolf, (Seewoll		ichas Lupu	12	IV.	
Meergabnchen, Denta		, <del></del>		VI.	
Mees, Meeze, (holl			-		625
Meeuw, (holf) Me	me.	-			344
Megæra, (Papilio)			<b>*</b>		603
Megæra, (Sphinx)		gel	, <b>*</b>		642
Meirix, bunter Lipp		973.14		IV.	
Meirval, Meirslang	2 (DOM.)	200118.	11 60	IV.	
Meise, Parus	Danna A		H. 625.		
— — Amerifanische, — — gesteckte, Parv		mericanuș			626 629
- Birginische, P	arus Vir	minianus	•		627 627
- menfarbige, l			- 1	ii.	
Meiselrinde. Flustra t	runcata	-0404,		VI2.	810
Meiselrinde, Flustra t Reisenland, Pedicult	IS Dari	•		/2. 10	
Meisenzeisig, Pipra p	areola	•	•	II.	
Melanokoruphos, (g		<b>Schwarzt</b> ov	f	11.	
Melbenfauger, (Rach				V.	
Meleagris, (Anguis)				IIL	
Meleagris, Truthahn	. <b>G</b> erraniya L		II. 461.		
- cristata, Br		ber Truth.			
	•	S	, ·	Mel	

	Sb.	6.
Meleagris latyra, Bengalifcher Truthabn	n.	
Meles, (Ursus) Dachs -		2 <b>8</b> I
Melet, (fr.) Sornabrenfisch	IV.	
Melisophagos, (griech) Immenmoff -	II.	
Meliffa, Melitta, (griech) Biene -	V2.	
Melite, (Papilio) Schwarzstügel	<b>v.</b>	तीर
Melknapje, (holl.) Milchschaale -	VI.	dì
Melkwitte Telline, (holl) Milchling	VI.	24 l
Melodift, (Krammetsvogel) Turdus polyglotto	s II.	
Melos, Maitafer - V. 37		
- Afer, Barbar.	D.	
— — Algirica, Algire	V.	
- antherina, Blutenfauger.	V.	
- atrata, geschmarter Maifafen -	€. :	
bimaculata, Punctum	V.	
- Capenlis, Pottentott	V.	
- Cichorei, Cichortentafer -	V.	
fenoftrata, Benftertafer -	E.	
— festiva, Rosentafer —	<b>E</b> .	
— Horalis, Blumenleace	<b>V</b> .:	384
- Gonani, Schwarzfafer -	<b>&amp;</b> .:	
luten, gelber Manfafer	e. :	259
- Majalis, Maiwurm -	V	380
— Marci, Marcustafer -	V.	383
— Necydalea, Maibod —	<b>6.</b> :	256
— ocellata, Maiauge —	<b>6.</b> :	258
— proscarabas, Zwitterfaser. —	F.	379,
— — quadrimaculata, Bierfleck	<b>S</b> . :	256
- quadripunciata, Mondfleck -	V.	382
— — Schæferi, Kronenfafer -	V.	383
— — Sibirice, Sibulet T	€.	25%
— — Syriaca, Sprift	P	
— tritaleis, Orchoand	<b>S</b> . 2	
- Uralenlis, Uralischer Maitafer -	<b>6</b> 5. 2	
- veficatoria, Spanische Bliege	W. 3	
Melotate, (Connentafer) Coccinella Cacli	<i>V</i> , 1	•
Melolontha, (Scarabæus) Maifafer -	V.	
Melolonthe bleuette, (fr.) Glansbahnchen	F. 1	
	Me	le:

Meiowuthe	Merganier	281
	•	Th. G.
Melolonthe quadrille, (fr.)	Schwarzpunkt	V. 187
Melongena, (Murex) Benge	ruch –	VI. 500
Melpomene, (Papilio) Roth	binde —	V. 586
Meltenlans, Aphis atriplicis	•	V. 519
Memerian bacala, Guincische	s Schaaf -	1. 428
Memnon, (Papilio) Rothfle	đ —	V. 569
Memphis, Mephis, Stinkshi	ier 🚤	L 251
Menchina di Re, (ital.) Me	erjunter .	IV. 204
Mendole, (fr ) Laxierfisch	7	IV. 181
Menelaus, (Papilio) Atlas	•	V. 571
Mengelfafer, (Gannentafer)	Coocinella Axirid	\$ 6 222
Menidia, (Atherina) Carolin	ifcher Kornabrenfile	5 IV 251
Menidia, (Jamalf.) Schner!	<b>i</b> ld –	IV. 342
Menola, Menole, (ital.) Lar	ierfiich -	IV. 181
Menonitentute, Conus Virgo	—————————————————————————————————————	VI. 368
Menfet, Homo	• I	61. 6. 3
beffen Fortpfanzung	· •	1. 78
beffen Lebensgiel	•	J. 84
ift bas Saupt ber Thie	te _	l. 61
- ift von Ratur wild	**	
Menfchen, geschwanzte	<b>~</b> `	
thr Berhaltnis in Min	sebuna bed Belchles	
ibre aufferliche Berfe	biedenheit.	
ibre Ungabl	Alforing in	
	,	
— milpe	₩ .	F 101
Menfchenabnlicha Geschöpfe,	सः र Primates I	L 85
Menschen ceter, (boll.) D	enschenfresser	61. <b>S.</b> 3.
Menschenfresser, (Geger) Vu		• •
Menschenfresser, (Daansisch)	Squake Corresies	H. 56
Menschert, (Dersmuschel)	Conquire Conques	
Menschensaus, Pediculus hui	Catchoni Catchia	
Mentula marina, Warzensche		V2, 1027
Mercator, (Conus) Regiute	ine' Quitthiak	VI 83. 98
Sperdante Margue albellus	•	VI. 375
Merchente, Mergus albellus	<b>8</b>	11 306
Meretrix, (Venus) Braunii	bbe 3	VI. 271
Merel, (boll.) Amsel	<b>4</b>	H. 536
Merganier, (Mergus) Ton	<b>C</b> -	IL 304
	8 5	Mergus

40- <u>-</u>	K man O man	* * * * *		
			Th.	E
Mergu	3, Lauchente -	•	II.	303
	albellus, weiffe Monne	-		306
	cucullatus, Kappentaucher		IL,	303
	minutus, Pfeilschwang	-		306
	s, Laucher -			338
Meribi	an, (Erdfafer) Carabus meridia	nus		364
Mertin	al, (Baffertafer) Dytiscus ftiel	icus		348
Merlar	1, (fr.) Scheffisch	- IV	. 79	. 91
Merlar	ngus, (Gadus) Wittling	_ · `,	IV.	91
Merle	à cravatte, (fr.) rostfårbiger Kran	mietevogel	G.	142
Merle	alpadie, (ital.) Alpenmerten, R	ukbáber	II.	177
Merle	d'eau, (fr ) Bafferstaar	-	II.	525
Merle,	indianische, (ber Kardinal)		Ħ.	577.
Merle	noire, (fr ) Umsel	•	11.	536
	Tanagra -	II. 572.	<b>E.</b>	158
	blone. Tanagra cyanca		IL	574
<del></del>	Brasilianische, Tanagra Brasilie	ននៃ		576
<b>-</b> -	braune, Tanagra fulca	• `		159
<del></del>	bunte, Tanagra varia	₹' .	` <b>G.</b>	158
	Cajennische, Tanagra Cajana	<b>—</b>	11,	576
	Domingische, Tanagra Dominica	•	II.	576
	gelbe, Tanagra Cajana	` <b>-</b>	II.	574
(	nesorenfelte, Tanagra punctata	• .	u.	577
·— — `	groue, Fanagra fajaca große, Tanagra maxima grune, Tanagra gyrola	<del>-;</del>	· II.	577
	große, Tanagra maxima	-	Ø.	149
	grune, Tanagra gyrola	۹.	II.	574
	Madagastarische	₹ `	II.	578
<b></b>	rothe, Tanagra rubra	•	Ĥ.	<b>FT3</b>
٠ ـــ ـــ	scharlachfärbige, Tanagra Bresili	<b>la</b> ,		573
	schwarze, Tanagra Jacapa 🔌	· 🔫	II.	572
	COMPATILE, LENEREE INSTE	•		159
	schwarzgelbe, Tanagra chlorotics	4	IL	478
<del></del>	violetfarbige, Tanagra violacea	•	IL	
	(Turdus) Beißsteck	خد.		139
	, (engl.) Sperber	-		
Merlo	nigro, (ital.) Amfek	•		<b>ç∯</b> 6
Merluc	cius, (Gadus) Stockfich	. •	IV.	
Merma	id, (engl.) Geemensch, (Saapsis	<b>4</b> )	III.	
		~	1	Me-

	0·L 4
Memenlaus, Pediculus Sterna	<b>21.</b> 0
Mementaube, Columba turbita	V2. 103
Meritaner, (Regenpfeifer) Charadrius Mexican	II. 501
Mepitaner, (Biebbreme) Tabanus Mexicanus	V2. 98
Mexitanerin, (Biene) Apis Mexicana	V2. 89
Mey - Tor, (boll ) Maitafer	V. 37
Mi, (Phalsena) das D?	V. 684
Mico, (Meertage) Simia argentata	<b>S</b> . 11
Microleon, (Mulea) Beifffrich	V2. 95
Midamus, (Papilio) Begenschein	V. 191
Midas, (Simia) Langebr -	J. 139
Midasobe, (Balje) Voluta Auris Mida	VL 41
Mieren, (boll.) Ameifen -	V2. 90
Mieren - ceter, (boll.) Ameifenbar .	L 180
Mieren - leenw, (boll.) Ameifenlows -	V2. 799
	7. 6. 379
angewachsene	VI. 32
— - bauchige -	VI. 332
gemeine -	VI. 334
- gerippte	VL 338
geftreifte, Mytilus ftriatulus	<b>6. 370</b>
grune -	VI. 338
Magellanische -	VL 339
norbische, Mytilus Pholadis	S 370
platte -	VI. 330
rothe -	VI. 338
— — Aufische, Mytikus polymorphus	Ø. 370
Mignatta, (ital) Blutigel -	VI. V
Mignetur, (Meelkafer) Tenebrig minutus	V. 300
Mignaturbastard, (Bastardbad) Necyclalis um-	• • • • • •
bellatorum —	V. 294
Mignatureule, Strix pulchella —	65. 6a
Mignaturmotte, (Rachtschm) l'halena minutella	V. 748
Mignaturschild, (Stinkfafer) Buprestis minuta	V. 342
Miguel de Tueuman, (parag.) Fleckentrager	III. 213
Milan, (fr.) Beihe - I	L 71. 72
Milbe, Acarus — V2. 1044.	G. 340
	2. 1045
**************************************	Milbe
	with the All

	Eb. Seite
Milbe, indianische, Acarus Indus -	V2. 1045
- raube, Acarus scaber -	V2. 1057
Milbenfreffer, (ungeflugelte Biene) Mutilla aci	l• (
rorum	V21 92t
Milbenhahnchen, Chrysomela minutissima	V. 169
Milbenspinne, Phalangium Macaroides	V2. 1062
Milbenwespe, (Raupentoder) lehneum Atomu	8 V2. 862
Mildband, (Nachtschm) Phalæna podacella	V. 751
Mildbinde, (Lagschm.) Papilio Bixæ —	V. 63 t
Milchboot, (Arche) Arca lactea	VI. 29\$
Milder, (Ratter) Coluber lacteus -	111. 18i
Wilchfleck, (Lagichm.) Papilio Ligea -	V. 601
Mildflügel, (Rachtschm.) Phalæna lactearia	V. 704
Milchflugel, (Tagfchm.) Papilio Phryne	<b>5.</b> 293
Milchfrabbe, Cancer lastatus —	V2: 1106
Milchlinfe, (Tellmufchel) Tellina laftea	VI. 241
Mildmilbe, Acarus lactis	V2. 1050
Mildnerite, (Schwimmichnede) Norita lactari	
Milchsand, (Candlaufer) Cicindela lacteola	<b>.</b> 24₹
Wilchfchale, (Korbmuschel) Mattra corallina	VI. 256
Mildschaale, (Echnirfelschnecke) Helix Haliot	oi-
des -	VI: 582
Mildichaale, (Tellmuschel) Tellina inæquivalv	
Mildtreppe, (Mondschnecke) Turbo lacteus	VI: 554
Milchtropf, (Erbfafer) Carabus decemguttatu	
Miles, (Conus) Artanische Zwirntute —	VI: 368
Millepeda, (Strombus) Bielfuffcnede	VI. 479
Millepieds à dard, (fr ) Bafferalchen	VI. 78
Millepora, Pimettoralle -	VI2. 709
- agariciformis, Lebertoralle	VI2. 722
- alcicornis, Juderforallé -	VI2. 710
- aspera, ranbe Punktforalle	VI2. 719
cellulosa, Spikenkoralle -	VI2. 720
Ceylanica, Ceylonische Bandforalle	VI2. 718
clathrata, Gitterforalle -	VI2. 719
- coerules, blaue Punftforalle	VI2. 719
comprella, gebrudte Millepore	VI2. 716
- coriacea, Lebertoralle	VI2. 725
•	Wit-

	Th. Sette
Millepora fascialis, Banöforalis -	VI2: +18
lineata, gestreifte Roralle -	VI2. 717
- miniacea, rothe Millepore -	VI2: 717
— — pinnata, Kloffenmillepore —	VI2. 717
— — polymorpha, Kalchforalle —	VI2. 712
retivulata, Restoralle	VI2. 719
folida, punktirte Rraufelforalle	VI2. 71
truncata, Zellenmillepore	V12: 7:5
Millepore, gedructe, Millepora compressa	VI2. 716
- rothe, Millepora miniacea -	VI2. 717
Millers - Thumb, (engl.) Kaulforf	IV: 137
Millioen - pooten, (boll.) Bielfüße -	V2, 1162
Millouin, (fr.) Rothhalsente	11: 200
Milvus, (Falco) Wethe	, II. 71
Milvus, Meetleuchte - IV	. 276. 279
Milvus regalis, Konigsweihe	11. 72: 88
Mimas, (Scarabæus) Puckelkafer —	V. 62
Mime, Mimi, (jap.) moluttifcher RreBs	V2. 1139
Mineur; (fr.). Plapperer —	II. 193
Mineus, (Papilio) Janus -	V. 168
Mino, Minor, Plaprerec -	II: 101
Minow, (engl.) Eleit	IV. 386
Miraletus, (Raja) Spiegelroche -	III. 243
Miraltet, (fr.) Spiegelroche -	III. 243
Mirtil, (fr ) Keuersalamander -	III. eiß
Mischmasch, (Wange) Cimex interstinctus	V. 488
Misippus, (Papilio) Streifrand	V. 997
Miffel-bird, Miffletoe-thrush, (engl.) Diff	eli
brossel –	IL 123
Mittelbroffel, Turdus viscivorus -	IL sak
Mifteltafer, (Rugeltafer) Curculio vilcaria	V. 224
Missfliege, Musca fimetaria -	V2. 900
Mistgraber, (Mangenflot) Podura simetaria	V2: 1021
Mistice, (Tagschm) Papilio Peleus -	V. ON
Mistafet, Scarabæus simotatius -	V.
Mittenuber, (Raubiafer) Staphylinus murinus	
Mistradiser, (Dupfer) Empis stercorea	V2: 995
Mite, (fr.) Milbe . =	V2. 1044
_	Mi_

Mitella	Dioht	287
y		Th. E.
Mitella, (Lepas) Geemite	<b>≟</b> t	VI 206
Mitra, (Voluta) Bifchofemuße	<b>,</b>	VI. 431
Mitra Papalis, (Voluta) Pabsttone	· ; 🕳	VI: 431
Mittagefliege, Musca meridiana	•	V2. 966
Mittagslinic, (Nachtschm.) Phalanda	mundana	V. 655
Mittelflect, (Childtafer) Caffida Dil	coides	V. 143
Mittel wider ben tollen hundsbiß		V. 82
Mitu, (Crax) Brafilianifcher Paumis	\$	II. 465
Mitu poranga, (bras.) Pauwis	_ II.	465. 466
Mneme, (Papilio) Buntflugel		V. 583
Mnemosyne, (Papilio) Finnlander	• • •	V. 581
Transact ( Market ) Services	- y.	1. 267
Mobitjes, (holl.) Amerifanische Sant	flobe	V2. 1042
Mocking-birch (engl.) Spottvogel	4.3	II. 533
Moddermann, (hou) Rrabbe Dioge	ncs	V2. 1120
Moderator, (Ichneumon) Steuret	•	V2. 844
Moberhiene, Apis cariola	· <del>-</del>	V2. 902
Moderfisch, (Ballerfisch) Amia cilva	·	IV. 287
Moderfliege, (langfuß) Tipula putri	s <b>-</b>	V2. 941
Moderhols, (Nachtschin.) Phalana ex		V. 694
Modervlakje, (boll.) linittes Kinkhor	n	VI. 457
Modielus, (Arca) Gondel	4	VI. 205
Moenas, (Cancer) Strandfrabbe	_	V2. 1106
Mond, grauer, (Tute) Conus minis	aus .	VI. 372
Monchgeper, (Rablhale)	•	II. 54
Monchlein, (Rlofterwenzel)	** **	11. 610
Monchstappe, (Walte) Voluta pertui	2	VI. 430
Mondeschu, (Pantoffel)		VI. 430
Moer's, (Papilio) Meiner Argus Moerbey (holl.) Maulbeer		V. 602
Morder, (Delphin) Killer		VI. 500
Rorder, (Seidenschwang) Ampelis C	rnifex	I. 507 II. 540
Moesjes. Tepelbakken, (hoff.) getro	nte Barte	i edeliškiej
backen	,	VI 438
Wohr, bandicter, (Stachelschnede) Mu	rex Morio	VI. 512
Mohr, (Fliege) Musca Morio		V2. 952
Mobr, geflecter, (Tagschni.) Papilio l	Bolina	V. 614
Mohr, (Meertage) Simia Sabea	· 🙇	I. 129
		Debe,
`		

• •		•
	Eb.	Ë
Mobi, (Rachtschii,) Phalsena atra		667
Mobr, (Raubstiege) Afilus Morio -	V2. 1	
Dobr, (S Joh. Fliege) Cantharis atra		311
Dobr, (Schlupfwefpe) Centhredo nigra	V2.	
Dobr, Comebenber, (Scheeber) Bombylius ater		
Mohrasse, Simia Maura		.003
	_ <b>6</b> ;	y
Möhrenbauch, (Porzellane) Cyprea Caput ferpe		
tis —		393
Mohrenbrenie, Tabanus Morio	V2.	
Mobrenbund, (turtifder Bund)		149
Mobrenflügel, (Lagfom.) Papilio Ancae		614
Mohrentopflein, (Rachtschm.) Phalmana Morio		674
Mobrenpapillon, (Lagichit.) Papilio Phereclus	V.	628
Mohrenscorpion, LWasserscorp.) Nepa atra		472
Mobrembange, Cimex Morio		489
Mobrin, (Bespe) Vespa calida -	V2.	
Mohrtaferchen, (Rieintafer) Dermeltes niger		109
Moineau, (Emberiza) Gelbband -		157
Moineau, (Loxia) Schwarzwirbel =	Ğ.	150
Moincau, Moisson, (fr.) Sperling -	ĬĪ.	590
Moire, (fr.) Bliegendreckstute -	VI.	277
Mola, (Tetrodon) Dublsteinfisch	III.	318
Sirkich. (Reversalamander)	iii.	118
Mole, Moldwrap, (engl.) Maulwurf		295
Mole, (fr.) Steinbolt	IV.	88
Molebute, (engl.) Dubliteinfich		319
Molenzar, (holl.) Zwergfabeljati, Wittling 1	V: 90	. 01
Molensteenvissch, (Boll.) Dubliteinfisch	tiī.	318
Molitor, (Tenebrio) Europaifcher Mullet	V.	368
Mol-Krekel, (boll:) Mauliburfgrille -	V.	423
Moli, Moll-röt, (holl.) Maulwurf 2	T	295
Mölliceps, Deerschnepfe		397
Mollo, (venet.) Zwergtabeljan	IV.	
		,
Mollusca, Würmer mit Gliedmaffeti VI.	9. 12	• 17 208
Molostus, (Canis) Butlenbeisser -		
Molossus, (Scarabæus) Doggentafer -	V.	54
Molossius, (Vespertilio) Hundsmaul	<b>. .</b> .	18
Molukle Krad; (holl.) Moluflisher Kreds	<b>V2</b> :	i 139 Ma:

Molurus	Menoceros	289
<b>A. .</b>		Th. S.
Molurus, (Coluber) Serpent	inatter -	III. 200
Molva, (Gadus) Leng	_	IV. 95
Momota, (Ramphastus) Gro	Btopf —	II. 158
Monacchia, (ifal.) Rebelfrab	<b>e</b> •	II. 174
Monacha, (Phalæna) Monne	•	V. 665
Monachelle, (ficil.) Borftenfl	offe -	IV. 186
Monachus, (Comis) Schilder	·ótentute	VI. 374
Monachus, (Vultur) Rabifor	of –	II. 56
Mond, brauner, (Nachtschin.)	Phalæna Ruffa	<b>७</b> . 308
Wond, weister, (Nachtschm.) F	halæna virens	V. 691
Mond, (Geestern) Asteria Lu	ina -	VI. 131
Mondauge, (Tagidim.) Papili	o Agamemnon	V. 572
Monddublet, (Rompasmufchel)		VI. 304
Mondfleck, (Mattafer) Melot	guadripunstata	V. 282
Mondflett, (Wassereulchen) Phr	vganea bimaculata	V2. 787
Mondnerite, (Mondschnecke) I	Turbo Neritoides	VI. 540
Wondschnecke, stumpfe, Turbo	obtufatus	VI. 540
Mondschnecken, Turbines		VI. 539
🤧 gegitterte	-	VI. 551
gethürmte gethürmte		VI. 555
mit einem Rabell	oche -	VL 548
Reritenartige		VL 540
- ohne Rabelloch	•	VI. 542
Mondzeichen, (Langfuß) Tipul		V2. 933
Mone, (Meerfage) Simia Mor	1e 🕳	<b>©</b> . 7
Monedula, (Corvus) Doble		H. 174
Moneta, (Cyprea) Gnineische	8 Geld •	VI. 399
Mongoz, (Lemur) Mongus	- JJ	6. 12
Mongoz, (Lemur) Ringauge		h I. 147
Mongus, (Gespenstthier) Lem	ur Mongoz	6. 12
Monile, (Buccinum) Anotente	ette -	G. 376
Monitor, (Lacerta) Bachhalt	er '	III. 87
Monkie, (holl.) Todenkopf, (2	liffe)	I. 137
Monnikje, (holl.) Borftenfloff	e <b>-</b>	IV. 186
Monnikskap, (boll ) Monchel	tappe 📥	VI. 430
Monoceros, (Batistes) Einhor	:R -	III. 295
Monoceros, (Meloë) Einhor	ir -	V. 384
Monoceros, (Monodon) Rar	wal -	L 477
American	<b>T</b> .	Mo.

- ·	26. G
Monoculus, Schilbfioh	V2. 1138
apus, Riefenfuß	V2. 1141
conchaceus, Muschelfloh	V2. 1144
lenticularis, Linsenfloh	V2. 114
piscinus, Kischlaus -	V2. 1141
quadricornis, Eraubentrager	V21 1144
telemus, Rugelflob =	V2. 1145
Monodon, Einhornfisch -	Ì. 476
Monops, Macedonischer Ochs -	L 438
Montanella, (ital.) Murmelthier	L 341
Montirung, (Lagidom.) Papilio dissimilis	V. 616
Monuste, (Papilio) barbartscher Weißling	V. 589
Moorenbuikje, (boll.) Mobrenbauch	VI. 393
Moos-belletje, (holl.) Moosblafe -	VI. 412
Moosblaje, Bulla hypnorum	VI, 412
Moosbununel, Apis hypnorum	V21 905
Moostocher, Tubularia Muscoides -	VI2. 817
Moosfordune, Sertularia Lichenastrum	VI2 853
Mooginillepore, Millepora Lichenoides	Vl2. 716
Mossichilb, (Rrabbe) Cancer mulcofus	V2. 1110
Mooeschnede, Limax hyalinus -	VI. 64
Moosschraube, (Mondschnecke) Turbo mulcoru	m Vb 559
Mossträger, (Raminschnäuße)	V2. 1114
Moosweihe, (Blenfalle)	ÌI. 70
Mopla, (Papilio) Rebenart bom Buntflugel	V. 483
Mopshund, Canis fricator	J. 209
Modnent! (it:) Channager -	II. 533
Morastrabbe, Cancer Uca	V2. 1103
Moraftfriecher, (Schnirkelschnede) Helix limo Moraftlaufer, (Rachtfchm.) Phalmna palludata	V: 72t
Moraftpatelle, (Klippfleber) Patella lacustris	VI. 612
Morastrolle, (Midakohr)	VI. 416
Morafichnirtel, (Schnirtelfchiede) Helix lutar	ia VI. 572
Mordella, Billenfresser	V. 181
Mordella, Erokoh	V. 385
- aculeata, Stachelfioh	V. 386
- flava, Schwefeltafet	V. 386
- frontalis, Gelbstirn	V. 386
Troutening Continue	Mor-

Mordella .	Moronua	29t
		₹ħ. S.
Mordella gigantea, Defterreid	ber	V. 387
humeralis, Gelbseite	-	V. 385
- paradoxa, Bruftrum	t ' -	V. 381
— — thoracica, Gelbbrust	•	V. 385
Mordella, Ohrwurm	-	V. 396
Moregzag, (perf.) Wachtel	•	II. 492
Morella, (rom ) Elrife	` •	IV. 1389
Morelle, (fr.) schwarzes Was	ferhuhn 🕳	II. 427
Morena, (ital.) Murene	•	IV. 32
Morgay, (engl.) junger hundt	aanfilch -	III. 264
Morgenlander, (Baftarbrußel	fafer) Attelabi	15
fipylus	<b>—</b>	V. 346
Morgenlander, (Radervogel)	Coracias orienta	lis II. 122
Worgenrothe, (leuchtender Raff	er) Lampyris co	ic-
cinea	•	V. 305
Morgenstar, (holl.) Morgenst		VI. 435
Morgenstern, (Walte) Voluta		VL 435
Morhua, (Gadus) gemeiner Ro	rbeljau -	1V. 81
Morilie, (Tute) Conus Prince		VI. 350
Morillon, (fr.) loffelente	- II.	294. 302
Morio, (Asilus) Mohr		V2. 1006
Morio, (Cimex) Mohrenwan		V. 489
Morio, (Murex) bandirter M	ope -	VI. 512
Morio, (Musca) Mohr	en en	V2. 952
Morio, (Phalæna) Mohtentop	prettr —	V. 674
Morio, (Tabanus) Mobrenbre		V2. 988
Morio, (Turdus) afritantiche		11. 538
Moria, (Voluta) schwarze Ban	ionadel -	VI. 429
Morkulla, (schweb.) Schnepfe	ratinadilan	II. 391
Morme, Mormo, (fr.) Murn		IV. 192
Mormelaaren, (hou.) Murmel Mormillo, Mormira, (ital.) A	Hilase	IV. 361
	sentimetoracidism	IV. 192
Mormon, (Simia) Choras		
Mormyri, Murmelfische Mormyrus, (Spanis) Wurmel	kradilm ·	IV. 351 IV. 192
Mormyrus, (Sparus) Murmel Wornell, (Regenpfeifer) Charas	viuwjiii Irius Mariaallaa	17, 192
Moromoro, (peruv.) Schaafta		
Moronua, Sterlet		L 372
mininiting) Attitus	T <sub>2</sub>	Mot.
•	<b>= =</b>	

292	antothieno 1410	Lacina	
,			Th. Š.
Marnha	us, (Tagschni.) Papilio Morpl	heite.	S. 299
Mornha	nes, Kischabler –		11. 86
Mornin	n, (fr.) Kilzlaus	<u>.</u>	V2. 1028
Monny	e, (fr) Seeguctguct		IV. 276
Morfo	(and ) Mattens	_	I. 172
Mante,	(engl.) Wallroß		I. 172
Mort (	(ruß.) Wallroß (norw.) gruner Schelfisch	·	IV 91
Monto	(engl.) drenjähriger Lachs		IV. 312
Manua,	(fr.) Rabeljau	i i	IV. 82
Macao	(ital.) Fliege		V2. 947
Nacional	t-Eend, (holl.) Bifamente	4	II. 288
Macaa	dino, (ital) Paselmaus		I. 350
Macah	(boll) Sperling	-	ĮI. 592
Macab	duifje, (boll) Sperlingtanbe	•	II. 512
March.	is, Mustusthier	-	I. 374
Molena	Grimmius, afrikanisches Dus	fustbier	I. 376
·	Grimmius, Jungfernbock	<b>3</b>	€. 5¶
	Moschiferus, Bisamthier	_	I. 375
	72 i i Cafe . A 50 a h	<u> </u>	I. 377
	o, (ital.) Stechfliege	4	V2. 996
Moloni	to, (amerit.) Muce	_	V2: 989
Monal	(holl.) Miesmuschel	4	VI. 327
Mana F	cou, Rohrbonunel	_	II. 386
Motodi	lla, Bachstelze	II. 60	2. G. 173
IVIDIACI		4	II. 607
	atricapilla, Rlofterwengel		II. 610
	aurocapilla, Goldwirbel	•	II. 613.
<u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>		<u>~</u>	©. 173
		à	S. 173
	A MAN IN IP. S. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	lie	11. 617
	calendula, Ringelfonig		II. 619
<u> </u>	calidris, Grasmucke	<u> </u>	II. 604
<u> </u>		diftelte	II, 605
<u> </u>	Canadensis, Canadische Bach	stelle I	I. 613. 617
<u> </u>	Capensis, Caapsche Bachstelle		II, 612
		•	II. 614
<u></u>	chrysoptera, Gelbflügel		II, 61f
	cinnamemea, Zimmetvogel	. •	II. 614
	Dimmissan		Me-

`		Motacilla	Motmot	. 193
				Th. S.
Mo	tacili	la coerulea, blave Bachste	lte •	11. 618
		coronata, getronte Bach		II. 611
		criftata, Seibud		S. 176
		curruca, Rachtsinger	•	II, 605
		domentarum, hedenfor	inaer -	II. 614
		Dominica, Domingifche		II. 612
<u></u>	_	ficedula, Beigeneffer	•	II. 606
	_	flava, gelbe Bachftelje		II. 608
_		fulicata, Philippinische &	Sachstelie	II. 617
<del></del>		fusca, Flugelfleck	· -	S. 175
`		grifea, greife Bachftelje	-	<b>6, 175</b>
		guifa, Brafilianifche Bac	hstelje .	II. 616
		icterocephala, Gelbfopf	_	II. 612
_	_	Maderaspatana, Mabag	jastarische Bad	,
•		stelse	•	II. 613
_	<del></del> -	Maura, Mohrentopfchen	-	S. 174
<del></del>	<del></del>	modularis, Baumnachtig	au –	II. 604
		Pensylvanica, Pensilvani	sche Bachstelze	II. 610
	_	petechia, geflectte Bachft	elze —	II. 613
~	<del></del> ,	rubecula, Rothfehlchen	•	IL 618
		rubetta, Rothfehlchen	•	H. 610
_		rubicula, Weißtehlchen	•	II. 610
	<del></del>	falicaria, Rohrfánger	_	II. 695
		Schoenobena, Binfennac		II. 604
<del></del>	_	Senegalensis, Cenegalisch		.ll. 611
_	_	Sialis, Amerikanische Bac	hstelze	II. 616
<u> </u>		sibila, Zischer	<b>-</b>	II. 618
		stapazina, Spanische Bo	chstelle	II. 608
	_	Suecia, Blautchlchen	-	Ц. 616
	_	lydvia, Baldfänger	•	II. 606
<u></u>	_	tiphia, Wasserstelze	•	II. 608
		tricolora, drepfarbige Be	achstelse	S. 175
-		varia, bunte Bachstelle		II. 612
<del></del>		velia, Curinamische Bad	ostelje —	Ц. 617
		, (fr ) Weißtehlchen	€.	II. 609
IATO	illy (	poln) Schmetterling		V. 555
MIO	LILALI	rix, (Tipula) Zudfuß	- 6.6-	V2. 938
<b>L</b> AT Ü	tmot	, (Phalianus) ungespornte		H. 471
		. <b>T</b>	3	Motten,

- ·	7.7	1 .	
		1	Σħ. €.
Motten, (Racht	fometterlinge) Tinéæ	•	V. 735
Mottenwefpe,	(Kaupentöber) Ichneun	on Turi	9-
	ellæ –		V2. 853
Mouche, (fr.)	Fliege	-	V2, 947
	n, Mouche araignée,	(fr.) flieg	eme
	e Pferbelaus -		V2. 1009
Mouche à scie	. (fr ) Schlupfwespe	-	V2- 829
Mouche d'Esp	agne, (fr.) spanische B	liege	V. 380
Mouche de vis	naigro, (fr.) Efigfliege	•	V2. 996
	(fr.) Raubfliege	•	V2. 1001
	olon, (fr.) Seorpionflie		V2. 803
Mouches - Ichr	neumons, (fr.) Raupen	toder	V2. 863
	llonées, (fr.) Wassereul	фen	V2. 782
Mouchet, (fr.)	eberpet.		II, 89
Mouette, (fr.)	Weine -	11. 344.	345. 348
	e, (fr.) Meerschwalbe		Ц. 353
Moule, (fr.)			VI. 327 Il. 479
	ck, (engl.) Auerhahn		II. 628
Mourier, (fr.)		'_	111. 118
Moufe (incl.)	Keperfalamander	_	L 349
Moule, (éngl)	(engl.) Maufes ober E	 lonMhier	I, 383
Monte - Deer	(Englis) Munic, voit &	-	II. 592
Mousset, (fr.)	operning erou, (fr.) Peruvianisa	hed Schad	
	ameel —	Act Cabus	I. 372
	janischer Pauwis		II. 466
Moune Mou	neton, (Savoj.) Blaum	reise	II. 627
Maco, Schlei	maka		IV. 354
Mucu, (bras.)	Chikichmans		IV. 53
	(.) Carolinische Grundel	IV.	285. 286
Muger, (port.		•	1. 175
Muggen, (bol	1.) Schnaden, Muden	•	V2. 989
Mugil imberb	is. Meerafche	•	IV. 352
Muck, Culox	•	V2. 989	2, 6, 336
Gaspisch	c, Culex Caspius	•	<b>5.</b> 336
Muckenaas.	Lagthierchen) Ephemer	a culicifo	) <b>r-</b>
1	mis –		V2. 780
Mudenfliege, (	Langfuß) Tipula Marc	i	V2, 939
	• • • • •		Micten

Muckenschmetterling Mu	rex 29 <b>f</b>
•	Th. S.
Mudenschmetterling, (Pfeilschmanz) Sphinx	culi-
ciformis —	V. 644
Muckenwanze, Cimex tipularius -	V. 506
Rublsteinfisch, Tetrodon Mola -	III. 318
Muller, (Raupentober) Ichneumon molitor	
Münchgeper, (Rablhals)	II. 54
Runchstappe, (Walze) Voluta pertusa	VI. 490
Munganger, (Fliege) Musca Mendastri	V2. 939 I. 349
Mois, (holl) Maus Muße, (Riprfieber) Patella barbara -	VI. 607
- Chinesische, Patella Chinensis -	VI. 604
Muizen voortjes, (boll.) Mauseohren	VI. 581
Mulcranoc, (engl.) Spistopf -	IV. 105
	IV, 270. 352
Mullet, (engl.) Geepapagen -	- ĮI. 311
Mullkris, (griech.) Oftinbigner, (Racterlad	f) V. 405
Mullus, Meerbarbe -	IV. 259
- barhatus, Nothbart -	IV. 269
- imberbis, Rabibart -	IV. 271
furmuletus, Riefenbarbe	IV. 270
Mullwad, (schweb.) Maulwurf	- I. 295
Mulus, (Equus) Manlesel	I. 454
Mungo, (\iverra) Schlangentober -	I, 245
Muontanello, (ital) Braunkehlchen -	II. 609
Moræna, Nal	IV. 31 IV. 43
Durene, Murana Helena	IV. 43 IV. 32
Murex, gejacte Schweißerhofen -	VI. 486
Purer, linter, (Stachelichnede) Murex can	
rius –	<b>G.</b> 379
	492, C. 379
- antiquus, Dieberlanbifche Spinbel .	VI, 515
- arvanus, gezactte Feige	VI. 514
- asper, ranhe Radel -	VI. 523
Babylonius, Babilonischer Thurm	VI. 510
- brandaris, borniger Schnepfentopf	VI. 495
- canaliculatus, Rube -	VI. 513
— — cariolus, Blußspindel —	VI. 510
T 4	Murek

	Th. G.
Murex clathratus, gefaltene Schraube	VI. 517
- contrarius, linker Murer -	S. 379
— — corneus, Hornschnecke —	VI, 518
- cornutus, gegactier Schnepfentopf	VI. 495
- craticulatus, Regspindel -	VI. 520
cutaceus, Sautschnecke -	VI. 503
decollatus, Ctumpfnadel -	VI. 524
despektus, nordische Spindel .	VI. 515
— — erinaceus, Granatapfel —	VI. 500
— — femoralis, Kukhorn —	VI. 502
fuscatus, gezactter Befaaneknopf	VI, 523
- granulatus, Kornernadel	VI. 524
- gyrinus, Froschschnecke - Javanus, Javanische Spindel -	VI. 501
- Javanus, Javanische Spindel	VI. 511
lignarius, Holzspindel -	VI. 519
- Neretoideus, weisse Maulbece	VI. 507
- perverlus, linkische Feige -	VI. 514
- pilearis, getrocfnete Birn	VI. 504
- ramolus, Krausschnecke -	VI. 497
- reticularis, Desschnecke .	VI. sas
- ricinus, Maulbeer -	VI. 506
faxatilis, Brandhorn -	VI. 499
scriptus. Schriftseindel -	VI. 520
senticosus, Distelschnecke -	VI. ros
— — spirillus, geschwänzte Rube —	VI. 513
succinclus, Rothlinie -	E. 379
- Syracusanus, Sprakusanische Spindel	VI. 520
- tribulus, Spinne -	VI. 494
- Tritonis, Tritonsschnecke -	VI. 515
- vertagus, Schnaußennadel -	VI. 521
Murganho, (span ) Spismaus -	I. 303
Murmelbrackem, Mormyrus .	IV. 192
Murmelfische, Mormyri -	IV. 361
Murmelthier, Mus Marmota -	I. 341
amerifanisches, Mus monax	L 343
Murmont, Murmelthier -	I, 341
Murmos, (griech.) Ameife -	V2. 908
Murre, (engl.) Papagentaucher —	II. 309
•	Mus

	Mus	Musaraigne	197
		,	₹h. <b>E</b> .
Mus	Canguru, Kanguruh	· -	. 62
Mus	, (Cyprea) Karthagenisc	he Porzellane	VI. 394
Mus	s, Maus -		334. S. 39
كتنع	agrarius, Ackermans	•	S. 41
•	aguti, Ferfelfaninchen		I. 337
-	amphibius, Bafferraße	-	I. 347
	aperea, Brasilianische M	aus 🐪 📮	€. 40
_	arenarius, Sandmaus	-	S. 44
•	avellanarius, Haselmaus	-	I. 360
7	barabensis, Obnmaus		©. 44
<del>نے</del>	barbarus, wilbe Maus	•	S. 47
	Cabiai, Amerikanische M		<b>S</b> . 40
•	citellus, Polnische Maus	3	I. 339
<del></del>	citellus, Ziselraße	•	<b>©</b> . 39
<del>11.</del>	cricetus, Hamster	-	I. 344
-	gregorius, Erdmaus	• `	I. 351
<del></del>	jaculus, Springer	- I.	352. <b>S</b> . 62
+-	lagurus, Raubschwanz	•	<b>S</b> . 45
-	lemmus, Lemming	-	I. 339
_	leporinus, Haafenmaus	-	I. 338
_	meridianus, Langfuß	•	S. 42
•••	migratorius, Zugmaus	₹.	S. 43
-	minutus, Zwergmaus	•	S. 41
_		Rurmelthier.	I. 343
-	musculus, Hausmaus	•	. I. 349
<del>11.1</del>	paludosus, Sumpfmaus	÷	<b>E</b> . 39
<del></del> .	percellus, Cavia	. <del>""</del>	S. 49
_	porcellus, Meerschweine	hen —	L 334
~	quercinus, Eichelmaus	<del>-11</del>	I. 381
-	arrange gritting within	•	S. 45
-	and an and a district as the an	•	I. 352
		₹	<b>G</b> . 46
•		. •	<b>G</b> . 43
~	1)114616467 201111111111	-	i. 352
_	Tamariscinus, Tamariss	enmaus -	S. 42
-	terrestris, Feldmaus		L 349
	volans, Flieger	•	I, 354
Mu	laraigne, (fr.) Spihmau	<b>8</b>	• I. 303
	•	T 5	Mu-

Mola

Musca		299
,		2h. €.
Musca florea, Blumenfliege	•	V2. 958
florescentiæ, Bluteufliege	•	V2. 980
frondescentiæ, Fruchtfliege	•	V2. 980
furta, Blatfliege		V2. 968
- germinationis, Marificge		V2. 979
— — gibbola, Soder	•	V2. 963
glaucia, Grunschild	• .	V2. 962
- groffa, Fliegenriefe	•	V2, 969
- groffificationis, Krublingefliege	;	V2. 976
Heraclii, Barenflaufitege	•	V2, 980
Hottentotta, Sottentot	-	V2. 953
- hyosciami, Bilfentrautfliege	•	V2. 979
ichneumonea, Colupffliege	•	V2, 961
illucens, Glassliege	•	V2. 950
inanis, Hohlbauch	•	V2. 966
intricaria, Berwirrer	•	V2, 959
Lappona, Lapplander	. •	V2. 997
larvarum, Raupenfliege	•	P2. 970
—— lepræ, Aussas	•	V2. 973
leucopa, Weißfuß	<b>♦</b> :	V2. 956
lucorum, Buschfliege	•	V2. 950
- maculata, Fledfliege	•	V2, 958
Maura, Meigband	•	V2. 953
- mellina, Sonigfliege	•	V2. 964
mondaftri, Mungefauger	•	V2. 964
meridiana, Mittagsliege		V2. 966
meteorica, Gemitterfliege	•	V2. 972
mortuorum, Tobenfliege	•	V2, 967
— — mutabilis, Unbestand	. •	V2, 961
- mystacea, Bartfliege	•	V2. 957
- neederea, Blumensauger	•	V2. 956
— — nemorum, Waldfliege	•	V2. 958
nobilitata, Ebelmann	•	V2. 974
- noktiluca, Nachtwanderer	•	$V_2$ , 962
oftracea, hornisfliege	•	V2, 959
pantheria, Panther	•	V2. 952
parietina, Wandfliege	•	V2. 976
— — pellucens, Durchleucht	•	V2. 965
•		Mulca

		Th. G.
Musca pendula, Dunnschwang	•	V2. 958
- petronella, Bafferlaufer	•	V2. 974
- pipiens, Singfliege	~-	V2. 964
- plebeja, Pobelfliege	•	V2. 950
- pluvialis, Regenfliege	- •	V2. 971
- polita, Polirfliege	-	V2. 973
- pubera, Rlafafter	_	V2. 974
- putris, Quarffliege	₹ '	V2. 972
- pyraftri, Birnfliege	•	V2. 963
- quadripunetata, Bierpunkt	₹	V2. 978
radicum, Rettigfliege	•	V2. 970
- ribefii, Johanniebeerfliege	•	V2. 963
roralis, Thaulecter	₹.	V2. 971
- rotundata, Rundbauch	÷	V2 969
- faltuum, Daibeftreifer	-	V2. 977
- fcolopacea, Ctachelfdnabel	<del>-</del>	V2. 954
Scorpiouros, Scorpionfliege	-	V2. 802
fcripta, Blumenfauger	• ,	V2. 44
- fcybilaria, Dredfliege	•	V2. 976
fegnis, Faulenzer	•	W2, 965
- fepulchralis, Grabfliege	-	V2. 99
- Gerrata, Cageflugel	₹	V2. 972
- ferratulæ, Diftelfliege	•	V2. 978
folftitialis, Gelbichilb	•	V2. 980
- fonchi, Ganfebiftel	, <del>•</del> ·	V,2. 979
- Rercoraria, Dungfliege	•	V2. 976
- fubsultans, Supfer	•	V2. 971
- fylvarum, Sainflieger	. ₹	$V_2$ , 960
- tarda, Zauberer .	₹.	V2, 954
- tenax, Kothfliege	•	V2. 954
- terrestris, Erdfliege	•	V2. 977
- transfuga, Bluchtling	•	V2. 963
- tremula, Bitterfliege	•	V2. 970
- triagraria, Infettenfanger	₹.	V2. 955
- trilincata, Drenftrich	-	V2, 951
- uliginola, Ruffliege	*	V2. 956
- umbrarum, Chattenfliege	-	$V_2, 9.6$
- ungulata, Rlauenfuß	•	V2. 974
/ / /		Mofet

	Musca	Muscicapa 3	<b>.</b> 6.	ði ⊛.
Minica ne	ticæ, Reffelfliege		√2.	
	brans, Triller		V 2.	
vic	luata, Wittme		/2.	
	mitoria, Brechfliege		/2.	
	blub, (Gienmuschel) C		vi.	
	nug, (Kinthorn) Bucc			465
	if, Fringilla conchata			166
	ob, (Schildfioh) Monoc		_	
Muschelte	ager, (Krammetsvogel	A Turdine folène	æ .	144
Muschelne	gel, (Kernbeisser) Lo	y i uraus tutcus		154
	achter, (Rrabbe) Cance		œ.	174
	a, Braunkeblchen	or bumobustax a	2 tt	609
	2, Fliegenfänger	- II. 595.	&	163
	arausiaca, Oraniet	- 41. 795.	€.	
ئے۔ ہے۔ نے نے	atra, schwarzer Fliege	než	€. €.	171 169
			II.	
	atricapilla, schwarzer Bourbonensis, Bourl	Mucgenfunger	<b>6.</b>	,,
	Cajanensis, Cajennisch	han Elisaan fansan	II.	171
<u> </u>				599
	Canadensis, Canadisa Capensis, Caapscher		II. II.	599 600
<u> </u>	Carolinensis, Carolin		11. S.	600
<u> </u>	caudata, Langschwan	•		168
<u> </u>	cinerea, Blaubauch	Hiisaan Elmaan		171
	coronata, gefronter		<b>E</b> .	168
	crinita, Amerifanisch	er Pitedenlauter	II.	597
<u>-</u>	cyanea, Blaurucken	. Clia sambluaan	Ø.	170
~ _	emeria, Bengalischer	Knedenlanger	IL.	597
	fasciata, bandirter Fl		D.	172
· —	fusca, brauner Fliege		TT .	170
<u> </u>	grisola, gestreifter F			601
	leueocephala, Beigl		<b>⑤</b> .	169
	maculata, Flügelfleck	Tii.aankinaan		171
 	maculata, geflecter	Kiledenlander Filedenlander	€.	
	Martinica, Martinif			596
<u>-</u>	mutata, Madagastar	ilmer Litedeulauder	11.	590
<del>-</del>	nitida, schoner Fliege	hian Glissenfinern	9.	170
	olivacea, Olivenfarl	nider Quefeulaudet	II.	
	Paradisi, Rotondieb	e Elisasuffuasu		595 601
	petechia, geflectter	2meAculanAct		Mu

Muscicapa pileata, Edwarzwirbel — purpurata, Purpurseble — rubra, vother Fliegenfanger — ruticilla, Rothschwang — ruticilla, Rothschwang — Senegalensis, Eenegalischer Fliegenf. — spurca, Schwarzbaken — spurca, Schwarzbaken — surinama, Eurinamischer Fliegenf. — torquata, Ringfragen — variegata, bunter Fliegenfanger — virens, grüner Fliegenfanger — virens, grüner Fliegenfanger — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — Viz 327  Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitische Bisamente II. 288  Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitische Bisamente II. 288  Muscusböcklein, (Bocklessen) — Russenbocklein, (Bocklessen) — Russenbocklein, Sus Tajacu — I. 460  Mussekhoorn, (boll.) Rotenschwede — VI. 432  Musica, (Rana) Quastrote — Musiekhoorn, (boll.) Rotenschwede — VI. 433  Musiekhoorn, (boll.) Rotenschwede — VI. 434  Musiekhoorn, (boll.) Rotenschwede — VI. 434  Musiekhoorn, (boll.) Rotenschwede — VI. 434  Mustella fluviatilis, Erusche, Masturpe  Mustella, Gadus) Reerquappe — Iv. 98  Mustella, Giesel — barbara, schwarze Wiesel — lutra, Flussotter — lutrola, Gumpfotter — lutra, Flussotter — lutrola, Gumpfotter — lutris, Reeroster — lutris, Reeroster — nivalis, Echneewiesel — putoria, Istis — Sarmatica, Gomewiesel — Lace — utris, Reeroster — lutris, Reeroster — lutris, Reeroster — lutris, Reeroster — sibirica, Gibrier — zibellina, 30bel — Lace  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustelus, Reerssu  Mustella fluviational Austelles  Mustella fluviational Austelles  Mustella fluviational Austelles  Mustella fluviational Austelles  Mustella fluviat		Th.	Œ.
purpurata, Purpurfehle rubra, vother Fliegenfanger ruticilla, Rothschwang ruticilla, Rothschwang Senegalensis, Senegalischer Fliegenf. Senegalensis, Senegalischer Fliegenf. Surinama, Surinamischer Fliegenf. Surinama, Surinamischer Fliegenf. Surinama, Surinamischer Fliegenf. Surinama, Surinamischer Fliegenf. Surinama, Surinamischer Fliegenfanger vorrens, grüner Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher Fliegenfanger virens, Bitginscher VI. 327 Muscoldes, (Tubularia) Mostowitische Bisamente II. 288 Muscousbocklein, (Bockascher) Cerambyx suaveolus virensscheren, (Bockascher) Cerambyx suaveolus virensscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscheren, Sus Tajacu virenscherenscheren, Sus Tajacu virenscherenscherenscheren, Sus Tajacu virenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenscherenschere	Muscicapa pileata, Edmarswirbel	€.	172
- ruticilla, Rothschwan; - 11. 595 - Senogalensis, Eenegalischer Fliegenf. II. 600 - spurca, Schwarzbaken - 5. 170 - Surinama, Gurinamischer Fliegenf. II. 595 - torquata, Ringkragen - II. 600 - variegata, bunter Fliegenfänger - II. 590 - virens, grüner Fliegenfänger - II. 590 - viridis, Grünkehlichen - VI. 327 - Virginea, Bitginischer Fliegenfänger - Virginea, Bitginischen - VI. 327 - Virginea, Bitginischen - VI. 327 - Virginea, Bitginischen - VI. 327 - Virginea, Bitginischen - VI. 327 - Virginea, Briefenführen - VI. 327 - Muscovy-Duk, (engl.) Moostocher - VI. 381 - Muscovy-Duk, (engl.) Moostocher - VI. 381 - Muscustöcklein, (Bockfäser) Cerambyx suaveolus - 238 - Ruscustöcklein, (Bockfäser) Cerambyx suaveolus - 238 - Ruscustöcknein, Sus Tajacu - I. 469 - Russik, wilde, (Balge) Voluta hebræa - III. 500 - Musica, (Rana) Quaktröte - III. 500 - Musicalla fluviatilis, Erusche, Malruppe - VI. 432 - Mustella, (Balge) Voluta hebræa - VI. 434 - Mustella, (Balge) Voluta hebræa - VI. 434 - Mustella, (Gadus) Reerquappe - IV. 93 - Mustella, (Gadus) Reerquappe - IV. 93 - Mustella, (Gadus) Reerquappe - IV. 93 - Mustella, (Gadus) Reerquappe - IV. 93 - Mustella, (Gadus) Reerquappe - II. 269 lutreola, Sumpfotter - I. 269 lutreola, Sumpfotter - I. 269 lutris, Reeroster - I. 269 putoria, Itis - I. 269 putoria, Itis - I. 269 Sarmatica, Sarmaticr - 5. 33 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34 - Sibirica, Sibirter - 5. 34	- purpurata, Purpurfehle .		
- ruticilla, Rothschman; - Senegalensis, Eenegalischer Fliegenf surinama, Gurinamischer Fliegenf surinama, Gurinamischer Fliegenf torquata, Ringtragen - torquata, Ringtragen - virens, grüner Fliegenfänger - Virginea, Birginischer Fliegenfänger - Virginea, Birginischer Fliegenfänger - viridis, Grünteblichen - viridis, Grünteblichen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Virginea, Birginischen - Litte, Moschoffen - Virginea, Gibirter - Lutra, Flusotter - Lutra, Flusotter - Lutris, Weerster - Lutris, Weerster - Lutris, Weerster - Lutris, Weerster - Lutris, Weerster - Lutris, Weerster - Lutris, Weerster - Lutris, Birsinischen - Sarmatica, Sarmatier - Sibirica, Sibirter - Sarmatica, Sarmatier - Sibirica, Sibirter - Zibellina, 30bel - Mustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weerstau - Wustelus, Weers	- rubra, vother Fliegenfanger -		
- Senogalensis, Eenegalischer Fliegens. II. 600 - spurca, Schwarzbaken - Surinama, Gurinamischer Fliegens. II. 597 - torquata, Ringkragen - variegata, bunter Fliegensager - virens, grüner Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsscher Fliegensager - Virginea, Birginsschen - Fliegensager - Virginea, Birginsschen - Fliegensager - Virginea, Birginsschen - Fliegenscher - Musschooften, (Bocktafer) Cerambyx suaveolus - Russchöcklein, (Bocktafer) Cerambyx suaveolus - Russchöcklein, Moschus - I. 374 - Musschoofn, (bosl.) Rostenschnede - VI. 432 - Musschoofn, (bosl.) Rostenschnede - VI. 432 - Musschoofn, (bosl.) Rostenschnede - VI. 434 - Musschoofn, (bosl.) Rostenschnede - VI. 434 - Musschoofn, (bosl.) Rostenschnede - VI. 434 - Musschla, Gadus) Meerquappe - VI. 434 - Musschla, Gadus) Meerquappe - VI. 434 - Musschla, Gadus) Meerquappe - VI. 434 - Musschla, Gadus) Meerquappe - VI. 435 - Loss - Lutra, Fiusotter - Lutra, Biusotter - Lutra, Biusotter - Lutra, Biusotter - Lutris, Meeroster - Lutris, Meeroster - Lutris, Meeroster - Lutris, Meeroster - Lutris, Meeroster - Lutris, Meeroster - Lutris, Schneewiesel - Loss - Sarmatica, Sarmatice - Sibirica, Sibirter - Zibellina, 30bel - Mustelus, Meerschu - Wustercharte, (Tagschm.) Papillo Leucotho - Wut, (boll.) Stundenschierchen - V. 612 - Mut, (boll.) Stundenschierchen			
— surinama, Gurinamischer Fliegens. — Surinama, Gurinamischer Fliegens. — torquata, Ringfragen — variegata, bunter Fliegensager — virens, grüner Fliegensager — Virginea, Birginischer Fliegensager — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — viridis, Grünseblichen — VI. 327 Muscodes, (Tubularia) Moostocher Muscody-Duk, (engl.) Mostochischer VI2. 817 Muscody-Duk, (engl.) Mostochischer Bisamente II. 286 Muscustböckein, (Bockfest) Cerambyx suaveolus — I. 466 Muscustbier, Moschus — I. 374 Musica, (Rana) Quastrote — Musickhoorn, (bos.) Rotenschnecke — VI. 432 Musik, wilbe, (Balze) Voluta hebræa  Musikella sluviatilis, Erusche, Malruppe  Mustella sluviatilis, Erusche, Malruppe  Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, Wiesel — erminea, Hermelln — lutra, Flusotter — lutreola, Sumpfotter — lutris, Meerotter — lutris, Meerotter — lutris, Reerotter — nivalis, Schneewiesel — putoria, Istis — Sarmatica, Garmatier — Sibirica, Sibirter — Sibirica, Sibirter — 2ibellina, 3obel — V. 612 Mustelus, Meersau  Mustelus, Reersau  Mustercharte, (Tagschm.) Papillo Leucotho  Wut, (bos.) Stundenthierchen  V. 612 Mut, (bos.) Stundenthierchen	Senogalensis, Genegalischer Bliegenf.		
- Surinama, Gurinamischer Fliegens. II. 597 - torquata, Ringkragen - III. 600 - variegata, bunter Fliegensánger - II. 599 - Virginea, Birginischer Fliegensánger - II. 599 - Virginea, Birginischer Fliegensánger - II. 599 - viridis, Grünkeblichen - VI. 327 Muscoldes, (Tubularia) Moostocher VI2. 817 Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitische Bisamente II. 288 Muscustochein, (Bockfaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscustochein, (Bockfaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscustochein, Sus Tajacu - I. 469 Musica, (Rana) Quaktrote - III. 500 Musica, (Rana) Quaktrote - III. 500 Musickhoorn, (host.) Notenschnecke - VI. 432 Musickhoorn, (bost.) Notenschnecke - VI. 432 Musickhoorn, (bost.) Notenschnecke - VI. 434 Musquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella stuviatilis, Trusche, Astruppe IV. 60 Mustella, (Gadus) Meerquappe - IV. 63 Mustella, Wiesel - I. 269 - barbara, schwarze Wiesel - I. 269 - erminea, Dermelln - I. 274 - lutra, Flusotter - I. 264 - lutris, Meerotter - I. 264 - putoria, Istis - I. 269 - nivalis, Echneewiesel - I. 269 - putoria, Istis - I. 269 - Sarmatica, Sarmatier - E. 33 - Sibirica, Sibirier - I. 264 - Sarmatica, Garmatier - E. 34 - Sibirica, Sibirier - I. 269 - Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Mustelus, Meersau - III. 260 Must, (bost.) Stundenthierchen - Ve. 784			
— torquata, Ringfragen — variegata, bunter Fliegenfänger — virens, grüner Fliegenfänger — Virginea, Birginischer Fliegenfänger — viridis, Grünteblichen — viridis, Grünteblichen — viridis, Grünteblichen — viridis, Grünteblichen — VI. 327 Muscoides, (Tubularia) Moostöcher Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitische Bisamente II. 288 Muscusböcklein, (Bocktäser) Cerambyx suaveolus — L. 469 Muscusböcklein, (Bocktäser) Cerambyx suaveolus — L. 469 Muscusschier, Moschus — I. 374 Musica, (Rana) Quaströte — III. 50 Musiekhoorn, (hosl.) Rotenschnecke — VI. 432 Musiekhoorn, (hosl.) Rotenschnecke — VI. 433 Muscusschier, Massey Muscusschier, Massey Mustella fluviatilis, Trusche, Aalruppe Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, Wiesel — erminea, Hermelln — lutra, Flussotter — lutreola, Sumpfotter — lutris, Meeroster — lutris, Meeroster — nivalis, Schneewiesel — putoria, Istis — Sarmatica, Garmatier — Sibirica, Sibirier — 2ibellina, 3obel — Sarmatica, Garmatier — 2ibellina, 3obel  Mustelus, Meersau  Mustercharte, (Tagschm.) Papillo Leucothos V. 612 Mut, (hosl.) Stundenthierchen  V2. 784	Surinama, Surinamischer Fliegenf.		
— virens, grüner Fliegenfanger — Virginea, Birginischer Fliegenfanger — viridis, Grüntehlchen — viridis, Grüntehlchen — viridis, Grüntehlchen — VI. 327 Muscoldes, (Engl.) Miesmuschen — VI. 327 Muscoldes, (Tubularia) Moostocher Muscovy-Duk, (engl.) Moostochische Bisamente II. 288 Muscusbocklein, (Bockfaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscusbocklein, (Bockfaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscusbocklein, Sus Tajacu — I. 469 Muscusthier, Moschus — III. 50 Musica, (Rana) Quaktrote — III. 50 Musiekhoorn, (host.) Notenschnecke — VI. 432 Musiek, wilde, (Balze) Voluta hebræa VI. 434 Musquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella sluviatilis, Erusche, Aalruppe Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, Wiesel — barbara, schwarze Wiesel — lutra, Flusotter — lutra, Flusotter — lutra, Flusotter — lutris, Meerotter — lutris, Meerotter — lutris, Meerotter — putoria, Istis — Sarmatica, Garmatier — Sibirica, Eibirier — 2ibellina, 3obel  Mustelus, Meersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Mustelus  Mustelus  Mustelus  Mustelus  Mustelus  Mustelus  Mustelus  Mustelus  Mustelu	- torquata, Ringfragen -		
— Virginea, Birginischer Fliegensanger — viridis, Grüntehlchen — viridis, Grüntehlchen — VI. 327 Muscoldes, (Engl.) Messmuschen — VI. 328 Muscoldes, (Tubularia) Moostocher		II.	601
Muscles, (engl.) Riesmuscheln  Muscoides, (Tubularia) Moostocher  Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitische Bisamente II. 288  Muscusbocklein, (Bocktoffer) Cerambyx suaveolus E. 238  Muscusbocklein, Sus Tajacu  Muscusthier, Moschus  Musica, (Rana) Quaktrote  Musica, (Rana) Quaktrote  Musickhoorn, (holl.) Rotenschnecke  VI. 432  Musickhoorn, (holl.) Rotenschnecke  VI. 434  Musquieten-Mama, (ind.) der wandelnde Stengel V. 410  Mustella sluviatilis, Erusche, Aslruppe  Mustella, (Gadus) Reerquappe  Mustella, (Gadus) Reerquappe  Mustella, Wiesel  — erminea, Dermelln  — lutra, Flussotter  — lutra, Flussotter  — lutris, Reerotter  — nivalis, Echneewiesel  — putoria, Istis  — Sarmatica, Garmatier  — Sibirica, Gibirter  — 2ibellina, 3obel  Mustelus, Reersau  Mustelus, Reersau  Rustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothos  V. 612  Mut, (holl.) Stundenthierchen  V2. 784			
Muscoides, (Tubularia) Moostocher VI2. 817 Muscoides, (Tubularia) Moostocher VI2. 817 Muscovy-Duk, (engl.) Moostocher VI2. 817 Muscovy-Duk, (engl.) Moostochische Visamente II. 288 Muscusbockein, (Bockfaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscusschier, Moschus II. 469 Muscusschier, Moschus III. 50 Musica, (Rana) Quattrote III. 50 Musickhoorn, (host.) Notenschnecke VI. 432 Musick, wilde, (Balge) Voluta hebræa VI. 434 Musquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella sluviatilis, Teusche, Aalruppe IV. 60 Mustella, (Gadus) Meerquappe IV. 60 Mustella, Wicsel I. 259 E. 33 — bardara, schwarze Wiesel I. 269 — erminea, Dermelln I. 274 — lutra, Flusotter I. 262 — lutreola, Sumpfotter I. 262 — nivalis, Echneewiesel I. 269 — putoria, Istis I. 269 — Sarmatica, Sarmatier I. 269 — Sarmatica, Sarmatier I. 269 — Sibirica, Sibirter I. 269 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustelus, Meersau Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (boll.) Stundenthierchen V2. 784	- Virginea, Wirginischer Fliegenfanger		
Muscoides, (Tubularia) Moostocher VI2. 817 Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitsche Sisamente II. 288 Muscusbocklein, (Bockfaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscusschier, Moschus — I. 469 Muscustchier, Moschus — I. 374 Musica, (Rana) Quattrote — III. 50 Musiekhoorn, (host.) Notenschnecke — VI. 432 Musiekhoorn, (host.) Notenschnecke — VI. 432 Musieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella suviatilis, Erusche, Aalruppe IV. 60 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 63 Mustella, Wiesel I. 259 E. 33 — bardara, schwarze Wiesel — I. 269 — erminea, Dermelln — I. 274 — lutra, Flussotter — I. 262 — lutreola, Sumpsotter — I. 262 — nivalis, Echneewiesel — I. 269 — putoria, Istis — I. 269 — Sarmatica, Sarmatier — E. 33 — Sibirica, Sibirier — Sibirica, Sibirier — I. 269 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — II. 269 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — II. 269 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
Muscovy-Duk, (engl.) Mostowitische Bisamente II. 288 Muscusböcklein, (Bocktaser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscussidien, Sus Tajacu — I. 469 Muscussidier, Moschus — I. 374 Musica, (Rana) Quaktrote — III. 50 Musiekhoorn, (host.) Notenschnecke — VI. 432 Musik, wilde, (Walse) Voluta hebræa — VI. 434 Musquieten-Mama, (ind.) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella sluviatilis, Erusche, Nalruppe — IV. 63 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 63 Mustella, Wiesel — I. 259. E. 33 — barbara, schwarze Wiesel — I. 265 — — erminea, Hermelln — I. 274 — lutra, Flusotter — I. 264 — lutreola, Sumpfotter — I. 264 — nivalis, Schneewiesel — I. 266 — — putoria, Istis — I. 269 — — Sarmatica, Sarmatier — E. 33 — Sibirica, Sibirier — E. 34 — Sibirica, Sibirier — E. 34 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustella — IIII. 260 Mustella — IIII. 260 Mustella — IIII. 260 Mustella — IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII			
Muscusbocklein, (Bockleser) Cerambyx suaveolus E. 238 Muscusschier, Moschus — I. 369 Musica, (Rana) Quaktrote — III. 50 Musica, (Rana) Quaktrote — III. 50 Musickhoorn, (boll.) Notenschnecke — VI. 432 Musik, wilde, (Wasse) Voluta hebræa — VI. 434 Musquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella sluviatilis, Trusche, Astruspe — IV. 93 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, Wiesel — I. 259. S. 33 — — barbara, schwarze Wiesel — I. 269 — — erminea, Hermeltn — I. 274 — — lutra, Flussotter — I. 264 — — lutris, Meerotter — I. 269 — — nivalis, Echneewiesel — I. 269 — — putoria, Istis — I. 269 — — Sarmatica, Sibirier — Sibirica, Sibirier — Sibirica, Sibirier — Sibirica, Sibirier — I. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — II. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, Meersau — IIII. 260 Mustelus, (boll.) Grundenthierchen — V2. 784	Mulcoldes, (I udularia) Modeloger	VI2.	817
Muscusthier, Moschus  Musica, (Rana) Quattrote  Musica, (Rana) Quattrote  Musickhoorn, (host.) Notenschuecke  Musit, wilde, (Walse) Voluta hebrwa  Musquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410  Mustella sturiatilis, Erusche, Astruppe  Mustella, (Gadus) Meerquappe  Mustella, Wiesel  — bardara, schwarze Wiesel  — erminea, Hermeltn  — lutra, Flussotter  — lutreola, Sumpfotter  — lutris, Meerotter  — nivalis, Schneewiesel  — yutoria, Istis  — Sarmatica, Sarmatier  — Zibellina, 3obel  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersau  Mustelus, Meersa	Mileovy - Duk, (righ) Akostominias Sijament	e II.	28%
Musica, (Rana) Quaftrote  Musica, (Rana) Quaftrote  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 432  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 433  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musickhoorn, (host.) Rotenschnecke  IV. 436  Musickhoorn, (host.) Retenschnecke  IV. 436  Musickhoorn, (host.) Retenschnecke  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 416  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 436  IV. 4	Multusbucitiii, (Soutraft) Cerambyx 102Veolu		
Musica, (Rana) Quattrote  Musiekhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 432  Musiekhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musiekhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musiekhoorn, (host.) Rotenschnecke  VI. 434  Musiekhoorn, (walse) Voluta hebræa  Musiekhoorn, (host.) Der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (sind) der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (sind) der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (sind) der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (sind) der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (sind) der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (sind) der wandelnde Stengel V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher Stengel V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher Stengel V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher Stengel V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  Musiekhoorn, (bost.) Stundenscher V. 410  M			
Musiekhoorn, (holl.) Notenschnecke — VI. 432 Musik, wilde, (Balge) Voluta hebrwa VI. 434 Musiquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella sluviatilis, Erusche, Aalruppe IV. 93 Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93 Mustella, Wicsel — I. 259. S. 33 — — bardara, schwarze Wiesel — I. 269 — — erminea, Dermelln — I. 274 — — lutra, Flussotter — I. 262 — — lutreola, Sumpfotter — I. 264 — — lutris, Meerotter — I. 269 — — nivalis, Schneewiesel — I. 269 — — putoria, Istis — I. 269 — — Sarmatica, Sarmatier — Sibirica, Sibirier — Sibirica, Sibirier — I. 272  Mustelus, Meersau — II. 272  Mustelus, Meersau — II. 260 Mustercharte, (Easschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Stundenthierchen — V2. 784		ı,	374
Mustella suviatilis, Erusche, Aalruppe IV. 434 Mustella suviatilis, Erusche, Aalruppe IV. 435 Mustella, (Gadus) Meerquappe IV. 93 Mustella, Wicsel I. 259. S. 33 — barbara, schwarze Wiesel I. 259. S. 33 — erminea, Hermelln I. 274 — lutra, Flusotter I. 262 — lutreola, Sampfotter I. 264 — lutris, Meerotter I. 269 — nivalis, Schneewiesel I. 276 — putoria, Istis I. 269 — Sarmatica, Sarmatier Sibirica, Sibirica, Sibirica I. 269 — I. 272 Mustelus, Meersau II. 272  Mustelus, Meersau II. 260  Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothos V. 612 Mut, (holl.) Stundenthierchen V2. 784		III.	50
Musquieten-Mama, (ind) der wandelnde Stengel V. 410 Mustella sluviatilis, Teusche, Aalruppe IV. 68 Mustella, (Gadus) Meerquappe IV. 93 Mustella, Wicsel I. 259. S. 33 — bardara, schwarze Wiesel I. 266 — erminea, Dermelln I. 274 — lutra, Flusotter I. 262 — lutreola, Sumpfotter I. 264 — lutris, Meerotter I. 269 — nivalis, Schneewiesel I. 276 — putoria, Istis I. 269 — Sarmatica, Sarmatier I. 269 — Sibirica, Sibirter I. 269 — I. 272 Mustelus, Meersau II. 260 Mustelus, Meersau II. 260 Mustelus, Meersau II. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Mustelus, Meersau III. 260 Must, (holl.) Stundenthierchen V2. 784		VI.	432
Mustella sluviatilis, Trusche, Aalruppe  Mustella, (Gadus) Meerquappe  — IV. 93  Mustella, Wicsel  — barbara, schwarze Wiesel  — erminea, Huskotter  — lutra, Flusotter  — lutreola, Sumpfotter  — lutris, Meerotter  — nivalis, Schneewiesel  — putoria, Istis  — Sarmatica, Sarmatier  — Sibirica, Sibirier  — zibellina, 30bel  Mustelus, Meersau  Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë  Mut, (holl.) Stundenthierchen  IV. 93  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 96  IV. 9		VI.	434
Mustella, (Gadus) Meerquappe — IV. 93  Mustella, Wiesel — I. 259. S. 33  — barbara, schwarze Wiesel — I. 266  — erminea, Hermelln — I. 274  — lutra, Flussotter — I. 262  — lutreola, Sampsotter — I. 264  — lutris, Meerotter — I. 269  — nivalis, Schneewiesel — I. 276  — putoria, Istis — I. 269  — yatoria, Istis — I. 269  — Sarmatica, Sarmatier — S. 33  — Sibirica, Sibirter — S. 34  — zibellina, 3obel — I. 272  Mustelus, Meersau — II. 260  Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612  Mut, (holl.) Stundenthierchen — V2. 784			
Mustella, Wicsel I. 259. C. 33  — barbara, schwarze Wiesel — I. 266  — erminea, Hermeltn — I. 274  — lutra, Flusotter — I. 262  — lutreola, Sampfotter — I. 264  — lutris, Meerotter — I. 269  — nivalis, Schneewiesel — I. 276  — putoria, Istis — I. 269  — Sarmatica, Sarmatier — C. 33  — Sibirica, Sibirter — C. 34  — zibellina, 3obel — I. 272  Mustelus, Meersau — II. 260  Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612  Mut, (holl.) Grundenthierchen — V2. 784			
— barbara, schwarze Wiesel — 1. 266 — erminea, Hermelln — 1. 274 — lutra, Flußotter — 1. 262 — lutreola, Sumpfotter — 1. 264 — lutris, Meerotter — 1. 279 — nivalis, Schneewiesel — 1. 276 — putoria, Istis — 1. 269 — Sarmatica, Sarmatier — 5. 33 — Sibirica, Sibirier — 5. 34 — zibellina, 3obel — 1. 272  Mustelus, Meersau — 11. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Grundenthierchen — V2. 784			
— erminea, Hermelin — I. 274 — lutra, Flußotter — I. 262 — lutreola, Sumpfotter — I. 264 — lutris, Meerotter — I. 269 — nivalis, Schneewiesel — I. 276 — putoria, Istis — I. 269 — Sarmatica, Sarmatier — S. 33 — Sibirica, Sibirier — S. 34 — zibellina, 3obel — I. 272  Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Grundenthierchen — V2. 784			
——————————————————————————————————————		_	
— lutreola, Sumpfotter — I. 264 — lutris, Meerotter — I. 279 — nivalis, Schneewiesel — I. 276 — putoria, Istis — I. 269 — Sarmatica, Sarmatier — S. 33 — Sibirica, Sibirter — S. 34 — zibellina, 3obel — I. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Stundenthierchen — V2. 784			
— lutris, Meerotter — 1. 269 — nivalis, Schneewiesel — I. 276 — putoria, Istis — I. 269 — Sarmatica, Sarmatier — S. 33 — Sibirica, Sibirter — S. 34 — zibellina, 3obel — I. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothos V. 612 Mut, (holl.) Stundenthierchen — V2. 784			
— nivalis, Schneewiesel — I. 276 — putoria, Istis — I. 269 — Sarmatica, Sarmatice — S. 33 — Sibirica, Sibirter — S. 34 — zibellina, 3obel — I. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothos V. 612 Mut, (holl.) Grundenthierchen — V2. 784			
— — putoria, Itis — I. 269 — — Sarmatica, Sarmatier — S. 33 — — Sibirica, Sibirter — S. 34 — — Zibellina, Zobel — I. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Grundenthierchen — V2. 784			
— — Sarmatica, Sarmatier — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			
— Sibirica, Sibirier — 5. 34 — 2ibellina, Jobel — 1. 272 Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (host.) Grundenthierchen — V2. 784	- Sarmatica Carmatica	_	-
— — zibellina, Zobel — I. 272 Mustelus, Meersau — II. 260 Mustercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (host.) Grundenthierchen — V2. 781	- Sibirica. Sibiriar		
Mustelus, Meersau — III. 260 Mustercharte, (Lagschm.) Papillo Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Grundenthierchen — V2. 781	- 2 ibelling. Robel -		
Muftercharte, (Tagschm.) Papilio Leucothoë V. 612 Mut, (holl.) Stundenthierchen — V2. 781			
Mut, (boll.) Stundenthierchen - V2. 784			
/m V			

	Th S.
Mutilla, ungeflügelte Biene - V2. 9	18. E. 331
- acarorum, Milbenfreffer -	V2. 921
- albeola, Weißwolle -	€. 33t
Americana, Gublander -	V2. 9.9
- atrata, Afrifaner -	V2. 920
barbara, Barbar -	V2. 920
bicolor, Gilberwolle -	<b>©</b> . 332
— Europæ2, Europäer	V2. 9:9
- formicaria, Baftardameise -	V2. 921
— helvola, Kaper — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	V2. 920
- Indica, Indianet -	V2. 919
Maura, Deutscher -	V2. 920
occidentalis, Abendlander -	V2. 918
sungora, Rothbrust -	€. 33t
- viduata, Wittme	<b>©</b> . 33 t
Mutret, (schweiz.) Spigmaus -	L 303
Muttereal, Muræna	IV. 32
Muttermotte, (Rachtschm.) Phalæna minutella	V. 748
Muttonfish, (engl.) Rothling —	IV. 204
Muur-Nagtegal, (holl.) Rothschwanz	11. 615
Muurvarken, (boll.) Resterassel	V2. 1153
Muythonden, (friest) Schleiben —	JV. 383
Mya, Klassmuschel - VI. 21	7. ©. 359
— aretica, Rordflaffer — arenaria, Sandfriecher —	VI. 224
edentula, Caspische Rlaffmuschel	VI. 218
- margaritifera, Perlenmuschel	S. 359
- perna, Breitflaffer	VI. 220
- pictorum, Mahlermuschel	VI. 223 VI. 219
- truncata, ftumpfer Rlaffer -	VL 219
- volsella, Bartkneifer -	VI, 218 VI, 223
MyEteria, Kahlfopf •	II. 366
Americana, Brafilianifcher Reiber	II. 366
Mydas, (Testudo) Riefenschildtrote	III. 18
Mygalos, (griech.) Spigmaus -	1. 303
Myja, (griech.) Fliege -	V2. 947
Myjops, (griech.) eine Art Fliegen -	V2. 982
Mylabris, Dichals	V. 248
	Myria.

•	Th.	G.
Myriataschild (Schildlaus) Coccus Myricæ		533
Myriophyllum, (Sertularia) Feberforalline	VI2.	
Myrmecophaga, Ameisenbar -	L.	180
didactyla, menfingeriger Ameifent	dr I.	180
jubata, langhaariger Ameisenbar		182
tetradactyla, vierfingeriger Ameisen	bár I.	183
tridactyla, brenfingeriger Ameifent	jár I.	181
Myrmeleon, Bastardjungfer — V2. 79	8. C.	, 317
- barbarum, Barbar -	V2.	108
- formicarium, Ameiseulome -	V2.	
— — longicorne, Langhorn —	V2.	
- trigrammum, Drepstrich.		317
Myros, (griech.) Nat	IV.	_
Myrpitta, (fcmeb.) gruner Regenrfeiffer		419
Myrthenblat, (Grashupfer) Gryllus myrthi		_
lius		428
Myrus, (Murena) Spigmaul -	IV.	
Mystus, (Clupea) Bartbering	1V.	
Mystus, (Silurus) Bartweld -	IV.	
Myten, (hotl.) Milben	V2.	
Mytilus, Miesmuschel VL 327	• <b>©•</b>	337
anatinus, Entenmicemuschel - barbatus, Bartmuschel -	\$7 <b>T</b>	333
- bidens, gerippte Micknuschel	VI.	333
- bilocularis, Zwergfell	VI.	
- cygneus, Schwanenmickmuschel	VI.	
- discors, Querstrichnuschel,	VI.	228
- edulis, gemeine Micemuschel	VI.	
- exustus, Kerbenmuschel -	VI.	222
Luchia Glattanfarror	VI.	329
- lythophagus, Steinmuschel -	VI.	222
- margaritiferus, Perlenmutter -	VI.	
_ modiolus, Papusmuschel, -	VI.	
- Pholadis, Morder Miesmufchel -	<b>6</b>	370
- polymorphus, Rufische Miesmuschel	<u>Š</u> .	370
- ruber, rothe Micsmuschel -	VI.	338
- rugolus, Runzelmuschel, -	VI.	333
ftriatulus, geftreifte Miesmuschel		370
	Myt	

Nabis, (athiop.) Rameelparder Nachasch, (bebr.) Schlange Machteule, Strix Aluco Machtfint, Fringilla noctis Rachtigal, Motacilla Luscinia Nachtigallenpapillon, (Tagfchm) Papilio Philome-Rachiferze, (Springfafer) Elater pholphoreus Rachtlicht, (leuchtender Rafer) Lampyris hespera Rachtmensch, Homo nocturnus Rachtschatten, (Springfafer) Elater obscurus V. 323 Rachtschatten, (Tagschmetterl.) Papilio Dedalus S. 287 Rachtschatten, (Wange) Cimex umbratilis V. 499 Machtschrener, (Frosch) Rana typhonia III. Rachtschwäriner, (Bodfafer) Cerambyx nottis V. 269 Rachtschwalbe Europaische, Caprimulgus Europæus II. 636 Nachtfinger, (Bachftelze) Motacilla curruca II. 605 Rachtfrinne, Aranea nocturna V2. 1077 Nachttopf, (Spornflugel) Para Jacana II. 431. Nachtvogel, (Schmetterlinge) Phalens V. 649. 5.306 Nachtmachterhorn, (Robreuschwamm) VI2. 796 Rachtwanderer, (Fliege) Musca noctiluca V2. 962 Nachtwanderer, (Laterntrager) Fulgora noctivida V. 449 ¥2; 104d Rachtmeder, (Floh) Pulex irritans Rackenhorn, (Rifer) Scarabæus nuchicornis ٧. Radel

300	20000	21400001	.49**		
•		· .	_	. <b>6</b>	eite
Mabel	bandirte, (Kinthorn)	Buccinum v	ittatum	VI.	471
	gebruckte, Buccinum h	ecticum		VI.	471
	geferbte, Buccinum cr	enulatum	-	VL.	
<u>-</u> -	geftriegelte, Buccinum	ftrigilatum.		VL	
	granulirte, (Rornernat	el)	•	VI.	
	tnotige, (Blugelschneck	e) Strombu	s tubeř	• _	
	culus	•		ŲÌ.	490
<b>ــ</b> ننڌ	raube, (Ctachelschneck	e) Murex a	[per	VΙ.	523
Rabel	feile, (Gtachelschnecke)	Murex Rad	ula	VI.	523
	fisch, Syngnathus			III.	339
Rabel	Schnecke, (braune Bandn	abel)	<b>-</b>	VI.	
Rabel	schiecke, (bunte Schrant	e)	-	VI.	
Rabel	scorpion, (Wasserkorp.)	Nepa lines	uriś È	<b>\V.</b>	473
Mabel	malie, gerippte, Voluta	Ruffina	-	VI.	
Mabel	walie, raube, Voluta sc	abricula	•.	VI.	
Rabel	manie, Cimex stagnoru	imi -		$\mathbf{V}_{i}$	506
Ráher	iadel, (Kinthorn) Bucc	inum duplic	atuni	VI.	
	de, ber, (Rachtschm) 1		nutatà		719
Naga	r, Afrikanisches Krumm	horn ,	-		53
Magef	lugel, (Rachtschm.) Phs	læna alniari	i <b>a</b>		706
Magel	, (Rlippfleber) Patella	Unguis	•	VL	
	, (Miesmuschel) Mytil			VI	332
Magel	fleck, (Rachtschm.) Pha	læna Tau			653
Magel	flügel, (Nachtschm.) Ph	ilæna ungic	cila	V.	739
	berg, (Bergmuschel) Ca	rdium acule	atum	VI.	
	muschel, (Waschbecken)	•		VI	
	roche, Raja clavata		ه ادیام ۱۹ سم	111.	
	schuler (Mondschneck)		annus	VI.	
Tringe.	lchulp, (holl.) Waschbi	icen -	•	VI. IV.	
	mulus, Sandbarfch		*		
Diagen	de Thiere, Glires	<del>-</del>	<b>L</b> 31	ı. e. IL	
Nagre	gal, (holl.) Rachtigal (Coluber) Brillenschla	<b></b>		Ш.	-
Naja <sub>j</sub>	COMPET (COMPET)	ngt ool	_	Ш.	
	tha, (chald.) Straußvo uer, Afrikanische Gensse			Ø.	
Nante	es, Somminmende Ampl	ihien I	II. 227.		
Paner	hnecken, (Klippfleber)	,, <u>,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	44/	VI.	602
Warh.	pflügel, (Lagichm.) Paj	oilio Phaleri	20	V.	
= NO C	Almand Philipping but	Latin of Studyou	•		act.

Narr	Matter .	307
		Th. G.
Marr, (Wange) Cimex stolidus	•	V. 480
Rarrentappe, (Gienmufchel) Chama	Cor	VI. 284
Rarrentappe, (Rlipofleber) Patella u	ngarica	VI. 610
Rarwal, (Einhornfisch) Monodon M	Onoceros	I. 477
Rascher, (Nachtschm.) Phalæna Libat	rix	V. 677
Rasenfisch, (Karpse) Cyprinus Nasus	•	IV. 394
Rafenfrett, Viverra nasuta	_ ,	- V 394
Nasenhorn, Rhinoceros	-	I. 247 I. 469
- Carolinisches, (Rafer) Scar	abæus Ca	409 <b>16</b> -
linus —	_	V. 61
- einborniges, Rhinoceros un	icornis	
- '- Euroraisches, (Rafer) Scars	bæus nafi	cor-
nis •	_	V. 58
- menhorniges, Rhinoceros b	icornis	L 472
Rafentriecher, (Bremse) Oestrus nala	lis	V2. 927
Rasenrumpfer, (Hornfisch) Balistes ri	ngens	III. 30I
Mashornvogel, Buceros Rhinoceros	, <b>-</b>	H. 162
Maffauer, (Mondschnede) Turbo pet	holatus	VI. 242
Nassauwer, (boll) Rassauer	•	VI. 543
Naffe, (engl ) Daubentaucher	<b></b>	II. 341
Nasus, (Cyprinus) Rasenfisch	-	IV. 394
Natarah, (arab ) Scorpion	•	V2. 1088
Natator, (Gyrinus) Schwimmer	•	V. 117
Ratheidechse, Lacerta Teguixin	•	III. 109
Natrix, (Coluber) Ringelnatter	•	HI. 178
Matter, Coluber -		IH. 172
— aschgraue, Coluber cinereus	•	III. 205
- bandirte, Coluber fasciatus	-	III. 170
- barbarische, Coluber Maurus	-	III. 175
— blane, Coluber coerulescens	~	III. 207
— blane, Coluber coeruleus	-	III. 162
- braune, Coluber Sipedon - bunte, Coluber petalarius	•	III. 175
- edige, Coluber angulatus	-	III. 202
— Europaische, Coluber berus		III. 167
- gestedte, Coluber Padera	-	III. 161
— geschlängelte, Coluber Cobella		III. 186
- grave, Coluber canus	•	III. 171
U 2	~	III. 186
		Matter,

ე∨ი	Mention	1,000	55		
				Th.	Ğ,
Matter.	grune, Coluber viridissi	mus	_	mi.	
	himmelblaue, Coluber cy:		2	III.	
	Japonesische, Coluber sei		è	<b>III</b>	
	linirte, Coluber lineatus		-	Ш.	
<u> </u>	Mexikanische, Coluber M	exicant	is	III.	
	punktirte, Coluber punct		۵.	ĬII.	
	Schwedische, Coluber Ch		4	III.	166
	weisse, Coluber albus		7	III.	168
Matter	ial, (Naalschlänge) Angui	s colub	rina	III.	212
Matur.	thierische,	_		VI2.	956
Matursi	piel, (Nachtschm.) Phalær	a ludif	ca		602
Nancu	m, (Bulla) Taubeneh		<b>→</b> ~	٧l.	540
Naunli	a, (Papilio) Brunette		<b>-</b>		616
Naupli	os, (griech.) Schiffsboot		-	AI.	
Nantile	e vitré, (fr.) Kahn		-	VI.	351
	18, Nautilus	•	VI. 35		
<u> </u>	fleiner blauer, (Quallen	boot)	_	VI.	
· 	långlicher	_			359
		lanatus	1		372
 a			2	VI.	353
 نب <u>-</u>		*		VI.	
	us. Rautilus	<b></b>	VI. 35	2i <b>G</b> .	372
<u> </u>	Recearii. Ammonsborn	t .	•	VI.	
	complanatus, platter.	Rautilus	3	€.	372
<u> </u>	crispus, Kornecnautilus	3	<b>=</b>		356
	obliquus, Krummhorn		š		379
<u> </u>	pompilius, Perlennutte	ernautili	18	VI	
<u> </u>		8		VI.	317
	umbilicatus, Rabel		-	VI;	358
Mautih	18, Vapiernautilus, (Shi	ffeboor)		VI.	347
د بت	beffen Verschiedenheiten		VI:	349	-351
Mantil	isschraube, (Mondschnecke	y Turb	o Nau-		
	tilus	-			560
Navel-	Slakken, (holl.) Nabelsch	nittel	•	VI.	571
Navet.	, (fr.) Arakanische Zwirnt	ute	<u> </u>	VI.	369
Neama	ih, (arab) Straußvogel		-		447
Neare	a. (Papilio) Rothring		÷		615
Nebbe	ling, (boll.) eine Art Wal	f	-		39
	· •			Ω	ebek

Nebelfrahe	Nereis	3	9
•			<b>S</b> .
Bebelfrabe, Corvus Cornix		II, 1	
Nebula, Ctachelroche	<del></del> -	III. 2	41
Necydalis, Bastardbock	_	V. 2	92
atra, Schwarzling	7	V. 2	94
brevicarnis, Stumpfhorn	<del></del>	, <b>V.</b> 2	96
coerulea, Blauling	-	V. 2	
flavescens, Gelbling	•	V. 2	
— — glaucescens, Grauling	•	V. 2	
major, Riesenbastard		V. 2	93
minor, Zwergbastard	T	V. 2	
- podagrariæ, Angelifbod	• ,	V. 2	
— rufa, Rothling	-	V. 2	95
- implex, Dunnschenkel		V. 2	96
- umbellatorum, Mignaturl	aftard	V. 20	94
Necydaloides, (Mantis) Surinamer	~	V. 4	19
Nedwed, (bohm.) Bar	, , ,	I. 2	•
Reedhams Beobachtung ber Saament	hierchen	I,	79
Needle fish, (engl.) Blindfisch	•	Ħl. 3	10
Neete-kammetje, (hou.) Spinne	-	VI. 4	94
Neet-Korallyn, (boll) Rifforalline	•	VI2. 8	<del>1</del> 7
Nefasch, (arab.) Nilsalm	•	ĮV. 3	3 L
Neleus, (Papilio) Weißpunkt	-	V. 6	
Relma, (lacheforelle) Salmo Nelma	•	<b>©</b> . 20	) <b>8</b>
Nemalim, (bebr.) Ameisen	• •••••••••	V2. 90	73
Nengeta, (Lanius) Brafilianischer &	ang proping	II. I	1 Î
Nepa, Bafferseorpion	77	V. 4	
— atra, Mohrenscorrion	₹.	V. 4	74
- cinerea, Europäer	•	V. 4	72
- fusca, Rungelschildein	~	V. 47	/2
— — grandis, Gurinamer — — linearis, Nadelscorpion	<del></del> ,	V. 47	/1
	_ =	V. 47	13
— - rubra, Rothader Reptunusdose, (Kammmuschel)	`_	V. 47 VI. 30	/2
Reptunustrebs, Cancer Neptuni		©. 34	/1 13
Reptunusmanchette, Millepora cellule	าโล	VI2. 72	) (
Reptunusmuhe, Madrepora Pileus	~~. —	Vl2. 6	.S
Neptunus - Schaft, (holl.) Giestanne	`.	VI. 62	
Nereis, Seetausendbein	•		75
U 3	•	N.re	
774 - ₹			:40

•	•		
		Th.	₫.
Nereis cirrola, Bartwurm	-	VI.	79
— — coerulea, Blaurucken	-	VI.	31
- gigantea, Holzbohrer	•	VI.	81
- lacustris, Bafferalchen	-	VI.	78
- maculata, Flectructen	-	VI.	81
mollis, Seevielfuß	•	VI.	80
- noctiluca, Seelicht	-	VI.	75
— — Norvegica, Schwarssahn	-	VI.	82
- pelagica, Steinbohrer	•	VI.	80
seticornis, Burstenwurm	-	VI.	80
viridis, Grunrucken	-	VI.	81
Nerita, Schwimmschnecke -	VI. 5	84. 🛎.	380
- albicilla, schwarzbunte Rerite	-	VI.	592
bidens, Zwenjahn	_	VI.	591
cannena, Anotennabel	•	VI.	
cornea, bunne Merite	_	VI.	589
exuvia, Warzennerite	<u> </u>	VI.	
fluviatilis, Flufinerite	<b>-</b> '	VI.	589
glaucina, Dicklipre	•	VI.	
- groffa, gerippte Sprenkelnerite	-	VI.	
lactaria, Milchnerite	<b>—</b> '	œ.	380
lacustris, Sumpfnerite	_	VI.	590
— — littoralis, Strandschwimmer	· / —	VI.	589
peloronta, Puleront	-	VI.	592
— — plicata, Kaltennerite	•	VI.	593
polita, glatte Rerite	-	VI.	592
- pulligera, Junghecker	-	VI.	590
- undata, Wellennerite	-	VI.	594
— — virginea, Blutzahn	• 1	VI.	591
— — viridis, grune Rerite	-	VL.	591
Merite, bunne, Nerita cornea	_	VI.	189
glatte, Nerita polita	_	VI.	192
— — grune, Nerita viridis	. •	VI.	591
raube, Nerita Radula	-	VI.	588
— — schwarzbunte, Nerita albicilla	•	VI.	592
Meritenforalline, Sertularia Neritea		VI2	858
Neritoides, (Turbo) Mondnerite			540
Reritschnirkel, Helix Neritoidea	-		582
•		gre	rben

•	Mervenschild	Neuntod	er 311
			Eb. S.
Rervenschild	, (Meeltafer) Ten	ebrio groffu	•
	pilio) Blakstrich		V. 617
	Musca urticæ	_	V2. 979
	n, (Tagschm.) Pap	ilio Prorfa	V. 617
	Chermes urticæ	•	• V. 523
	r, (Nachtschm.) Pha	læna urticat	
Reffelmurm,	(Nachtschm.) Phal	æna vertical	is V. 733
	Karpfe) Cyprinus :		IV. 396
Nestor, (Pa	apilio) Althater	_	· V. 578
	bou.) Regroue	•	VI. 378
Neucrates.	(Echeneis) Schiffe	ibalter -	- IV. 114
Neucrates,		<u> </u>	IV. 113
Reniorfer.	(Bastardwespe) Spl	ex tropica	V2. 872
Regiorfer, (	Kinf) Fringilla Ta	rin -	- <b>S</b> . 163
Reuiprter,	(Alebermans) Velp	ertilio Bore	alis S. 20
Reunauge,	(Price) Petromyz	on fluviatilis	III. 231
Reunpuntt,	(Sonnentafer) C	occinella no	vem-
	punctata	_	V. 152
Reunftral, (	Seeftern) Afteria	endeca	- 🕳 356
Reuntober,	Carbo, (schwarze I	Rerle) -	- II. 573
Reuntober.	Lanius	- 1	I. 108. C. 71
af	chgrauer, Lanius Sc	negalus	- II. 117
<b>-</b> - 38	engalischer, Lanius	Emeria	- II. 118
blo	mer. Lanius coerul	eus	- 6. 72
B	rasilianischer, Laniu	s Nengeta	II. 111
6	nanscher. Lanius co	llaris	— II. 112
5	riennischer, Lanius	Cajanus	— II. 117
E	madischer, Lanius C	Canadenlis	II. 110
ge	haubter, Lanius cri	status .	- II. 110
ge	lber, Lanius sulpht	iratus -	- II. 116
ge	reifter, Lanius doli	atus '	- II. 116
gr	uner, Lanius virid	is =	· ©. 72
£0	uissanischer, Lanius	Ludovician	us II, 111
En	cionischer, Lanius I	Lucionenlis	ĮĮ, 112
W	ladagasfarischer, L	anius Mada	galca,
	rensis		JL 117
<b>—</b> — M	danillischer, Lanius	Chabert	<b>. ©</b> . 72
ro	ther, Lanius rufus	-	ll. 116
		U 4	Meune

	Tb.	6.
Reuntober, schwarzer, Lanius Anerajen -	<b>S</b> .	74
- schwarzer, Lanius barbarus -	II.	116
weisser, Lanius Albus -	<b>S</b> .	75
zwenfärbiger, Lanius bicolor -	Ġ.	71
Reuntoberlaus, Pediculus infausti -	V2. 1	
Meunzehnpunft, (Sonnentafer) Coccinella nove	:n- `	
decimpunctata -		155
Reungehnpuntt, (Tagiom ) Papilio Encedonia		594
Neuroptera, (Infecta) Jufetten mit aberigen &l	· • •	774
geln -		76t
Neustria, (Phalma) Ringelvogel -		661
Mes, (Nachtschm.) Phalana oporana		725
Mes, (Tagichm), Papilio Levana —	¥.	617
Regeule, (Baffereulchen) Phryganea reticulata	V2.	704
Desflugel (Cifabe) Cicada reticulata -	<b>V</b> 2.	459
Rettingel (Chluntmetre) Tenthredo nallata	Vá.	419 Pag
Regflügel, (Schlupfweipe) Tenthredo naffata Regflügel, (Schlupfweipe) Tenthredo reticulate	, V2.	034
Resforalle, Millepora reticulata	¥775a	834,
- Megpatelle, (Klippfleber) Patella reticulata	VI <sub>2</sub> .	719
Regrolle, (Eute) Conus Clavus -	VI. VI	012
Resiculation Anguis reticulata	117	1/3
Desichnede, (Stachelichnede) Murex reticulari	III.	213
Designiciel, Helix Gualtheriana -	VI.	507
Deffpinbel, (Ctachelfchnede) Murex craticulatus	v 1. c 371	507
Desspinne, Aranea reticulata —	3.7-	720
Negstern, Asteria reticulata	V2.	1071
Megtute, Conus Mercator -	VÎ.	104
Nhanda Guacu, (braf.) Ameritanifther Strauf	VÍ.	372
Nhandu apoa, (int.) Rahltopf -	Ĭ IT	
Nicton, (griech.) Fisch		356
Niedzwiedz, (poln.) Bir	IŲ.	2
Nierenfleck, (Tagschm.) Papilio betulæ -	1.º	277
Nigellastrum, Listenkorosline	V.	
Nightingale, (engl.) Rachtigal	VI2.	
	II.	
Nigricilla, Spanische Bachstelze		608
Nigripes, (Cimex) Schwarzfuß -	۷.	
Nigua, (fpan.) perupianischer Sanbfioh	V2. 1 IV.	
Nigui, (braf.) Brummer =		
	Pil	qui

<b>N</b> iqui	Mordlander.	313
• • •	•	b. Ceite
Niqui, (braf.) Stachelbrache	` <del></del>	`
Milbarich, Perca Nilotica	-	IV. 77 IV. 230
Rileidechse, Lacerta Nilotica	•	ļll. 110
Milgrundel, Gobius Aphya	•	ĮV. 129
Miltarpfe, Cyprinus Nilotiçus	•	ĮV. 388
Milpferd, Hippopothamus	•	I 457.
Rimmerfatt, (Brachvogel) Tan	talus Loculator	II. 389
Nimmerzatt, (boll.) Rimmerfe	aft —	11. 389
Niobe, (Papilio) Bastarosilber	rvogel -	V. 622
Niphe, (Papilio) Chincfische 9	Aymphe -	V. 619
Nireus, (Papilio) Goldband	· •	V. 574
Niso, (Papilio) Zettelpunft	=	V. 632
Riftamm, (Spinne)	₹ '	VI. 495
Rifforalline, Sertularia lendig	era -	VI2. 847.
Nisus, (Falco) Sperber	-	II. 89
Roahsarche, Arca Noz	<del>-</del> , `	VI. 294
Roabsmuschel, (Waschbecken)	•	VI. 286
Roadspatelle, (Klippfleber) Pat	ella Noachina	<b>S</b> . 381,
Noctilio, Ragenfledermans	-	I. 261
Americanus, Ameritani	sche Rakenflederm	aus I. 361
Noctua minor, Zwergeule	_	II. 106
Noctum, (Phalmnm) Gulen ob	ne Saugrußel	V. 679
Nodus, (Murex) Dinobeer	•.	VI. 507.
Noemba, (Javan.) Nashorn	. =	I. 469
Romas, (Rugelfafer) Curculi	o Nomas	<b>€.</b> 230
Nonnata, (genuef.) Grundel	•	IV. 130
Ronne, (Rernbeisser) Loxia No		S. 151
Ronne, (Rachtschm) Phalana	Monacha	V. 665
Ronne, weiffe, (Lauchente) Me	Lans alpelina	II. 306
Nonnette, (ft.) Blaumeise	-	II. 627
Nonnette, (Loxia) Ronne		<b>€</b> . 151
Noordiche Wulk, (hell) nor	orice Chincer	VI. 515.
Nootedop, (hou) Nukschaale	<b>.</b>	VI. 605.
Nootekraaker, (holl) Rußha Noote-Moskaat, (holl) Rußh	yti —	II. 177
Rordfaper, (Walfich)	nituunii.	VI. 466
Rordflaffer, (Rigffmuschel) My	a arflica	Vi. 224
Rordlander, (Hürfer) Empis I		V2. 594
Accessioners ( And les) rubis r	Ü.	Biord
	<b>5</b> 4	<b>7</b> /1/1/17

	Th.	6.
Nordschlupfer, (Schlupfwespe) Tenthredo septe	n-	•
trionalis	V2.	832
Norrquint, (schwed.) Bergfink -	II.	581
Nors, (schwed.) Meerstint	IV.	331
Rorweger, (Rrebs) Cancer Norvegicus	V2.	
Notenecta, Wasserwanze - V. 468		
atomaria, Zwergin -		275
- glauca, Rudenschwimmer -		468
- Indica, Indianerin -		275
minutissima, Wänzlein		469
ftriata, Querwelle -		469
Rotenschnecke, (Balge) Voluta Mulica	VI.	
Notkraka, (ichweb.) Rugbaber -		177
	V2. 1	
Notopeda, (griech.) Springkafer -		315
Nottols, (ital.) Fledermaus -		150
Novacula, (Coryphæna) Messerruden	IV.	
Noya, (ceplon.) Brillenschlange	III.	
Noyra, Nuira, Aurorpartit		14I 177
Nucifrago, Rughaber -	VI.	
Nucleus, (Arca) Pfeffernüßchen	VI.	
Nucleus, (Cyprea) Reiffornerporzellane	IV.	
Nugnogen, (heiligl.) Schlangenfische		678
Mul Mul, (Machtichin.) Phalmana O o	IV.	
Num-Eel, (engl) Zitteraal Numida, Perlhuhn - II. 476.	<b>E</b>	126
- coronata, Rronenperlhuhn	Š	126
- cristata, Daubenperlhuhn -		126
- Meleagris, Perlhubn - II. 476.		
Rummerrapillon, (Scheckflugel) -		611
Nun. (engl.) Blaumeise —	II.	627
Nuffatella, (Conus) granulirter Bottgerbobrer	VI.	378
Rugbeiffer, (Baftardrugeltafer) Attelabus avel-		-
lanæ		244
Ruftbaber, Corvus Caryocataetes -		177
Ruffdfer, (Rufeltafer) Curculio nucum		232
Ruffchale, (Klippfleber) Patella porcellana	VI.	-
Nutbreaker, (engl.) Rußhäher —		177
	Nut	ris.

Nutria <sup>/</sup>	Ochsenaug	je 315
		₹5. <b>E</b> .
Nutria, (fpan.) Blufotter		I. 262
Ruge der Fische	<u> </u>	IV. 18
Rupe ber Thiere		l. 21
Nycteris, (griech.) Flederman	<b>.</b>	- I. 150
Nicticorax, (griech.) Rachtra	ibe —	· II. 636
Nympha, Infektenpuppe	•	V. 13
Nymphales gemmati, (Papili	ones) Romph	en neit
augigen und geze	abnelten Ktuge	In V. 600
Nymphales phalerati, (Papil		
gabnelten, auch	edigen Alugel	n obne
Augen	-	V. 608
Rymphe, amerifanische, (Tagic	hm.) Papilio	Lene V. 618
Chinefische, Papilio N		- V. 619
- Defterreichifche, Papil		- V. 619
Mnniphe, (Baffertafer) Dytilo	eus Iuridus	V. 347
Romphen mit augigen und	getabnelten A	lňoch.
( Tagfchmetterlin		
gemmati		- V. 600
Rymphen mit gegahnelten ober ohne Augen, (2		flügeln
les phalerati	_	V, 608
	<b>).</b>	
D, (Tagiom.) Papilio Feroni	io.	- V. 602
Dberadmiral -		VI. 370
Oblate, (Arche) Arca numer:	rie .	VI. 299
Oblate, (Zimmetwaffel)		VI. 299 VI. 408
Oblatenflügel, (Nachfichm) P	halæna retuß	Vr. 408
Obrinus, (Papilio) Bandflug	701	
Obstmotte, (Rachtschm.) Phal	mna nadella	• V. 596
Obnmans, Mus Barabensis	www barretta	V. 737
Oca, (ital.) Meme		€. 44
Ocha, (ital.) Gans	_	II, 344
Ochiatella, (ital.) Krampffijd	<b>.</b> .	II. 283
Dose, Bos —		III. 237 I. 431. <b>E.</b> 57
— milber, Bos Bonasus		
Dchsenauge, (Rohlmeise)		I. 437 II. 626
~- Misuande (mobiustie)	_	Ochsena

· .	Th.	6.
Pofenauge, (Sonirtelfonede) Helix ampullaces		569
Ochsenbreme, Tabanus bovinus -	V2.	
Ochsenbremse, Oestrus bovis -	V2.	
Dofendarm, (Robrenfcnede) Serpula grenaria	VI.	
Dofenefel, Jumarra -		455
Ochsengagelle, (hteschood) Antilope bubalis	७.	54
Dofenhader, Buphaga -	•	164
	VI2·	,
Defentopfe, (gebornte Sturmbauben) -	VI.	
Ochsenlaus, Pediculus bovis -	V2. 1	
Ochsentober, (Duce) Culex Lanjo -	€.	
Ochsenzungenhahneben, Chrysomela exsoleta	V.	
Ocrophus, (Tringa) punttirter Strandlaufer	Ц.	410
Oculus Capri, (Helix) Schellenfchurtel	VĮ.	
Odeboer, (nieberfachs.) Starch -	Įſ.	375
Odeniwale, (fcmet.) fcmarger Storch	ĬŢ.	
Odites, (Papilio) Gurinamischer Beigling	G.	
Dechslein, (Rafer) Scarabæus Taurus -	V.	65
Oedipus, (Simia) Lowenaffe	Į.	133
Debrlein, (Meerobr) Haliotis parva -	VI.	600
Oeil de bouc, (fr.) Klipptleber	VI.	
Oeil de paon, (fr.) Pfauenauge	V.	
Delander, (Raubfliege) Asilus Oelandicus V	72. 10	
Delbs, (schweiz) Schwan -	II.	276
Delfuchen, gerippter, (Stachelfcnede) Muren		
Olearium -	VI.	
- Inotiger, Murex Lampas	VĮ.	501
	VĮ.	
Oenanthe, (Motacilla) Beifschwanz -	II.	
	<b>608.</b>	
Oenas, (Columba), Relotanbe	II.	
Oenone, (Papilio) Rleinauge	V. (	
Oernmask, (schwed) Ohrwurm	<b>Y</b> .	
Deftereicher, (Stintfafer) Buprestis Austriaca	<b>V.</b>	
	VI.	114
Oestervanger, (boll.) Austersticher -	II.	
	2. 1	
Qestrus, Bremfe . V2. 925.		
	Oelp	. uz

<b>V</b> estrus	Ombre	317
		Th. S.
Oestrus Antilopum, Antilopen	bohret -	. 333
bovis, Ochsenbremse	<b>÷</b>	V2. 926
hæmorrhoidalis, After	friecher 🗼	V2. 927
nasalis, Rafentriecher	<b>2</b>	V2. 927
— - ovis, Stirngrübler	-	V2. 927
Tarandi, Rennthierhot	rniffe 2	V2. 927
Dhr, (Citade) Cicada aurita	<b>à</b>	V 454
Obrauge, (Frosch) Rana ocell		III. 62
Ohrentafer, Scarabæus Cepha	lotes -	S. 214
Ohrloffelchen, (Mondschnede)	Turbo Aurifcalpo	:]-
lum	• `	VI. 559
Obrqualle, Medusa aurita	<u>.</u>	VI. 125
Ohrschneiten, haarige Ohren, (	Grimaffen)	VI. '506
Ohrvogel, (Kropfgans)		II. 324
Ohrwürmer, Forficulæ	- Vi 39	5. <b>S</b> . 26 <b>2</b>
große, Forficulæ	uriculariæ	V: 396
fleine, Forficulæ n	ninores -	V. 398
Oileus, (Papilio) Beiglinie	-	V. 632
Ois, (griech.) Schaaf Difeau, (fr.) Bbgeichen	•	1. 421
Oileau, (fr.) Bogelchen	÷ • • •	VI. 339
Oiseau mouche, (fr.) Fliegen	colibre -	II. 271
Oldwife, (engl ) Altweib; (7)	ornfisco) —	III. 30ò
Oldwife, (engl.) Altweib, (M	eerschleie)	IV. 207
Dleandervogel, (Pfeilschwang)	Sphinx Nerii	V. 636
Olearium, (Murex) geripptet		VI. 502
Oliekoken, (boll.) fnotiger De	elfuchen en	VI. 501
Oligactis, Armvolppe	. <b>-                                   </b>	VI2. 884
Olive, (Walze) Voluta Oliva	- <b></b> -	VI. 419
Olivenammer, Emberiza olivac	:62 —	II. 563
Dlivendroffel, Turdus olivacet		II. 53t
Olivenkeen, (Walze) Voluta re	litica -	VI. 425
Olives de vase, (fr.) Dlive		VI. 419
Olla, (Voluta) Topf	<b>~</b>	VI. 446
Olor, Schwan		II. 276
Olyphants - tanden, (holl.) El		VI. 618
Olyphant-torretjes, (boll-)		V. 216
Ombervisschen, (host.) Umber	epicoe •	IV. 217
Ombre de Lune, (fr.) Mond	icpatter -	IV. 219
		Ombre

	Th. G.
Ombre de mer, (fr.) Meerschatten -	IV. 219
omwonden Pennen, (boll.) ummunbene Rabeln	Vl. 472
Onager, (Equus) wilber Efel, Balbefel	L 454
Onca, (Felis) Panther -	L 238
Oneganli, (iroquoif) Klapperschlange -	III. 133
Ongedierte, (boll.) Ungeziefer -	V. t
Oniscus, gemeiner Stor	1II. 287
Oniscus, Kellerwurm - V2. 1140	6 S. 349
- aquaticus, Wafferaffel .	V2. 1151
- affimilis, Strandaffel -	V2. 1152
- bicaudatus, Doppelschwang -	V2. 1150
— — Caspius, Caspischer Assel —	<b>S</b> . 350
— Ceti, Walfischassel —	V2. 1150
- crenulatus, Rerbenassel -	<b>E.</b> 349
— — linearis, Schmalwurm -	V2. 1151
- marinus, Geelaus -	V2. 1160
- oceanicus, Geeaffel -	V2. 1151
ruderalis, Mauerassel -	<b>S</b> . 349
- Copularum, Klippenwurm -	V2. 1151
Onir, blauer, (Porzellane) Cyprea Onyx	VI. 396
Onirtuten, (Schildfrotentuten) -	VI. 374
Onderatulus, Pelefan, Kropfgans -	II. 323
Onos, (ariech.) Esel -	L 453
Onos, (griech.) Schelfisch - I	V. 79. 94
Onrust, (boll.) Widder, (welcher Politater)	. V. 290
Onrusten, (holl.) Pfeilschwänze -	V. 634
Onyk, (Cyprea) blauer Dult -	VI. 396
Onyx marina, Krausschnecke -	VI. 498
Oo, (Phalmaa) Rul Rul -	V. 678
Oorhoorens, (holl) Grimassen -	VL 106
Oorkruiper, Oorworm, (holl.) großer Ohrmun	m V. 397
Oorlepeltje, (holl.) Ohrloffelchen -	VI 550
Oorstelp, (holl.) Wilchschaale -	VI. 🕬
Opana, (amerif.) Baumente	IL 302
Opastum, Beutelraße	1, 228
Ophlazer. (holl.) Blafer - III	312. \$14
apperolde Bezaantje, (boll.) aufgewideltes &	ier .
faansseegel -	V L. 459
	Opher,

<b>Opher</b>	Organismus	319
-		₹h. €.
Opher, (hebr ) hirschfalb,	Dambirsch I	. 390. 399
Ophidion, (Syngnathus) &		Ill. 343
Ophidium, Schlangenfisch	•	IV. 58
barbatum, Bartm	ánchen -	IV. 58
imberbe, Kahlbar	t -	IV. 59
Ophiomachos, (griech ) Sp		III. 93
Ophiorhiza, Schlangenfrau	<b>-</b>	III. 18¢
Ophis, (griech.) Schlange	- ` III	122. 153
Ophis, (Muræna) Seeferpe	ent -	IV. 35
Ophrias, (Boa) Bergichlang		III. 150
Opilio, (Phalangium) 28ebe		V2. 1060
Opsarion, Opson, (griech.)		IV. 2
Opuntia, (Corollina) Feige		VI2. 825
Ora, Oraco, (ital.) Goldbro		IV. 177
Drangenadmiral, (Tute) Cor	nus Araunacus	VL 379
Orangenfahne, (Tagschm.) P Oraniemantel, (Reisemantel)	apaio Cieopatra	V. 594
Oranje. Pennen, (boll) Bif	danfamiten	VI. 310
Oranier, (Fliegenfanger) Mi	Meicana azongosa Ileicana azongosa	VI. 431
Oranjes, (holl.) Rollenmach		<b>E.</b> 171
Oranje-Spons, (holl.) Stee		©. 242
Oranje-Spons, (boll.) Po	atujojivanin Meronienfilija ISI	VI2. 804
Orbiculus, (Echinus) Seefe	Beibe -	VI. 156
Orca, (Delphinus) Butfisch		o6, S. 61
Orbensband, (Tagfchm.) Par		V. 612
Dronung, Briffons, ber Thie		1. 52
Ordnung ber Geifter	•	III. 46
Ordnung der zwepten Rlaffe b		II. 35
Ordnung, Linneische, der Thi	ere in Rlaffen	I. 54
Ordnungen der Infefren	•	V. 22
Orebh, (bebr.) Rabe	•	II. 168
Oreille, (fr.) Grimasse	•	VI. 506
Oreille d'ane, (fr.) Fechter	<b>-</b>	VI. 480
Oreille de cochon, (fr.) Da	bnenkanun	VI. 329
Oreille de mer, (fr.) Reero	<b>φτ</b> •	VI. 594
Orfus, (Cyprinus) Urf		IV. 393
Organie, (genuef.) Meerleit Organismus, mas er ift	•	IV. 273
Suntaminal tang et elt	•	VI2. 943
		Organo,

		•
and the second of the second	Th.	G.
Organo, (ttal.) Meerleuchte	IV.	
	VI2.	
Orgelpfeifendublet, (Rinnendublet)	VI.	
Orgelftein, (Sternforalle) Madrepora muficalis	VI2.	
Orico-Cachero, (port.) Igel -		304
Orignav, (canad.) Elenethier	I.	389
Oriola, (ital.) Golddrossel	II.	
Oriolus, Dirossel - II. 189		
— — aureus, Ostindianisthe Golddrossel		191
- Cajanensis, Gelbflügel -		190
- Capensis, Caapsche Drossel -		190
- Chinensis, Chinesische Droffel -		186
- Chrysocephalus, Ameritanische Golddroffel		19¢
- citrius, Eitronfarbige Droffel -	Ċ.	87
← — cucullatus, Kappendroffel —	G.	87
Dominicensis, S. Domingische Drossel	II.	190
— — Guianenlis, Guajanische Drossel	11.	188
— — hæmorrhous, Blutschwanz	H.	187
- icterocephalus, Gelbfopf -	II.	190
- ilterus, Schwarzforf -	II.	187
- melancholicus, migfarbige Droffel	11.	190
- melanocephalus, Brauntopf -	II.	
- Mexicanus, gelbe Droffel	11.	189
- Mexicanus, Merikanische Droffel.		188
- Persicus, Ameritanische Droffel		188
- Phoeniceus, Purpurdrossel -		187
Spurius, Baftarddroffel -		189
- tricolor, drenfarbige Droffel -	७.	87
- viridis, grune Droffel -	G.	87
Drion, (Tagschm.) Papilio Orion -	6.	297
Orithya, (Papilio) bunter Pfau -	v.	60 L
Orix, (Emberiza) Afritanischer Ammet		564
Orix, (Loxia) Grenadier	Ċ.	148
Orlamje, (boll.) Fischtbeiberhaube -	Vl.	
Orlax, (schwed.) Lachsforelle	IV.	
Ormslao, (fcmeb.) Blindschleiche, (Malfchlange)	III.	218
Ornatrix, (Phalæna) Festfleid -		685
Orontes, (Papilio) Weißschwang 2		574
		-01

Orosp	i <b>za</b> Ost	racion	321
All Vision			Th. G.
Orospiza, (griech.)		The state of	H. 581
Oroyendula, (span.)		1 To 1	11. 186
Orpheus, (Turdus)		· Sup I's	II. 533
Orphus, (Sparus) &	hothtopf	4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4 (4	IV. 183
Orfo, (ital. und span	.) Bar	The Gira	1. 277
Orthocrea, (Nautili	is) Bildhofestal		VI. 361
Ortolan, (Ummer) F.	mberiza hortu	ana	II. 562
Ortolan, (fr.) Ortol			II. 562
Ortolan de neige, (f	r.) Schneeanm	ler	II. 560
Ortolan, (Reigbieb)	6 × MA . 6 . 6	· 1 572 1	II. 567
Ortygometra, (griec	9.) Wachtelmui	ter -	II. 435
Ortyx, (griech) Ba Oruga, (fpan.) Raux	e e	150	II. 492
Orvert, fr.) Blinds	delaidia Mallati	-	Y 544
Oryx, (Antilope) &	uniciane, antiqui	ange	111. 218
Oryx, Johnstons. E	louhthian	-	G. 55
Os. (holl.) Ochs	-		₽ 389
Os, (holl.) Ochs Os Sepiæ, Meerschat	m. (Sifchhein)	- 41(-1)	371 431
Ofmeri, Stinte mit ge	aeneinandersteh	enden Shicken	110
und Af	terflossen .	Silver Deader	IV - 702
Ofmerus, Lache			IV 200
eperlanus, s	Meerstint	-	IV 202
faurus, Gee	eidechfe	Star	187 220
Offe-Koppen, (holl)	gebornte Ctui	mbauben	VI 140
Offenhoorn-korallyt	1, (boll.) Kreb	8 scheerentoral	1
line	-		VI2. 853
Offe-oogen, (holl.)	Dchfenaugen	A	VI 560
Ostarde, Ostardeau,	(fr.) Dickfuß, (	Regenpfeif.)	II. 420
Ofteren, (Bergmuschel	) Cardium læ	vigatum	VI, 251
Osterium echinatum,	gezactte fazaru	stlappe	VI 281
Oftindianer, (Raderla	nd) Blatta orie	ntalis	V. 404
Oftindianer, (Tagschn	.) Papilio Den	nophile	V. 589
Oftracion, Beinfisch		-	III. 303
	Proceschwanz	- 12/12	III. 307
- cornutus,		-	III. 309
- cubitus, To		-	III. 311
gibbosus, @			III. 310
- quadricorni		_	III. 308
A HAVE TO SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVICE AND A SERVIC	X		Ostra-

972	Old deloi.	~			
. `	•		,	<b>Th.</b>	€.
Oftracio	on tricornis, Drebbo	ru	_	III.	
	trigonus, Dreneck	نب	,	111.	
<u>ئ</u> ــ ـــــــ	triqueter, Biegeleife	eri		III.	304
<u>.                                    </u>	tuberculatus, Roffer	:fild)		111.	310
Oftraco	delmata, Seefterne	· -	<u>:</u>	VI.	129
Oftraco	rderma, (griech.) Co	onchilien		VI.	158
Oftrea,	Rammuschel		VI. 300		
	diluviana, <b>K</b> ammauste	ŧ,	-		313
	dulis, gemeine Aufter		-		314
<u> f</u>	asciata, Eisbublet		<u>**</u>		311
f	lavicans, Goldborse		-	V.).	311
5	gibba, Moamadublet		<u> </u>	Ŋ١.	310
ء ـــ ـــ	clabra, glatter Mante		<u></u>	VI.	310
4-1	lacobæa, Jakobiterini	ıfdfel	<u> </u>		303
, 1	naxima, Pilgrimemu	jchel –	ا المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظ	٧l.	302
<u>ت</u> ـــ ـــ ١	ninuta, Ddkchen		-	VI	304
r	iodola, Korallenduble	t	-	Vi.	3C7
<u></u> (	obliterata, Gonnenze	iger		VI.	308
(	percularis, Reisemai	ıtel		ΥI.	310
	orbicularis, Scheiben	austet		VI.	313
	pellucens, Sommern	iantel	<u>.</u>	Vi	308
1	languinea, Blutmante	l	•	VI.	309
<u> </u>	semiaurita, Halbohr	4	_	VI.	314
<u> </u>	triatula, Schminfdos	e	<del></del>	VI.	304
· 7	varia, bunter Mantel		<del></del>	V1.	309
Oftreut	m sylvestre, Blatterko	ınım			329
Oftridg	ge, Oftrich, (engl.)	Stranknog	CI		447
Dft. W	est, (Lagschm.) Papili	o Phoetula			613
Otarde	, Outarde, Ostarde,	, (fr ) Ere	ippgan <b>s</b>		441
Otis,	Erappgans		. •		441
- Afi	ra, Aechiopische Trapp	H	<b></b>		441
بد Ar	abs, Acabilche Ecappe				444
- tar	da. Trapre		•		441
Deter,	(Matter) Coluber Af	pis			168
Otterfu	k, (Kammuschel) Utti	ea pes iui	.135	VI <sub>2</sub>	368
Actorto	ratina Sertularia ani	guina	-	V 12	8-3
Otternf	Spfchen, (Rameelhais)	Kabuigis	Ohmo.	Ve	804
	fpis	-			007 (US)
				•	ノルンフ

Ottis	Oysters	323
125 - 127 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 - 128 -	·,	Th S.
Otus, Rumibifche Jungfer, (Meiber)	<b>)</b>	II. 371
Otus, (Strix) fleine Horneule	2	II. 98
Quaikare, (amerif) Faulthier	<u> </u>	I. 178
Quari, (amerit.) Anteifenbar	2	I, 181
Oud - wyf, (boll) Altweib, (Sornfi	i(d)	III. 300
Oudemans - duimen, (bott.) Man		VI2. 779
Oule, (engl.) Schuhu	•	II. 02
Durang. Dutang, (Nachtmensch) Ho	mo nocturnu	s I. 109
Ouria, (griech) Seetaube	1 -	II. 312
Ourissia, (Trochilus) Blaubauch	<u>~</u>	II. 268
Ourizo, (port.) Igel	16.	I. 304
Ouroura, (guajan.) Menfchenfreffet	17	1'. 56
Ours, (fr.) Bar		I. 277
Ourlin, (fr.) Ceeapfel	-	VI. 144
Outin, (flandr.) Sauting	<u></u>	IV. 327
Oveia, (span.) Schaaf	1	1. 421
Ovisi Schaaf	•	1. 421
- fera, Kameelparber	_	i. 379
- Guineensis, Guineisches Schaaf	· . <u>~</u> .	1. 428
- Peruana, Peruvianisches Schaaf	ftameel .	I. 372
- fylvestris, wildes Schaaf	<u>-</u>	1. 422
Ovum, (Bulla) En		VI. 404
Owca, (roin.) Schaaf	2	I. 422
Ox, (engl) Das	<u>*</u>	I. 43g
Ox-èye, (engl.) Kohlmeise	2	11, 628
Ox-eyed Cackrell, (engl.) Großau	ige -	IV. 18
Oxyrinchus, gemeiner Stor		III. 287
Oxyrinchus, (Raja) Spigmaul	1 4.1	III. 242
Oxyrinchus, (Salmo) Dauting		IV. 327
Oye, (fr.) Gans -	, ,	II. 283
Oyevaar, (holl.) Storth	2	11. 375
Oyl-Beetle, (engl.) Zwitterkafer	<b>=</b> .	V. 379
Oylon, (fr.) junge Gans	-	II. 283
Oysters, (engl.) Austern	<b>=</b> \(\sigma\)	VI. 314

324	₹ <b>y</b>	ragoous		
-	-		Th.	Ġ,
	ท่		- 4.	•
20.	47.		<u>.</u>	
Paalin	g, (hou.) Aaal	÷		39
Paalw	orm, (holl) Holzbohrer	•		631
Paapje	, (holl.) Braunkehlchen	<b>-</b>		609
Paard	e-Schaft, (boll.) Relfenne			88
Paard	e - Voetje, (holl.) Pferdefu	B -	. ¥VI.	287
Paarle	moer-Hoorn, Paarlemoer	Nautilus, (600	• •	
	Perlenmutternautti	118 -	, V =-	353
Paarle	emoer-Schulp, (holl.) Per	lenmuschel		332
Paarl.	Oefter, (boll ) Perlenniut	ter —		332
Paarfo	he Telline, (hva.) Stump	fende -		238
Paauw	v, (hou.) Pfau	<b>-</b>		457
Paauw	v-Staart, (holl) Breitschn	rans, (Taube)		50E
Paauw	7-Vissch, (holl.) Meerpfo	ui -	IV.	
Raca,	(Camelus) Chilisches Scho	aaftameel		372
	(Mus) Raninchenmaus	•		341
	ian, (Sanproche)	•		250
Pad.	(boll ) gemeine Krote	<u>.</u>	III.	51
Padda	, (schwed.) gemeine Krote	•.,	III.	ŞI
Padde	- Haay, (holl.) Meerengel	<b>-</b>	III.	257
Padde	-Hooft, (boll.) Donnerfri	ote -	١٧.	137
Padde	n, Paddetjes, Paddehoor	ensi (holli) Ki	ر روان	
	tenfcnecten	-	VI.	
Pader	a, (Coluber) geflecte Ratt	et – (	III.	186
Pagala	a, (ind.) Kropfgans	- II	. 325.	355
Dage,	brauner, (Lagichm ) Papi	lio Phidippus		577
_ g	roßer, Papilio Hector	•	٧٠	<b>566</b>
- gr	uner, Papilio Paris	-	$V_{4}$	566
- fl	einer, Papilio Phoreas	, 4 -	e.	281
<b>—</b> @	surinamischer, Papilio Leil	ius -		575
Page c	le la Reine, (fr.) Königiun	ienpage -		575
Pagel,	(fr.) Rothschuppe	. •	İV.	
Pagge	detten, (holl.) türfische To	nube —		502
Pagod	e, (holl.) Chinesisches Dac	<b>b</b> .—	VI	
	e, (Mondschnecke) Turbo	<b>Pagodus</b>	VI.	
	e, (fr.) Pagodenschnecke	•	VI.	
Pagod	us, (Turbo) Pagode	•	VI.	
			Pa	Zns.

Paguacaguara	<b>Pampus</b>		345
<b>7.90.00.9</b>			
			G.
Paguacaguara, (braf.) Gabelfchmang			174
Paille en cul, Paille en queue, (fr.)	pregenor	t ,,	
Phaëton	•		335
Pailleta, (savoj) Iltis	-	i.	269
Paisse, (fr ) Sperling		11.	592
Pakhaay, (holl.) Meerengel		111.	257
Pal, (marfeil ) Meerfau	_	111.	260
Pala, Genfer Weißgangfifc	•	ŀV.	326
Palamon, (Tanschm.) Papilio Palæmo	n	Θ.	299
Palæno, (Papilio) Gilberruntt		V.	593
Palamedea, Brafilianischer Kranich	-	11.	364
cornuta, Horntrager	•	II.	364
— — cristata, Bastardfranic		II.	365
Palamedegvogel, (Kraniche)		II.	<b>372</b>
Palatinaffe, Simia Roloway	•-	G.	10
Pale, (norm.) gruner Schelfisch		IV.	
Pale, Palette, (fr.) weiffer Loffler	-	II.	36E
Palet-Spons, (boll.) Webelschwamm	-	VI2.	793
Pallas, (Tagschm.) Papilio Archiades	•	G.	297
Pallium, (Oftrea) Konigemantel	•	VI.	306
Palltaska, (fcmeb.) gemeiner Safchenti	ebs '	V2. 1	108
Balmbobrer, (Rugelfafer) Curculio pa		V.	
Palmoroffel, (Rrammetsvogel) Turdus		n II.	535
Palmi juncus anguinus, Sceftrit		VI2.	
Palmier marin, (fr.) Sternftamm		VI2.	
Palmipedes, Lappenfuße	•		273
Palmines, (Lepas) Plattfuß	•	G.	358
Palmipes, (Sphex) Fingerfuß	-	V2.	870
Palmista, (Turdus) Palmvogel	•	S.	143
Palmvogel, (Krametevogel) Turdus Pa	lmista	Ø.	143
Palmweidenbohrer, (Gallapfelmurm) C	ynips fali		_
cis capress	•	V2.	816
Palmwelbenschild, (Schildlaus) Çoccus	capreæ	V.	
Paloma, (span.) Taube -	•	II.	
Palumbus, (Columba) Ringtaube		II.	
Pamnon, (Papilio) Rammerdiener	-	V.	
Pamphilus, (Papilio) heupapillon	•	V.	
Pampus, einfarbiger Breitfich	•	IV.	
X 2			ım-

•	Th.	Ģ.
Panamadattel, (turfifches Lager)	VI.	
Pandorus, (Papilio) Stebenauge -		574
Panggoeling, (oftind.) Schuppthier -	Į,	185
Panope, (Papilio) Flectleinssoum -	V.	616
Panorpa, Scorrionfliege	V2.	802
- Coa, Levantiner -	V2.	804
communis, Scheerenschwang -	V2.	801
- Germanica, deutsche Scorpionfliege	V2.	
- hyemalis, Thuringer -	V2.	
Pantalena, (venet ) Rlippfleber -	VI.	
Panterling, (Rachtschm.) Phalæna pantarina		709
Panther, (Rliege) Mufca Pantherina -	V2.	
Panther, (Rahe) Felis Onca -	I,	238
- fleiner, Felis Uncia -		29
Panther, (Comentafer) Coccinella Pantherina	<b>V.</b>	162
Pantherfliege, (Stinffliege) Hemerobius specioly	s V2.	
Panthous, (Papilio) Reifficcf -		571
Pantoffel, (Rlippfleber) Patella fornicata	·VI.	
Pantostelmuschel, (Bastarb) Anomia Sandalium	Œ.	
Pantoffeltje, (boll) Pantoffel -	Ųί.	
Pantouslier, (fr.) Hammerfisch -	III.	
Pangerfisch, Loricaria	IV.	307
Pangerbahn, (Sechahn) Trigla cataphracta	IV.	272
Pangerforalline, Sertulgria loriqulata	VI2.	855
Pangermele, Silurus cataphractus .	ĮV.	
Paon, (fr.) Pfau	II.	457
Paon de jour, (fr ) Pfanenauge -	V.	600
Paon de mer, (fr.) Rampfhahn -	Įſ.	404
Paoncello, (ital.) Riebig -	Ųl.	405
Papa, (Loxia) Pabst -		152
Papa, (Vultur) Rabibale -		54
Papa piexe, (port ) Brafilianifcher Saubeneisvog	el IL	241
Papagallo, (rom ) Mecerfau -	ĮV.	200
Papagen, Phittacus - Il. 1:	21. S	. 73
— 2 Amazonischer, Psittacus nobilis	,	129
- Umbeinesischer, Plittacus Amboinensis		131
Amerikanischer, Plittacus autumnalis	ĮI.	146
	91	are

yapagen	<b>P</b> apilio	327
	-	£6. €.
Papagen, Brafilianifcher, Plittacus	Brafilienfis	II. 146
brauner, Pfittacus fuscus	•	S. 78
brauner, Pfittaçus obscuru	s -	II. 128
- bunter, Plittacus versicolor	<del>-</del>	<b>◎.</b> 78
- gelber, Psittacus Paradisi	•	II. 145
- grauer, Plittacus fordidus	•	II. 148
- gruner Brafilianischer, Plitt		
Guineischer, Psittacus Eryth		II. 140
Japanischer, Pfittacus Jape	enicu <b>s</b>	II. 131
limitter, Psittacus lineatus	_	<b>€.</b> 73
Philippinischer, Psittacus Li	ucionenfis	II. 144
- fchediger, Pfittacus pectora	lis / -	<b>€.</b> 78
- Ichwarzer, Plittacus niger	•	II. 143
Senegalischer, Psittacus Ser	regalus	II. 149
Suringnuscher, Psittaeus Ar	mazonicus	II. 145
Papagenammer, Emberiza psittaca	₩.	11. 568
Papagenennatter, Coluber sirtalis	,	III. 188
Papagenenschnabel, (das alte Weib,	Hoculian)	III. 300
Papagenenschnabel, (Terebratul)		VI. 324
Papagenenvogel, (Pfeilschwanz) Spl	ninx Caricæ	V. 638
Papagenfisch, (Stukkopk) Coripho		
Papageptaucher, Alca	H. 308	
Papechieu, (fr.) Riebig		11. 406
Papageye-Bekken, (boll) Schupp	senialnoteoren	III. 18
Papera, (ital) junge Sans	-	II. 282
Paphia, (Rapitio) Gilberstrich Papier, gerolltes, (Zimmetwaffel)	₹.	V. 639 Vl. 408
Papiertocher, Tubularia papyracea	<b>-</b>	VI. 408 VI2, 821
Papiernautilus, (Schiffsboot) Argo	naute Argo	
Papier-Nautilussen, (hoss) Schife	Mauca Migo	VI. 347
Papierrinde, Flustra papyracea	-	¥l2. 812
Papilto, Tagvogel, (Schmetterling)	V. 555. 56	
— Anacardii, Anacardienweißlii	16 ~	V. 587
Aonis, Bolfenefau	·a ·	V. 600
— — Aonis, Wolfenefau — — arcanius, Roffflügel	-	V. 627
- affimitis, Ctaatelivree	-	V. 616
- Betulæ, Rierenfleck		V. 623
- Bixæ, Milchbinde	-	V. 631
X 4	-	Papilie.
		4

		<b>Sh.</b> (	5.
Papilio Boeticus, Afterauge	-	V. 6	24
- Brafficæ, gemeiner Robiweifling	•	V. 5	88
- Cardamines, Rregweißling	•	V. 5	90
cardui, Distelnymphe	_	V. 6	06
caricæ, Augensaum	•	V. 6	27
- Caffie, Caffienpapillon	-	V. s	97
- cercus, Bielrunkt		V. 6	33
eratægi, beutscher Beifling	-	V. 5	
distimilis, Montirung	• , `	V. 6	
- glaucus, Wolfenritter	•	V. 5	
hyperbius, Zwentern		V. 5	
Jatrophæ, Blagftugel	•	P. 6	10
- Malvæ, Malvenrapillon	•	V. 6	32
- napi, Langrubenweißling	•	V. 5	88
niavius, Aberstrich	٠ 🕳	V. 5	
obrinus, Bandflugel	-	V. 5	
philomelus, Nachtigalenpavillon	1	V. 5	
- Pinthæus, fchwarz und weiffer 9	unbflügel	V. 5	
populi, Pappelnymphe		V. 6	08
- pruni, Punktband	-	V. 6	
- plidii, Cujavafchmetterling	` •	V. 5	_
quercus, Blauschwanz	•	V. 6	
rapæ, Rubenweißling	-	V. 5	88
rhamni, Citronpariston	-	V. 5	
- ricini, Wunderpapillon	-	V. 5	
rubi, himbeervogel	-	V. 6	26
Senæ, Gilberfleck	-	V. 5	93
fimilis, Uniform	-	V. 6	15
finapis, Senfweißling		V. 5	88
— — Sophoræ, Cophorapapillon	-	V. 5	
- urticæ, fleine Aurelia	•	V. 6	09
- vanillæ, Banillenvogel		V. 6	22
virgaurem, Feuerparillon	-	V. 6	29
papillon, Gibirifcher, (Lagidm.) Papi	ilio Janthe	<b>6</b> . 2	92
Papillons, (fr.) Schmetterlinge	-	V. 5	55
Papilloneflugel, (Guineische Tute)	•	VI. 3	
Papio, Pavian -	•	Į. i	
Papegaais Beck, (boll.) Terebratul	-	V!. 3	14
		Papp	χŀ

Pappelnager Pareas	329
	Th. S.
Pappelnager, (Rüßelkäf.) Curculio populi	V. 226
Parpelubock, (Bocktafer) Cerambyx populeu	s V. 273
Pappelneitade, Cicada populi —	V. 460
Pap: elufreffer, (Goldhahnchen) Chrylomela poj	ouli V. 173
Pappelnlaus, Aphis populi	V. 518
Pappelnmotte, (Nachtschm ) Phalæna cinctella	V. 744
Pappelnnymphe, (Tagschm.) Papilio populi	V. 608
Pappeluschleicher, (Schlupfwespe) Tenthredo	DO-
puli 🗕	V2. 833
Paprelufteider, (Bange) Cimex populi	V. 503
Paprelnvogel, (Nachtschm.) Phalæna populi	V. 660
Parft, (Kernbeisser) Loxia Papa -	E. 152
Parstfrone, (Walze) Voluta Mitra papalis	VI. 431
Papstvogel, (Ummer) Emberiza Ciris -	II. 570
Papuenuschel, (Diesmuschel) Mytilus Modioli	ıs VI. 336
Paracenthelis, (Chryfom ) Enlinderhahnchen	<b>€</b> . 223
Paradiesammer, Emberiza paradisea -	11, 568
Paradiescolibri, Trochilus paradiseus .	II. 263
Paradicefifch, (Fingerfifch) Polynemus paradifi	cus IV 250
Paradiesmerle, Tanagra Tatao	II. 5 <b>75</b>
Paradiesparfit, Plittacus ornatus -	II, 137
Paradiesschmetterling, (Tagvogel) Papilio Aec	dea V. 586
Paradiesvogel, Picæ paradiseæ	II. 197
Paradicevogel, (Eisvogel) Alcedo paradifea	II. 244
Paradilea, Paradicevogel -	II. 197
apodia, Luftvogel -	II. 197
- regia, Königsvogel -	II. 199
— — triftis, Bastard —	II. 20t
Parallele, (Bockläfer) Cerambyx linearis	V. 274
Parallele, (Stintfafer) Buprestis linearis	V. 342
Parallelipipedon, (Lucanus) Baltenschröter	V. 98
Parallelpunft, (Nachtschm.) Phalæna duplaris	V. 735
Parallelschnur, (Pfeilschwanz) Sphinx Tiliph	one V. 642
Parallelwanzen, dunne –	V. 505
Pardalion, Pardalis, Leoparb -	I. 237
Parder, (Strandläufer) Tringa squatorola	II. 414
Pardus, (Felis) leopard	I. 237
Pareas, (griech.) Aefculapschlange -	III. 177
Χ·	Par.

·		Th.	•
Pargneesch, (bebr.) Blob	₹,	V2. 1	_
Paris, (Papilio) gruner Page -	-	V	560
Parisvogel, (schwed.) Rernbeisfer		II.	54
Parfit, bunter, (Papagen) Pfittacus var	ius 🏸	€.	79
Cajennischer, Psittacus agilis	-	II.	138
— — Cajennischer, Psittacus Cajaneus	<del>-</del>	G.	81
- geflecter, Pfittacus maculatus	_	Œ.	74
- gelber Unjolifcher, Pfittacus folftit	ialis	IŁ	132
gemahlter, Psittacus pictus	-	ල.	75
- gruner Carolinischer, Plittacus Car	rolineni	is IL	132
Guineischer, Pattacus Guineenlis		€.	81
- rother, Psittacus Borneus	<b>'</b> —	II.	132
- fcmutiger. Plittaeus inguinatus		G.	79
Parpaglia, Parpaglione, (ital.) Schmett		V.	555
Parra, gebornter Riebis, ober Spornfluge	:I		430
chavaria, Kruppel			433
Dominica, Demingischer gebornter	: Riebis		434
- jacana, Nachtkopf -	•		430
Senegalla, Genegalischer gebornter	: Riebig	11.	431
- variabilis, mexifanischer gedornter	Riebis		432
Parruche, (fr.) Partit -		II.	123
Parrufa, (ital ) Reife		H.	625
Parrusolina, (ital ) Blaumeife	<b>—</b>		627
Parthenias, (Phalæna) Jungferntind	- T-		682
Partridge, (engl.) Rebbubn	_		488
Paru, (braf.) einfarbiger Breitfifch	-	IV.	62
Parus, Deife	H. 621		178
Americanus, Amerifanische Meife			626
- ater, Cannenmeife	•	II.	
- atricapillus, Schwarzfopfchen	•	H.	
biarmicus, Bartmanneben	***	H.	_
bicolor, zwepfarbige Deife	-	H.	
caudatus, Comangineise		II.	
coeruleus, Blaumeife	•	II.	
cristatus, Daubenmeife	-	II.	
—— erectus, Blaubusch		S.	
- major, Robimeise		H.	
- paluftris, Sumpfmeife	-	11.	
er Eurationies Samblaniele.	•		rus

Parus	Patella .	331
	•	Th. E.
Parus pendulinus, Beutelmeife	· 🙀	II. 629
- peregrinus, Auslander	÷	II. 628
- Virginianus, Birginische M		II. 627
Palan, Bejoarbod -		6. <b>6.</b> 55
Palithoë, (Papilio) Beifftral	• •	V. 582
Paffara, (ital.) Sperling	77.	II. 592
Passer lævis, Platteis	<del>,</del>	IV. 153
Paffer, (Pleuroneites) Stachelflun	der -	IV. 161
Passer, Sperling	-	II. 592
Passera salvaticha, (ital.) Grasmi	icte -	Il. 604
Pafferau, (fr.) Sperling	₹.	II. 592
Pafferes, (Aves) Sperlingartige D		. S. 131
Pastetchen, (Urche) Arca pectuncu	lus -	VI. 298
Pastinatians, Aphis pastinacæ	. •	V. 513
Patella, Rlippfleber -	- VI, 602	s• €. 38r
- antiquata Alte Saube	<del></del>	VI. 611
- barbara, Muße	Ţ.	VI. 607
Chinenlis, Chinesische Dug	je -	VI. 604
- coerulea, blaue Patelle	· ` <del></del>	VI. 610
- compressa, Strobbuth	=	VI. 613
— — crepidula, Coillig	7	VI. 606
cristata, Backenkamm	₹	VI. 612
- cruciata, Kreußer	₹.	VI. 615
- equestris, Fischweiberhaub	e. 7	VI. 603
— fornicata, Pantoffel	•	VI. 60¢
— — fusca, Braunrand	₹.	VI. 614
— græca, Gitter	<b>₹</b>	VI. 616
- granatina, Körnerschild.	. , ₹	VI. 608
- granularis, Bestung	•	VI. 607
- laciniosa, Medusenkopf		VI. 606
— — lacustris, Morastpatelle	₹	VI. 612
— — lutea, Rothring	٠	VI. 611
- mammillaris, Anopfpatelle	-	VI. 611
— miliaris, Zwergpatelle	<del></del>	<b>€.</b> 38₁
— Neritoidea, Rothlippe	7	VI. 604
— nimbosa, Straspatelle	· -	VI. 616
— Noachina, Noahspatelle	ė	C. 38t
- notata, Bledenrand.	•	VII. 614
	•	Patella

	Th. S.
Patella nubecula, Wolfenratelle -	VI. 617
- pelinata, Rungelkamm -	VI. 611
- pellucida, Glaspatelle -	VI. 613
— — porcellana, Rußschaale -	VI. 605
- reticulata, Repratelle -	VI. 615
ruftica, Baurentappe -	VI. 614
faccharina, Sternpatelle	VL 607
testudinaria, Schildfrotenfchilb	VI. 613
- tricarinata, Drepfiel -	VI. 611
tuberculata, Knotenpatelle -	VI. 610
- Ungarica, Marrentapre -	VI. 610
- vulgata, gemeine Patelle -	VI. 609
Patelle, blaue, Patella coerulea	VI, 610
- gemeine, Patella vulgata -	VI. 609
Patellen, (boll.) Rlippfleber	VI. 602
Patelles, (fr.) Rlippfleber •	VI. 602
Paternofter, Staatenfahnennabel -	VI. 428
Pathagen, (oftind.) Schupptbier -	I. 187
Patroclus, (Papilio) Braunflügel -	V. 573
Patrys, (holl.) Rebhuhn -	II. 489
Patrys Hoorn, (holl.) Rebhuhn -	VI. 446
Pattatesmilbe, Acarus Batatas -	V2. 1055
Paus, (holl.) Papstvogel -	IL 571
Pausekroon, (boll.) Papstfrone -	VL 432
Pauvis, Crax	' II. 465
- Brasilianischer, Crax Mitu -	II. 456
Euraffauischer, Crax globicera -	IL. 467
— Guajanischer, Crax Alector -	II. 465
Mexikanischer, Crax Pauxi -	II. 468
Peruvianischer, Crax rubra -	IL 466
Pauxi, (Crax) Mexifanischer Pauwis -	II. 468
Pavo, (Labrus) Meerpfau -	IV. 200
Pavo, Pfau - II. 457	<b>6</b> , .121
- bicalcaratus, Chinesischer Doppelfporn	IL 419
- Chinquis, Chinquis .	G. 128
- cristatus, gemeiner Pfau, -	II. 457
- muticus, Japanischer Pfan -	II. 460
Pavon de las Indias, (span) Indianischer Sahn	II. 461
	Paxaro,
	•

Peigner

Peigne	Penguin	335
		Th. E.
Peigne, (fr.) Pilgrimemufchel	·	VI. 302
Peitschlange, (Matter) Coluber	Ahætulla	III. 200
Peixegallo, (port.) Meerhahn	<b>.</b>	IV. 143
Peixepuerco, (port.) Botenfisch	<u>.</u>	III. 298
Peister, (Dochschauer) Cobitis fo	Milis -	IV 281
Pelamis, (Scomber) Bonetfisch	22	IV 259
Pelandor-Aroe, (inb.) Beutelra	ge —	1. 288
Pelargos, (gricch.) Storch	· — ,	II. 375
Pelecanus, Pelifan -	II. 323. 361	E. 106
aquilus, Fregatvogel		11. 327
baffanus, Schottische Ge	ans 👊	11. 336
- graculus, Bafferrabe		II. 330
mandibulis serratis, Co	igeschnabel	II. 330
occidentalis, Amerifani	iche Kropfgans	II. 325
onocratulus, Krorfgans		II. 123
orientalis, Orientalische	<b>Rropfgans</b>	II. 323
pygmæus, 3mergmaffer	rabe -	(S. 10%
- rostro adentulo, ungeza	bnelter Conabe	II. 323
Peleus, (Papirio) Mistice		V. 628
Pelias, (Coluber) Spiesnatter		III. 197
Pelias, (Papilio) Bobelfchmetterlit	ig 🛎	S. 281
Pelifan, Pelecanus -	II. 323. 361	
Pella, (Helix) Iglander	-	VI. 579
Pella, (Trochilus) Surinamifche	r Cottbri	II. 254
Pellex, (PHalana) Querfleck	, . 🚓	V. 684
Pellio, (Dermestes) Rirschner	_ =	V. 101
Pelon ichiatl Oquitli, (peruv.)	Schaaffameel	I. 372
Peloronta, (Nerita) Puleront		VI. 592
Pelure d'oignon, (fr.) Rlebaufte	rt . —	VI. 319
Pelimette, (Rachtschm.) Phalæna	pellionella	V: 741
Pendactes, (Holothuria) Rippenl	blafe -	VI. 98
Pengoin, (fr.) Papagentaucher	- II,	308. 309
Penguin, Diomedea	3	II. 320
- fliegender, Diomedea ex	ulans 4	II. 320
MageHanischer		II. 32Z
- nordischer, (Papagentand	er) Alca impe-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
- fcwimmender,vomEaap,D	iomedes demo-	II. 310
LAMMINISTRATION AND AND SAME OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	TOTHEREN MEDICAL	Peni.
•		Laille

Perca

Perca	Perlenblase	337
<b>B</b> 1	,	Sh. S.
Perca labrax, Salmbarich		IV. 228
- lineata, linirter Barfc	<b></b>	IV. 241
luciopesca, Sandbarsch	-	IV. 225
- marina, Geebarich	•	IV. 232
- mediterranen, Brufffect	•	IV. 236
— melanura, Schwarzschwa — Nilotica, Rilbarsch	ing —	IV. 240
— nobilis, Stiberbarfc	-	11. 230
— ocellata, Augenschwan	-	IV. 233
— palpebrosa, Braunwimpe	يت.	IV. 232
- Philadelphica, Pensilvan	i Gallan Chi Lucae e	IV. 235
- polymna, weißbandirter	nicht Bariching	IV. 234
- punctata, Gelbichwang	our Juping	IV. 233
- punctata, Sprenfelbaric		IV. 227
- ftriata, Strichbarsch	) <u>`</u>	IV. 237
trifurca, Drenjact		IV. 241
- undulata, Bellenbarich	•	IV. 245
- venenosa, Siftbarfc	, -	IV. 231
- vittata, Banberbarfc	_	IV. 239
Perce-oreille, (fr.) ber große L	Arfauria	IV. 237
Perche, (fr.) Barfc	Aciontin	V. 396
Perd sa queue, (fr.) Schwangma	ni∳ ≤	IV. 222
Perdice, (ital.) Rebhuhn	-	II. 628
Perdrix, (Buccinum) Rebbubn		II. 488
Perdrix, (fr.) Rebhuhn	_	VI. 445
Perdrix ruftica, Balbichnepfe	, <b>.</b>	II. 48 <b>8</b> II. 396
Perdrix, (Tetrao) graues Rebh	ubn .	II. 488
Peregrinator, (Cimex) Reifend	er s	V. 488
Peregrinator, (Ichneumon) Rei	fender _	V2. 850
Peremouler, (port ) Seefuh	•	L 175
Perico ligero, Perillo, (pert.)	Faulthier	I, 178
Peristera, (griech.) Taube	•	11. 497
Perius, (Papilio) Stebenvuntt	<u>~</u>	V. 596
Perla, (Hemerobius) Laufefreffe	t .	V2. 793
Perlæ, Jungfeen	•	V2 763
Peribergbubn, Tetrao Chinenfis	•	S. 129
Perle di Concona, Pferbefug	<b>.</b>	VI 287
Perlenblase, Bulla fontialis	<b>÷</b>	VI. 411
•	Υ -	Perlen
•	-	Derieu.

	Th.	Ģ,
Perlenflugel, (Rachtschm.) Phalena margaritatà	V.	712
Perlenmufchel, (Rlaffnufchel) Mya margaritifera	VI:	220
Perlenmutter, fleine, (Lagiom.) Papilio Euphro	•	
fine —	<b>V.</b>	621
Perlenmutter, (Diesmufchel) Mytilus margarit		
ferus		330
Perlenmutternautilus, Nautilus Pompilius		353
Perlenmuttervogel, (Tagiom) Papilio Lathonia	. <u>V.</u>	621
Perlentrager, (Eidechse) Lacorta scutata	IIL.	_
Perlhuhn, Numida Meleagris II. 476		
Perna, (Ostrea) hammauster -		314
Perna, Steckniuschel	·Vh	
Pernisa, Pernisse, rothes Rebhuhn -		488
Pernsteen, (holl) Arosestein	VI2	
Peroquet Mascarin, (fr.) brauner Paragen		128
- violet, (fr.) Guajanischer Papagen		143
Perro, (span.) Sund		206
Perfa, (Cudulus) Perfianifcher Gudgud		213
Persego, (ital.) Barsch -		222
Persianer, (Bienenfresser) Merops Persica		95
Perstaner, (Klippfisch) Chætodon nigricans		168
Persianer, (Balge) Voluta Persicula -		, 422
Persiantje, (hou.) Persianer -		422
Perspectiffe, (holl.) bas griechische A -		271
Perspectiv - Hoorn; (holl.) Perspettivschnede		528
Perfrettivdublet, (Pferdefuß)		287
Perspettivschnecke, (Rrausel) Trochus perspettivus		528
Peruquentaube, (Saubentaube) -		500
,	V2.	
Pes felis, (Ostrea) Rapenfuß		308
Pes Lutræ, (Ostrea) Otterfuß		368
Pes Pelecani, (Strombus) Bogelfuß -		476
Pesce, (ital.) Fisch	IV.	
Pelce-angelo, (ital.) Meerengel		257 258
Pesce balestra, (ital) Dammerfisch -		
Pelce - capone, (ital.) Seehahn		273 270
Pesce-colombo, (ital.) glatter Dadyfisch		273
Pesce-forca, (ital.) Panzerhahn		در به معمام

	Eh. 🕏.
Pfau, Chinesischer, (Lagichm.) Papilio Almana	V. 600
- gemeiner, Pavo cristatus -	II. 457
- Pavo muticus -	II. 460
- Andianischer, (Tagschm.) Papilio Asterio	V. 606
- fleiner, (Rachtschm.) Phalæna pavonia	V. 653
Phanenauge, (Lippfisch) Labrus ocellaris	IV. 207
Osfanenauge, (Tagicom.) Papilio Io	V. 600
Mfauenlaus, Pediculus pavonis	V2. 1036
Mfauenreiher. Ardea pavonia -	II. 370
Mfauenspiegel, (Rachtschm.) Phalæna Atlas	V, 651
gifaufajan, Phalianus Argus -	II. 473
Mefferfresser, (Toutan) Kamphaicos piperivor	us II. 155
Meffernukchen, (Arche) Arca nucleus -	VI. 299
Wfeifdrossel, (Zipdrossel)	11. 530
Pfeiffe, (Rablipruge)	VI. 46
Pfeiffenfisch, Fistularia	IV. 333
exfoiffente. Anas penelops	II. 294
Pfeiffenthierchen, (Robrenpolppen)	VL 631
Pfeiffer, (Citabe) Cicada Tibicen	V. 459
Mfeilband, (Lagidone) Papilio Polydamas	V. 569
Pfeilbrache, Chimæra monstrosa	III. 276
Pfeileidechse, Lacerta velox	` <b>©</b> . 187
Pfeilfeber, Pennatula Sagitta	VI2, 900
Pfeilhecht, Esox Sphyræna	IV. 376
Phelmaus, Mus Sagitta	<b>€</b> . 46
Pfeilpuntt, (Nachtschm) Phalæna Aprilina	V. 691 V. 569
Pfeilritter, (Eagichm.) Papilio Anchises	JII. 181
Pfeilschef, (Ratter) Coluber Jaculatrix Pfeilschmange, (Danmerungsschnetterlinge) Sphi	n-
sprengovante, Danamerangolamerango, Opia	4. <b>S</b> . 301
ges - V. 63	V. 634
achte, mit glattem Flügelrande	V. 637
achte, mit rauben After _	V. 643
Bastarde -	V. 644
Pfeilfdmans, Caapfder, (Dammerungefdm.) Sph	
Capeniis -	V. 638
Carolinifcher, Sphinx Carolina	V. 637
fcmaribrauner, Sphinx Helymus	S 304
Assa as B. c. c. c. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v.	Pfeile

Pfeilschwanz	Pflanzenmilbe	<b>;</b>	341
		Th.	<b>G</b> .
Pfetischwanz, (Cichhorn) Sciure	us Sagitta	Ī.	
Pfeilschwang, (Ente) Anas acut			205
Pfeilschwang, (Roche) Raja pa			246
Pfeilschwanz, (Cauchente) Mer	gus minutus		306
Pfeiltrager, (Raupentober) Ichi	neumon jaculator	. V2.	856
Pfenningforalle, Madrepora po	orpita -	VI2.	675
Pferd, Equus -	•		445
- Arabisches .	•		451
— Barbarisches —	. 🖛 .		448
- Brafilianijches	-	I.	45 E
- Danisches -	′ -		449
- Deutsches -	•		450
- Englandisches	-	I.	449
- Frieslandisches			449
— Italienisches		ı.	449
— Jelandisches	<del></del> -	I.	451
— Polnisches —	-	. I.	450
- Rugisches -	•		450
— Spanisches -	•	I.	449
— Ungarisches — —	- ' -	I.	450
Pferdeameise, Formica Hercule	ana 🗕	V2.	914
Pferbefliegen, (Ochfenbremen)	-	V2.	984
Pferbefuß, (Gienmufchel) Cham	a Hippopus	VI.	286
- borniger, (Gienmufchel)	Chama arcinella		
Pferbetrabbe, (gemeiner Taschen		V2. 1	
Pferdelaus, Pediculus equi	•	V2. 1	
- fliegende, Hippobolc	a equin <b>a</b>	V2. 1	
pferdemucte, Culex equinus	· —	V2.	992
Pferbestecher, (Stechfliegen)	-	V2.	
Pferdhaan, Squalus maximus	-		265
Pferdmatrele, Scomber Hippos		IV.	265
Pfersichblat, (Benusmuschel) V			
Pflanzenflohe, Poduræ -	- V2. 1017		
Pflanzenläuse, Aphides	<b>-</b>		208
Pflanzenlausfresser, (Larve ber L	Birnfliege)	V2.	963
Pflanzenlauszwicker, (Raupentot	er) Ichneumon		
Aphidum	•	V2.	
Pflanzenmilbe, Acarus Aphidioi		V2. 1	
	. <b>Y</b> 3	93	fan'

,	Th. C.
Pflanzenschänder, (Langfuß) Tipula oleracea	V2. 932
Pflanzenthiere, Phytozoa -	VI. 25
Pflaumenblat, (Rachtschm.) Phalæna prunt	V. 657
Pflaumenbohrer, (Schlupfmefpe) Tenthredo pruni	V2. 835
Pflaumenfebertoralline, (Rronenforalline)	VI2. 856
Pflockfisch -	I, 493
Pflodichwang, (Beinfisch) Oftracion bicaudalis	III. 307
Pflugninschel, (Gienmuschel) Chama rugola	<b>⑤</b> . 367
Pflugschaar, (Spiegelfisch) Zeus Vomer	IV. 142
Pfluger, (Raupentober) Ichneumon exarator	V2, 853
Bhuger, (Rufelfafer) Curculio grator	<b>5.</b> 229
Pflüger, (Ruffelkafer) Curculio arator - Pfulschnepfe, gemeine, Scolopax limola	II. 40t
- rothe, Scolopax fedoa -	11. 398
Phædra, (Papilio) Bomerangenatlas -	V. 604
Phaeton, Tropifer -	11. 335
- methereus, fliegender Phaeton	11, 335
	II. 337
——— demersus, schwimmender Phaeton	181. 323
	<b>. 5</b> . 306
- Ablynthii, gevierter Puntt	V. 690
- Aceris, Epring	V. 691
Aesculi, Blausieb -	V. 679
æstuata, Rettenvogel - / V. 714	. E. 311
— — affinis, Anverwandter ( —	V. 692
albicillata, Beißfeld	V. 717
_ albinella, Goldbogen -	V. 753
- alchemiliata, Alchimist -	V. 716
- Algira, Graurand -	V. 683
- allica, Blaufleck	<b>5</b> . 309
- Alni, Doppelfleck -	V. 690
alniaria, Rageflugel -	V. 706
- Alftromeriana, Braunfied -	V. 729
- amatoria, Liebling	V. 705
- ameriana, Gemeinstrich -	V. 726
- antiqua, Sonderling -	V. 670
- Aprilina, Pfeilpuntt	V. 691
- arbutella, Barentraubenmotte -	V. 742
	V. 726
— arcuana, Bogenwinde —	Phalæna
	E HETSCHE

		Phalæna		343
			•	<b>L</b> b. <b>C</b> .
Ph	alæi	na arenaoea, Sandflügel		V. 674
_	_	argentella, Silbermotte		V. 750
_		aristella, Gilberlinie	_	V. 749
		asperella, Couppenfiect	•	V. 745
			, <b>•</b> '	V. 708
_		atra, Mobr -		V. 667
_	- —	Atriplicis, Melbenfauger	-	V. 699
	. 🛶	aulica, Dofbame	<b></b>	V. 675
		avellana, Safelmidler		V. 726
_	_	aversata, Finnlander	-	V. 716
<del></del>		barbalis, Schenfelbart	.—	V. 732
		bella, Punfthand	_	V. 736
			•	V. 728
		betularia, Weißling	-	· V• 709
_		bicostella, Doppelrippe	-	V. 743
		bilineata, Ziegelwelle	<del>-</del>	V. 715
		bimaculoli, Schwarzsteck	× 7	V. 701
	÷	Bonnetella, Wellenfilber	-	V. 754
		bractella, Goloftugel	-	V. 749
_	_	Branderiana, Braunwickler	-	V. 727
		brafficæ, Robleule	₹.	V. 696
			•	V. 722
_		Brunichana, Pierect	•	V. 730
_			-	V. 755
		Bucephala, Baffentrager	_	V. 659
_		Caffraria, Kafferling	₹ '	V. 711
	_	caltella, Sumpfdottermotte	-	V. 750
		camelina, Rronenvogel	-	V. 678
	-	Capenfis, Zimmetblat	-	V. 657
_	_	capitella, Gelbkopf	•	V. 749
	_	Capuzina, Rapuziner	_	V. 678
		carnella, Fleischroffe	~	V. 739
	_			V. 661
-	_	catax, Rollrand		V. 658
		caudella, Schwanzlinie	-	V. 749
		cecropia, Sichelflugel		V. 652
	-		-	V. 677
-		cembrella, Weißsprenkel	<del></del>	V- 747
		Y.4		Phalæna

				Eb.	€.
Pha	læn	a cereana, Panisdieh	-	<b>V.</b>	
_		cherophyllata, Korbelfreund		V.	
<del></del>	<del></del> .		-	V.	
<del>-</del>			•	<b>V.</b>	
	<del>,</del>		-	V.	
<del></del> -		chryforhea, Goldafter	-	V.	
	_		<b>→</b> ·	V.	
-			<b>*</b>	V.	
		cingulata, Ringelflügel	,	V.	
<b>-</b>	_		₹ ′	V.	
	_	clathrata, Gitterflügel	•	V.	
		crossing, Crystallinett	-	V.	756
<del></del>		clorana, Weidenwickler		V.	724
	_		_	$V_{\bullet}$	671
	-			V.	
		comitata, Geselle	•	V.	
-	_	complana, Flachflügek	•	V.	
•	-	conspicillaris, Brillenbogen	₩.	V.	
<del></del>	_	corticella, Rindenmotte	•	<b>V.</b> ,	
•	-	coryli, Pafeleule	•	V.	667
<b>—</b>	_	cratægata, Decfentriecher	•	V,	714
	-	cratægella, Pagedornmotte	~~	V.	737
	~	cratægi, Dorneule	<del></del> -	V,	666
	-	erepuscularis, Dammerungs	ogel	<b>V.</b>	65 <b>5</b>
-	_	eruciana, Bogenfled	-	<b>V.</b>	73¥
		cucullatella, Sperbermotte	-	V,	743
	_		-	<b>V</b> .	739
<del></del> -	-	curtula, Kurjarsch	~	<b>V.</b> (	<b>568</b>
	_	cywosbatella, Rosenmotte	-	<b>V</b> , :	740
	_	dealbata, Tuncher -	_	<b>V.</b> (	717
_	·-		<del></del>	€,	311
			-	€,	313
-	-	do Geerella, Cilberband	-	V. :	75 <b>I</b>
-		Delphinii, Rittersporn	٠ 💣	V. :	
-	-	deplana, Sangflügel	• •	S.	
		depunctata, Punftstrich derala, Wischflugel	•	V. ;	703
			. •	<b>V.</b>	69 <b>5</b>
-	-	dittma, Brandflugel	` -	<b>V.</b> (	572
		• •		Phala	ena.

	,	Phalæna	2.4 6
			345
Ph	alæn	a didactyla, Imenfeder _	Th. E.
		didymata, Doppellappen	V. 757
_		diffinis, Landsmann	V. 720
_	_	diplaces, Kartenvogel	V. 693
		dispar, Grostopf	V. 702
		dodecella, Zwolfpunkt	V. 665
		dolabraria, Eichenmeffer	V. 747
		dubitata, Adthsel -	V. 706
_		dumeti, hedenfriecher	V. 712
	_	duplaris, Parallelpunkt	V. 658
		elinguaria, Rablfauger	V. 735
		elongella, Echmalfingel	V. 708
		emarginata, Randelflügel	V. 743
	<del>-</del>		V. 713
		exclamationis, Bermunderungszeichen	V. 736
_	,	exfoleta, Moderholz	
		Fabriciana, Punftpaar	V. 694
		fagi, Eichhorn	V. 731
		falcataria, Cicelflügel	V. 659
	-	farinalis, Politstügel	V. 704
		falcelina, Burftenraupenvogel	V. 732
		fasciana, Weißband -	V. 669
		fasciaria, Bandling	V. 723
	_	festucm, Sumpfschwingel	V. 708
		flaveolata, Selbfeld -	V. 689
		flavicornis, Gelbhorn	V. 714
		fluctuata, Wasserwoge -	V. 701 V. 718
		foenella, Heumotte	V. 740
		forficalis, Kohlwurm	V. 740
		Forskahleana, Schnet	V. 733 V. 727
		fraxini, blaues Band -	V. 688
		Frischella, Bergulber -	V. 752
		frumentalis, Setraidwurm	V <sub>*</sub> 734
		fuliginosa, Rugnügel	V. 682
		fullonica, Walter	V. 655
		fulvulata, Birkenvogel -	©. 313
	_	fulvia, Lowenhaut	V. 633
_	<b>-</b>	furcula, Brustpunkt	V. 667
	-	Y	Phalana
		<b>~</b> ;	₩ 11 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

•		Th. S
Phalæna fufcella, Sausmotte		V. 74
- Geerella, Gilberband	-	V. 75
- gelatella, Aerfelschaler	~	V. 73
- gemella, Gilberwolfe	-	V. 74
- Geofrella, Gilbergitter	_	V. 752
- glaucinalis, Glattflugel	-	V. 73
- glyphica, Bilberflugel	-	V. 684
- gnomana, Schiefband	•	V. 729
- Goedartella, Gilberbogen	-	V. 753
— — Gothica, Gothische Schrift	-	.V. 696
- Gouana, Braunfutter	₹	V• 730
- grammica, Streifflugel	-	V, 677
- graminis, Grasmaber	_	V, 676
- granella, Kornwurm	-	V. 742
- groffularia, Dintenfleck	-	V. 714
- hamana, hatenflugel	•	V. 724
Harisella, Brandspige	_	V. 756
- Hartmanniana, Doppelftrich	-	· V• 728
hastata, Spiegband	-	V, 717
Hastiana, Rrummbinde	-	V. 729
Heliconia, Pelikonerin	.—	V. 685
- hepatica, Leberfarbe	_	V, 698
- Heraeleana, Rronenwickler	-	V, 731
- hexadactyla, Sechsfedet	_	V. 758
hirtaria, Raubflügel	•	<b>E</b> . 312
- Holmiana, filbernes Drepect	<u> </u>	V. 728
- humuli, Sopfeneule	-	V. 679
- hyalinata, Drenedflugel		V. 722
- Jacobæa, Jatobaerin	•	V. 685
Janata, Janus -	•	V. 717
- jatrovaria, Purgierling	-	V, 711
ilicifolia, Stechpalmenblat	_	V. 656
- immorata, Zauderer	-	V. 719
- immutata, der nämliche	-	V, 719
- incanata, Mantelchen	•	V. 718
- interrogationis, Fragseichen	•	V. 689
- interrupta, Bleifchflugel		V. 686
- irrorella, Pomeranzenmette	~	V. 737
		Phalaina

		Phalæna		347
		· ·		26. S.
Pha	læn	a Julia, Pinselschwanz	•	<b>6.</b> 319
		Jungiella, Berdoppeler	<b>/</b> €	V. 754
		juniperata, Bachholdervegel	~	V. 718
•		juniperella, Bachbolbermotte	- '	V. 747
		Koekeriziana, Einpunft	_	V. 725
-		lacertinaria, Eidecheschwanz	•	V. 706
	_	lactearia, Milchflugel	_	V. 704
		lanestris, Wollenafter		V. 658
		lapella, Klettenmotte	•	V. 742
		Lecheana, das J, E,	•	V. 727
	<u> </u>	Lediana, Silberschurre	•	V. 729
<del></del> '	_	lemnata, Mafferschmetterling	-	V. 721
-		leporina, Ablerpunkt	•	V. 685
-		loucatella, Weißhand	, ∙,	V- 744
<del></del>		leucomela, Weigwolfe	**	V. 701
		Leuwenhockella, Gilberlinie	• •	· V. 753
-		lichinella, Flechtenmotte	•	V. 756
		limbata, Braunsaum	•	V. 720
		Lineella, Autor	•	V. 755
		Lionetella, Eilberrostral	**	V. 754
		Listerella, Salbringel	•	V. 752
		litorana, Buchftabenflugel	_	V. 724
<del></del>		Loeflingiana, Doppeltreuß	as.	V. 727
	<del></del>	logiana, Roblenstaub		V. 730
-		lota, Schwarzpunkt	-	V. 675
-		lubricipeda, Slitschfuß	•	V. 675
		lucernea, Lichtflieger	•	V. 683
		lucipara, Purpurglang	•	V. 702
		ludifica, Raturspiel		V. 692
		lupulina, Bogenflugel	•	V. 680
		lusoria, Spielart	•	V. 676
		lutarella, Gelblingin	•	V. 737
	_	macrops, Grofauge		©. 308
-	~	macularia, Fledling	. •	V. 708
		maculata, Englander	•	<b>©</b> , 313
	ستد	margaritata, Perlenflugel		V. 712
		marginata, Flicer	•	V. 717
-		materna, Waisenkind	<del></del>	V. 686
				Phalæna

•		Th.	6,
Phalmna Maura, Bahnflügel	•		688
— melanaria, Schwärzling	•	$\nu$ .	708
- mellonella, homiglecker	-		741
- mendica, Bettler			664
- Mercurella, Quedfilber	•		746
- Merianella, Gilberblatchen	-		753
— — mesomella, Grasmotte	•		738
- meticulosa, Achatslugsi	•		689
- miata, brey Rullen	•		716
- militaris, Krone -	-		654
- ministrana, 'Rothrand	***	V.	726
- minutella, Mignaturmotte	_	V.	748
- moderiana, Randfleck	•	V.	730
- monodactyla, Cinfeder	_	V.	756
- Mori, Seidenvogel -	V. 660	<b>6</b> .	309
Mouffetella, Spitflugel	_		752
— mundana, Mittagslinie	-	V.	655
Myrtilli, Sumpfheideleule	-		698
Narbonea, Portugiese	•	V.	684
— nemorella, Baldmotte	•	V.	739
- nietitans, Weigniere -	-	V.	691
nigrella, Belkstriem	• ,	ੴ.	314
— — nigricans, Schwärzling	•	V.	700
- nisella, Eperfleck	•	V.	741
- nivez, weisse Eule	•	V.	685
- notata, Zeichenflügel .		V.	712
nupta, junge Frau	•	V.	687
- nymplicata, Schwimmer	· <b>.</b>	V.	721
— occidua, Abenblander	•	V.	655
- occulta, Decffügel	-	V.	693
occultella, Fenftermotte	•	V.	756
ocellata, Doppelange	-	V.	717
ocularis, Beigauge	-	V.	683
oculata, Bioletauge	•	V.	
- odora, Riecher -		V.	654
- oleracea, Wurgelnager	•	V.	
- oporana, Ret		V.	
- oxyacantella, Beifibornmotte		V.	738
		Phale	

	. Phalæna		349
	•		Eb. Seite
Pha	lena Oxyavanthe, Sochschwangen	le	V. 697
	- pacta, Berlobte	•	V. 687
	- padella, Obstmotte	•	V. 737
_	- pallons, Bleicher	•	V. 684
	- palludata, Moraftlaufer		V. 721
	- palpina, Sichelfühler	•	V. 673
	- Pantharia, Panterling	-	V. 709
	- Paphia, Fenfterfceibe	•	V. 652
	- papilionaria, Tagling	•	V. 710
	- parenthesella, Beiglinie	•	V 743
	- pariana, Blepbinde	- 4	V. 730
_	- pascuella, Buttermotte	•	V. 738
	- pavonia, fleiner Pfau	•	V. 653
	- pedella, Querbein	•	V. 750
<b>-</b>	. — pellionella, Pelimotte	•	V. 741
	- pennaria, Rothfügel	•	V. 707
	- pentadactyla, Fünffeder	•	V. 718
	- persicariæ, Sagerand	•	V. 692
-	- perspicillaris, Brille	•	V. 693
	— perspicua, Glasband	•	V. 654
	- Petiverella, Schleuder	•	V. 750
	- piceana, Pechflugel		V. 726
	- pinastri, Buctel	•	V. 696
	- pinetella, Sichtenmotte	•	V. 738
	- pinguinalis, Butterfneter	, .	V. 733
	— pini, Fichtenwanderer	, • .	V. 657
	— piniaria, Bruchlinte	` •	V. 707
	- pili, Dulfenfreffer	-	V. 699
	- plagiata, Breitband	•	V. 719
	— plantaginis, Spanische Kahne		V. 664
	- plebeja, graue Eule	-	V. 698
-	- plectra, Didrand -	•	V. 699
	— podella, Milchband	•	V. 791
	- polymita, Rettichbeiffer	-	V. 700
	— pomonella, Birnmotte	-	V. 746
	- populata, Sudelspite	•	V. 715
	— populella, Haarflügel	•	V. 746
_	- populi, Pappelnvegel	_	V. 660 Phalæna
			工工的可能的

			₹1. E.
Ph	alæna porata, Punitflügel	•	V. 712
	— porectella, Langhorn	, •	V. 749
	- potamogetata, Saamfrauffpe	annet	V. 721
	- potatoria, Trinfer	_	V. 657
	— præcox, Rothsaum	-	V. 699
	- pralinana, Erlenwickler		V. 723
	- pratella, Wiesenmotte	•	V. 738
_	- probolcidalis, Rugelfühlet	-	¥. 732
_	- processionea, Rageneule	-	V. 662
	- proletella, Muttermotte	-	V: 742
·	- pronuba, Sausmutter	-	V. 687
-	- prosapiaria, Stammling	-	V. 710
	- prunaria, Schleedornmeffer		V. 707
	- prunata, Greieflügel	•	V. 716
	— pruni, Pflaumenblat	• .	V. 657
_	- pterodactyla, Flugelfeber	•	V. 757
	- pudibunda, Kopfhanger	_	V. 669
	- pulchella, Blutpunft	-	V. 736
	- pulveraria, Staubling	-	V. 708
	- punctaria, Punttftrich	-	V. 705
_	- punctella, Punttflugel	•	V. 745
	- punktigera, Punkttrager	•	V. 655
	- pupillana, Silberauge	-	V. 731
	- purpuralis, Purpurmantel	•	V. 735
-	- purpuraria, Purpurling	-	V. 710
	- purpurea, Purrurbar		V. 674
	- pularia, Rleinling		V. 716
	- pusiella, Zabnstrich		V. 736
	- putataria, Weißstrich	•	V. 704
-	- putris, faules bolg	•	V. 694
	- pyramidea, Klammenflügel	•	V. 701
<u></u>	- pyrausta, Fruhlingseule	-	<b>©</b> : 310
<u></u>	- quadra, Bierect	• `,	V. 686
		•	V. 656
	- quercus, Eichenstreicher	•	V. 658
		•	V. 755
	- ramella, Eichenmotte	-	V: 740
	- Reaumurella, Goldrand	•	V. 751
	•		Phalena

	Phalæna		351
			<b>L</b> b. S.
Þh	alæna rectangula, Binfelhafen	<b>&amp;</b>	V. 720
	- remutata, anderer	_	V. 719
_	- repandata; Bellenflugel		V. 712
_	- refinella, Parimotte	<i>=</i>	V. 747
_	— reticularis, Buntbart	•	V. 734
	- retula, Oblatenflugel		V. 703
	- Rhediella, Bruchfilber	_	V. 755
	— rhomboidella, Schwarzviered		V. 745
	- Robertella, Beißecke	_	V. 752
	- Roefella, Silberbudel		V. 755
	- Rolandriana, Krummstrich	-	V. 728
	— rorella, Thaumotte	_	V. 739
	- rolana, Rosenwickler	٠.	V. 739 V. 725
	— roftralis, Langschnauße	Ξ.	V. 733
	- rubi, Sindbeerblat		V. 657
	— řubricolla, Purpurhals	-	V. 685
_		<u></u>	V. 676
	- rumicis, Saurampfereule		V. 697
_	— rusia, brauner Mond	•	€. 308
	— russula, Rothband	_	V. 676
	— facraria, Blutling	-	V. 709
	- salicella, Weidenmotte		V. 740
	- falicis, Ringelfuß	-	V. 666
	- fambucaria, Schwanzede	•	V. 705
	- fanguinalis, Blutband	-	V. 734
	- sanguinolenta, Bluttorper	-	V. 683
	- farcitella, Rleidermotte	-	V. 741
_	- fatellitia, Trabantenvogel	•	V. 700
	- scabrella, Schuppenflugel	•	V. 745
	- Schæfferella, Buchenwühler	-	V. 754
	- Schallerians, Roftsted	****	V. 729
	- Schraberiana, weiffes Drened	-	V. 729
	- scopolella, Goldsprentel	**	V. 753
	- fecalis, Rockenwurm	` ∸	V. 734
-	- sequella, Krummbalken	•	V. 737
	- scratella, Langschenkel	-	V. 745
	- lociella, Honigmotte	•	V. 735
	- Solandriana, Birfenwickler	•	V. 728
	,		Phalæna

1		de L	4
Phalæna fordiata, Saloppe		Žħ.	718
sponsa Braut -		y. zr	715
sticticalis, Bartrand			687
stipella, Schwefelsteck	•		734
_ — ftratiotata, Amphibium	-		748
- ftriataria, Gelbstrich	_		721
- ftrigillata, Kammstrich	<del>-</del>		704
ftrobinella, Zapfenmotte		V.	719
succenturiata, Anhang		77	746
- fulphuralis, Schwesclfühler	•	Vi IT	719
- Sulzella, Goldband	•	12	733
- Swammerdamella, Groffborn	_		751
Sylvella, Bartforfcen		77	75 i
- fylvina, Walbeule			748
— — Syringa, Achaeffügel	-		680
- Syringaria, Fliedermeffer			312
- tædella, Spaltsted			706
- tapezella, Tapetenmotte	_	77.	747
- Tarquinia a, weisses D	-	V ,	741
- Tarquinia b, fleines D	<del>=</del>		306
- tentacularis, Langfühler			306
- tertionella, Dunkelstrich	ب <b>ند</b> ,	ν.	732
- testionena, Duntestitus	_		745
	مد نن		742
- tesseradüctyla, Boltenfeber	_		757
- tetradactyla, Bierfeber			757
- tetrapodella, Bierfuß	ند.	V.	744
- Thymiaria, Wellenstrick	-		705
tragoponis, Godebart	• ,	V.	700
trapezina, Tischfled	• •	V.	
tremula, Zahnflügel	*		671
tricinctaria, Gurteling	<del>-1</del>		711
tridalyla, Drenfeber	<b>~</b> `		737
trigonella, Doppeldrened	خف	V.	741
triplasia, Drenbocker	<b>∸</b>	$V_{i}$	699
triptera, Blugelfted	=		692
tripunctaria, Punktling	÷	$\nu$ .	710
triftata, Rloftervogel	<u> </u>		716
- tritici, Kornabre			700
•		Phal	eni

. E.	Phalæna	Phalangiu	m	353
2007.00	The state of			Th. G.
Phalæn	a turionella, Anflugmo	fte	all the	V. 746
-	typica, Splitterftrich	ST. Has NO.	-	V. 702
	Uddomanniana, Quer	fled	1015	V. 730
	umbratica, Rappentra	ger		V. 693
-	uncana, Rlauenflugel	adding the		V. 723
	undulata, Braunwelle	d with the course	-	V. 713
-	unguicella, Ragelflug	el l	-	V. 739
	urticata, Reffeffpanne	150	_	V. 720
	ustella, Brandrand	STATE OF THE SECOND	-	V. 743
	vaccinii, Beibelbeeren	le	aliana .	V. 697
-	verbafci, Wollfrauten	e		V. 694
-	vernaria, Frublingsvo	gel .		V. 704
	versicolora, Buntfluge	taled by	-	V. 660
-	verticalis, Reffelmurm	Things in the		V. 733
-	velpertaria, Abendling			V. 710
-	vestianella, Tuchmotte		LOY.	V. 740
_	vibicaria, Purpurstrid	private and	_	V. 704
_	villica, Raumfleck	A COLUMN	-	V. 664
-	vinula, Gabelfcman;	- Per		V. 659
-	virens, weiffer Mond	Shright Brook	-	V. 691
-	viridana, Grunwickler		men	V. 723
	viridata, Grunflugel		-	V. 711
	, — ,	131 " "		V. 743
	vitis ideæ, Stumpffau		-	V. 680
-	Wahlbomiana, Bolfe	nband	ation . T	V. 729
-	Wauaria, Beling	SHE'LL	-	V. 709
-	Wilkella, Bogenband		4	V. 754
	xylosteana, Kreugtrage		* 2	V. 725
-	xylostella, Levtojenmot	te		V. 744
-		er were day		V. 724
	oides, (Cicada) Echni		be	V. 464
	oides, (Hemerobius)			V2. 794
Phalæn	oides, (Phryganea) W	afferschmette	rling	V2. 785
	oides, (Tipula) Echme			V2. 942
Phalang	rium, Rrebsfpinne	- V2.	105	9. G. 341
-	Balænarum, Balfi			V2. 1063
		sipinne	140	V2 1064
-	cornutum, hornsch		y 3714	V2. 1061
HAROT A		Z		Pha-

5/1	
•	Th. <b>G.</b>
Phalangium reniforme, Langarm - V	<sup>7</sup> 2. 1064
	2. 1064
Phalaris, (griech.) fcmarges Bafferhuhn	II. 427
Phalaropos, Sturmsegler -	II. 409
Phaleros, (Papilio) Narbenflugel -	V. 62
Phantafterer, (Raupentober) Ichneumon delira-	
torius	V2. 848
Phar, (arab) Pausmans . —	I. 349
Pharaorage, (Frett) Viverra Ichneumon	L 244
Sharaofchnecke, (Rrausel) Trochus Pharaonicus	VL 529
Phascas, (griech.) Winterhalbente -	IL 296
Phalianus, Fasan - II. 469.	<b>S.</b> 123
Colchicus, Fasan	II. 472
- eornutus, gebornter Fafan -	€. 125
— nyethemerus, Haubenfasan —	II. 474
- pietus, bunter gafan -	II. 474
- fuperbus, Chinesischer Sabn -	<b>6</b> : 124.
Phatapus, (Holothuria) Seegespenft -	VI. 95
Pheasant, (engt.) Fasan -	IL 472
Phogea, (Sphinx) Ringelmotte -	V. 642
Phereclus, (Papilio) Mohrenpapillon -	V. 628
Phidias, (Papilio) Rothmund -	V. 631
Phidippus, (Papilio) brauner Page -	V. 577
Phil, (bebr.) Clefant	I. 158
Philadelphier, (Golbhanden) Chrysomela Phila	•
delphica	V. 178
Bhilander, Didelphis - I. 287. 291	. <b>G.</b> 35
Philea, (Papilio) Goldborte -	V. 594
Philenor, (Tagfom.) Papilio Philenor	<b>E.</b> 280
Philiasus, (Papilio) Zwen und Eins -	V. 625
Philocles, (Papilio) Quermelle -	V. 627
Philostetes, (Papilio) Blauauge	V. 174
Philomele, (griech.) Rachtigal -	II. 602
Philomelus, (Papilio) Rachtigalenpapillon	V. 598
Phlæas, (Papilio) Erbpapillon -	V. 629
Phoca, Seefalb - I. 194	. <b>5</b> . 25
- hispida, Stachelsechund -	S. 26
- leonina, Seelowe - I. 197	. C. 25
en en en en en en en en en en en en en e	Phoca

Phoca .	Phryganea	355
•	,	<b>26. S.</b>
Phoca pulilla, fleiner Geehu	nb	<b>5.</b> 26
urfina, Geebar		I. 195
vitulina, Robbe		. 201. 6, 25
Phocoena, (Delphinus) Br	aunfisch -	L 504
Phoenicopterus, Rlamming	er, -	- II. 358
Phoenicurus, (Motacilla)	Schwarzkehlchen	II. 615
Phoenicurus, Rothschwanz	_	IL 615
Phoetusa, (Papilio) Off. 20	iest	- V. 613
Bholade, Pholas	•	VI, 210
- accippte, Pholas costs	itus -	VL 213
- gestreifte, Pholas stri	atus -	VL 213
- meiffe, Pholas candid	us -	VI. 214
Pholas, Pholade	-	VI, 210
- candidus, weiffe Ph	olade -	VI. 214
costatus, gerippte PH	polade -	VI. 213
- Grifpatus, Lodenpho	lade -	- VI. 215
- pufillus, Zwergpholo	ide —	VI. 214
- Rriatus, geftreifte P	holade .	VI. 213
Pholis, (Blennius) Spiktop		IV. 105
Phorbonia, (Lagichm.) Pap	ilio Pherbonta	<b>6.</b> 280
Phorcas, (Papilio) fleiner	age -	<b>©. 281</b>
Bbosphorns, (leuchtender Ro	ifer.) Lampyris	Phos-
phorea	-	V. 302
Phryganea, Bafferenichen		V2. 782
albifrons, Weiß	topt -	V2. 789
azurea, Bioletfie	igel -	V2. 788
- bicaudata, Gabo	elschwang -	, , Od
- bilineata, Beißs	erico) —	V2. 789
bimaculata, Mo		V2. 787
— — ciliaris, Raubbr	nle —	V2, 788
— — filosa, Fadeneule	*	V2. 789
flava, Gelbnet	, <b></b>	170
flavilatera, Gelb		V2. 787
— - fusca, Brauneule	•	V2. 789
- grandis, Wasser		V2. 786
— — grisea, Graumo		7 700
- longicornis, kan		700
— — marginata, Gell	rand -	V2. 788
	<b>Z</b> 2	Phry.

•		Th. S.
Pic-grieche rousse, (fr.) schwarzoh	riaer <i>Re</i> untóbe	t S. 71
Picha, (ital.) Elster	_	II. 179
Picharouki, (amerif.) Krofodil	•	III. 59
Picicitli, (bras.) Saubenzeifig		II. 622
Pico, (ital.) Grecht	•	II. 219
Pictarne, (schottl) Meerschwalbe	•	II. 352
Picuipinima, (braf) Sperlingtaub		II. 512
Picus, Epecht	II. 21	8. <b>G.</b> 91
- aurantius, pomeraugenfarbig		II. 223
- auratus, Goldflügel	به ۱۴۰۵۰	II. 223
Danielanis Bancalistas &	inacht -	II. e25
— Bengalensis, Bengalischer Sp — Carolinus, Carolinischer Sp	echt —	11. 224
- Caronnes, encountaget Of	-	<b>5</b> . 92
- elegans, zierlicher Specht	whitant	II. 222
- erythrocepholus, fleiner Ro	, drobi	· S. 91
—— flavus, Gelbsecht	inedit —	II. 222
— hirundinaceus, Schmalben	bendi _	II. 22E
lineatus, gestreifter Specht		II. 226
- major, bunter Specht		IL 219
Martius, Fufelier		11. 227
- medius, meisser Specht	_	II, 227
- minor, Grasspecht		II. 222
- pafferinus, Sperlingspecht	_	II. 221
- pileatus, Saubenspecht	•	II. 220
principalis, Grenabier	₹ <b>~.</b>	ĮI, 226
— — pubelcens, Virginianischer	Stimi	II. 225
— — semirostris, Halbschnabel	<b>—</b>	-
- Senegalensis, Gebrücken	-	Ø. 91
ftriatus, geftreifter Epecht	•	<b>5.</b> 91
- tridactylus, brenfingeriger	Sheak	II. 229
- undatus, Rothbaden	_	II. 224
- varius, ichediger Grecht		IL 227
— — villosus, zottiger Specht	-	II. 226
viridis, Grunspecht	· 🕶	II. 224
Pidaks, (engl) Pholaden	•	VI. 210
Pie, (fr ) Elster -	•	II. 179
Pie, (fr ) Coldat	•	VI. 548
Piecostomus, Harnischsich	<b>.</b>	1V. 308
	Z 3	Pig-

			_	
			Th.	
Pickenier, (boll.) Langennadel		-	VI.	
Pierlerche, Alauda trivialis		•		519
Piera, (Papilio) Glassingel		-		582
Pierrot tacheté, (fr.) Caapsche	Taube	•		317
Piette, (fr.) weisse Lauchente		_		302
Piexe-pogador, Piexe-pioltho	, (port.	)Ganger	: IV.	из
Pig, (engl.) junges Schwein		•		461
Pigaza, (fran ) Elfter	•	-		179
Pigeon, (fr ) Caube	• '			4,6
Pigeon cuirassé, (fr.) Selmtaube	?	•		103
Pigeon des Indes, (fr ) Indiani	de Tur	teltaube	II.	505
Pigeon patu, (fr.) Federfuß		- '	II.	499
Pigghuarf, (schwed.) Platifisch		<del></del>	IV.	179
Pigg swin, (schweb.) Stachelsch	wein	•		311
Pignoletta, (venet.) Grundel		•	IV,	
Pike, Pikerell, (engl.) Secht	•	•	IV.	340
Pila marina, Geeball	•		VI2.	778
Pileus, (Madrepora) Reptunus	műße	•	VI2.	
Pilgrimemufchel, (Rammmufchel)	Ostrea	maxima	VΙ.	
Billentugel, (nagenber Rafer) By	rhus pi	lula		120
Billentafer, Soarabæus pilularis		•		70
Pillenwefpe, (Schmalbauch)	•	•	V2.	
Pilote-fish, (engl.) Lootemann	•	•	IV.	
Pilula, (Byrhus) Pillenfugel		•		120
Pimberah, (ceplon.) Brunctte		• '	III,	
Pimpelchen, (Stachelschnecke) M	urex hi	ppocast		- , ,
num	•		VI.	50\$
Pimpeltje, (holl.) Blaumeife		-		627
Pimpeltje, (boll.) fleines Pimpel	lden		VI.	
Pimpeltje, (boll ) Morgenftern	. /	•	VI.	
Pimpernugchen, (Golbhabuchen)	Chrys	mela st	1-	477
phylea	-			172
Pinçon, (fr.) Fint	-	II.	579.	
Pinelmeife, (Blaumeife) -		•		627
Piniperda, (Dermestes) Balbad	rtner		V.	•
Pinirolo, (ital ) punftirter Stran		•	II.	
Pink, (engl.) Elrige	•		IV.	
Pink, (engl.) Geegrundel	٠	,	IV.	
•	-		_	ma

Pinna	Pipra	319
Pinna, Stedmufchel	•	Eh. S. VI. 340
digitiformis, Fingerschinke	_	VL 344
- lobata, Lappenschinke		VI. 344
- muricata, Beftphalifcher @	Schinle	VI. 342
nobilis, ebler Schinke	•	VI. 342
- pellinata, geraucherter Sd	binfe	VI. 341
- rotundata, runber Schinke	•	VL 343
rudis, rober Schinke	. •	VI. 34E
faccata, Cacfcbinte	· •	VI. 344
Pinnotheres, (Cancer) Stedmufe	belmådter 🐪	V2. 1102
Pinfel, (Meerschwalbe) Sterna fto	lida -	II. 35 t
Binfelgallert Vorticella conglom	erata	VI2. 870
Pinselgallert. Vortice la conglom Pinselfocher, Tubularia pennicille	ıs -	VI2. 820
Punjelmoos, Corallina pennicillus	<b>-</b>	VI2. 829
Pinselschwang, (Nachtschm.) Phala	na Julia	<b>5</b> . 310
Pintacilgo, (fpan.) Diftelfint	•	II. 582
Pintados, (port.) Caapfche Caube	· •	IL, 317
Pinthæus, (Papilio) Echwarz unt	weiß -	V. 596
Pinus, (Certhia) Blauflügel	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	II. 258
Pioio. (span.) Laus	•	V2. 1026
Piota, (ital.) Rothfloffer -	•	IV. 392
Pipa, (Rana) Curinamifche Rrote	•	III. 48
Pipal, (amerit.) Curinamifche Rro	te -	III. 48
Pipenlaus, Pediculus meleagridis		V2. 1036
Piper, (engl.) Pfeifer -	•	IV. 273
Pipistrella, (stal.) Flebermaus	· ,=	I. 150
Pipit, Surinamifche Bachftelge	•	II. 617
Pipizton, (neufpan.) Seibenfchma	nj -	II. 542
Pipleis, (Papilio) Siebenauge	77	V. 607
Pipra, Zeifig	• II. 62	
—— albifrons, Beigbusch		II. 622
- aureola, Rothtopf	<b>-</b> _	II. 623 II. 623
- cristata, Saubenzeisig - erythrocephala, Gelbtopf	_	II. 622
- gutturalis, Beigfehlchen	_	II. 623
- leucocephala, Beißfopf	<u> </u>	IL 623
— leucocilla, Rohrzeisig	<del></del>	II. 623
- melanocephala, Schwarzfo	nf -	<b>5.</b> 177
Z		Pipra,

~. <i>.</i>	•		•	
			,	£6. G.
Pipra mi	nuta, Zwerg	zeifig		11, 624
p	reola, Mei	enzeifig	. •	II. 62 t
	umata, Rotl		, •	<b>E</b> . 177
	betra, Gelb		•	II. 622
	bra, rother		•	S. 177
ru	picola, Etc	inicilla		II. 621
fe	rena, Luftlir	19	•	II. 624
Piques,	(fr ) amerifo	mifche Canb	flóbe	V2, 1042
Piquiting	a, (bras.) E	conerffico	•	IV. 342
	, (braf.) 30		•	III. 297
	, (braf.) flie		71 -	
			hus Niloticu	
	fnotige, Tro			VI. 527
Viramibe	nschnecken, (		_ :	VI. 362
	nwurm, Clic		ta •	VI. 110
Pira Pira	nga, (braf.)	Jatob Ever	rtefisch	IV. 237
	a, (braf.) @		_	1V, 114
	Papilio) Bla		-	V. 632
	, (Papilio)		-	V. 626
Pirolus,		-	•	1. 355
	le, Gracula	Barita	• ,	II. 194
	offel, Oriolu		- ·	II. 189
	(Pelecanus		-	IL 331
	, (Rana) D		•	III, 280
	atilaginei, (		Amphibien	III. 228
	ondropteri		•	III, 236
	ani, Plattfif		-	IV. 147
Piscis, &		•		IV. 2
Piscis gu	tturolus, Di	icthals .	•	IV. 103
Piscis, (1	Rana) Meer	frest)	· 🚗 -	III. 280
Piscis tri	angularis, I	drenect, (Be	infisch)	IIL, 306
	(engl ) Ame		•	V2. 908
Pifor, (F	Bruchus) Er	bsenfresser	-	V. 206
	(bon.) Uffe			· VI. 403
Pissebed,	(boll.) Affe	lschnecke	-	VI. 483
Pissebed,	(hon.) Ken	erassel		V2. 1183
Pistacien	laus, Aphis	pistaciæ	•	V. 519
Pitangua	, (Reuntober	r) Lanius P	itangua	II. 115
			-	Pitant

- Pitaut	Platura	361
		Th. €.
Pitaut, (fr.) Pholade	•••	VI, 210
Pithekos, Pithex, (griech.) Affe	<b>:</b> -	1, 118
Pithiornus, (Emberiza) Sperli	ingsburgel	<b>E.</b> 156
Pitvissch, (boll ) Seedrache	•	IV. 70
Piula, (catalon.) Pfeifente	<b>+</b>	II, 294
Pivoine, (fr.) Thumpfaffe	•	II. 547
Pizamolche, (ital.) Grasmude	, •	11. 605
Pizzardella, (ital ) Beerschnepf	ė . <u>–</u>	II. 397
Placenta, (Echinus) Seefuchen	. •	VI. 154
Placomus, (Gorgonia) Seebeid	efraut -	W2. 754
Plagiuri, Plattichmange vber Be	ufische –	IV, 3
Plagiusa, (Pleuronectes) Car		:Bi
schwimmer	-	IV, 148
Plaife, (engl ) Platteis	•	IV. 153
Plakker, (boll.) Rohlmeise	<del></del>	II. 626
Plancus, Kormoran	<b>→</b>	II. 328
Plapperer, (fleine Doble) Graci	ula religiosa	Il. 193
Platalea, Löffler -	•	II, 361
- ajaja, rother brafilianifd	her Löffler	II. 362
leucorodia, meisser Loff	ler 🗕	II, 361
pygmea, Zwergloffler	_	II. 362
Platessa, (Pleuronectes) Platte	is •	IV. 153
Plattbauch, (Jungfer) Libellula	depressa	V2, 768
Plattbauch, (Tobengraber) Sylp	ha depressa	V. 132
Plattbruft, (Meeltafer) Tenebi	io depressus,	V. 371
Platteie, Pleuronectes Platessa	-	IV. 153
Plaitsisch, bandirter, Pleuronell	es lineatus	IV158
Plattfuß, (Meeltafer) Tenebrio	tibialis	V. 376
Plattfuß, (Metreichel) Lepas p	almipes	S. 358
Plattborn, (hirschbod) Antilop		G. 54
Plattruden, (Bodfafer) Ceram	byx depressus	V, 262
Planruden, (Rugeltafer) Curci		V. 230
Plattruden, (Bielfuß) Julus cor	nplanatus	V2. 1164
Plattschild, (Bockfafer) Ceramb	yx planatus	V- 258
Platischild, (Erdfafer) Carabus	complanatus	V. 359
Plattschwanz, (Malschlange) Ang	uis Platura	III, 216
Plattviffchen, (holl ) Geitenfchr		IV. 147
Platura, (Anguis) Plattschwanz	-	III. 216
	Z 5	Pla-
1		-

•	₹ħ. €.
Platyrhynchos, (griech.) Loffelente, Breitfchnabe	[11. 290, 293
Platzydige Telline, (holl) Milchschaale	VL 237
Plauberer, (Papagen) Plittacus garrulus	IL 141
Plautus albatros, Ungewittervogel -	II. 315
Plagregenschnede, (Raferschnede) -	VL 162
Plebeji rurales, (Papiliones) Bauernvogel	V. 622
Plebeji urbicolæ, (Papiliones) Burgervogel	V. 630
Plecostomus, (Loricaria) Rungelmaul -	IV. 308
Pleuroneftes, (Ostrea) Kompasmuschel	VI, 304
Pleuroneftes, Seitenschwimmer -	IV. 147
- cynoglossis, Dundstunge	IV. 151
- dentatus, Paasenmaul -	IV. 189
- felus, Flunder -	IV. 155
- hippoglossus, Deisigbutte	IV. 149
- lineatus, banbirter Plattfifch	IV. 158
- lunatus, Sichelschwanz -	IV. 161
- maximus, Steinbutte -	IV. 160
- ocellatus, Surinamischer Seitenschi	vin:
mer -	IV. 149
- papillosus, Warzenflunder	IV. 161
- trychodactylus, Amboinischer Sei	iteno
fcwimmer -	IV. 148
Plevier, (fr.) Regenpfeifer - 11	[. 417. 416
Plexippus, (Papilio) Breitader -	V. 597
Plica, (Lacerta) Faltenträger -	III. 107
Plica, (Oftrea) Jagermantel -	VI. 306
Plongeon, (fr.) Taucher	II. 338
Plotus, Langhals	IL 333
Plotus, Berkehrtschnabel -	11. 315
Plover, (engl.) Regenpfeifer -	II. 419
Ploge, (Rasenfisch)	IV. 304
Pluiero, (bologn.) Regenschnepf	II: 399
Pluma, (Sertularia) Buschforalline	VI2, 841
Plume, (fr.) Bischofsmüße -	VL 431
Plumipes, (Apis) Feberhummel —	<b>€</b> , 329
Pluvialis major, Regenschnepf	IL 399
Pluvine, (fr.) Feuerfalamander -	III. 118
Plye, (fr.) Platteis =	IV. 113
	Pochard,

Pochard	Poisson	363
•		₹6. E.
Pochard, (engl.) Rethhals	-	II. 296
Poche, (fr.) Löffler	_	II. 361'
Podenruden, (hornfifd) Baliftes	papillolus	III. 298
Poctenwange, Cimex variolofus	-	V. 489
Podagra-Kreeft, (bell ) Podagr	aschnecke	VL 478
Podagrafdnecke, (Flugelfcnecke)	Strombus sco	) <b>r-</b>
pius	•	VI. 477
Podalirius, (Papilio) Segelvogel		V. 577
Podex marinus esculentus, Austo		VI. 88
Podobe, (Rrammeisvogel) Turdu		<b>E</b> . 145
Podura, Pflauzenflob -		17. 8. 339
ambulans, Spagierer	~~	V2, 1021
aquatica, Baffertretter	_	V2. 1020
arborea, Baumlaufer	-	V2. 1019
atra, Erdfioh	-	V2. 1018
cincta, Gurtelflob	_	V2. 1020
fimetaria, Diftgraber	-	V2. 1021
helvola, Eplinderfloh		€. 33 <b>9</b>
minuta, Sandfornchen		V2, 1019
nivalis, Concelaufer		V2. 1019
plumbea, Baumfioh	, -	V2. 1018
polypoda, Bielfuß	~	V2. 1018
- pusilla, Verschwinder		V2. 1020
vaga, Beiggabel	-	V2. 1019
villosa, Zotenbalg	•	V2. 1020
virldis, Grünling		V2. 1017
Pobelstiege, Musca plebeja		V2. 950
Pobelfafer, (Erbtafer) Carabus v	ulgaris	V. 362
Potelbering, Clupea Harengus	•	IV. 363
Poetsemaaker, (boll ) Rrabbenfpi	nne -	V2. 1085
Poffer, (boll.) blaffes Ruchenduble	et	VI. 297
Poffer, (boll ) Tortlein	_	VI. 298
Poignastre, (fr.) Petermannchen	-	IV. 76
Poikilis, (griech) Elfter	<b>-</b>	II. 179
Poil, (fr.) Saubentonig	<b>É</b>	II. 620
Poisson, (fr.) Fisch	•	IV.
Poisson - coq, (fr.) Seehahn		III. 277
Poisson d'or, (fr.) Chineficher &	oldfild	IV. 386
	• • • <del>•</del>	Poisson

1	Th. S.
Poisson volant, (fr.) fliegender Fisch -	IV. 278
Polarente, Colymbus arkticus	II. 339
Polecat, (engl.) Itis -	I. 269
Polirer, (Raubkafer) Staphylinus piceus	V. 394
Polirstiege, Musca polita -	V2. 973
Polirflugel, (Rachtschm.) Phalæna farinalis	V. 732
Politzahn, Dentalium politum	VI. 620
Pollachias, (Gadus) Pollat	IV. 93
Pollat, (Rabeljau) Gadus Pollachias -	IV. 93
Polnische Muße, (unachtes attalisches Rleib)	VI, 453
Polnischer Sammer, (Rammuschel) Oftrea Malle	us VI. 312
Polnischer Sattel, (Kammuschel) Oftrea Eph	ip-
pium -	VL 315
Polnisches Messer, (Scheibe) Solen Cultellus	VI. 228
Polnischternerschild, (Schildlaus) Coccus Polo	m-
cus -	V. 534
Polpo, (ital) Achtfuß —	VI. 113
Polybe, (Papilio) grune Ceibe -	V. 622
Polychloros, (Papilio) große Aurelia -	V. 609
Polycletus, (Papilio) Gilberrunft -	V. 632
Polydamas, (Papilio) Pscilband -	V. 569
Polydorus, (Papilio) Kleinschwang -	V. 568
Polygraphus, (Dermestes) Zeichner -	V. 104
Polymena, (Sphinx) Gelbsteck -	V. 646
Polymna, (Perca) weißbanbirter Barich	IV. 233
Polymnia, (Papilio) Pomerangenflugel -	V. 583
Polynemus, Fingerfisch —	IV, 357
- Paradileus, Parabicefisch -	IV. 359
- quinquarius, Funffingerfisch -	IV. 358
- Virginicus, Birginischer Fingerfisch	IV. 359
Polydon, (Phalmena) Bicliahn -	V. 698
Polippe, Zoophyta; Hydra -	VI2. 881
- blaffe, Hydra pallens	VI2. 890
- gelbe, Hydra grisea -	VI2. 889
- grune, Hydra viridis -	VI2, 882
Polypen find Pflanzen -	VI2. 952
Polypen, was sie sind ?	VI2. 946
Polypes a bouquets, (fr.) Buschelpolypen	VI2. 868
	Polv-

Th.	€.
72. i	
	307
VÍ2.	819
VI2.	
$V_{\bullet}$	567
	263
	604
	629
JV.	116
$V_{\bullet}$	583
<b>6</b> .	
VI.	465
<b>ල</b> ,	14[
V.	737
<b>. G.</b>	80
	593
	159
	541
V.	322
VI.	353
VI.	347
	140
. I,	269
VI.	228
VI.	313
VI.	316
IV.	277
VL.	113
11,	311
٧٠	13
VI.	591
į.	461
	Z.S. VILV. V. V. S. V. S. V. S. I. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V.

orc- epic, (fr.) Stachelschmein orcelet, (fr.) Relleraffel

orcelet des Indes, (fr.) brafilianifches Kaninchen

V2. 1152

1. 325

365

<b>3</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3 1-1-1-1-1	
•		Eb. E.
Porcellaines, (fr.) Porzellanen	•	VI. 385
Porcellana montola, Caapichnede	•	VL 384
Porcelleti, (ital.) Relleraffel	•	V2. 1152
Porcellus, (Mus) Meerschweinchen	n –	L 334
Porcellus, (Sphinx) Schweinssch	nauße	V. 641
Porco, (ital.) Edwein		L 461
Porco spinolo, (ital.) Stachelichte	ein -	I, 311
Porcopine, (engl.) Stachelichwein	-	L 311
Porcus, Schwein -		- L 461
Porcus, (Scorpæna) Dornfcwein	-	IV. 139
Poreus, (Sus) Guineifches Comei	m . —	I. 465
Porites, (Madrepora) Doderfora	Ae .	VI2. 696
Porphyrbattel, offinbifche, (turtifche	es lager)	VI. 419
Porphyrio freti Hudionis, Carolin	nische Ralle	IL 439
Porphyrio, (Fulica) Sultan	٠ 🚙	11. 428
Porpita, (Madrepora) Pfenningfe	oralle	VI2. 675
Porpo, (genues.) Achtfuß		VI. 113
Porsellein-Hoorens, (boll.) Porje	Uanen .	VI. 386
Porsellein - Hoorn, (boll.) Ep	-	VL 404
Porshoeft, (boll ) Donnerfrote	-	IV. 137
Porte - corne, (fr.) Rasenhorn	-	1. 469
Mortobellodattel, (türkisches Lager)	-	VL 418
Phalena!	Narbonea	V. 684
Portnaiest, (Raubfliege) Afilus Lu	litanicus	V2, 1006
Porus matronalis, Sternforalle, Bu	nsentorall V	l2,672.694
Porzana, (Rallus) fleine Bafferrall	ie —	II. 437
Porzana, (venet.) Bafferralle ,	*	II. 437
Porzellanblafe, Bulla cypræa	•	VI. 413
Porzellane, Cyprea -		5. 6. 323
- Carthagenische, Cypren N	Tus -	VL 394
- mit breitem Saum	•	VI. 398
- mit einem Rabel		96. <b>G.</b> 373
- mit Windungen	- VI.3	37. C. 378
- ohne Windungen		VI. 393
Porzellantrabbe, (Breitfuß)	-	V2. 1106
Porzellanschnecken, umgekehrte	-	VI. 386
Pos, Posch, Poschje, Post, (6011.)	<b>Xaulbaric</b>	IV. 24
Posaune, (Robrenschwamm)	<b>⇔</b> .	VI2. 74
Ŧ		Doffen

	0-L &
Michia hook cond \ Darnisch	<b>26.</b> €.
Prickle-back, (engl.) Dornfisch - Prickle-fish, (engl.) Kornahrenfisch -	IV. 254
Prickle-using (engl.) Southoom	IV. 349
Prickly Dog, (engl.) Dornhaap	III. 253
Priguire, (port. und span.) Faulthier	1. 178
Prik, (holl.) Pride	IH. 229
Prikstaart, (boll.) Pflockschwang	III. 307
Prill, (engl.) Biereck (Ceitenschwimmer)	IV. 159
Primates, Menfchendbnliche Gefcopfe -	1. 61
Princeps, (Conus) Morilie	VL 369
Prins Roberts Knoop, (boll.) Pharaufchnede	VI. 529
Prinfe-vlag, (holl.) Staatenfahne, Pringenfahne V	1,409,413
Print, (engl.) Meetlerche	. II. 413
Pringenfahne, (Blafe) Bulla virginea -	VI. 413
Pristis, (Squalus) Gagefisch .	.111. 273
Procellaria, Sturmvogel -	II. 314
- mouinoctialis, Wetterrabe -	II. 316
- Capensis, Landjeiger -	11. 316
- fregatta, Segler -	II. 315
_ glacialis, Geepferd .	II. 316
- Pelagica, Ungewittervogel -	II. 31¢
Progne, (Papilio) Backenflugel	E. 204
Prorfa, (Papilio) Reffelpapillon -	V. 617
Profcarabæus, (Meloë) 3witterfafet -	V. 379
Prolimia fusca, Mongus -	<b>6</b> . 12
Protesilaus, (Papilio) Bittwe von Peru	V. 577
Protheus, (Chaos) Unbestand	V12, 920
Protheus, (Papilio) Benfterfied .	V. 630
Protumnus, (Papilio) Comutter -	V. 630
Prox, (griech) Damhirsch -	1. 399
Proyer, (Fringilla) melirter Finte	6. 164
Prunell, (fr.) Grasmude -	IL 604
Mf, griechisches (Rachtschm.) Phalæna Psi	V. 699
Pfalidostomus, (griech.) Schildhecht -	IV. 337
Pfar, Pfaros, (griech.) Staar -	11. 523
Psenes, (Cynips) Feigenstecher	V2. 817
Ph. (Phalena) griechisches Ps	V. 690
Pfittacus, (Coriphoena) Papagenfis	IV. 123
Plittacus, Papagen — 11. 12	
- mreamy handah	Plitta

		Pfittacus			369
		,		Tb.	5
Pfitt	acu	saccipitrinus, Braunfopf			147
-		æruginofus, Braunteble	-	II.	137
_		æftivus, bunter Amajon	•	IL.	144
~		agilis, Cajennischer Partit	-	II.	
-		albus, weiffer Rafatu	-	€.	76
-	-	Alexandri, Kragenpapagep	-	IL.	133
	<u> </u>	Amazonicus, Guricamifcher Pap	agen	IL.	145
_			agen	IL	131
-		arauliacus, Pomeranjenbals		S.	79
_		aurantius, Pomerangenschnabel		S.	89
_	<del></del>	autumnalis, Amerifanischer Papa	gey	IL	146
-	-	borneus, rother Parfit	_	11.	131
-	_	brachyurus, Kursschwanz	_	IL.	139
-	_		300 1		146
	_	Cajaneus, Cajennischer Papagen	•	S.	78
-	_	Cajanus, Cajennischer Partit	-	S.	81
_	-	canicularis, Rothtopf	7	IL	136
-	_	Capensis, Blaurand	-	S.	80
-		Carolinensis, Gelbfopf	-	5.	74
-	_	Carolinentis, gruner Carolinifcher	Pacfis	П.	132
_	-	Chinenlis, Chinesischer Rafatu	•	5.	77
-	-	chrysopterus, Goldflügel	<b>—</b> ,	II.	149
_		coeruleocephalus, Blantopf	•	11.	143
-	-	collarius, Rothkragen		II.	148
_	$\overline{}$	Functing in the	_	II.	139
_	_	cristatus, Kafatu -	_	11.	139
_	_	cyanocephalus, Blaufopf	-		13E
-	_		,		140
-	-	erythroleucus, Rothschwanz	•	II.	140
_	_	fasciatus, Weißtopf	-	€.	74
_	_	ferrugineus, Rostbauch	•	€.	75
_	-	festivus, Festvogel	-	11.	145
		fuscus, brauner Papagey	•	G.	78
	_	galgulus, Sangvogel -	-	11.	149
-		garrulus, Plauberer -		II.	14E
<u> </u>		Guineensis, Guineischer Parkit	•	Ģ.	81
			-	€.	79
		hæmatodus, Blutpapagen	•	♥.	73
		A a		1	Pfit-

		:	Th.	Ğ,
Pfitt	acus	hæmaturopygius, Rotharschfakatu	G.	77
	_	Japonicus, Japanischer Papagen	II.	131
	_	inguinatus, ichmutiger Parfit -	ල.	79
-		jugularis, Gelbkehl -	Ç.	80
		leucocephalus, Weißtopf -		143
		leucophthalmus, Weißauge -	S.	75
	_	lineatus, linirter Papagen -	ල.	73
	_	Lucionensis, Philippinischer Papagen	II.	144
	_	macrourus, Langichwang -	11.	126
		macrourus minor, fleiner Langschwang	II.	130
		maculatus, geflectter Partit -	G.	74
		marginatus, Gelbrandpapagen	<b>S</b> .	
	_	Mascarius, Mascarin -	€.	76
		melanocephalus, Merifanischer Coman	<b>.</b>	
		topf –		148
-	نــ	menstruus, Blauhals -		147
		militaris, gruner Dufar		127
-	<del></del>	niger, schwarzer Papagen -		143
		nobilis, Amazonischer Papaget -		129
		notatus, Korallenhals -	Œ.	
		obscurus, brauner Papagen -		128
<u></u>				137
		Paradili, gelber Papagen -		145
		pafferinus, Sperlingpartit -		150
		pettoralis, icheckiger Papagen	<b>©</b> .	
	<u></u>	pertinax, Gelbschnabel		135
-		Peruvianus, Langichwanz	E.	80
	_	Philippensis, Graurand -	Ø.	
	<u> </u>	pilus, gemablter Partit -	<b>©</b> .	
	<del></del>	pullarius, Zwergpapagen —		149
-	<u> </u>	purpureus, Purpurfopf -		
		roratus, Thaufakatu —	ල.	77
		rufirostris, Rothschnabel -		137
<del></del>		Sancti Thomæ, S. Thomasparfit	€.	
		Senegallus, Genegalischer Papagen		149
		feverus, gruner Brafilianifder Papagen	II.	130
-		folftitialis, gelber Angolischer Partit	· II.	
-		fordidus, grauer Papagen -		148
	-	•	P	litta-

Pfittacus	Pugione	371
,	r oblone	
Pfittacus varius, bunter Parfit		Th. S.
— ventralis, Rothbauchpa	•	<b>€.</b> 79
- versicolor, bunter Papa	pagey -	<b>©</b> . 79
- verticolorus, Buntschwa	gry -	<b>©</b> . 78
Psophia, Anarrhubn		S. 75
crepitans, Farzer		II. 440
Pfora, (Oniscus) Seemange		II. 440
Pfura, (griech.) Laus	-	V2. 1148 V2. 1026
Plyche, (griech.) Schmetterling		V. 555
Psyllos, (griech) Floh		V2. 1040
Ptak bitny, (poln.) Kampfhahn	-	II. 404
Ptarmigan, (ichottl ) Schneehuhn		II. 482
Ptinus, Bobrkafer	-	V. 111
- germanus, Rungelbobrer	-	V. 113
- imperialis, Abler	-	V, 112
- mollis, Beichschild	_	V. 112
pectinicornis, Feberfamm		V. 111
- pertinax, holibobrer	<b>-</b> ,	V. 112
Puant, (fr.) Balbrage	_	I, 292
Puce, (fr.) Flob -		V2. 1040
Pucellages, (fr.) Porzellanen	-	VI 385
Pucerons, (fr.) Pflanzenläuse	7	V. 508
Puckel, (Rinkhorn) Buccinum gib	bolum	VI. 459
Puctelfafer, Scarabæus Mimas	<del>-</del>	V. 62
Puckelmespe, (holzwespe) Sirex C	amelus	V2. 839
Puddingfish, (engl.) Etralauge	•	IV. 191
Budel, (hund) Canis aquaticus		I. 208
Puderfafer, (Rußelfafer) Curculie	o icaber	V. 221
Budersalm, Salmo pulverulentus	•	IV. 331
Puella, (Libellula) Sumpfannich	e —	V2. 774
Puerco, (span.) Schwein		I. 461
Pueroo espin, (span.) Stachelsch	wein -	I.\311
Puerpera, (Venus) Rindbetterin	Auin Banna	<b>E.</b> 363
Puffin, (engl.) Seepapagen, Pen ran -		
Puffinus, (Procellaria) Sturmverl	11. 311. Fûndiger	320. 328 II. 317
ugillator, (Ichneumon) Kechter		V2. \$56
Pugione, (Sphinx) S. Thomassa	5metterlina	· V. 647
	) a 2	Pui-
,	1 m 🐐	T ale

	Th.	€.
Puikilus, (griech.) Diftelfint -	II.	582
Puimiteen, (boll.) Bimfenftein -	VI2.	
Puppchen, (Schnirfelschnede) Helix Pupa	VI.	579
Puppchen, (Bange) Cimex minutus -	V.	492
Puppchennerite, Nerita Pupa -	VI.	591
Puir, (norm.) Bastardmatrele	IV.	264
Puit-aal, (holl.) Erufche, Malruppe -	IV.	
Pulce, (ital.) Flob -	V2. 1	040
Puleront, (Comimmschnede) Nerita Peloronta	VI.	592
Pulex, (Cancer) Seeflob	V2. 1	
Pulex, (Insectum) Floh -	V2. 1	040
- irritans, Rachtwecker -	V2. 1	040
penetrans, Sandfloh _ \	V2. 1	043
Pulex, (Monoculus) Wasserston -	V2. 1	
Pulgas, (han.) Floh	V2. 1	040
Pullus, (Turbo) Bockspiecke -	VI.	542
Pulmo marinus, Qualle	VI.	
Pulpo, (span ) Achtfuß —	VI.	113
Pultok, (engl.) Dubnerbieb -	II.	72
Dunaise, (fr.) Wanie -	V.	477
Punaise à ailerons, (fr.) Saumwanze -		485
Punata. (bras.) Kammlerche		101
Dunktator, (Ichneumon) Bohrer -	V2.	
Punchum album, (Tenthredo) Weikpunkt	V2.	
Dunger. (engl.) gemeiner Laschenkrebs	V2. 1	
ounte (Rhhrenschiede) Serpula planordis	VI.	
dunft genierter. (Nachtschm.) Phalæna ablynthi	i V.	690
ountehanh (Machtichm.) Phalæna bella	V.	736
Munfthand. (Machtichm.) Phalæna necta		679
Muntiband, (Sagiom.) Papillo pruni		623
Munftbod, (Bodfafer) Cerambyx punctatus		240
dunfegügel. (Nachtschm) Phalæna porata	V.	712
Munftffügel. (Machtschm.) Phalæna punctella	V.	743
Munfthabnchen, Chrysomela decempunetata		174
Bunktirer, (Springkafer) Llater aterrimus		321
Hunktirer, (Lagichm.) Papilio Pirithous		626
Punttirfdild, (Rafermufchel) Chiton punctatus	VI.	
Punftfafer, Scarabæus punctatus -		87
,	勒	ınft

Aa3

Purpurameife, Formica hæmatoda

V2. 916

	Tb.	€.
Purpurbrachsem, Sparus Synagris -	IV.	
Purpurdrossel, Oriolus Phoeniceus -	II.	187
Purpurfint, Fringilla Maja -		592
Durpurflect, (Rafer) Scarabæus plagiatus	V.	91
Purpurflect, (Schi diafer Cassida purpurca		139
Purpurflugel, (Tagschm.) Papilio maturna	V.	618
Purpurglanz, (Rachtschm.) Phalæna lucipara		702
Purpurhals, (Nachtschm.) Phalæna rubricollis		645
Purpurhoorn, (holl.) Krausschnecke -	VI.	
Purpurteblchen, (Merle) Tanagra gularis		576
Purpurtehle, (Fliegenfanger) Muscicapa purpi		
rata —		169
Purpurforf, (Papagen) Plittacus purpureus	S.	
Aurrurkopf, (Rabe) Corvus cinereus -	●.	
Purpurforalline, Sertularia purpurea	VI2.	
Purpurling, (Nachtschm.) Phalæna purpuraria	V.	710
Purpurmantel, (Nachischm.) Phalæna purpural	lis V.	735
Purrurmaulmurf, Talpa virginea -	S.	-
Purpurnatter, Coluber Tyria -		198
Purpurreiber, Ardea purpurea		378
Purpurschild, (Holsbod) Leptura rubra		285
Purpurschwalbe, Hirundo purpurea -		633
Purpur Connenftral, (blauer Connenftral)	VI.	
Purpurstrich, (Rachtschm.) Phalæna vibicaria		704
Purpurstrich, (Schnirkelschnecke) Helix Leucas	VI.	
Purpurvogel, (Krammetevogel) l'urdus purpurei		143
Pula, (gront.) Robbe, Seebund -		169
Pusio, (Curculio) 3mergrußel -		229
Pusio, (Murex) Gnemonschnede -		516
Pulio, (Oftrea) Mantelchen -	VI,	•
Pustula, (Patella) Blatter -	VI.	
Putois, (fr.) Iliis —		269
Putter, (boll.) Diftelfink -	- II.	
Puzolo, (ital.) Itis -		269
Pygargus, Bejoardbod —		416
Pygargus, Kischgener -	II.	
Pygmæa, (Papilio) auslandischer 3wers		289
Pygmæus, (Hister) Zwerg -		116 256.
		yg-

D.	rm 90116	Ourser	ro 646
Гу	gmæus	Quaperv	2 375
			Th. S.
Pygmæus, (Mo	fchus) Guineis	des Reh	I. 403
Pygmæus, (Sire			V2. 840
Pvl fnock, (bo	a.) Pfeilhecht	<b>-</b> ·	IV. 336
Pylitaart, (holl.	) Pfeilschwanz,		III. 247
Pylitaart, (boll.)	) Pfeilschwanz,	(Schmetterlin	g) V. 634
Pylftaart, (boll.	) Pfeilschwang,	(Lauchente)	II. 30 <b>6</b>
Pypdiertje, (bo	al) Robrenpoli	ppe –	VI. 635
Pyp-gewas, (b)	oll) Sectocher	•	VI2. 814
— — gen	aveld, (holl.)!	Rabeltócher	VI2. 819
Pypkokers, (ho	al.) Meerzähnch	en —	VI. 618
Pypkoraal, (bol	4) Róhrentora	Ae —	VI2. 667
— — geke	ttingd, Rettenfe	oralle -	VI2. 669
- gevle	ugeld, Flosseni	millepore	VI2. 717
Pypkorallyn, (	holl.) Geetocher		VI2. 814
Pyp-spons, (be	II.) Robrenschi	vanım -	VI2. 796
Pyranthe, (Papi			V. 592
Pyrene, (Papili		<b>+</b>	V. 590
Pyrrhus, (Papi		oans -	V. 573
Pyrum, (Mure:		-	VI. 504.
Pyrum, (Voluta	2) Birnwalze	•	VL 436
	వి.	,	
O 131 (m.			TT
Quachilton, (mo			II. 220
Quacter, (Benu		is erycina	VI. 269
Quaderente, An		-	II. 292
Quadfrote, Ran			III. 50
Quadreiber, Ar			II. 377
Quadrille, (fr.)		·	V. 223
Quadrupes, (A			III. 209
Quaglia, (ital.)			II. 492
Quail, (engl.)	wantel Britishmant	(Tauka)	II. 492
Quaker, (engl.)		(Sunot) =	II. 501
Qual, (norm.) &	coaupia	 64666	I. 480
Quale- sey, (nor	iv.) gruner Ga	yeifilay	IV. 91
Qualle, Medusa		VI, I	20, 8. 356
Quallenboot, (@			
Quaperva, (ame	•		IV. 175 Ouaploës
	Aa	4	<b>√</b> uabio <b>e</b> )

	Th. 6.
Quaploë, (ban.) Langstoffe -	III. 332
Quartfliege, Musca putris -	V. 972
Quatotomomi, (mexif.) Specht -	II. 220
Quattr'ochi, (ital.) Quadenten -	IL 292
Quauch techallotl thiltic, (amerif.) schwarzes Ein	<u> </u>
børn	I. 356
Quaucoyamatl, (mer.) Museusschwein -	I. 465
Quauthzonecolin, (mer.) Bachtel -	II. 491
Quedgrashahnden, Chrysomela polygoni	V. 172
Quedfilber, (Rachtschm) Phalæna Mercurella	V. 746
Queeft, (engl.) Ringtaube -	II. 506
Quela, (Emberiza) Indianischer Unmer	II. 564
Quenotte, (fr.) Blutzabu -	VI. 191
Querband, (Tagichm.) Papilio Trite -	V. 592
Querbein, (Rachtschm) Phalæna pedella	V. 750
Quered, (Tagichm.) Papilio Leda -	V. 605
Querfleck, (Nachtschm.) Phalæna Pellex	V. 684
Querfled, (Machtschm.) Phalmna Uddomannian	
Querlinie, (Bange) Cimex Lincola -	V. 490
Quermufchel, (Gienmufchel) Chama cordata	VI. 238
Querftrich, (Solsbod) Leptura detrita	V. 289
Querftrich, (Baffertafer) Dytiscus ftriatus	V. 348
Querftrichmufchel, (Diesmuschel) Mytilus discors	VL 338
Querwelle, (Tagfchm.) Papilio Philocles	V. 627
Querwelle, (Baffermange) Notonetta ftriata	V. 469
Quetele, Congoifch Perlhubn -	II. 476
Quici, (surin.) Gelbband -	V. 264
Quil, Quispele, Ceilonischer Fuchs -	I. 245
Quinson, (fr.) Buchfint	II. 580
Quiriz20, (jamaik.) Pauwis -	IL 465
Quoya Voran, Brafillanischer Affe -	I, 114
N.	
Raadiur, (ban. und fcwed.) Rebe -	1 401
Raaf, (boll.) Rabe	I, 401 II, 168
Raap, getakte, (gedoornde) Raap, (holl.) Rube	VI. 513
Rabaforcado, (port.) Fregatvogel	II. 328
Rabbet, (engl.) Raninchen	I. 322
	Rabe,
	_ • • • •

		ŞH.	6.
Rauber, Tartarifcher, (Raubtafer)			π.
Tataricus			261
Rauberhahnchen, (Raubkafer) Staphy	linus Chry	•	
fomelinus	-		394
Rauberriefe, (Raubfliege) Afilus barb	arus 7	/2. 1	
Rage . Kniv, (ban) Scheermefferfisch	•	IV.	122
Raja mucosa, (ital) Spismaul	•	M.	243
Raja, Roche -	-	III.	236
- clavata, Ragelroche	-	III.	248
- fullonica, Walterroche	•	III.	245
- pastinaca, Pfeilschwang	<del>.</del>	III.	246
Rail, (engl.) Ralle -		II.	435
Rain - deer, (engl.) Rennthier	•	_	395
Raine, (fr.) Laubfrosch	-	III.	69
Rain-fowl, (engl.) Grunfpect	<b>—</b> .	II.	225
Rale, Rasle, (fr.) Ralle	. II.	£35.	
Raffe, Rallus -	II. 435.		
- bandirte, Rallus Philippensis			438
- Bengalische, Rallus Bengalensis		II.	
- braune, Rallus fuscus	=	IL,	437
- Caapsche, Rallus Capensis	-	S.	
- Carolinische, Rallus Carolinus	•	П.	439
- geftreifte, Rallus ftriatus	-	II.	
- grune, Rallus viridis	-	<b>S</b> .	
- Birginische, Rallus Virginianus	•	II.	439
Rallus, Ralle -	ĮĮ. 435.		
- aquaticus, große Wafferralle	_	II.	
- Bengalensis, Bengalische Ralle	•	II.	
- Capensis, Caapsche Ralle	-	<b>S</b> .	
Carolinus, Carolinische Ralle		IL.	439
- fuscus, braune Ralle	-	II.	
— — Philippensis, bandirte Ralle	-	II.	438
- ftriatus, gestreifte Ralle		II.	
— — torquatus, Ringelralle	-	IL.	
- Wirginianus, Bieginische Ralle		II. 4	
— — viridis, grune Ralle	_	<b>E.</b> 1	20
Ram, (engl.) Widder -		1. 4	<b>2</b> E
Ram, (holl) Bidder -		I. 4	
		1	12-

_	2.D. 🖯
Rana, (Murex) Krotenschnecke -	VI. 50
Ranatra, horn, (Cifade)	V. 450
Ranatræ saltatoriæ, Springer -	V. 46
Randsted, (Goldhahnchen) Chrysomela Moræi	V. 18
Randsteck, (Nachtschm.) Phalwna Moderiana	V. 730
Randflügel, (Krammetevogel) Turdus Europæus	6. 14
Randflügel, (Tagthierchen) Ephemera marginata	V2. 77
Nandfrosch, Rana marginata —	111. 6
Randfäfer, (Erdfäfer) Carabus marginatus	S. 250
Randpunkt, (Cagschm.) Papilio Arion -	V. 62
Rangier, Reëne, Renne, (fr.) Rennthler	L 39
Ranzeltrager, (Baftardwespe) Sphex manticata	€32
Raocka, (schweb.) Nagelroche -	III. 249
Rapa, (Bulla) Rube	VI. 410
Rape, (fr.) Feile	VI. 311
Raphanus, (Nautilus) Rettigschote -	VL 360
Raphiati, (braf.) hofjunter, (Ratter) -	III. 182
Raphidia, Rameelhals	V2. 809
— — cornuta, Horntopf —	V2. 806
- mantispa, Rutscher -	V2. 806
- ophiopsis, Otterntöpschen -	V2. 805
Raphinistrum, (Nautilus) wilde Senfichote	VL 359
Rapp-Hoena, (schwed.) Feldhuhn -	II. 489
Rasenameise, Formica coespitum -	V2. 914
Raspdubblet, (hou.) Keile -	VI. 311
Raspeçon, (fr.) Warzentopf -	IV. 72
Raspelbarsch, Perca Radula —	IV. 244
Rat de montagne, (fr.) ber Springer -	I. 353
Ratelaar, (holl.) Anirscher	V. 442
Ratel-Slang, (holl.) Klapperschlange -	III. 133
Rathsberr, (braune Mewe) —	II. 347
Ratissoire, (fr.) die Feile -	VI. 3tz
Raton pequenao, (span.) Eichelmaus -	L 351
Ratta de Matto, (port.) Buschraße -	I. 325
Ratte, Mus Rattus	I. 347
— — fliegende, (Fledermaus) Vespertilio Spasm	a l. 154
Rattenschwanz, (Pfeilschwanz) Sphinx coarctata	€. 304
Lattle Snake, (engl.) Klapperschlange	III. 133
Ratto penago, (ital.) Flebermaus -	I, 150
•	Ratto

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•	Th.	€.
Ratto pequenno, (span.) Spismaus -	I.	303
Rattus, (Mus) Sausraße .	L	347
Raubsliege, Asilus - V2. 1001	. C.	338
Raubkafer, Staphylini - V. 387	6.	261
fleine	V.	398
— mittlerer Größe -	V.	388
Raubschwanz, (Maus) Mus lagurus -	€.	
Raubthiere, Feræ - I. 194	-	,,
- ibr Rusen -	L	25
- Bertheidigung wider diefelben -	L	18
Rauchtaferchen, (Rleintafer) Dermeftes fumatus	v.	
	V2, 1	
Raubbarter, Myxinæ		54
Raubbruft, (Baffereulchen) Phryganea ciliaris	V2.	722
Raubflugel, (Langfuß) Tipula persiciriæ	V2.	042
Raubflugel, (Muce) Culex ciliaris -	V2.	901
Raubflügel, (Rachtschm.) Phalæna hirtaria		313
Raubfuß, (Biene) Apis lagopoda -	V2.	Roa
Rauhfuß, (Sahn aus Bantam) -		123
Raubhahnchen, Chrysomela hirta -	V.	201
Raubpels, (Tobengraber) Sylpha scabra	v.	121
Raubpell, (Bange) Cimex scaber -	v.	485
Raubpuckel, (Geeraupe) Aphrodita fcabra	VI.	74
Rauhrucken, (Krabbe) Cancer chabrus	V2. 1	
Rauhruden, (Stinftafer) Buprestis hirta		338
Rauhschild, (Kafer) Searabæus scaber -	V.	69
Rauhschwalbe, Hirundo rustica -		630
Raubtaube, Columba hispida -	11	<b>500</b>
Raumsteck, (Nachtschm.) Phalwna villica		664
Raupen, Erucæ		544
Raupenfliege, Musca larvarum -	V2.	774
Raupenjäger, (Erdfäfer) Carabus inquisitor	v.	256
Raupentoder, Ichneumones - V2. 841		
Eleine, mit drafformigen Fühlbornern	170	214
- mit einfarbigem Schilde und Bruftft	₹2•	ō59
de, aber Kublhornern, die mit einer		
Bande umgeben find	и V2.	040
Stube underen line		
	Rau	rem

•	Th.	€.
Raupentober, mit einfarbigem Schilbe und Bru	to .	-
ftude, aber ichmargen und burfte	T.	
artigen Fuhlhornern -		850
mit gelben, burftenartigen Bublbb	N	•,
nern —	V2.	857
mit meiffem Schilde, und Rublbo	D	-,4
nern, welche mit weiffen Ringen b		
feget sind -		843
mit weißlichem Schilbe und schwarze	n	-13
Kubihornern -		847
Raupentober, (fleine Doble) Gracula quiscula		196
Ravocchia, (ital.) Frosch	IIL.	48
Rawlin-pollac, (engl.) Pollact	IV.	93
Raye, (fr.) Roche -	III.	236
Rate, Mus Rattus		347
- fliegende, (Flebermaus) Vespertilio spalma		154
Rabenschwang, (Pfeilschwang) Sphinx coarctata		304
Razor-bill, (engl.) Alf	II.	309
Re di Triglia, (malthef.) Kahlbart, (Barbe)	IV.	271
Reattino, (ital) Zaunkönig	11.	619
Reaumurs Eintheilung der Schmetterlinge	₩.	560
Rebhuhn, (Kinkhorn) Buccinum Perdrix	VI.	445
Rebuhn, graues, Tetrao Perdrix	H.	488
- großes Brasilianisches, (der Karzer)	II.	440
— Marylandisches, Tetrao Marilandicus	II.	490
- Meritanisches, Tetrao Mexicanus	II.	480
- rothes, Tetrao rufus -	11.	480
Birginisches, Tetrao Virginianus	II.	490
Recker, (Raupentoder) Ichneumon extensor	V <sub>2</sub> .	852
Recurvirostra, Wassersäbler -	11.	422
— — avocetta, Gabelschnäbler -	II.	422
Red Deer, (engl.) Hirsch	I.	390
Red-Start, (engl.) Rothschwanz	II.	615
Red-Wing, (engl.) Sipbroffel -	И,	530
Reem, Rem, (hebr.) Rasenhorn -	I.	469
Reeve, (engl) Kampfbahn -	II.	404
Regalbulo, (ital.) Golddroffel —		186
Regenbreme, Tabanus pluvialis	V2.	
ı	K	gene

<b>Eh.</b>	6	Seite
Regendeuter, (Biehbreme) Tabangs tropicus V	<b>2</b> .	986
Regenstiege, Muica pluvialis	2.	071
Regenpfeifer, Charadrius - II. 415.	<b>S</b> .	114
Alexandrinischer, Charadrius Alexan-	٠,	,
drinus	Ħ.	416
Egiptischer, Charadrius Aegyptius	II.	416
gestelliger, Charadrius gregarins	<b>X</b> ,	115
	Ħ.	418
	ii.	418
	11	399
Regenvogel, (Ortolan) - j	Π.	562
Regenvogel, (Schnepfe) Scolopan Phocopa	ĪĪ.	395
	71.	38
Regillo, (ital.) Zauntonig -	II.	619
Kegina aurarum, Weibchen des Kabibalies	-	54
Regulus, (Falco) fleiner König		66
Regulus, (Motacilla) Saubentonig -	Ó.	620
Rehe, Capreolus -		40I
- Guineisches, Capreolus Guineensis -	İ.	401
- Guineisches, (Muscusthier) Moschus pygmaus	L	37 <del>7</del>
Nehschröter, Lucanus Capreolus		96
Reichsvogel, (Rernbeisser) Loxia Verdier		153
Reiffnatter, Coluber doliatus _ 1		173
		76
Magerlans, Pediculus Ardese – V2	 • 10	034
Meiher, Ardea - IL 369.	5.	100
— aschgrauer, Ardea Cocoi	II.	38£
blauer, Ardea major - I	L	380
Brafilianischer, (Rahlfopf) Mycleria Amori-		,-
cana -	IL.	366
—— brenfarbiger, Ardea tricolor —		111
- gestreifter, Ardea striata - 1		384
- grauer, Ardea cinerca -	11.	378
- gruner geneatter, Araea vireicens	iL.	385
~ - Dudjomscher, Ardea Hudsonia - 1	II.	384
- Dstindischer, Ardea grisea - 1	I.	387
meisser, Ardea Garzetta -		381
6D 61 4164 A 1		387
		cin

	Th.	€.
Reinfarrenbabachen, Chrysomela Tanaceti		166
Reinfarrenlaus, Aphis Tanaceti -		516
Reisbreyfinthorn, Buccinum papillosum	VL.	
Reisbrenmondschnede, Turbo muricatus	VI.	543
Reisbrennautilus, (Papiernautilus) -	VL	350
Reiedieb, (Anuner) Emberiza oryzivora		567
Reiedublet, (herzmufchel) Cardium pectinatum	VI.	
Reifelbeerwirbel, (Geegallert) Vorticella berb	C-	•
rina	VI2.	875
Reisemantel, (Kammmuschel) Ostrea operculari	s VI.	310
Reisender, (Raupentoder) Ichneumon peregina	•	
tor -	. <b>V2.</b>	850
Reisender, (Wange) Cimex peregrinator		488
Reisfresser, (Kernbeisser) Loxia oryzivora	II.	550
Reisfornerporzellane, Cyprea nucleus	VL	402
Reigharfeit der Thiere -	I.	
Reluctator, (Ichneumon) Wiberstreber	V2.	
Remora, (Echeneis) fleiner Sauger -	IV.	113
Renard, (fr.) Fuchs		224
Rennthier, Cervus Tarandus -		394
Rennthierbreme, Tabanus Tarandinus -	V2.	
Rennthierhornisse, Oestrus Tarandi -	V2.	
Rennthierforalle, (Puntiforalle) -	VI2.	7:2
Reptiles, friechende Amphibien III. 1	3. €.	
Republif ber Donigbienen -	V2.	
Requin, (fr.) Meersau -	III.	
	252.	
Requin, (fr.) Stachelroche	III.	
Reticulum, (Gorgonia) Scenet -	VI2.	
Reticulum, (Millepora) Dratforall -	VI2.	
Rettigbeisser, (Rachtschm.) Phalæna polymita		700
Rettigstiege, Musca radicum - Rettigschote, Nautilus Raphanus -	V2. VI.	970
Reudschalling, (ban.) Rothflosser -	IV.	
Reuter, (Giftfrabbe)	V2. I	
Reuter mit grunen Rugen, (Regenschnepf)		399
Reutwurm, (Maulmurfgrille)		399 422
Rex, Saubentonig		620
And the second second		aad
•	4211	_~

Rhaad	Riesenherz	38}
•		₹ħ. €.
Rhaad (barbar) fleine Trapp	gane –	11. 445
Rhea, (Struthio) Umerifanifch	er Strauß	IL, 452
Rheintaucher, (die weiffe Ronne	<b>:</b> ) –	II. 306
Rhinobare, Saanroche	_	III. 250
Rhinobatos, (Raja) Pangrochi	<b>-</b> -	HI. 250
Rhinoceros, (Buceros) Nash	otnogel -	II. 162
Rhinoceros, Nafenhorn	<b>-</b>	I. 469
- bicornis, 3menboi	rniges Rafenhorn	I. 472
- unicornis, einhorn	tiges Rasenborn	I. 469
Rhinoceros, (Scarabæus) 3nt	ianischer Rhinoce	ros,
tafer	-	V. 57
Rhodopus, punftirter Stranble	lufet —	11. 410
Rhomboides, (Cancer) Burf	elfchild -	V2. 1104
Rhomboides, (Sparus) Gelbfl		IV. 187
Rhombus, (Pleuronestes) Ni	ere <b>ct</b> –	IV. 159
Abombus, (Bange) Cimex rho	ombeus -	V. 483
Riand, (arab.) Krampffisch	_	III. 237
Riapsa, (arab.) Raupe		V. 544
Ribbandish, (engl.) Langenfisch	<b>6</b> —	IV. 175
Riccio, (ital.) Igel	•	l. 304
Riccio, Rizzo, (Ital.) Steapf	d <u> </u>	VL 144
Richard, (fr.) Stinffafer	-	V. 332
Ricinoides, (Pediculus) Kuff	ans —	V2. 1029
Ricinus, (Murex) Maulbeer		VI. 506
Riecher, (Nachtschm.) Phalæna		V. 654
Riemfisch, (Spißschwanz) Cepe	ola rubelcens	IV. 111
Riese, (Colibri) Trochilus Ma		IL 267
Riese, (Reiber) Ardea Herodi		Ц. 381
Riese, Spanischer, (Meelkafer)	I encorio Gigas	V- 379
Riefe, Surinamischer, (Meeltafe	t) i enebrio Gigi	
Riesenassel, Scolopendra gigan	itea -	V2. 1158
Riefenbarbe, (Weerbarbe) Mu Riefenbastard, (Bastardbock) d	de la la la la la la la la la la la la la	IV. 270
refenbaguro, (Sagtatodat) r Ristenbast (Bastáfer) Conss	Necydails major	V. 293
Riefenbock, (Bockfafer) Ceran Riefencikade, Cicada plebeja	ina Riguitens	S. 237
Ciefengefpenft, (Gefpenfttafer)	Mantia Giara	V. 456
Liefenhahnden, Chrysomela g	ratelles Olas	V. 409
liefenherj, (Perjunschel) Care		V. 164 VI. 250
contambeet / Ansternished Car.	B P	Ricfen
		Marslow

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
	Th.	
Riesentaser, Scarabæus Alceus —	V.	
Riesentafer, Scarabæus Gigas -	V.	
Riefenlerche, Alauda magna -	II.	
Riesenohr, (Hohlohr)	VI.	597
Riesenohr, (Mondschnecke) Turbo Olearius	VI.	
Riefenobr, (Schlangenbaut) —	VI.	547
Riesenschildtrote, Testudo Midas -	Ш.	
Riefenschlange, (Gerpent.) (Konigefchlange) III.	144	147
Riefenmespe; (Solmespe) Sirex Gigas	V2.	
Riefin, (Jungfer) Libellula grandis -	<b>V</b> 2.	769
Rietmees, (boll.) Sumpfmeise -	II.	627
Rietlinger, (boll) Robrfanger -	11.	606
Rietvooren, (boll.) Rethauge -	ÍV.	393
Rindenbecherchen, (Sallapfelwurnt) Cynips quer	•	• • •
cus corticis —	<b>V</b> 2.	814
Rindenmotte, (Rachtschnf.) Phalæna corticella	V.	748
Rindenschaale, (Benusninschel) Venus incrustata	VI.	275
Rindenwanze, Cimex corticalis —	V.	482
Rines, (griech.) Meerengel -	ÌII.	257
Ringauge, (Sefpenftthiet) Lemur Mongoz		147
Mingauge, (Meerbrachfem) Sparus cantharus	ÌV.	196
Ringauge, (Ratter) Coluber annulatus	IIL	196
Minghauch, (Meerhaafe) Cyclopterus liparis	Ш.	
Mingbiene, Apis succincta -	¥2.	
Ringbroffel; Turdus torquatus		537
Ringduif, (boll.) Mingtanbe		506
Ringelbede, (Schilbtdfer) Cassida supposita		143
Ringelfled, (Sonnentafer) Coccinella annulata	V.	
Ningelflügel, (Racheschm) Phalmna eingulata		722
Ringelfuß, (Boeffafer) Cerambyx armillatus		253
Ringelfuß, (Nachtschni.) Phalæna salicis	V.	
Ringelfuß, (Bange) Cimex punctatus -	V.	
Dingelgans, Anas Bernicla		285
Mingelfonig, (Bachstelle) Motacilla calendula	11.	619
Ringelmotte, (Pfeilschir.) Sphinx Phegea	v.	
Ringelnauer, Coluber Natrix -	ÌII.	
Ringelraffe, Rallus torquatus	II.	•
Ringelschange, Amphisbens -	111.	
Appro De elabem (Oct. pere Leanne peren	Rin	rgeli

<u> </u>	Th. G.
Rocham, Rokhome, (arab ) Seper -	Il. 48
Roche, (engl.) Rothfloffer -	IV. 392
Roche, Raja -	III. 236
- großer, Raja Oxyrinchus	IIL 243
- mit scharfen Zahnen -	111. 237
- mit ftumpfen 3abnen -	III. 249
Rocenwurm, (Rachtschm.) Phalena secalis	V. 734
Rockfish, (engl.) Gifibarfc —	IV. 238
Rock-goat, (engl.) Geme -	L, 421
Roe-deer, (engl) Rehe -	L, 401
Roeding, (ichweb.) Bergforelle -	IV. 320
Roed-stiert, (schweb.) Rothschwanz -	II. 619
Robrentocher, lubularia nituloia	VI2. 816
Mobrentoralle, Lithophyta: Tubipora	VI2. 667
gothlanbische, (Rettenkoralle)	VI2. 669
Robrenfrabbe, Cancer tubularis -	V2, 1120
Robrenpolype, (Sandföcher) Sabella ringens	VI. 634
Ribrenschnecken, Serpulæ –	VI. 622
Robrenschwamm, Sponzia fistularis -	VI2. 796
Roek, (holl.) Saatfrabe -	IL 173
Roep-Eend, (holl.) Schnatterente -	II. 291
Roerdomp, (boll) Robrommel .	II. 386
Rosels Eintheilung der Schmetterlinge -	V, 562
Roesselvisla, (amerif) gestrelftes Eichborn	I. 358
Nathel. (Rothfosser)	IV. 392
spathling. (Bastardbod) Necydalis rufa	V. 295
Mathling. (Dornfafer) Hispa testacea -	V. 204
Mathling, (Lachsfotelle) Salmo Umbia -	<b>I</b> V. 322
Mothling, (Lippfisch) Labrus Anthias	IV. 197
Rothling, (Wange) Cimex ruber -	V. 491
Rognkal, Rognkex, (norm) Lump -	⁻ Щ. 331
Rohrdommel, großer, (Reiher) Ardea stellaris	II. 385
fleiner, (Reiher) Ardea minuta	11. 388
Robroroffel, Turdus arundinaceus	11. 538
Mohrmide (Panafuk) Tipula arundineti	V2. 936
Mohridager, (2)achitelle) Michaella lailealla	II. 606
Robesperling, (Ammer) Emberiza Schoenicius	11. 567.
<b>&amp;.</b>	155. 156.
	Nobe

Rohrlpinne	Rosenblume	389
	K y St	Th. S.
Mohrspinne, Aranea arundin	1001	V2. 1073
Robrieisig, Pipra leucocilla	`	II. 623
Roi des cailles, (fr.) Bachte	elfonia -	II. 436
Roitelet hupe, (fr ) Sauben		II. 620
Rokhome, (arab.) Erbgener		II. 59
Rolle, (Bockfafer) Ceramby		V. 274
Rollenblafe, Bulla canalicula		VI. 411
Rollenbreber, (Baftarbrugelta		vli V. 213
Roller, (Mandelfrabe)	•	II. 182
Rollier, (fr.) Mandelfrabe	•	II. 182
Rollrand, (Rachtschm.) Phale	ena estav -	V. 658
Rollfchlange, (Rohrenschnecke		
Roloway, (Simia) Palatina		<b>Q.</b> 10
Romaffoe, (isl.) Langflosse		III. 332
Rondela, Rondinella, (ital.)	her Hienenhe Ten	fel IV 60
Rondina, (ital.) Schwalbe	) oet jingende ætu	II. 630
Rondmonden, (boll.) Mont	Schneden	VI. 539
Ronkje, Ronkertie, [hou.]		II. 268
Rood-appeltje, (holl.) ber t	Calline sobyes	VI, 250
Rood-bandje, (hou.) bas ro	who Bonk	VI. 250 VI. 410
Rood-borstje, (host) Rothi		II, 618
Rood-dreggetje, (holl.) Ra		IV. 60
Roode Brassem, (boll.) Rot		
		IV. 184
Roode geknobbelde Kasket, haube	(don') torde Quiti	1045 11.71 4.00
Roode Mol, (boll.) ber Fud	ia .:	VI. 450
Rood - Juffertje, (hell) bie		VI. 390
Rood-lip, (boll) Rothlippe		VI. 218
Rood-oog, (holl.) Junghed		VI. 604
Rood-staart, (boll.) Rothsch		VI. 590
		II. 611
Rooman, (holl.) der Schweti Rooster, (holl.) Rost	istubit -	IV. 183
Ropoza, (port.) Waldrage		VI. 424
Rosalie, (fr.) Steinbocklein		I. 292
Rosalie, (fe.) Steinbocksein Rose, glatte, (Tellmuschei) Ti	elline lavionte	V. 265
	etmire for Alkara	VI. 236
Rosen, (Seesterne) Rosenasse, Simia rosalia	_	VI, 129
Rosenblume, (Geeapsel) Echi		I. 134
	Rha	VI. 153

	Tb.	6,
Mosenback, (Bisambocklein) -	V,	264
Rofenbod, (meicher Solibod) Leptura violacea	E,	243
Rosenbohrer, (Gallapfelmurm) Cynips rolm	V2.	811
Rosenbublet, (Leumuschel) Tellina planata	VI,	234
Rofentafer, (Mantafer) Meloe festiva .	6,	259
	VI2.	706
Rosenlaus, Aphis rosæ -		514
Rosenmotte, (Rachtschm.) Phalæna cynosbatella		749
Rofenriecher, (Cifabe) Cicada rofæ -		467
Rofentiecher, (Schlurfmefpe) Tenthredo,rola		
Refenvogel, (beutscher Apollo) -		581
Rofenwidler, (Rachtichm.) Phalma rolana		725
Rospp, (ital.) gemeine Krote, Meeradler II	١, ٢١,	245
Rospus fish, Meerfrosch -	ĦĬ,	280
Ros, (Pferd) Equus Cabalhus -	ı.	446
Rosse, (fr.) Rothstosser -	ĮV,	393
Rossignol, Roussignol, (fr.) Machtigal	11.	603
Rossignolo, (ital.) Rachtigal		602
Rofttafer, (Stinktafer) -		72
Rossmat, Rostunger, (nords.) Wallros -	Į,	177
Rognatter, Coluber Hippocrepis -	III.	204
Roßschweiffpralline, (Kranzkoralline)	Vl2.	844
Roft, (Balge) Voluta reticulata -	VI.	424
Roftband, (Schnirfelschnecke) Helix Gothica		567
Roftbauch, (Papagen) Plittacus ferrugineus	્€,	
Rostbiene, Apis ferruginea -		<b>∞</b> 1
Roftbod, (Bodtafer) Cerambyn Balteus		236
Roftfied, (Rachtschm.) Phalmna Schalleriana		729
Rosssled, (Schlupswespe) Tenthredo slava		835
Roststeck, (Lagschm.) Papilio Metis —		628
Rofffligel, (Lerche) Alauda Cochevis		136
Roffflugel, (Tagfcom) Papilio Arcanius		627
Rostfaferchen, (Rleinfafer) Dermeltes forruging	<b>4 Y.</b>	107
Rostforper, (Langfuß) Tipula ferruginata		940
Roftforver. (Stechfliege) Conops ferrugines		999
Roftreuß, (Rachischm.) Phalæna cellia Rostmaul, (Meeltafer) Tenebrio quisquilius		677
Rostmaul, (Meeltafer) Tenebrio quisquilius	V.	377
Rostpuckel, (Baffertafer) Dytiscus ferrugineus		349
		Rote

•	Eb. 6.
Rothbruft, (Baffertafer) Dytifens ovatus	V. 390
Rothfeder, (Rernbeisser) Loxia hamorrhoidalis	<b>6.</b> 153
Rothfeder, (Rabe) Corvus ruber _	E. 85
Roibfeder, (Zeisig) Pipra plumata -	G- 177
Rothfint, (Thumpfaffe) -	11. 547
Rothsted, (Tagschm.) Papilio Meranon	V. 569
Rothfloffe, (Meerbrachfem) Sparus Smaris	IV. 181
Rothsoffer, (Karpfe) Cyprinus rutilus	IV. 352
Rothflugel, (Golbhabuchen) Chryfomela hæme	D-
ptera -	V. 168
Rothftugel, (Grasbupfer) Gryllus miniatus	€. 270
Rothflugel, (Rachtschm.) Phalæna pennaria	V. 707
Rothfligel, (Rachtschm) Phalens rufina	V. 676
Rothflugel, (Raubkafer) Staphylinus erythropt	<b>6-</b>
rus —	V. 389
Rothflügel, (Lagichm.) Papilio Horta -	V. 583
Rothfuß, (Bastardwespe) Sphex Rufipes	V2. 872
Rothfuß, (Kinte) Fringilla flava	6. 164
Rothfug, (Gans) Anas erythropus -	II. 284
Rothfuß, (Goldhabnchen) Chrysomela Rufipes	V. 184
Rothfuß, (Rafer) Scarabæus Rufipes -	V. 91
Rothfuß, (Yangfuß) Tipula Rufipes -	V2. 944
Rothfuß, (Raubfafer) Staphylinus Rufipes	V. 394
Rothfuß, (Rugelfafer) Curculio Rufipes	V. 238
Rothfuß, (Schlupfwespe) Tenthredo Rufipes	V2. 829
Rothfuß, (Conepfe) Scolopax Calidri	II. 400
Rothfuß, (Spinne) Aranea Rufipes -	V2. 1076
Rothfuß, (Tobengraber) Sylpha Rufipes	V. 131
Rothfuß, (Wange) Cimex erythropus	V. 494
Rothfuß, (Bange) Cimex Ruspes -	V. 484
Rothgürtel, (Goldwespe) Chrysis succincta	V2. 876
Rothbals, (Colibri) Trochilus jugularis	IL 266
Rethhals, (Ente) Anas ferina	II. 296
Nothbals, (Kinfc) Fringilla rubricollis	S. 166
Rethbals, (Pelibed) Leptura collaris -	V. 283
Rothbale, (Rernbeisfer) Loxia rubricollis	♥. 205 €. 151
Rethbale, (Rugelfafer) Curculio ruficollis	V. 221
Rothyals, (Taube) Columba Afiatica	6, 13
MAINAL JANUARY ANNUAL COMMISSION S.	9501 <b>b</b> s

·	Rothhorn	Rothrucken	393
	-		£6. €.
Rothborn, (	Biene) Apis rufi	cornis –	V2. 901
Roibhorn, (	Rußelkäfer) Cur	culio ruficornis	V. 237
Rothkarpe,	(Colibri) Trochi	ilus elatus -	II. 270
Rothfarausd	e, (Rothauge)		IV. 393,
Rothfehlcher	, (Bachftelge) M	lotacilla rubecula	II. 618
Rothfeblchen	, braunes, (ber S	Rarbinal) -	II. 577
Rothfehle, (	Parapagen) Plitt	acus gutturalis	E. 79
Rothfopfcher	1, (Goldhabuchen)	Chrysomela eryt	hro-
	cephala	<b>-</b> ,	V. 182
Rothkopf, (P	Baumläufer) Cer	thia cruentata	II. 258
Rothfopf, (9	finte) Fringilla (	Cabaret -	<b>6</b> 16c
Rothkopf, (	Rernbeisser) Lox	ia erythrocephal:	II. 540
exertiteant, (2	Wayfafer) Melo	ë erythrocephala	€. 255
Rothfopf, (9	Reerbrachsem) S	parus Orphus	IV. 183
Rothforf, (	Bapagen) Plittac	us canicularis	II. 136
Rothkopf, (	Schlupfwefpe) '	Tenthredo eryth	170-
	cephala	• , •	V2. 822
Rothfopf, (A	Basserfáfer) Dytil	cus erythrocepha	lus V. 349
Resident, (	seifig) Pipra aur	eola —	II. 623
Mothfragen,	(Papagen) Plitte	acus collarius	Il. 148
Rothfragen,	(Springkafer) 1	Elater ruficolfis	V. 321
Nothlinie, (6	Stachelschnecke) I	Murex fuccinétus	S. 379
Rothlippe, (	Rlippfleber) Pate	ella Neritoidea	VI. 604
Nothmund, (	Sinfhorn) Bucc	inum Hæ <mark>ma</mark> stom	VI. 462
Rochmund, (	Schnirkelschnecke)	Helix hæmastos	na VI. 577
Mothmund, (	(Eagschm) Papil	io Phidias -	V. 621
Rothnuß,(Ge	llapfelwurm)Cyi	nips quereus infer	us V2, 813
Rothpunkt, (	(Sagichni) Papil	io Rumina	V. 617
Rothrand, (	Biene) Apis barl	bara -	V2. 900
Rothrand, (	Erdfafer) Carabi	is marginatus	V. 359
	Rachtschm.) Phali		V. 726
Rothrand, (	Pfeilschwanz) Sp	hinx creusa	V. 645
Rothring, (	llippfleber) Pate	la lutea -	VI. 611
Rothring, (3	agfchm.) Papilio	Nearea -	V. 615
Kothringel,	(Pfeilschwanz) S	phinx Ephialtes	V. 645
Kotbrucken,	(Soldhahnchen) (	hryfomela cocci	
	(Langfuß) Tipul		V2. 944
Kothrucku,	(Kanbfliege) All		V2. 1004
		Bb s	Roth

	Eħ.	6
Rothfaum, (Rachtschm) Phalæna præcox	V,	69
Mothschatten, (Tagschm.) Papilio Cassus	V.	59
Rothschenkel, (Bodtafer) Cerambyx femoratus	<b>V.</b>	27
Rothschild, (S. Joh. Bliege) Cantharis rufa	V.	30
Rothschnabel, (Papagen) Psittacus rufirostris		13
Rothschnabel, (Ruffelfafer) Curculio druparum	V.	23
Rothschnabel, (Toutan) Ramphastos Tucanus	II.	
Rothschupre, (Meerbrachsem) Sparus erythrinus	IV.	
Nothschmant, (Bachstelte) Motacilla erythaca	11.	619
Mothschmant, (Colibri) Trochilus Molquitus	II.	
Rothschwanz, (Kliegenfänger) Muscicapa ruticili	a II.	
Rothschwans, (Papagen) Plittacus erythroleucus	11.	
Rothsoble, (Mante) Cimex virens —	٧,	
Rothspike, (C. Job. Miege) Cantharis bipultulat	a V,	309
Rothsteiß, (Goldhabnen) Chrysomela hæmon	<b>!-</b>	
rhoidalis —	V,	166
Rothstral, (Tagschm.) Papilio Erato —	V.	-
Rothstral, (Tellmuschel) Tellina radiata	VI.	
Distriction ( Commoline Br.) minima a service	V2, I	<b>OO</b> F
Rothweidenbohrer, (Gallarfelmurm) Cynips sali		
cis amerianæ —	V2.	
Rothwurzel, (Tayfchm) Papilio Talaus	Ϋ́	
Rothziegel, (Rafermufchel) Chiton ruber	VI.	
Rothzirkel, (Qualle) Medusa æquora -	VI.	
Rotie, (fr.) Brandhorn -	VI.	
Rotlimpa, (schwed.) Donnerfrote -	IV.	
Rotula, S. Peterefifch	IV.	
Rotzdubblet, (boll) Belfenbublet	VL:	-
(your) Ordania	V2. I	
Roug, (engl) Kaulbarich	IV. :	
Rouge - bourfe, Rouge - gorge, (fr.) Rothtehlche	IL (	ere Lee
Rouge-queue, (fr.) Rothschwanz	-	•
Bord (los) alternation with the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the	269. :	
Rouleaux, (fr.) Oliven	VL IL	
Roupeau, (fr.) Schildreiber	IL (	
Roupie-berée, (fr.) Nothkehlchen  Roufette (fr.) Birthur feltel	II.	
Roufette, (fr.) Binsennachtigal	I.	
Roulette, (fr.) fliegender hund	Loufet Soufet	

Roufette	Ruga	394
•		₹b. €,
Rousette, (fr.) Hundshaan, Se	ehûndehen III.	262. 265
Kouiserolle, (Turdus) Roussero	ae —	C. 145
Royston-Crow, (engl.) Nebelfre	áhe —	II. 174
Rossisch, Blennius	-	IV. 100
- mit einem Kamm auf bem	Sopfe '	IV. sob
ohne Kamm	•	IV. 105
Ruat, (engl.) spanische Taube	-	II, 499
Rube, (Blafe) Bulla Rapa		VI. 410
Rube, (Stachelichnecke) Murex	canaliculatus	VI. 513
- geschmanzte, (Stachelschn.) ]	Murex spirillus	VI. 513
Rubecula, (Murex) Livreefconet	cte —	VI. 504
Rubenschlupfer, (Schlupfmespe)	Tenthredo rapa	Va. 831
Rubenweißling, (Tagfchm.) Papi	ilio rapæ	V. 588
langer, (Tagfchm)	Papilie napi	V, 588
Rubeline, (fr.) Rothfehlchen		II. 618
Rubellio, Rothschuppe	-	IV. 185
Ruber, (poln.) Bison	~	I. 469
Rubeta, (Rana) Feuerfrote		III. 58
Rubicilla Americana, Der Domii	ntfaner	H, 548
Ruck, ein erbichteter Bogel	,	II. 59
Ruck, (Saatkrabe)	-	II, 172
Rudd, (engl.) Orfe	•	IV. 393
Ruddock, (engl.) Rothfehlchen		II. 618
Ruberente, Anas merla	-	<b>5</b> . 102
Rudolphus, (Linkhorn) Buccing	m Perficum	VI. 462
Ruffe, (engl.) Rampfhahn	-	II. 404
Ruffe, (engl.) Kaulbarich	*****	IV. 242
Rufipes, (Aranea) Rothfull		V2. 1076
Rufipes, (Chrysomela) Rothfug	**	V. 184
Rufipes, (Cimex) Rothfull	•	V, 484
Rufipes, (Curculio) Rothfuß	-	V, 238
Rufipes, (Searabæus) Rothfuß	<b>4</b>	V, 91
Rusipes, (Sphex) Rothfuß	<b>~</b>	¥2. 873
Rufipes, (Staphylinus) Rothful	3 <del></del>	V, 394
Rufipes, (Sylpha) Rothfuß	•	V, 131
Rufipes, (Tenthredo) Rothfull	•	V2. 829
Rufipes, (Tipula) Rothfing	•	V2. 944
Ruga, (ital.) Raupe	<b>27</b>	V. 544
•	•	Ruhre

Runzelbohrer

	Th.	€.
Ruhrmilbe, Acarus dysenteriæ -	V2. 1	
Rudenschwimmer, (Baffermange) Notonetta glau	ca V.	468
Rudenftecher, (Stechfliege) Conops irritans	<b>V</b> 2.	
Rudflugel, (Tagfchm.) Papilio Spio -		633
Ruigbekken, (boll.) Raubbarter -	VI.	
Ruigpoot, (boll) Feberfuß, (Laube) -		499
Ruisch, (boll.) Rothauge -	IV.	303
Ruffelbreme, Tabanus rostratus -	V2.	
Ruffelfisch, (Klippfisch) Chætedon rostratus	IV.	
Ruffelfled, (Bodfafer) Cerambyx Curculionoide		
Ruffelfühler, (Rachtschm.) Phalena proboscidal	is V.	712
Raffelfafer, Curculio - V. 210		
- gemahlter, Curculio pictus .		232
Rurgichnabel mit gezähnelten Schenkeln	$\mathbf{v}$	224
- Rurgichnabel mit ungezähnelten Schenfe	In V.	226
- Lahmer, Curculio paraplesticus		224
- Langschnabel mit einfachen oder bunne	n	
Schenfeln –	V.	211
- Langschnabel mit gezähnelten Schenkeln	V.	228
- fpringender Langschnabel, mit biden Si	nø.	
terfcenteln -		226
- weisser, Curculio Inderiensis -	E.	
Ruissenor, (span.) Rachttgal —		603
Rumina, (Papilio) Rothrunft -		617
Ruminax, bunter Lippfifch -	IV.	
Rumpfnafe, (Matter) Coluber mylterizans	III.	
Rumpfnase, (Stuftopf) Coryphoena Siima	IV.	
Runbbauch, (Kliege) Musca rotundata	V2.	
Rundbauch, (Rafer) Scarabæus cylindricus	V.	
Rundflugel, bunte, (Tagichmetterlinge) Papilion	es	,-
Danai festivi		595
Rundflugel, weiffe, (Tagichmetterlinge) Papilione	es	•••
Danai candidi -	V.	587
Rundflugel, (Pfeilschwang) Sphinx Auxo	V.	
Rundtopf, (Ratter) Coluber Sibon -	III.	189
Runbruden, (Schlupfwefpe) Tenthredo ovata	<b>V</b> 2.	
Rungelbalg, (Grasbupfer) Gryllus rugolus	V.	
Rungelbohrer, (Bohrkafer) Ptinus Gormanus	V.	113
	Ru	ijeb

Rungelbund Ry	nchops	•	397
		Th.	€.
Rungelbund, (Mondfchiede) Turbe	o rugofus		546
Mungeihabnchen, Chrysomela sterco	raria	V.	195
Rungelfafer, (Tobengraber) Sylpha:	rugola	V.	129
Rungelfamm, (Rlippfleber) Patella		VI.	611
Rungelfinthorn, Buccinum rugofum	-		375
Rungelforb, (Rorbmufchel) Mactra	Dlicataria	VI	255
Rungelmaul, (Pangerfifch) Loricaria	Plecoftomus	IV.	208
Rungelmufchel, (Drevedt) Donax ru			259
Rungelmufchel, (Diesmufchel) Myti		VI:	279
Rungelnautilus, Nautilus rugosus		VI.	333
Rungelohr, (Meeroht) Haliotis ftris	ıta —	Vi	598
Rungeischild, (Meelkafer) Tenebrio	rngolise	V	770
Rungelschildlein, (Wafferfeorpion) N	iena fii(ca	v.	375 472
Runjelschwamm, Spongia Krigosa		VI <sub>2</sub> .	4/2
Runjelvenus, Venus rugofa	_ `		
Rungler, (Bange) Cimex rugolus			363
Rupicapra, Gemse	_		482
Rups, (boll) Raupen	~	1. 37	409
Ruspator, (Ichneumon) Spuhrer	_	¥.	544
Ruspatrix, (Vespa) Scharrer	_	V2.	
Ruffe, (Todengraber) Sylpha Russic	_	V2.	
Ruffliege, Musca fuliginosa	<b>*</b>		126
	·linin ·C	V2.	
Rufflugel, (Rachtschm) Phalæna fu Ruffringel, (Ringelschlange) Amphi			682
nola -	ocus imigi		222
Rufructen, (Baffertafer) Dytifcus i	inliginative	37	350
Ruftwange, Cimex fuliginolus	- Entotus	V.	370
Rusticus, (Cerambyx) Bauer	_	V	479 276
Rusticus, (Conus) Aschenstober	_	VI.	
Ruthenus, (Acipenser) Sterlet	_	III.	2/7
Ruticilla, Rothfehlchen	_		618
Rutilator, (Ichneumon) Bergolber	_		
Rutilus latior, Rutilus fluviatilis, 1	1-6	V2.	
Russcher, (Kameelhals) Raphidia N	lly - Tantifna	IV.	
Rutte, (Trusche) —	renerib <b>s</b>	V2.	
Ruuwe Penhoorn, (holl.) rauhe M	ahalmalia	IV.	
Runchone Wantakasidanakas	un cimaile	VI.	
Rynchops, Berkehrtschaal			355
— — fulva, fahler Bertehrtschnal	)		356
		R	yn-

	Th. È
Rynchops nigra, fchwarzer Bertebetfchiabel	IL 359
Rypa, (norm) Coneebubn -	IL: 48
Ryftdubblet, (boll ) Reisbublet -	VI. 252
Rystenbry - haorntje, (boll ) Reisbrentinthors	VI. 45
Ryskorrels, (holl.) Reistornerporzellane	VL 461
any tenomination (40 m.) Operators the the fedure	4 11 <b>4</b> 02
<b>6.</b>	•
C, lateinifches, (Golbhahneben) Chryfomela S I	it_
tera	 V: 180
S, littera, (Chrysomela) lateinisches &	V- 18
Saamentafet, Bruchi	V. 20
Sammentern, (Robrenfchnede) Serpula Seminulu	
Saamentorn, (Todengraber) Sylpha Seminulun	V. 12
Camenmoos, Corallina rubens -	VI2. 82
Samennager, Bruchus Seminarius -	V. 20
Sagmentbierchen, Beobachtung berfelben	L 78. 7
Saamfrautfpanner, (Nachtschm.) Phalena pota	- <del></del>
mogetata	V. 72
Gaatfrabe, Corvus frugilegus -	Ü. 17
Saatfpringer, (Muffeltafer) Curculio fegeris	V. 25
Sahhel, (schweb.) 30bel	1. 27
Sabeldier, (holl.) Babel -	1. 27
Sabella, Canbfocher -	VI. 63
- alveolata, Trichtermurin -	VI. 63
- granulata, Griestobre -	VI. 634
- ringens, Robrenpolope	VL 634
- Ccabra, Sanbrobre -	VI. 634
ferupola, Grottentobre	VI. 636
Sabot, (fr ) Krausel	VI. 52
Saccolos, (fran.) Alfe	IV. 392
Sackagnich, (turf.) Krorfgans	H. 324
Cacfiofe, (Meetbrachsem) Sparus pagrus	1V. 184
Sacre, (engl.) bet beilige Balte =	IL 76
Saete, (fr ) ber heilige Falle	11. 76
Gadichinte, (Stedituschel) Pinna saccata	VI. 344
Cadferuge, (Sprugenwurm) Sipunculus faccatm	VL d
Sastrager, (Spinne) Aranda faccata	V2. 1084
AMERICAN LOCKINGS SERVICE CONTRACT	- A (e. 4)

<b>S</b> åbelfist	Salm	39 <del>9</del>
		Th. S.
Cabelfisch, (Buttopf) Epée de mer	-	1. 507
Sabelbeuschreden, Tettigoniæ	-	V. 427
Sabelschnabler, Recurvirostra avoce		II. 422
Sabelschnablerlans, Pediculus recur		V2. 1035
Sage, (Tellmuschel) Tellina truncat	<b>a</b> -	VI. 239
Sagefisch, (Daan) Squalus Pristis	1	III. 273
Sageflügel (Bliege) Mulca ferrata		V2. 972
Sageborn, (Bodfafer) Cerambyx	erraticornis	V. 276
Cageborn, (G. Job. Riege) Canthari	s ferrata	V. 312
Sagerand, (Rachtschm.) Phalena per		V. 692
Sagerippe, (Bergmuschel) Cardium :		VI. 250
Sagefchild, (Grasbupfer) Gryllus fe Sagefchnabel, (Pelifane)		V. 420
Sæg-fisk, (somed.) Gageffich	TT 330	<b>6.</b> 106
Sanger, (Rrammetsvogel) Turdus (	)-nheva	III. 273
Saugende Seethiere, Cete -		11, 533
Sangende Ebiere -	475	I. 1. 50
Saumden, fnotiges, (Rinthorn) Bu	ceinna kei	1. 1. 50
naceus		VI. 454
Safrannillbe, Acarus croceus	· •	72. 1058
Safranmuce, (Langfuß) Tipula croc	iata .	V2. 932
Saf Saf, (barb.) fleine Trappgans		11. 445
Sagitta, (Mus) Pfeilmans		G. 46
Sagitta, (Pennatula) Pfeilfeber	- <b>i</b>	/lz. 900
Sagitta, (Sciurus) Pfeilschwanz, (Eic	bborn's	1, 360
Sagrée, (ital.) Spornhady	_	III. 256
Sagryndubblet, (holl.) Kapenstinge	╼,	VI. 232
Sajacu, (bras.) grane Merle -	ÌI. 577:	G. 160
Sackvia, (Sechwi) (hebr.) Hahn	-	II. 469
Salamander, gemeiner, (Erdfalamande		III. 114
Salamandra, (Lacorta) Fenersalaman	ber	III. 117
Salamandre d'eau, (fr.) Sumpffolor	nanb <b>ic</b>	IIL 114
Salar, (Salmo) gemeiner lachs	-	IV. 316
Solibat, (ind.) Feuerglut	<del>-</del>	V. 115
Salicornia, Robrentocher	` <b>-</b> _ '	VI2. 816
Salingas, (griech.) Erbichnede ohne S	àH₽	VI. 59
Salkotoc, Breitsisch		IV. 26z
Salm, Salme -	à	IV. 310
		Galm,

		Th.	G,
Salm, geflecter, Salmo bimaculatus	•	IV.	329
ungeflectter, Salmo immaculatus	•	IV.	329
'Salmandrino, (ital.) Salmarin	-	IV.	322
Salmarin, (Salm) Salmo salmarinus		.IV.	324
Calmafins fchreibet den Thieren Bernui	ift ju	I,	4
Calmbarsch, Perca labrax	-	IV.	228
· Salmbrachfeme mit vier Stralen in ber !	Riemenh	aut,	
Characini	-	ıv.	328
Salm - forell, (hou.) Lacheforelle	-	į IV.	
Calmlaus, (Lachswurm)	•	VI.	106
Salmo, Salm —	IV. 3	10. <b>E</b> .	208
Alpinus, Bergforelle	-	IV.	320
anastomus, Sechmaul	-	IV.	3 32
argentinus, Silberforelle	•	IV.	
bimaculatus, geflecter Calm	-	IV.	
- eperlanus, Merstint	•	IV.	327
foetens, Stinkfalm	•	' IV.	329
— – gibbosus, Hochristen	•	IV.	328
immaculatus, ungeflectet Calm	3	IV.	329
lacustris, Pechforelle	•	IV.	319
Niloticus, Egipter	-	IV.	330
- motatus, Charafterfalm	•	lV.	328
— — pulveralentus, Puderfalm	-	IV.	331
rhombeus, Würfelsalm	-	IV.	33 t
Salmarinus, Salmarin	• \	IV.	322
Salvelinus, Salvelin	-	IV.	321
faurus, Seeeidechfe	•	IV.	324
Salmon - Trout, (engl.) Lacheforelle	•	IV.	317
Salome, (Tagschm.) Papilio Salome	-	€.	290
Saloppe, (Rachtschm.) Phalæna fordi	ata	V.	718
Salpa, (Sparus) Golbstrich -	•	IV.	187
Saltamonte, (fpan.) das europaische	wandeln	ibe	•
Blat -	•	V,	412
Saltarella, (ital.) heuschrecke	-		437
Saltator, (Gasterosteus) Dupfer	•		253
Saltatrix, (Musca) Springer	-	V2.	
Saltatrix, (Perca) Springer	•	IV.	
Saltatrix, (Phryganes) Supfer	•	• V2.	970
			Salt-

Saltwate	r Sandfloh		40
		42	•
Saltwater - Braam, (engl.)	Meerbrachfem	ĬV.	· 181
Calvelin, (Calm) Salmo	Salvetinus -	IV	321
Saltheuschrecke, Gryllus f	alinus –	(3)	271
Californerporzellane, Cyp	rea vitellus 📁 💄	VI.	394
Califraut, (Robrentocher)	-	VI <sub>2</sub> .	Q y A
Salfrebs, Cancer Talinus	•	V2.	T.O.
Salzschlange, (Ratter) Co	lubet Dione	(A)	192
Samabras, (arab.) Echlen	derkowani 🕳	III.	
Camarier, (Baftardwefre)	Sphex Samarientis		321
Sambiafisch, (Seefrote)	_	III.	284
Sammethubn, (große Baf	ferralle) -	77	
Cammetrock, (Bastardrüße	lfafer) Attelabus moll	s V	クルゴ
Commerspende, Aranea no	iolerica -	V2. 1	777 1070
Sammetvogel (Evlibri) I	FOCULIUS HOINIATIONS	11	257
Sanct Domingo: Muschel, r	aube. Venus tigerina	VL	274
Sanct Johannishicae, (Kand	MUR) Tipula Iohannie		940
Sanct Johannisstiegen, Ca	nthatides -	V.	306
mit	plattem Bruftftucke	V.	307
mit	rundem Bruftftude	V.	313
Sanct Johanniskafer, Scar	abæus Horticola	V.	80
Sanct Johanniswurm, La	mpyris neffiluca	V.	297
Sanct Petersfisch, (Spiegel	lfifc) Zeus Faher	IV.	
Sanct Petersvogel, (Sturi	mvšael) _	11	24.4
SanctThomasbock,(Bockfa	f.)CerambyxS.Thom:	ne V	256
Sanct Thomasparkte, (Par	agen) Puttacus S. Tho	) <b>-</b>	-,,
mæ.	-		81
Sanct Thomasschmetterling	, (中feilschw.) Sphin:	K	••
Pugione	_	V. 1	647
Sanct Thomastaucher, Col	ymbus S. Thomæ	5.	107
Sandaal, (Schmelte) Amo	dytės Tobianus	IV.	56
Sanda-Benamet, (ind.) M	lafenborn •	ī.	469
Sandalium, (Anomia) Pan	toffelmuschel -	Ģ.	369
Sandat, (pommerl.) Canb	baria .	IV.	
Sandange, braunes, (Lagsch	m.) Papilio Janira	V. 1	
— gelbes, (Tagschn	1.) Papilio Juttina	V. (	
Sandbarich, Perca Luciop	elca -	IV.	B25
Sand-Eel, (engl.) Sandad Sandfloh, Pulex penetran		IV.	57
CAMPINAL ERICK PAUCILIUS		72. 1	048
	L. C		100

,	Th. G.
Sanbflügel, (Rachtschm.) Phalæna arenacea	V. 674
Sandgraber, (Todengraber) Sylpha sabulosa	V. 129
Sandhest, (bán.) Grundling -	IV. 383
Sandfafer, Scarabæus sabulosus —	V. 74
Gandfocher, Sabella -	VL 633
Sandtornchen, (Pflanzenfloh) Podura minuta	V2. 1019
Canbforalle, (Sternforalle) Madrepora arena	<b>)-</b>
ria -	VI2. 687
Sandforalle, (Zellenforalle) Cellepora ramulos	a VI2. 74
Sandfrabbe, (Winter) -	V2. 1104
Sandtrebs, Cancer scyllerus -	V2. 1133
Sandfriecher, (Rlaffnuschel) Mya arenaria	VL 218
Sandfriecher, (Ratter) Coluber Amodytes	III. 157
Sandtriecher, (Bange) Cimex arenarius	V. 500
Sandlaufer, Cicindelæ - V. 32	27. 6. 245
Sandlaufer, (Strandlaufer) Tringa arenaria	IL 412
Canbraus, Mus arenatius -	<b>6.</b> 4
Sandufeife, (Benusichaft) —	VI. 627
Canbofeifer, (Strandlaufer) Tringa Hypoleu	cus II. 411
Sandninger (engl.) Sandpfeifer	II. 411
Sanbedbre, (Sandfochet) Sabella Icabra	VI. 634
Canhtelline. 1 ellina Kellis -	VI. 239
Saupheine, (Haitatomeine) Odnex arenaria	V2. 873
Sandiiblibir, (Bastardwespe) Sphex sabulosa	V2. 864
Gandwühler, (Bielfuß) Julus sabulosus	V2. 1164
Sanglue, (fr.) Bluttgel -	VI. 47
Sanguettola, (ital) Blutigel -	VI, 47
Sanguinerolla, (ital.) Elrige	IV. 389
Sanguisuccio, (span.) Blutigel -	VI. 47
Sanguiluga, (Hirudo) Bluttgel -	VI. 47
Saph, Eine Art Stosfalke -	11. 76
Sappho, (Papilio) Wolgaer -	<b>S.</b> 286
Sapuruca, (braf) Indianischer Affel -	V2. 1158
Saraf, (bebr.) Bipper -	III. 153
Sarbelle, Clupea Encrasicolus -	IV. 373
Sardine, (fr.) Sprotte -	IV. 270
Sardyn, (holl) Sprotte -	IV. 370
Sargazzo, (ital.) Steinqualle -	VI. 13
	Car.

Samaties	Savanna-,	40
	, <b>3</b>	b. C
Sarmatter, (Mondfchnede) Tur	rbo Sarmaticus 🔻 🤻	VI. 547
Sarmatter, (Wiesel) Muitella S		€. 3
Sarn, Sarna, (poin.) Rebe	-	I. 401
Sarpedon, (Papilio) Grunband	- '	V. 170
Sarlir, (bebr ) Staar	• (	H. 523
Sattelraupe, (Zickjack):	•	V. 672
Sattelmefpe, (Baftardmefpe) Sp	hex ephip <b>pia</b> V	/2. 870
Cathr, (Affe) Simia Satyrus	-	1. 119
Satyrus, (Simia) Gator		L 219
Sau, Sus Scropha	•	I. 462
Saubohne, (Scheide) Solon Le		1. 227
Sauburste, (Hornfisch) Balistes	hispidus H	li. 296
Sauclez, (fr.) Kornabrenfisch	_ P	¥ 200
Sauerampfereule, (Machtfchen:)	Phalzna romieis '	V. 697
Constampserians, April acotoli	<b>*</b>	¥. ere
Sauerlecker, (Schlupfwefpe) Ter	ithrède rumicis V	2. 835
Sauermaul, (Rükelkafer) Curev	ılio Lapathi 📑 🤻	V. 227
Saug, (norm.) Ságefisch	· • H	H. 273
Sauger, Echoneis	-	√. 113
fleiner, Echeneis remort	L - 15	F. 113
Caubund, (Saan) Squalus Cent	rina - H	I. 255
Saumfled, (Rachtschm.) Phalen	ua Fim <del>bria</del> 🤏	7. 688
Saum-toffe, (Appfisch) Labrus m	nargin <b>ali</b> s I <b>\</b>	r. 203
Saumflügel, (Goldhahnchen) Chr	ryf.marginata 🐪 🦎	t. 176
Saumon, (fr.) Calm -	- IV	7. 310
Saumspinne, Aranea simbriata	- V2	1077
Caumwange, Cimex marginatus	• 1	7. 48 <del>5</del>
Saurita, (Coluber) Cidechfennatt	ics - If	t, 194
Sauros, (griech.) Eidechse	- Ii	I. 77
Saurus, Breitfisch	- 11	r. 262
Saurufict, (Lippfifc) Labrus ruf	fas 🛥 IV	·. 202
Saurugelfifch, (Griegelfifch) Zeu	•	. 145
Sauterelle, (fr.) Beufchrede	<b>-</b> , A	437
Sauteur, (fr.) Windbeutel, (Bro	( <b>4</b> ) • 1H	79
Sauvegarde, (fr ) große Tegugu	uscu-Eibechfe H	109
Sauvegarde, (fr.) Bachhatter	`IH	t 87
Savanna Blak - bird, (engl.) Jan		
Denfreffer .		t 165 <sup></sup>
Ce	2 Sa	vetta.

,47 ° J			•	Th.	₫.
Carre	***	(ital.) Rasensisch	_	IV.	
Save	illag ( ). Com	191.) Bastardmatrele		iv.	264
Scali	lon-	(engl.) Pilgrimsmuschel	-	VL	
Scale	unes.	Buschrage -	_		293
Scale	nelin	m, (Lepss) Febermesser	<b>å</b>	VI.	
Sear	idnle	ca arborum, Baumlaufer			253
		Seewolf		IV.	
Scar	abæ	oides, (Cimex) Raferwange	•	V.	478
Scar	abæda	oides, (Dermestes) Distelfuß			106
Scar	abe	oides, (Dytiscus) Segler	•	V.	346
Scar	abæ	us, (Helix) Laferschnecke	•	VI,	162
Scar	aben	as, Rafer -	V. 4	8. 🗲	213
_	-	encus, Frembling	_	V.	90
_	_	aruginolis, Tupferfchutt	-	V.	90
-	_	albellus, Beiftingfafer	•	€.	217
-	_	albus, weiffer Rofer		€.	218
-	-	alcous, Riesentafer	<b>-</b>	V.	54
-	-	amazonus, Amajon	-	V	74
_	-	aulicus, Poffunter	•	V.	84
-		auratus, Goldläfer	•	$\boldsymbol{\mathcal{V}}$	
_	سد `	bilobus, Lappentafer	•	V.	•
	-	brunneus, Europäer	-	V	•
•		calcaratus, Sporutraget	• .	V	•••
-	-	Capenhs, Afrikaner	-	ν.	
-	_	Carolinus, Carolinisches Ra	fen <b>horn</b>	ν	
-	-	ceratoniæ, Johannisbrodfaf	er -	V	•
-	-	claviger, Schluffeltrager	•	_	214
_	-	conspurcatus, Dreckafer	, •	V	-
-	-	cylindricus, Aundbauch		V	
-	_	dichotomus, Doppelhorn	-		213
-	-	erraticus, Streifer	-	V.	
<b>—</b> ,	-	farnolus, Staubtafer	-	V	
-	_	fasciatus, Blumentafer	•	V.	
-	-	Taranament sal Manualisalisa	•	V.	
<b>—</b>			. —	V. V.	•
_			•		316
_		Goliatus, Goliathstäfer	•		. 64
_	-	granatius, Waitenforn			caff

		Scarabæus 14	-5005	405
	`			£6. €.
Sea	rabæ	us hæmorrhoidalis, Rotharfch	STY2	V. 68
		hemipterus, Salbflügel	(f1)31	V. 83
-	_	hirtellus, Burftenfafer	edqual	V. 85
~	-	Hispanus, Spanier	-	V. 63
-	-	humerofus, Schulterfafer	4 47	6. 215
-		Indus, Indianer		V. 86
		lanigerus, Wollentrager	ALCO TO A	V. 85
-	-	lanius, Umerifaner	and your	V. 88
-	-	laticollis, Breithale	- 7 30	V. 69
-	-	longimanus, Langarm	-	V. 70
-	-	Junaris, Birteltopf	7 23-8	V. 56
-	_	Marianus, Carolinifcher Rafer	Lorve	V. 68
	-	nalicornis, Europaifches Rafe	nhorn	V. 58
-		nitidus, gruner Rafer	4111	V. 75
-		nobilis, Ebelmann	-	V. 90
<del></del>		nuchicornis, Radenborn	NEWSTY.	V. 65
-	-	occidentalis, Weftinbifcher Re	ifer	V. 83
		orichalcus, Rupfertafer	2199	S. 216
-	-	ovatus, Giertafer	45	V. 73
-		oxypterus, Kurzfuß	2 1p 20	G. 217
-	_	pillularius, Pillentafer	in In	V. 70
		plagiatus, Purpurflect	5 a 105	V. 91
-	_	polyceros, Bielhorn	2	G. 214
		punctatus, Punttfafer	-	V. 87
	-	quadrimaculatus, Bierfled	100	V. 91
	-	quisquilius, Rebrichtafer	BH.Y	V. 90
	_	fabulofus, Sandfafer	12	V. 74
	_	facer, beiliger Rafer	27-117	V. 62
	-	scaber, Rauhschild		V. 69
_	-	Schaferi, Schaferstafer	di -a	V. 71
-	-	Schraberi, Schraberstafer		V. 73
	_	folititialis, Juniustafer		V. 83
-	-	Spireæ, Spierlingfafer	-	G. 219
-		fqualidus, Comuntafer		V. 85
		ftereorarius, Stinttafer	- · D	V. 71
-	-	Sticticus, Punktfafer		V. 76
<u> </u>		fubterraneus, Erdwühler	-	V. 66
<del></del>	-	Surinamus, Surinamifcher Ra	ter	V. 75
		Cc 3		Scara-

	Tb.	€.
Scarabæus Syriacus, Spetichet Raffer -	V.	77
- tetradactylus, vierfingeriger Rafer	€.	
- thyphæus, fleiner Stier -	V.	44
- valgus, Krummibein -	V.	63
- variabilis, Unbestand -	V.	89
- vernalis, Frühkafer -	V.	72
vertumnus, Frühlingekafer -	€.	217
Scarabée onlineux, (fr.) Zwitterfaser	V.	379
Searabelaphus, hirschschrieber -	V.	94
Scarafoggio, Scarafosso, (ital.) Rafer -	V.	
Searps, bunter Lippfisch -	IV.	
Scat -fish, (engl ) Welf -	IV.	
Scattes (venet.) Biereck, (Platififch)	I¥.	
Scaut, (schottl.) Alit	<b>II</b> .	
Scizoge, (ital.) Dornhaan -	Ш.	
Schaef, Ovis		421
- Angolisches, (Guineisches Schaaf)	L	428
- Guineisches, Ovis Guineensis -	I.	428
Schaafbromebar, (Kameel) Camelus Guanicos	€.	
Schaafgarbenhahnchen, Chrysomela Gottingensis	¥.	164
	<b>72.</b> 1	060
Chapffameel, Camelus Glama -	I,	371
- Ehilisches, Camelus Paca -		372
Echanflaus, fliegende, Hippobolca ovina	<b>72.</b> 1	010
Schansmaul, (Porzellane) Cyprea lota -	VI.	393
Echaefrelj, (Cifade) Cicada lanata -	¥,	463
sohaah, (perf.) Geiß -	T	404
Schaatenthiere, (Conchilien)	VI,	157
Schappenbout, (boll) Rothling	IY,	
	V2. 1	
Echaben, (Motten) -	V.	735
Schabsügel, (Rachtschm.) Phalana defoliaria	Ø.	313
Sokabital, (bebr.) Erdschnecke ohne haus	VI.	.,
Schach, (Neumoder) Lanius Schach -		II
Schachtelfisch, (Beinfisch) Oftracion gibbolis	u.	310
Schad (Braififch)	IV.	
Schaferstafer, Scarabæus Schæferi -	V.	
Schander, (Raupentider) Ichneumon lugillatorius		
	E.	háti

Scharmues	Scheermesse	rfisch		40
	1	•	Th.	5
Scharmues, (schweis.) Ma	ulwurf			29
Schalach, (bebr.) grauer 9	leibez	_		379
Schally, (engl.) Lavaret	_		IV.	
Scharfrand, (Schnirkelschn	ecte) Helix albe	ella	VI.	
Scharfrippe, (Mondichnecke	) Turbo acutar	gulus	VI.	37
Scharlaar, (boll.) Racterve	oacl	•	II.	181
Scharlachfint, Fringilla Ca	rdinalis •	-	G.	
Scharre, (Seitenschwimme	r). Pleuronech	s Lin	)-	,
guatula		•	IV.	1 < 8
Echarrer, (Wefpe) Velpa r	uspatrix	•	V2.	
Scharre-tong, (hoff.) Dun		IV.		
Chartenlaus, Aphis Cirsii	-	• • •	v.	
Schattenenle, (Waffereulchen	) Phryganes un	brofa	V2.	790
Chattenfliege, Musca umbi	rarum	•	V2.	
Schattenflügel, (Jungfer) L	ibellula umbra	ta ·	V2.	
Schauerschlange, (Rlapperfe	hlange) Crotali	us hor	• \ `	••
ridus -	•	-	III.	139
Schaufelfisch, (Haan) Squa		-	111.	
Schaumwurm, (Cifade) Cic		,	V.	
Sched, (Großmaul) Bucco		-	Œ.	
Echeck, (Holibock) Leptura	mystica .		V.	
Scheck, kleiner, (Holzbock)		iensis	<b>6.</b>	
Scheck, (Strandläufer) Tri		•	II.	
Ecet, (Taube) Columba l	Histrio	•	<b>S.</b>	
Scheck, (Toukan.) Ramphai	stos pulcher	•	C.	
Scheck, (Wanze) Cimex his	trionicus	-	V. 4	
Scheckeule, (Rachtschm.) Ph	alæna leftrix		V. (	580
Schedflügel, (Bastardmespe)	Sphex varies	ata	V2. (	
Scheckflügel, (Tagschm.) Pa	pilio Atalantha	}	V. (	Sig
Scheode, (boll) Scheide	• •	•	VI.	225
Scheep, (engl.) Schaaf		•	_I. ¿	42 E
Scheerbecken, (Gienmufchel)	Chama oblong		VI.	289
Scheerenaffel, Scolopendra	forficata -		72. 11	157
Scheerenschwanz, (Raubfliege	) Alilus forcipa	tus V	2. 10	205
Scheerenschwanz, (Scorpion	fliege) Panorps			
munis		,	V2. 8	ioz
Scheermefferfisch, Amerikanis	der, (Eretensei	:)	IV.	97
•	Cc 4		500	CCO

408	Scheerschwanz Schifsbohrwurm		
Scheen	fowang, Afrikanischer, (Reuntober) Laniu	Eþ. s	
	forficatus - Bengalifcher, ober Caapfcher, Laniu	IL.	109
	coerulescens -	īL	10
Schrif	venauster, (Kammuschel) Ostren orbicularis		
	venbod, (Bodfafer) Cerambyx trochleari		
	enfift, (Rip: fift) Chatodon rotundus	IV.	
	enschnede, (Schnirkelschnede) Helix pla-		
, ,	norbis — —	VI.	96
	oen, Solenes - VI. 225		
C dell	entafer, (Rußeltafer) Curculio vaginalis	V.	
<b>C</b> deit	ensteder, (Raupenteber) Ichneumon vagi	i- V2.	
Scheit	an, (arab.) Langbart -	IV.	
	v, (bebr.) Bachtel -		49
	ifch, (Rabeljau) Gadus æglefinus	IV.	
Cuyin	grüner, Gadus virens —	IV.	•
C dale	ischitis		,
		III.	
	ischteufel, Callyonimus -	IV.	
	e, (Kinthorn) Buccinum Galea	VI.	443
<b>Cuye</b> u	enschnecke, französische, (Blase) Bulla Achi tina —	VI,	•••
Actori	enschnecken, (flaschenartige Kinkhörner)	VI.	
	enschnirfel, Helix Oculus Capri -	VI.	
	telbart, (Nachtchm) Phalæna barbalis		732
	teiblat, (Grasbupfer) Gryflus lamellosus		429
	felbummel, Apis femoralis		
	telringel, (Kliege) Musea corrigiolata	<b>S.</b>	-
	e, (Bennemufchel) Venus fluxuola	V2. VI.	
		VI.	
Deneri Deneri	ie, (holl.) Echerbe band, (Kránsel) Trochus cineracous	VI.	
<b>Call</b>	band, (Rachtschm.) Phalæna gnomana		
	band, (Eaglone.) Papilio Augies —	V.	-
<b>E</b> wit	pante, (Eaglighte) Fapino Augus —	<b>V.</b>	030
	erpudil, (Seefcnede ohne Saus) Doris bi lamellata	VI.	70
Schier	lingfreffer, (Boldbahnchen) Chrysomela Phe	1-	
<b></b>	landrii –		199
	schlange, (Matter) Coluber Aurora	III.	
e diff	bohrwurm, (Holybohrer) Toredo navalis	VI.	

Shifsboote	Schild-Snoek	409
	`	₹b. €.
Chifsboote, Argonautæ	_	VI. 347
Schiffsfabne, (Rraufel) Troch	us dolabratus	VI. 537
Chifshalter, (Sauger) Echen	eis Neucrates	IV. 114
Schikpleder, (ban.) Platteis	_	IV. 153
Childaffel, Scolopendra cole	optrata	V2. 1156
Schildauge, (Bocffafer) Ceran	nbyx oculatus	V. 274
Edilde, (Klippfleber)	-	VI. 602
Schilden, (boll.) Klippleber	-	VI. 602
Schildente, (Loffelente)	• •	II. 290
Schildfink, (Buchfink) -		II 180
Schildsisch, Centriscus -	. •	Щ. 335
Shildfiebe, Monoculi -	•	V2. 1138
Schildhecht, Elox offeus	•	IV. 337
Shildigel, (Seeapfel) Echinus	reticulatus .	VI. 154
Childtafer, Cassida	•	V. 135
Schildfrote, Testuda		III# 15
- Carolinische, Testude	o Carolina	III. 44
- geometrische, Testud	o geometrica	111. 45
- gezähnelte, Testudo - mosaische, Testudo g	denticulata	III. 43
— — mosaische, Testudo g	ræca –	III.
Edilderdtenfisch, (Stachelbauch	)) Tetrodon testy	<b>i-</b>
dineus -	•	III. 313
Schill frotenlaufe, (Schildfroten	ipocten) -	VI and
Childfrotenpocke, (Meereichel) !	Lepas testudinaria	VI. 206
Childfritenporgellane, Cypres	teltudinaria	VI. 390
Echilofrotenschild, (Rlippfleber	) Patella tellud	
naria	-l	VI. 613
Schildfrotentute, Conus Monac Schildlaufe, Cocci	cnus -	VI. 37+
	un Iohannan C	V. 127
Childlausbohrer, (Raupentode corum	r) Ichneumon Co	C-
Edildnatter, Coluber scutatus	•	V2. 860
Schildpad, (boll.) Schildfrote	•	<b>©</b> . 190
Schildpad - Hoorn, (holl.) Sch	ilhfråtennamertene	III. 15
Schildpad - Pok, (holl.) Schild	tratenace	
Schildpad-Toot, (holl.) Schi	ibfråtentute	VI. 206
Schildreiher, (Quadreiher)		VI. 374
Schild-Snoek, (holl.) Schildh	edit	II. 377 IV. 338
	C e	Schille.

	Th.	6
Schilbspike, (Bespe) Vespa uniglumis -	V2.	
Schild Torretje, (boll) Schildtafer -		135
Schildträger, (Baftardwefpe) Sphex clypeata	V2.	
Schilbtrager, (Stuftopf) Coryphoena clypeata	IV.	125
Schilbtrager, (Tobengraber) Sylpha thoracica		128
Schildträger, (Bangen) -		478
Schild-Varkje, (boll.) Pangerthier -		188
Schillervogel, (Tagfchm.) Papilio Iris -		607
Schillig, (Rlippfleber) Patella crepidula	VI.	
Schimmerbauch, (Soldweste) Chrysis fulgida	V2.	877
Schimmerer, (Raupentober) Ichneumon corru	-	
fcator —	V2.	
Schimmerkafer, Lampyris corrusca -	V.	300
Schindel, Schiel, (Sandbarsch) —	IV.	
Schink, (boll.) Stint	III.	99
Schinke, ebler, (Stedmufchel) Pina nobilis	VL.	342
- geräucherter, Pinna pectinata	VI.	341
rauber, Pinna rudis -	VI.	341
- runber, Pinna rotundata -	VI.	344
Bestphalischer, Pinna Muricata	VI.	342
Schip Klemmer, (boll ) ber fleine Cauger	IV.	113
Schirabo, Schiratolo, Schirivela, (ital.) Cichor	n I.	355
Schlafmaus, Schlafrage, (Saselmaus) -	I.	350
Schlammmuschel, (Korbmuschel) Mactra lutaria	VI.	256
Schlammschildfrote, Testudo lutaria -		41
Schlangenbalg, (Ratter) Coluber Leberis	III.	146
Schlangeneidechse, Lacerta Seps	111	-94
Schlangenfisch, Ophidium -	IV.	
Schlangenfresser, (der weisse Loster) -	II.	368
Schlangenhaut, (Mondichn.) Turbo marmoratus	VI.	546
Schlangentafer, (Ruffeltafer) Curculio anguinus	V.	235
Schlangentonig, (Ronigsschlange) -	III.	147
Schlangenköpfchen, (blauer Onix)	VI,	396
Echlangenfopf, (Bastard) Anomia Caput serpentis	VI.	323
Echlangenforf, (Panghale) Plotus Anhinga	II.	333
Schlangentopf, (Porzellane) Cyprea Mauritiana	A 1.	334
Schlangenröhre, (Abhrenfchnede) Serpula vermi	VL.	haa
cularis. — -	<b>₩</b>	-

Ochimideulmmottore Ochinblivelbe	Ħ	411
	Th.	E.
Schlangenschildfrote, Testudo serpentina	IIL,	
Schlangenschnirtel, (Conirtelfdnede) Helix Voi	<b>r-</b>	••
tex		. 566
Schlangenschwang, (Seeftern) Aftoria ophiura		. 139
Solangentober, (Krett) Viverra Mungo	1	245
Chleedornmeffer, (Machtschm) Phalæna prunari	s V	704
Schleichende Amphibien, Serpentes III. 122		
Chleier, (Lagschm.) Papilio Sybilla .		614
Echleiernatter, Coluber vittatus -		176
Schleierschild, (Bodfafer) Cerambyn lineatus		257
Echleiertanbe, (Saubentaube)		500
Echleterwange, Cimex Gronovii	V.	500 503 :
Chleibe, Cyprinus Tringa -	117	383
Echleimnatter, Coluber mucosus		206
Chleimfchlange, (Blinbfchleiche) Czcilia glutinoli	, 111.	200
Schlerpe, (Grashupfer) Gryllus elongatus	1 141. 37	320
Echleprennatter, Coluber stolatus	V.	429
Chlerpentrager, (Lagichm) Papilio Deiphobus	, <b>7</b> 71	176
Schleuber, (Rachtschm.) Phalæna Petiverella		
Echleuderer, (Ratter) Coluber agilis	V.	750
Schleuderfuß, (Langfuß) Tipula flexilis	Va	181
Coleuberfdmans, (Cibeofe) Lacerta caudiverber	- V2.	938
Schleuberschwanz, (Klapperschlange) Crotalus mi	F 110	· 75
liarius -		
Schleyer, s. Schleier,	111.	139
Schlotfeger, (Bockfafer) Cerambyx fuliginator	T 7	
Echinfelloch (Gitter) Ceramoyx rungmator	٧,	268
Schlüffeltrager, (Rafer) Schrabwus claviger	VI.	616
Echlupfbiene, Apis ichneumonea —	<b>.</b> .	214
Edupffliege, Musca ichneumonea —	V 2.	901
	, V 2.	96 t
	. <b>©</b> .	318
- mit abgestußten Fühlbornern	V2.	822
— — mit burftenartigen Kublbornern	V2,	833
- mit drafformigen Auf hörnern	V2.	827
- mit gegliederten und etwas abgestuß		_ ′
ten Kühlbörnern	V2.	826
- mit fammartigen Fühlbornern	¥2.	826
mit ungegliederten Fühlhörnern		824
	~mm	áchta

	Th.	€.
Schmächtling, (Jungfer) Libelfula juncea	V2.	770
Echmalbauch, (Polyboch) Leptura linearis		291
Comalbauch, (Rugeltafer) Curculio oblongus	V.	235
Schniglbauch, (Sanblaufer) Cicindela gracilis		246
Schmalbauch, (Stintkafer) Buprestis stricta		335
Schmalbauch, (Befre) Velpa coarctata	V2.	883
Schmalbecte, (Schilbkafer) Cassida angustata		144
Schmalflugel, (Rachtichm.) Phalmne elongella	V.	743
Comalhals, (holibod) Leptura attenuata	V.	297
	V2.	1135
Comalbans, (Tobengraber) Sylpha oblonga	V.	131
Schmalruden, (Golbhabuchen) Chrysom elongat	a V.	203
Schmalmurm. (Rellerwurm) Oniscus linearis	V2.	1151
Schmalstüchlein, (Kammuschel) Ostrea pilosa	VI.	299
Comaragoschnecke, (Kinkhorn) Buccinum Sma	<b>!-</b>	
ragdulus	VI.	464
Schmeerfloffe, (Bele) Silurus Bagre -	IV.	301
Schmeißfliege, Mulca carnaria -	V2.	
Schmelte, Amodytes -		56
Schmerling, (Dochschauer) Cobitis Anablebs		282
Schmetterlinge, Insecta lepidoptera -		542
Schmetterlingfisch, (Rogfisch) Blennius ocellaris	IV.	103
Schmetterlingseifade, Cicada Phaiænoides -	V.	464
Schmetterlingsmude, (Langfuß) Tipula Phalænoi	i-	
des	V2.	
Schmintvose, (Kammmuschel), Ostrea ftriatula		304
Schminkeflafterwarzenbade, (getronte Bargenbe	li.	٠
<b>đ</b> t) -		439
Edmutter, (Tagfom.) Papilio Protumnus		630
Schmußbauch, (Lirpfisch) Labrus Onitis	IV.	
Comuger, (Krammetevogel) Turdus fordidus		143
Schmustafer, Scarabæus squalidus		85
Comusmuce, (Langfuß) Tipula contaminata	V2.	
Schmusschild, (Stinkfafer) Buprostis trikis		340
Chnabelbohrer, (Meelfafer) Tenebrio roftratu		
Chuabeler, (Biene) Apis rostrata -	V2.	
Schnabelfisch, (Waifisch) Balæna boops		492
Schnafen, (Mucken) -		989 1

Schnakenflügel Schnepfenkopf	413
	Th. S.
Schnakenfliege, (Langfuß) Tipula culiciformis	V2. 943
Schnatterente, Anas strepera -	II. 291
Schnaußenfrabbe, Cancer rostratus -	V2. 1110
Schnaugennabel, (Stachelichnede) Murex verta	
gus	VI. 521
Schnebbennabel, (Schnaugennabel) -	VI, 521
Sonede, gefurchte, (Schwimmschnede) Nerita	١
Hiltrio —	VI. 193
Schnede, geographische, (Kronenbacke)	VI. 383
Schnecken, (einschaaltge gewundene Couchilien)	VI. 346
Schnedenforalline, Sertularia rugosa -	VI2. 837
Schnedenschilb, (Schildtafer) Cassida reticulari	_
Schnedenschlange, (Hornschlange) -	VI. 626
Schnedenschmeiterling, (Pfeilschm) Sphinx tipuli formis	• 
Echneeammer, Emberiza nivalis	V. 644
	II. 560
Schneefink, Fringilla nivalis –	II. 587
Schnechuhn, Tetrao lagopus	II. 482
	V2. 1037 II. 619
Econcetonig, (Zauntonig) Econceloufer, (Pflanzenflob) Podura nivalis 1	71. 019 72. 1019
Schneefchlange, (Ratter) Coluber niveus	III. 191
Schneesperling, (Schneeammer) -	IL 160
Schneetbiefel, Mustella nivalis —	I. 276
Schneiber, (Bafferhute)	V2. 768
Schneider, (Wassenfild)	IV. 394
Echnelltafer, (Springtafer)	V 315
Ednerfe, Scolopax -	IL. 393
- Brasiliantiche, Scolopax Guerauna	IL 394
- Caarice Scolopax Capenis -	IL 402
- — Canadische, Scolopax alba —	II. 403
- gewöltte, Scolopax fusca -	IL 395
- Dudsonische, Seolopan candida	II. 403
- Lapplandische, Scolopax Lapponica	II 402
- Madagascarische, Scolopan Madagasca	
rienlis -	IL 394
Schnepfe, (Balge) Voluta Tringa -	VI. 426
Schnepfentopf, dorniger, (Stachelichnede) Mure	
Brandaris -	VI. 495
	Schmen

•	
	Th. E
Sanepfeutopf, gezacter, Murex cornutus	VI. 49
Schnepfenfchnabel, (Stachelfchn.) Murex Hauft	el-
lum —	VI. 493
Schnerfisch, (Pecht) Esox hepsetus -	IV. 342
Coneppenfifc, (Collbfifc) Centriscus Scolopa	x III. 337
Schneppenpfeifer, (Regenpfeifer) Charadrius Ut	
piensis –	6. 117
Schnirfel, (Robrenfchnede) Serpula Spirillum	VI. 623
Schnirkelnabel, Helix decollata -	VI 578
Schuirtelschnecken, Helices -	VL 561
eirunde -	VI. 579
gethürmte -	VI. 578
fielförmige _	VI. 563
ohne Rabel _	VI. 573
runde, genabelte _	VI. 567
menfchneidige -	VI. 562
Echnottolf, (Meerhaase) Cyclopterus nudus	III. 333
Schnurbund, (Rraufel) Trochus Conulus	
Constinue (Sensitify Tipula manilia	VL 539
Schnurstiege, (Langfuß) Tipula monilis	V2. 938
Schunrbart, (Rabeljan) Gadus Cimbrius	IV. 6
Schoeniclus, (Emberiza) Robesperling	IL 567
Schoenmaker, (niederk.) Schleibe -	IV. 333
Schoer-Haay, (boll) Meetengel -	III. 257
Schoffelaar, (holl.) der weisse Lössler	II. 361
Schol-aakster, (holl.) Meerelster -	IL 424
Scholl, (boll.) Platteis -	IV. 153
Scholvaars, (boll) Taucher	II. 338
Schonshund gleich einem Lichhorn —	6 7
Schoosschlange, (Ratter) Coluber Domicella	III. 160
Schop-Haay, (boll.) Schaufeifisch -	IIL 2,9
Schor, (bebr.) Stier	F 431
Schout by Nagt, (boll) heritute -	VL 364
Schraberstäfer, Scarabæus Schraberi	V- 73
Schrætser, (Perca) Schraisser -	IV. 247
Schraitser, (Barfcbing) Perca Schrætler	IV. 243
Schraube, alte, (Mondschnecke) Turbo exoletus — bunte, (Mondschnecke) Turbo imbric	VI. 112
	<b>.</b> .
tus — .	VL 555
	Corank.

Schwalbe

•	Eb.	€.
Schuppengrind, (Grashüpfer) Gryllus Kaurrofu		
Schuppenhorn, (Bodfafer) Cerambyx imbricorni		
Schuppenkafer, (Ruffelkafer) Curculie hispidus	V.	
Schuppenmufchel, (Rafermufchel) Chiton fquamo	-	•
fus –	VI.	199
Couppenructen, (Geeraupe) Aphrodita fquamata	VL	74
Schuppenschilb, (Cifabe) Cicada squamigera		453
Schuppenschild, (Schildfrote) Testudo imbricate	ııL	17
Schurpenvenus, Venus fquamofa -	Vl.	
Schurpthier, Manis -	1.	185
fünffingeriges, Mantis pentadallyla	I.	18
vierfingeriges Mantis tetradattyla	L	186
Schufter, (Bockfafer) Cerambyn Sutor .	V.	266
Schwaben, (Kackerlacken) -		401
Schwächer, (Raupentober) Ichneumon enervator	V2.	851
Schwängerer, (Raupentober) lehneumon gravi	<b>i-</b> ,	
dator -	V2.	
Schwarmer, (Bastardwespe) Sphex vaga	¥2.	
Schwarmer, (Klippfisch) Chætodon vagabundus	IV.	173
Schwarmer, (nagender Kafer) Byrrhus vagus		121
Schwarmer, (Wanje) Cimex vagabundus	V.	500
Schwärmer, (Waffereulchen) Phryganea Woener	V2	749
Schwarzer, (Fliege) Musca denigrata -	V2.	913
Schwätzling, (Bastardbock) Necydalis atra		29
Schwärzling, (Dornkafer) Hispa atra -		203
Schwarzling, (Goldhahnchen) Chrysomela Gor		
teriæ	V.	180
Schwarzling, (Rachtschm.) Phalæna melanaria	V.	708
Schwarzling, (Rachtschul) Phalæna nigricans	V.	
Schwalbe, Hirundo - II. 630	. E.	179
Amerifanische, Hirundo tapera		634
- Canadische, Hirundo Subis -		633
— — Carolinische, Hirundo Pelasgia	II.	
- Ehinesische, Hirundo esculenta		631
— — Rußische, Hirundo Daurica	€.	•
- Cenegalische, Hirundo Scnegalensis	II.	
Sibirische, Hirundo Alpestris	€.	
- Spanische, Hirundo melba -	II.	634

Schwalbe	Schwanzwurd	417
	A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STA	₹b. €.
Schwalbe, (Porgellane) C	vorea Hirondo	VI. 397
Schwalbengener, (Bifchger	per) -	II. 61
Schwalbenlaue, Pediculu	s hirundinis	V2. 1033
	ippobosca hirundina-	
ria		V2. 1010
Schwalbenschwanz, (Konig		V. 575
Schwalbenspecht, Picus hi		II. 222
Schwammerdams anatomi		
Eagthierche		V. 777
Schwaminhahnchen, Chry		V. 175
Schwamintafer, (Baftarbi	cupelt.) Attelabus Ce	
ramboides	ation colonial marion	V. 247
Schwammtafer, (Todenge		
Schwammtaferchen, (Rlein	italet) Dermeites Eui	the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
Schwammforalle, (Sternt	andley Madesada G	V. 107
	brune) iviaurepora it	VI2. 676
gites Schwammilbe, Acarus f	incorned =	V2. 1057
Schwammniftler, (Ranbfa	Ger) Stanhylinus Bolet	V 2. 1057
Schwammstaub, (Infusio		
gorum	introduction Chaos run	VI2. 921
Schwammftein, (Bellenfor	dle) Cellepora Spon	
gites	WE CAMPAGE SEC	VI2. 725
Schwan, Anas Cygnus	200	II. 275
Gambifcher, Anas	Gambenfis =	II. 279
Schwanengans, Anas Cyg		II: 278
Schwanenfrebe, Cancer N	Mantis -	V2: 1131
Schwanenlaus, Pediculus	cygni -	V2. 1033
Schwanenmiesmufchel, M	ytilus cygneus	VI. 336
Schwanzbauer, (Tagfchin.		V. 623
Schwanzblafe, (Geeblafe)		VI. 93
Schwanzecke, Machtschm.	) Phalæna fambucaria	
Schwanzhafen, (Jungfer)	Libellula forcipata	V2. 770
Schwanzlinie, (Nachtschm		V. 749
Schwangmeife, Parus caud		II. 628
Schwanzrage, (Philander)	Didelphis dorugera	
Schwanzspinne, Phalangie	ım caudatum	V2. 1064
Schwanzwurm, (Flügelme		VI, 110
A COLLEGE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE P	Dd	Schwarz

•	,	Th.	6,
Schmarzafter.	(Holyweste) Sirex mariscus	<b>V</b> 2.	839
Schmartafter.	(Raupentober) Ichneumon rami-		
	dolus •	<b>V2</b> .	857
& Amariaria	(Solthod) Leptura melanura	V.	284
& Amartanae	(Panatur) 1 IDUIA OCCIIATIS	V2.	934
Comartanae.	(Pippfild) Labrus melops	IV.	209
Samariana.	(Porzellane) Cyprea ocellata	VI.	401
Amarianae.	(Enrinafafer) Llater oculatus		317
Somarshade	r (Kliegenfanger) Mulcicapa Ipurc	a C.	170
Samorthanh.	(Rodfafer) Cerambyx Diraiciatu	2 A.	278
Schmarthand.	(Grasbupfer) Gryllus coeruleicen	s١.	441
Chmarthefe.	(finishede) Leptura reveitita	V.	285
Comare her	(Ruffelfafer) Curculio cardonariu	is Va	229
Schmarte, bet	, (Ctinftafer) Buprestis Tenebrie	)-	
	nis ·-	v,	338
Comarge, die	(Bange) Cimex ater -		495
Bamarified.	'hokbod') Leptura quadrimaculata	, V	. 286
Schmartfied.	(Machtichm) Phalæna bimaculola	V.	701
&chmarifled.	Rugelfafer) Curculio bipunctatu	s V	, 225
Comarifluge!	, (Grashupfer) Gryllus melanopt	e-	
_ •	tus	V.	. 431
Schwarzflügel	, (Jungfer) Libellula quadrimac	1.	
	lata -	Y 2	. 766
Comariffuge!	, (Tagschm) Papilio Melite		. 583
Comarifluge!	(Maffereulchen) Phryganea nigra	1 V2	. 787
Schmartfuß,	Bodfafer) Cerambyx melanopus	5 V.	. 254
Schwarzfuß,	(Goldhahnchen) Chrysomela mel	2- * 7	
نفذ ند	nopa -		. 197
Schwarzfuß,	(Bante) Cimex Nigripes		. 501
Schwarigurte	1, (Raurentober) Ichneumon einste	S V 7	2. 858 -0a
Schwarzbart,	(Lagthierchen) Ephemera nigra		. 786
Schwarzhals,	(Laube) Columba atricollis		. 135
Schwarzhals,	(Loufan) Ramphastos atricollis		. 83
Schwarzfafet,	(Mantafer) Meloë Gonani		. 255 . 610
Samaritappo	hen, (Klosterwensel) -		, 010
edmaritehia,	en, (Bachstelje) Motaeilla Phoen	1° 11	. 619
<b>*</b> * * * ***	Curus - Curusii		. 013 , 20}
Schwakftehle'	(Baumhader) Trogo Curucui	A 4.	, <u></u> ,

Schwarzköpschen Schwarzrock		419
	ŶЪ.	S.
Schwarztopfchen, (Erbtafer) Carabus atricapili	us V.	366
Schwarzfopfchen, (Golbhahnchen) Chrysomela at	ri-	,,,,
çilla —		182
Schwarzköpfchen, (Meife) Parus atricapillus		627
Echwaritopf, (Drossel) Oriolus icterus	II.	187
Schwarzfopf, (Erdfafer) Carabus melanocephali	ıs V.	36E
Schwarzfopf, (Kernbeisser) Loxia melanocepha	la II.	556
		150
Schwarzkopf, kleiner, (Blauspeche) -	II.	232
Schwarztopf, (Kleinkafer) Dermestes melanoc	e.	
phalus	V.	106
Schwarzfopf, (Natter) Coluber melanocephalu	s III.	170
Schwarzkopf, (Neuntober) Lanius Cajenenkis		72
Schwarztopf, (Wanze) Cimex melanocephalus		499
Schwarztopf, (Zeisig) Pipra melanocephala		177
Schwarzfragen, (Regenpfeifer) Charadrius to	ŗ•	- • •
quatus		419
Schwarzlinte, (Citade) Cicada lineata		453
Schwarztime, (Rachschm.) Phalæna vitella		743
Schwarzmond, (Rackerlack) Bistts oblongsts		406
Schwarzmotte, (Rachfichm.) Phalsena Clerkella	V.	756
Schwarzmund, (Canarienfchnecke) -	VI.	483
Schwarznase, (Meerkage) Simia Talapoin	€.	
Schwarznymphe, (Lagschm.) Papilio Tipha	V.	<b>609</b>
Schwarzohr, (Reuntober) Lanius auriculatus	G.	71
Schwarzpunkel, (langfuß) Tipula nigra	۷e.	
Schwarzpunkt, (Goldbabnchen) Chrysomela qua-	•	
dripunctata	, <b>V.</b>	187
Schwarzpunkt, (Fangfuß) Tipula atrata	V2.	
Schwarzpunkt, (Nachtschm.) Phalæna lota		675
Schwarzpunkt, (Schlidkaf.) Callida grossa		14E
Schwarzeunkt, (Wanze) Cimex lexpunctatus		488
Schwarzrand, (Schildfafer) Cassida marginata	V.	
Schmargrand, (Setingkafer) Elater marginatus	V.	
Schwarzrand, (Tagichm.) Papilio Thamyras		625
Schwarztingel, (Biene) Apis annulata	V2.	
Schwarzeingel, (Weerbrachsem) Sparus annularis	IV.	180
Schwarzrock, (Ruftelkafer) Curculio ater		239
Dd 2	<b>E</b> Ó#	art

	Th. E.
Schwarzrock, (Springkafer) Elater niger	V. 325
Schwarzeuden, (Schlupfwespe) Tenthredo mess	
mela —	V2. 829
Schwarzruffel, (Ruffeltafer) Curculio æquatus	V. 216
Schwarzschit, (Gulfettufet) Chryfomela decem	
Edmarilanto, (Solobanharii) Ciri y tomera decem	¥. 192
maculata	
Somarischild; (Sonnenkafer) Coccinella Surina	V. 147
mensis -	¥ 501
Sowarzschild, (Banje) Cimex fetrugineus	K 65. 141
Schwarzschnabel, (Krammeter.) Turdus maculatu	2 II. 408
Schwarzschnabel, (Stranblaufer) Tringa morinell	V. 642
Schwarzschnur, (Pfeilschw.) Sphinx Theylis;	IV. 240
Schwarzschwanz, (Barsching) Perca melanura	
Schwarzichmani, (Baftardruffelfafer) Attelabut	V. 245
melanurus	E- 153
Schwarzichwanz, (Rernbeiffer) Loxia melanura	_
Schwarischwang, (Meerbrachsem) Sparus mol	IV. 180
nurus Conthorio d	
Schwarzschwang, (S. Joh. Fliege) Cantharis m	V. 314
lanura	
Schwarzspite, (Raupentober) Ichneumon bico	V2. 858
lorus	V. 583
Schwarzstrich, (Tagschm.) Papilio Calliope	V. 586
ANAMARITATION (YANIMING) PROMIC CULVIA	V. 590
Schmartstrich, (Lagidin,) Papillo Glaucippe	V. 591
Schmaritrette, (Sagichia,) Papillo Arialle	
Schwarz und weiß, (Tagichm ) Papilio Pinthæ	
Schwarzviered, (Rachtschm.) Phalmna rhombe	)1- <b>₩. 74</b> 5
della	V. 610
Schwarzmelle, (Lagichm.) Papilio Dirce	
Schmarzwiebel. (Kliegenfanger) Mulcicapa puea	(a S. 172
Admaramichel (Kernbeitter) Loxia [vioineau	G. 17º
Edwarushn, (Seetaufendbein) Nereis Norvegu	A VI. 82
Comeber, Bombylius -	V 26 100/
- großer, Bombylius major -	V2. 1007
fleiner, Bombylius minor -	V2. 1008
- mittlerer, Bombylius medius	V2. 1008
Edwede, (Goldhahneh.) Chry fornela Calmarien	lis V. 196
in the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac	A character

	Schwede	Schwertelkafer		421
	•		Eh.	G.
<b>Come</b>	de, (Grashupfer,) C	Gryllus apricarius	V.	444
	oc, (Rleinfafer) De		у.	109
	feler, (Citabe) Cica			463
	felfled, (Rachtschm.)			748
Come!	felfübler. (Machtschm	.) Phalæna folphurali		733
	elhabuchen, Chryso			200
	eltafer, (Erdflob) !		V.	386
	felspinne, Aranea fla		¥2, 1	078
Schwei		- L 46	ı. <b>5</b> .	58
<del>_</del> _			€.	59
	Guineisches, Sus P		Į.	465
		<b>T</b>	I,	463
		- · · · · · -		464
Schwei	nchen, (Balge) Vol	uta Dactylus	VI.	
@dowei:	nfisch, (Zotenfisch)	-	Ш.	298
Comei	nglaug, Pediculus S		<b>V2.</b> 1	
Samei	nsrücken, (Liprfisch)	Labrus fuillus	IV.	206
Schwein	ngrüßel, (Flederma	us) – VI.	434,	435
@chmei	ngrüßel. (Tatoba:R	rua) —	VI.	439
Schweit	nsschnauße, (Pfeilsch	m.)Sphinx Porcellus	<b>.</b> V.	641
Schweli	nstein. Pedro del P	orco —	1.	309
Sameir	nstabn, (Meerbrach	(km) Sparus Hurta	ĮV,	183
Schweit	nsjahn, (Meerjahne	pen) Dentalium apri-	•	_
	num	-	уı.	619
Schweiz	er, (Strandläufer)	Tringa helvetica		410
Schweig	erhose, (gezackte Be	alķ) ÷	VI.	
	- gejactte, Stro	embus Gigas		485
Schweiz	erfrabe, Corvus gi	raculus -		181
Schwen	iska, (schwed.) Gri	infint 🖚		554
Schwer	dfisch, (Degenfisch)	Xiphias Gladius	IV.	•
Schwer	dfisch, (Petermannd	hen) —	IV.	•
Schwer:	mer, (Baftardwespe	) Sphex vaga	V2.	874
Schwer	mer, (Lippfisch) Ch	ætodon vagabundus	IV.	
Schwer	mer, (nagender Sá	fer) Byrrhus vagus		121
Schwer	mer, (Wanze) Cime	ex vagabundus		506
		) Phryganea Woeneri	V2.	•
Schwert	telhummel, Apis Ire	eos —	€.	329
Schwert	telkäfer, (Ruffelkäfe	er) Curculio Ireos		230
• • .	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Dd 3	<b>E</b> án	YAIG

,	Tb.	6.
Schwimmen der Fische -		. 12
Schwimmende Amphibien, Nantes III.	227. €	. 194
Schwimmer, (Drebfafer) Gyrinus Natator	V	. 117
großer, (Baffertafer) Dytilcus p	iceus V	344
fleiner, (Waffertafer) Dytilcus C	ara-	•
boides	V	. 346
Schwimmer, (Maufeabler) -		. 84
Echwimmer, (Meerpferd) Pegalus natans	Ш	L 349
Echnimmer, (Rachtschm.) Phalæna nymphæ	ata V	. 721
Cominmer, (Conirfelfonede) Helix ftagna	alis VI	L 578
Schwimmer, (Weihe)		l. 71
Schwimmschnecken, Neritæ - VI.		
gegahnelt und ohne Rabello		. 590
mit genabelter Mundung	- VI	1. 585
ungegabnelt und obne Rabe		
Schwinumftein, (Sternforalle) Madrepora na		
	273. €	101
mit flachem Ednabel, Roftro		-
æquali -		I. 275
mit hoderigem Schnabel, R		
basi gibbo -		L 281
Schwingelfuß, (Langfuß) Tipula fibratoria		2. 938
Schyf-Taling, (holl.) Rriechente -		IL 297
Sciena, Umberfisch		7. 217
eirras, Barnımber -		7. 220
- unimaculata, Seitenfied -		7. 21R
Scincus, Stint	-	L 99
Scinke, (engl.) Etint -		L 99
Sciurus, Eichhorn —		l. 355 L 359
— — Estuans, Eurinamisches Sichhorn — — cinerous, aschgraues Sichhorn		I. 356
- flavus, gelbes Cichborn		1. 357
— getulus, Afrikanisches Eichhorn		I. 357
- getuus, afritumpus emyetu		I, 356
— niger, schwarzes Eichhorn		I. 317
- palmarum, Wiefeleichborn - ftriatus, gestreiftes Cichhorn -		I. 358
- volans, flegendes Eichborn		I. 359
vulgaris, gemeines Eichhorn		Î. 355
Am Ambures Seminar publican		ciurus

	Sciurus	Scomber	423
	7		TH. S.
Sciurus	, (Simia) Mongus	-	S. 12
	Laxierfisch	-	IV. 182
	estrea, (griech.) Conchilie	n	VI. 158
	ix, (Centriscus) Schnepp		III. 337
	ix, Schnepfe	•	II. 393
	ægocephala, Geißtopf	• .	11, 402
	alba, Canadifche Schnep	fe –	II. 403
	arquata, Rrummichnabel	-	II. 39 <b>4</b>
	calidris, Rothfuß	<b>—</b> 1	II. 400
	candida, Subsonifche Co	<b>I</b> nepfe	II. 403
<b></b>	Capensis, Caariche Schi	nepfe -	II. 402
<u> </u>			II. 398
<u> </u>	fulca, gemo fte Schnepfe	, 🖚	IL 395
	gallinula, Bafferbubnch	en —	II. 39 <b>8</b>
	Guarauna, Brasilianisch	e Schnepfe	II. 394
	glottis, Regenschnepfe	-	II. 399
	Lapponica, Lapplanbisch	he Schnepfe	II. 402
	limola, gemeine Pfulichn	epfe –	II, 40E
	Madagascariensis, Mada	gascarische Sc	hne
	pfe		II. 394
	phoeopa, Regenvogel	•	II. 395
	rusticola, Waldschnepfe	-	II. 396
	totana, Strandschnepfe		II. 400
Scolope	ndra, Asselwurm		V2. 1155
<b>-</b> -	- coleoptrata, Schild		V2, 1156
	- electrica, Glanzaffel		V2. 1159
— <u> </u>	- ferruginea, Afrikan	ilcher Allei	V2. 1159
	- forficata, Scheereng	nei -	V2. 1157
	- Gabrielis, franzossf		V2. 1159
	- giganten, Riesenaffe	1 -	V2. 1158
<del>ー</del> フ	- lagura, Haasenschwe	ang +	V2. 1156
	- marina, heringsaffel		V2, 1161
سده متنه	- morsitans, indianisch		V2, 1158
	- occidentalis, Abend	lander	V2. 1160
 Saa=b==	— phosphorea, Johann	itealler	V2. 1160
ocomb <b>e</b> i	r, Mafrele	<b>-</b> 1V.	. 256. 257
	chrysurus, Goldschwanz	-	IV. 256
-	glaucus, blaue Mafrele	• ,	IV. 263
~	Dd 4	}	Scomber

,	Th. C,
Scomber pelagieus, Seemafrele -	IV. 267
- trachurus, Baftardmafrele -	IV. 264
Scooper, (engl.) Waffersabler -	II. 422
Scopoli Eintheilung ber Fliegen =	V2. 949
Scops, afrifausscher Reiher —	II. 371
Scops, (Strix) Baumeule	İL 99
Scorpæna, Meerscorpion	IV. 139
hamida Osubaniida —	IV. 141
- ferofa, Stachelsau	IV. 140
Scorpio, (Murex) Scorpioniconece -	VI. 499
Scorpio, Ecorpion -	V2. 1088
- Afer, Afrikaner	V2. 1091
- Americanus, Amerikaner -	V2. 1091
- australis, Sublander -	V2. 1002
— Carpathicus, Ungar —	V2. 1091
— Europæus, Europáet =	V2. 1092
- Maurus, Aethiop	V2. 1090
Scorpiaen, (boll) Ecorpian	V2. 1088
Scorpioenen, (boll.) Podagraschnecken	VI. 478
Scorpioentje, (boll.) Scorpionschnecke -	VL 499
Soomion Wiegen (hall) Scarpingfieden	V2, 802
Scorpioen-vliegen, (boll.) Scorpionsliegen Scorpioides, (Testudo) Scorpionschilbsrote	III. 42
Scorpion, (engl. und fr.) Scorpion z	V2. 1088
Pobliciam Conniones	V2. 1088
Ccorpiones -	V2. 802
Scorpionfliegen, Pangepen Scorpioides	III. 42
Crorpionichnecke, (Stachelichnecke) Murex Sc	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VI. 499
P10  Corpionspinnt, Phalangium Cancroides	V2. 1063
Scorpiouros, (Musea) Scorpionfliege	V2. 802
Scorpius, (Strombus) Podagraschnecke	VI. 477
Scortum, (Donax) Triangel	VI. 259
Scorzetta, (ital.) Wiesenserche	11. 518
Scorzone, (ital.) Dundshaan -	III. 262
Scraba, (schwed) Donnerfrote	IV. 137
Scraye, (engl.) Meerschmalbe =	II. 35#
Seriba, (Perca) Schriftbarsch -	IV. 239
Scrobilator, (Murex) Doggerfander	VI. 505
Propositional fortalisms of Advisors	Scro-

pcrofano	Seansauge	429
		₹b. €,
Scrofano, Serofanello, (ital.)	Dornschwein	IV. 139
Scropha, (Scorpæna) Stache		IV. 140
Scropha, (Sus) Maftichwein	-	S. 58
Scropha, (Sus) Cau -	-	Į. 46ą
Scurf, (engl.) Lachsforelle	<b>~</b>	IV. 317
Scurulus, Eichhorn	<del>-</del>	1. 355
Scurvogel, (boll.) Indianisch	er <b>Labifop</b> f	II. 366
Scylla, (Papilio) Boltenfluge		V. 592
Scyllea, Seemoosschnecke	· 🚣 .	VI. 107
Pelagica, Geegrasfrie	cher –	VI. 107
Scytale, (Anguis) 3mentopf	-	III. 217
Scytale, (Boa) Stockschlange		III. 149
Scytha, (Coluber) Baldichla	nge -	S. 191
Sea-Adder, (engl.) Geenatter		III. 343
Sea-Devil, (engl.) Meerfrosd	6	III. 280
Sea- Dottrell, (engl.) ber Dol	limetschen =	II. 407
Sea-Feather, (engl.) Seefeb		Vl2. 754
Sea-Feather, large (engl.)		VI2. 766
Sea - Gudgeon, (engl.) Grunt		IV. 126
Sea-Horse, Sea Cow, (engl	) Mallroff -	Į. 172
Sea-Hound, (engl.) Meerfau	-	III. 260
Sea - Lark, (engl.) Regenpfeifer	. Schnesammer II	415.560
Sea-Loche, (engl ) Meerquar		
Sea - Owl, (engl.) Geeeule	-	III. 330
Sea - Pie, (engl ) Aufterfischer	·	II. 425
Sea-Pike, (engl.) Seehecht	-	IV. 337
Sea-Rough, (engl.) Bahnbrac	bfem -	IV. 189
Sea-Snail, (engl) Rablbart	-	IV. 69
Sea-Snail, (engl.) Ringbauch	• •	III. 333
Sea-Star, (engl ) Sceftern	_	VI. 129
Sea - Urchin, Sea - Hedgehog,	(engl ) Geeapfel	l VI. 144
Sea - Wolf, (engl ) Ceemolf	_	IV. 54
Seal, Seal - Hound, (engl.) R	obbe ober Geebun	b l. 198
Seche, Seiche, (fr ) Dintenfis	<b>d</b> ) -	VI. 115
Sechsauge, (Spinne) Aranea	lenoculata	V2, 1979
Secheauge, (Tagschm.) Papili	o Canthus	V: 599
Sechsauge, (Lagschm.) Papili	o Hero 💂	V. 629
Sechsauge, (Tagschm.) Papilie	o Lampetia	V. 607
	Pds	Cecha
	· • · ·	

	Th.	€.
Cechsfeber, (Rachtschm.) Phalena hexada&yla	<b>V.</b>	758
Sechefied, (Sonnenfafer) Coccinella sexpultulat	a V.	161
Sechsfuß, (Rrabbe) Cancer hexapus	V2, 1	101
Sechspuntt, (Connentafer) Coccinella fexpun-		
Etata -	V.	
Sechspunkt, (Spinne) Aranea sexpunctata	V2. 1	
Cechswinder, (Schnirfelschnecke) Helix Algira	VI.	
Sechstahn, (Ameise) Formica sexdens	V2,	915
Sechzehnsted, (Sonnentafer) Coccinella sedecin	n-	
pustulata	V.	102
Sechiehnpuntt, (Connentafer) Coccinella sedecin	n-	
punctata –	<b>V</b> ,	,154
Sechgehntropf, (Connentafer) Coccinella fedecin	v.	ن
guttata -	IV.	
Sektatrix, (Perca) Springer	VI.	-
Seda, Wassersaden —	11.	
Seeabler, (Fischabler)	VI.	
Seeapfel, Echini - mit bem After oben -	VI.	
- mit dem After und Munde unten	VI.	-
Secamaranth, (Sternforalle) Madrepora Am		-,+
ranthus - VI2.	682.	702
Secamfel, (Bafferstaar)	II.	
Secananas, Madrepora Ananas -	VI2.	681
Seeaffel, (Rellerwurm) Oniscus oceanicus	V2. 1	
Seeaster, (Geeblume)	VI.	90
Seebar, (Seefalb) Phoca urlina -		195
Seeball, (Seeapfel) Echinus esculentus	٧J.	147
Cectort, (Cectort) Alcyonium Cydonium	VI2.	
Seebarsch, Perca marina -	IV.	
Scebasta, (Euchschwamm)	VI2.	
Scebefen (horntoralle) Gorgonia vorrucola	VI2.	
Geebeutel, (Darmscheibe)	VL VI	-,
Seebeutel, (Seeblafe) Holothuria frontofa	VI.	
	VI2. VI2.	
Ceebimfe, (horntoralle) Gorgonia anca	VI2.	-
Seeblase, Holothuria - •	VI.	-
Seeblume, (Seeneffel) Actinia effocta		ee.

Seegallert, Zoophyta: Vorticella VI2. 865. S. 383
— Boltenische, Vorticella Bolteni S. 383
Seegespenst, (Seeblase) Holothuria Phantapus VI. 95
Seegrastriecher, (Seemoosschnecke) Scylkea pelagica VI. 107

Ceegallert, (Geeforf) Alcyonium gelatinosum

Seegudgud, (Beinfisch) Ostracion quadricornis III. 308 Seegudgud, (Seehahn) Trigia Cuculus IV. 279 Seehaase, (Lump) — III. 330

Seehaase, (Seelunge) - VI. 66

VI2. 788

	Eb.	€.
Seebaafe, Tethys	VI.	Ģī
Schahn, (Seedrack) Chimæra Ca	llorynchus III.	277
Seebahn, Trigla -	17. 272. 😇	302
Carolinifcher, Trigla Caro	olina 🥙	
- fleiner. Trigla minuta	- 6.	205
Cechandidu, (Meerichwamm) Spons	gia tubulosa VI2	797
Secheher (Bättcherhohrer)	- VL	412
Seebeidefraut. (Hornforalle) Gorgot	nia Placomus VI2.	, 754
Seehenne, Secelster, (Gronlandisch)	e Geetaube) 11.	312
Sechenschrecke, (Rrebs) Cancer Ho	omarus V2.	129
Seebonigtuchen, (Sternforalle) M	adrepora fa-	40
<b>V</b> 0(2 -	V12.	
Cechorn, (Sorntoralle) Gorgonia	ceratophyta V12.	758
Geebundchen, (Saapfifc) Squalus	Catulus III.	
Seebund, fleiner, (Geefalb) Phoca	pullia E.	
Seeigel, (Blutigel) Hirudo murica	ita - VI.	
Seefanden, (Beinfifch) Oftracion	cornutus III.	
Seefafatu, (Papagentaucher) Alca	criitata 😇	104
Ceefalb, Phoca -	I. 194. E pestinata VI2.	
Ceetamm, (Dornforalle) Gorgonia		
Ceetastanie, (Geeapfel) Echinus G		149
Seetage, (Bladfifch) Sepia Loligo		
Sectnotchen, (Secapfel) Echinus L	eroides VI.	
Seetnopf, (Seeapfel) Echinus Sph		
Seetocher, Zoophyta: Tubularia	- VI2.	300
Seefort, Zoophyta: Alcyonium		
Seetrabe, (Umberfisch) Sciena Um		
Sectrote, (Seeteufel) Lophius Hist Sectrone, (Secapfel) Echinus Diad	lema VL	
Sectrone, (Gerapper) Echinus Diac	icenta VI.	
Seefuchen, (Seeapfel) Echinus Pla		
Seetugel, (Seeapfel) Echinus Glot Sectub, Trichecus, Trichecus Mar	natus I. 171. 174.	K 21
Sectio, Trichecus, Trichecus iviai	— I.	176
Cectubstein, Lapis Manati		
Scelaus, (Rellerwurm) Oniscus ma	→ V2.	
Scelaus, (Spebs) Cancer Dorfipes		386
Seclausporzeflane		40
Scele; ihr Aufenthalt im Korper	ui.	
- ibr Daseyn -		Secle
	~ ~	_ ****

Sede	Seepferdchen	429
		Th. G.
Seele; wann, und warum verl	äßt sie den Körper	III. 55
- wo kommt sie bin ?	_	III. 57
Seclerche, (Rogfifd) Blenniu	s Galerita	IV. 100
Seelerche, (Strandpfeifer)	-	II. 415
Seelicht, (Menonitentute)	<u> </u>	VI. 368
Seelicht, (Geetausendbein) No	ereis Notiluca	VI. 78
Seelilie, (Seegallert) Vortice	ella Encrinus	VI2. 866
Seelowe, (Seefalb) Phoca le	onina —	I. 197
Geelunge, Laplusia		VI. 66
Seemaufe, (Dulfen ber Ctache	lrochenener)	III. 242
Geemause, (Seeraupen)	<b>—</b>	VI. 72
Seematrele, Scomber pelagio	ius ·	IV. 267
Seemaulwurf, (Sternforalle) !	viagrepora i aipa	
Seemans, (Stachelruden)	-	VI. 72
Seemerte, (Lippfifc) Labrus	Meruia -	IV. 216
Seememe, Labrus marinus	_	II. 346
Seembuch, (Giestanne)	<del>-</del>	VI. 629
Seemoosichneden, Scyllene	. NASLANIA	VI. 107
Seemuge, (Meereichel) Lepas	ileeria •	VI. 206
Ceemute, (Qualle) Medula	ollearis	VI. 126
Seenatter, (Rabelfifch) Syng:	athus Ophiaion	III. 343
Seenelte, (Seeblume)		VI. 90
Seenelte, Seedlume, (Auftern	lener)	VI. 88
Seenelte, (Sternforalle) Mac	repora racera	VI2. 702
Seeneffel, Actimia	(Deartafal)	VI: 87
freye, beutelartige, (	min Dationshim	VI. 127
Seenes, (Sornforalle) Gorge	Min Kenedium	VI2. 769
Geenuf, (Gienmufchel) Cham	Verus Perestie	VI. 287
Ceenymphe, (Benuemuschel)	A cities Doceans	VI. 276
Seeorgel, (Robrenforalle) Ti	101bora minica	VI2. 667
Seeotter, (Meerotter)	· Afon oπΩion	I. 259
Ceerapagen, (Paragentaucher	Alea Ofittania	li. 311
Seepartit, (Papagentaucher)	Mica Philacula	<b>6.</b> 104
Ceepastete, (Geeftern) After	ta atanciaca	VI. 137
Ceepeitsche, (hornforalle) G	or Rouna makenora	VI2. 76f
Scepfau, (Rampfbahn)	Apliaria Macialia	H. 404 11. 316
Seepferd, (Sturmvogel) Pro	renathus Hinnoge	
Ceepferdchen, Madelfisch) Syn	2 min tribbock	HI. 344
F.c.		

• •	
,	Th. G.
Seepinsel, (Gicefanne) -	VI. 630
Seepode, große, (Mecreichel) Lepas Balanus	VI. 201
fleine, (Meereichel) Lepas Balanoides	VI. 203
Seepolype, (Seegallett) Vorticella polypina	VI2. 867
Seepomerange, (Scefort) Alcyonium lyncurium	VI2. 784
Secquitte, (Secfort) Alcyonium cydonium	VI2. 786
Seerabe, (Meerschwalbe) -	IV. 27?
Scerabe, Geerapp, (Scefrabe) -	IV. 219
Ceerabe, (Tauchergans) -	II. 304
Seeraupe, Aphrodita -	VI. 72
Secrațe, (Pfeil rache) -	III. 277
Seerescha, (Sorntoralle) Gorgonia lepadifera	VI2, 752
Secrinben, Fluftræ -	VI2. 807
an beeben Sciten poros -	V12. 808
- an einer Seite poads -	VI2. 812
Ceefandwurm, (Regenwurm) Lumbricus marinu	s VI. 41
Seefcheibe, (Seeapfel) Echinus Orbiculus	VI. 156
	3. E. 355
Seefchilling, (Geefcheibe)	VI. 156
Seefconecte ohne Saus, Doris	VI. 69
Ceefchwalben, Seefpechte, (Eisvogel) -	11. 236
Ceeschwermer, (Qualle) Medusa pelagica	VI. 127
Ceefcorfion, (Donnertrote) -	IV. 137
Seeferpent, (Mal) Muræna Ophis -	iV. 35
Seesonnenblume, (Rronennessel) -	VI. 89
Ceespinne, Phalangium Grossipes -	V2. 1059
Seefrlint, (Seefort) Aleyonium alburnum	VI2. 781
Seeftachelbarich, (Dornfisch)	IV. 254
Seefterne, Afteriæ . VI. 120	D. S. 316
fteruformige	VI. 131
- ftralige -	VI. 139
- ungetheilte -	VL 131
Geestichling, (Stachelbarsch) Gasterosteus puns	gi-
tius – 🦩	IV. 253
Seeftint, (Grundel) Gobius Jozo -	IV. 130
Seeftrick, (Dorntoralle) Gorgenia spiralis	VI2. 756
Seeftrumpf, (Aufterneffel) -	VI. 88
Seetamarinde, (Roralline) Sertularia Tamariles	V12.835
	E co

	Eb. È.
Seitenfleck, (Schildtafer) Cassida lateralis	V. 143
Beitenfled, (Umberfifch) Sciena unimaculata	IV. 218
Seitenschwinner, Pleuronectes -	IV. 147
Umboinischer, Pleuronectes try	<b>'-</b>
chodactylus —	IV. 148
Carolinischer, Pleuronestes Pla	[•
giula	IV. 148
bie Augen an ber linten Ceite	IV. 158
die Augen an ber rechten Seite	IV: 148
Surindinischer, Pleuroneltes oc	el-
latus —	IV: 149
Selabonbod, (Bodfafer) Cerambyx glaucus	V. 263
Seledon, (Tanagra) Seledonfopf	<b>5</b> . 148
Gelebontopf, (Merle) Tanagra Seledon	<b>5.</b> 158
Selvago, (port.) brafilianischer Affe	l: 114
Semele, (Papilio) Europaischer Atlas -	V. 604
Semilituus, (Nautilus) Halbrosaune	VI: 358
Seminulum, (Serpula) Saamentern	VI: 623
Seminulum, (Sylpha) Cannentorn	V. 126
Senator, (Conus) Bastarbabmiral	VI. 372 II. 620
Senator, Haubenfonig	
Genegalier, (Strandlaufer) Tringa Senegalent	er H. 552
Senegaly Raye, (engl.) Genegalicher Rernbeiff	III. 103
Senembi, (ind.) Rammleguan Senffreffer, (Golbhahnchen) Chryl. Barbares	V. 190
Senfreißling, (Tagiom.) Papilio finapis	¥. 588
Seniculus, (Simia) Greiß	1, 126
Sentflugel, (Citaben) Cicadæ deflexæ	V: 464
Sentflugel, (Grashupfer) Gryllus cinerarius	V. 433
Senforium commune: ohne daffelbe tann tein El	
femi -	VI2. 950
Sépia, Blackfisch -	VI: 112
- media, Meersplinne -	VL 117
octopodia, Achtfuß	VL 113
officinalis, Dintenfifch	VI. 115
- Gepiola, Zwergblackfisch -	VI. 118
Sepicola, (Scarabæus) Zauntafer -	V. 71
Bepiola, (Sepia) Zwergblacksch =	VI. 118
	Seppe

	•	, =		
Se	rtular	ia avicularia, Bogelforalline	_	Th. E.
-		bursaria, Saschenkoralline	_	VI2. 857
-		cedrina, Cebernforalline	_	VI2. 855
_	-	ciliata, Haarkoralline	_	VI2. 854
_		cornuta, Bockshornkoralline	, <del>-</del>	VI2. 860
		cupressina, Eppressentorallir		VI2. 862
		cuscuta, Flachefeibenforallin		VI2. 836 VI2. 846
-		dichotoma, Drattoralline	*	VI2. 840 VI2. 849
-	. —	eburnea, Elfenbeinkoralline	•	VI2. 849 VI2. 861
_	_	echinata, Ctachelforalline		VI2. 801 VI2. 842
-	-	falcata, Sichelforalline	_	VI2. 840
-		fastigiata, Rronenforalline		VI2. 856
	-	filicina, Forrentoralline	-	VI2. 853
	_	gelatinofa, Gallertforalline		V12. 848
_		geniculata, Anotenforalline	_	VI2. 847
_		halecina, Beringforalling	· •	VI2. 838
-		lendigera, Rifforalline	-	VI2. 847
-	_	loricata, Parnischforalline	•	VI2. 863
		loriculata, Panjerforalline	_	VI2. 855
-	-	medica cochleata, Schnecken	tlee	VI2. 837
—	<del></del>	neritina, Reritenkoralline	•	VI2. 858
7	<u> </u>	operculata, Deckelkoralline	•	VI2. 834
	-	paralitica, Rlebforalline	•	VI2. 860
		pennaria, Federkoralline		VI2. 853
_		pinnata, Burftenkoralline	<u>.</u> .	Vl2. 851
	-	polyzonia, Gurtelforalline	•	VI2. 852
	-	pumila, Zwergkoralline	_	VI2. \$34
		purpurea, Purpurforalline		VI2. 854
	<u>·</u>	reptans, Kriechforalline	_	VI2. 859
		rosacea, Lilienforalline	-	VI2. 833
_	-	rugola, Schneckentoralline	•	Vl2. 837
	i	scrupola, Steinkoralline	•	VI2. 858
_		speciola, Rrausforalline	-	VI2. 842
		spinola, Seidenforalline	-	VI2. 850
_		lyringa, Flotenforalline	-	VI2. 845
		tamarisca, Seetamarinde	•	VI2. 835
_		thujia, Burstenkoralline	-	VI2. 838
_		uniflora, Korallenrinde	-	VI2. 845
_		vertici <b>Ux, A</b> ranzforaAine	=	VI2. 844
				Ser-

Sertularia	Siebbein	435
Centularie malubilia (Barawana)	4:	Eh. S.
Sertularia volubilis, Korallenrin	ide VI2	. 844. 845
Cerval, (Rage) Felis Serval	•	<b>©</b> . 30
Sey Of, (norw.) gruner Schelfi		IV. 91
Sgnainolo, (ital.) punktirter Str.	andlauter	II. 41E
Shad, (engl.) Alse —	-	IV. 372
Shagg, (engl.) Kormoran		II. 328
Shake, (engl.) Breitschwanz, (To	inde) 🛥	II. 501
Shark, (engl.) Meersau -	-	III. 260
Shearwater, (engl.) Penguin	_	II. 320
Sheld apple, (engl.) Rernbeiffer		II. 544
Sheldrake, (engl.) Brandgans	• -	II. 279
Shepherd, (engl.) Weberknecht	• .	V2. 1060
Shipjack, (engl.) Dupfer		IV. 252
Shoveler, (engl.) Loffelente		IL 290
Shrew-moule, (engl.) Spikman	18 -	I. 303
Shrimp, (engl.) Garnale	` <del></del>	V2. 1125
Siælt, (schwed.) Robbe -	<b></b> .	I. 198
Sjantoschnecke, (linkische Feige)	<b>-</b>	VI. 514
Sibirier, (Graebupfer) Gryllus		V. 443
Sibirter, (Kernbeisser) Loxia Sib		S. 148
Sibirter, (Mantafer) Meloë Sib		S, 257
Sibirter, (Wiefel) Mustella Sibir	1C2 —	S. 34
Sibon, (Coluber) Rundtopf	• .	Ш. 189
Sichelbogen, (Raupentoder) Ichn	eumon circum	]-
flexus	_	V2. 898
Sichelflosse, (Lippfisch) Labrus fa		IV. 201
Sichelflosse, (Stachelbarsch) Gast	erosteus Caro	
linus		IV. 251
Sichelfügel, (Nachtschm.) Phalæn		V. 652
Sichelflügel, (Rachtschm.) Phalæ		V. 705
Sichelfühler, (Nachtschm.) Phalæ		V. 673
Sichelforalline, Sertularia falcata		VI2. 840
Sichelschnabel, (Brachvogel) Tan	talus falcinellu	is II. 390
Sidelfdmanz, (Seiteuschwimmer	) Pleuronette	
lunatus	•	IV. 161
Siddervissch, (holl.) Krampffisch	-	IIL 237
Siddervissch, (holl.) Zitteraal		1V. 47
Siebbein, (Bastardwespe) Sphex		V2. 870
E e	2	Sieben

430	Ottobennage	
•		Th. S.
Ciebe	nauge, (Lagichm.) Papilio Panderus	V. 171
Siche	nauge (Sagidam.) Papilio Pipieis	V. 607
- Aisha	mostire (Sauthm.) Papillo Heicita	V. 591
Siehe	nountt, (Sonnenfafer) Coccinella lepten	n-
	punctata -	• , -
Siebe	inpuntt, (Tagschm.) Papilio Perius	V. 590 a V. 141
<b>Micha</b>	entroof. (@dilbfatce) Callida leptembuccat	V. 460
@iche	ntehner, (Cifabe) Cicada Septendecim	V. 677
@ich(	asael (Nachtidmi.) Phalæna Criorum	-
Giege	elwacheschnabel, (Senegalischer Rernbeiffer)	V2. 1049
Siert	je, (boll.) Rasemilbe	11. 547
Siffle	ur, (fr.) Ebumptane —	11. 469
Sikvi	, (bebr.) Hausbahn	IV. 364
Cil /	Chmch ) Defind —	IV. 189
Cilbi	erauge, (Meerbrachsem) Sparus argyrops	V. 731
is: if	erange. (Machtschm.) Phalæna pupiliana	V. 625
Cilb	erauge, (Tagichmetterl.) Papilio Argus	IV. 373
Cilb	erband, (hering) Clupea Atherinoides	1V. 5/5
Gilb	erband, (Nachtschm.) Phalmna Bergmannia	V. 751
<b>t</b> ⊄ilb	erband, (Nachtschn.) Phalæna de Geerens	V. 619
Cilb	erband, (Lagschm.) Papilio Cytherea	IV. 233
Cill	erbarfc, Perca nobilis	A
<b>Cilb</b>	erblatchen, (Rachtschm.) Phalmena Meriane	
Cilb	etbogen, (Nachtschm.) Phalæna Goedartel	V. 755
Cilb	perbuctel (Machtschm.) Phalmna Roesella	IV. 346
Gilb	erfisch, Argentina	IV. 143
Cilb	erfisch, (Pflugschaar)	V. 593
@ilb	verfleck, (Lagfchm.) Papilio Senns	IV. 322
Cill	perforelle, Salmo argentinus	V. 752
<b>C</b> ilt	bergitter, (Rachtschm.) Phalmena Geoffrella	€. 24)
Cilt	berbund, Canis cinereo argenteus	
Eilt	bertafer, (Rugelfafer) Curculio argentatu	V. 84
Cill	bertafer, (Staubtafer)	V. 603
Ciff	bertern, (Tagfchm.) Papilio Libye	IV. 166
Sill	berflippfisch, Chæteden argenteus	VL 381
Gill	berlaten, (Spigenrolle)	V. 748
Gill	berlinie, (Nachtschm.) Phalsena Aristella	
Cil	berlinie, (Rachtschm.) Phalsena Leeuwenh	V. 753

	£1). Q.
Silbermotte, (Rachtschm.) Phalæna argentella	¥. 750
Silbermund, bunter, (Mondichnede) Turbo ma	r-
garitaceus -	VI. 549
gerippter, Turbo argyrostomus	VI. 549
— — gruner, Turbo Cochlus —	VI. 544
Silberpunkt, (Tagschm.) Papilio Palæno	V. 593
Silberpunkt, (Tagichm.) Papilio Polycletus	V. 632
Cilberpurpur, (Lagichnu) Papilio Thyra	V. 624.
Silberroftral, (Nachtschm) Phalæna Lionetella	V. 754
Silberrugel, (Ruffelfafer) Curculio argyreus	V. 236
Oliverichuppe, (Rachtschm.) Phalæna Lediana	V. 729
Cilberstrich, (Lagschm.) Papilio Paphia -	V. 619
Ollbertropf, (Lagschm.) Papilio Cupido	V. 622
Silberwolfe, (Nachtschm.) Phalæna gemella	· V• 748
Silberwolle, (ungeflügelte Biene) Mutilla bicolo	or <b>E.</b> 332
Sild, (ban.) Pering	IV. 364
Silenus, (Simia) Weißbart	I. 124
Siliqua, (Solen) Mefferheft	VI. 226
Silkworm, (engl.) Geidenwurm .	V. 660
Silver, (arab.) Aalwels · -	IV. 294
Silurus, Wels -	IV. 288
— — anguilaris, Aalwels —	IV. 294
alotus, Affatischer Wels -	IV. 289
— batrachus, Froschwels —	IV. 29 <b>9</b>
- carinatus, Rielrucken -	IV. 298
eataphractus, Panzerwels -	IV. 304
- costatus, gerippter Bels -	IV. 302
- Cous, Sirifcher Wels -	IV. \$98
- fasciatus, bandirter Bels .	IV. 300
— galeatus, helmfopf -	IV. 297
- glanis, Europhischer Bels -	IV. 290
— inermis, Welchstoffe —	IV. 296
- militaris, Steifbart -	IV. 296
- mystus, Bartwels -	IV. 293
— — undecimalis, Ellificat	IV. 299
Silver - eels, (engl.) eine Urt Male -	IV. 39
Silver - fish, (engl.) Caro inischer Rornabrenfisch	IV. 351
Simak il Inglefe, (ital.) Schlangenfisch -	IV. 60
Ee 3	Simia,

•		Th.	€.
Simia, Affe	I, 11	3. <b>E</b> .	6
— — aigula, Eulasse —	•	I.	131
apedia, Kursschwanz	-	ı.	122
apella, Rabibart -	-	1.	136
— — argentata, Mico —		E.	11
Capucina, Kapuziner	-	ı.	136
— — cepha, Blaumant —	•		130
- cynocephala, Sundsfepf	•		123
- cynomolga, Sundebeiffer	-		127
- fatuella, Feldgott	-	I	135
- Maura, Mobraffe	-		. 9
- morta, Lodentopf	•		137
— nemæa, Dud —	-	<b>S</b> .	
- nemestrina Baldgott	•	I.	
- nictitans, nickender Affe	_		132
- panisca, Walbgott -	•		126
- petaurista, Beifingse	_	●.	
- pithecia, Possereisser			132
— rosalia, Rosenasse — Sabza, Mobr —			134
- Ciurea, Cichornaffe	_ •		129 136
- Sinica, Sutaffe		<b>S</b> .	
—— syrichta, zwerg	_		9 137
- trepida, Bitteraffe -			130
— veter, Altvater —			124
Simia Zambus, Mongus		€.	12
Simfon, (Scarabæus) Simfon	_	v.	52
Sinaire, (fr.) Stosfalte	•	II.	76
Singe, (fr.) Uffe -	₩ ,	ı,	118
Singbroffel, Turdus mulicus	•		530
Singer welche nicht hupfen, (Cifaben)	Cicadæ m	2-	••
niferæ -	.=		454
Singfliege, Musca pipiens -	• <u>,</u>	V2.	994
Singschnate, (Mude) Culex pipiens	•	<b>V2</b> .	
Sipedon, (Coluber) braune Ratter	-	III.	
Siphiphon, (bebr.) Birper -	-	III.	
Sippouris, (neugriech.) Golbbrachfem	•	IV.	
Sipunculus, (Nautilus) Spruge	-	VI.	
			-מנו

Sipunculus	Slangenvelle	43	9
	•	Th. 6	5.
Sipunculus, Sprugenwurm	<b>-</b>		15
nudus, Rabispruße	•		15
faccatus, Sacffpri		VI. 4	16
Siren, Sirene		<b>6.</b> 19	77
Sirene bes Bartholin, Siren B	artholin -	S. 19	7
Sirex, Holimespe -	. •	V2. 8	7
Siro, (Acarus) Rafemilbe	•	V2. 104	10
Silerre, (fr.) Miftelbroffel		II. 52	
Siskin, (engl.) Zeisig -	<b>.</b>	II. 59	•
Sitta, Blauspecht -	-	II. 23	tr
— Canadensis, Canadischer B	lausecht -	II. 23	3
- Europæa, Europaischer Bl	auspecht -	II. 23	2
- Jamaicensis, Jamaitaischer		II. 23	3
Situla, (Coluber) Waffernatter		III. 19	٦
Skait, Skat, (engl.) Stachelroc	be —	III, 24	•
Skalla, (schwed.) Schulle -	•	IV. 15	2
Skalops, (griech.) Maulmurf	_	I. 29	
Skarv, (norm.) Kormoran		II. 32	
Skjærflæka, (fcmed.) Bafferfa	bler ∸	IL 42	
Skibbo, (norm.) Barfcing	_	IV. 22	2
Skiouros, (griech) Eichhorn		L 34	
Sklimak, (poin.) Erdichneck ob	ne Haus	VI. 5	<b>,</b>
Skogsknetter, (holl) Bachstelle		II. 60	
Skogs Lus, (amerif.) Waldmilb		/2. 104	
Skorpios, (griech.) Scorpion		72. 108	
Skomakare, (schweb.) Schleibe	***************************************	IV. 38	
Skraka, (schwed.) Tauchergans	-	II. 30	
Skrot aborra, (fcmed.) Sumpf	falamanber	III. 114	
Skrzeczek, (poln.) Hamster	<u> </u>	L 344	•
Skua, (fcwed.) bunte Deme	-	II. 34	8
Skullia, (griech.) Sundshaan	-	IIL. 262	
Skyalryta, (fcmed.) Donnertrol	te —	IV. 137	
Slag - hock, (fcmeb.) Bienenfre		11. 88	
Slag - Oern, (norm.) Bergabler	•	II. 66	5
Slak, (holl.) Erdichnecke ohne D	aus –	VI. 59	)
Slakhoorens, (holl.) Schnirfelfc		VI. 561	
Slakhoornkorallyn, (holl.) Schi	neckenkoralline T	/I2. 837	,
Slangenvelle - Hoorn, (holl)		VI. 546	;
	E c 4	Slan-	

Soeter Sonnenkater	441
•	Th. S.
Soeter, (engl.) schwarze Ente	- II. 281
Soffietta, (ital.) Schnepfenfisch -	III. 337
Soland - Goofe, (engl.) Schottische Bans	II. 330
Soldaat, (holl.) Coldat	VI. 548
Soldat, (Mondschuecke) Turbo Pica	VL 548
Solbatenfifch. (Klippfifch) Chætodon capifti	
Soldido, (port ) Beifibelpbin -	IV. 303
Soldier - crab, (engl ) Bernhardustrabbe	V2. 1119
Sole, (fr.) Kompasmuschel -	VI. 305
Sole, Soul, (fr.) Zungenfisch -	IV. 157
Solea, (Pleuronestes) Zunge -	IV. 157
	225. 360
anutinus, Entenschnabel -	VI. 229
- bullatus, Kammscheibe -	VI. 229
- minutus, Gurtentern -	VI. 230
radiatus, blauer Connenftral	VI. 228
ftrigilatus, rother Sonnenftral -	- VI. 229
— — virens, Grasscheide —	VI. 230
Solenostemus, Scedrache	III. 349
Solenostomus, Pseisfenfisch -	IV. 334
Solium, (Tænia) einmundiger Bandwurm	VI2. 904
Commerfliege, Musca æstivationis -	V2. 971
Commerbalbente, Anas circia -	II. 297
Sommermantel, (Kammufchei) Oftrea pelluc	cens VI. 308
Commernatter, Coluber æstivus -	III. 200
Commersprossen, (Flugelschnecke) Strombus	lenti-
ginofus —	VI. 479
Commervogel, (Cometterlinge)	- V. 542
Sonderbare Fortpflanzung der Pflanzenlaufe	V. 509
Sonderling, (engl.) Meerlerche	– II. 413
Sonberling, (Rliege) Musca devia -	V2. 961
Sonderling, (Rachtichm) Phalæna antiqua	V. 670
Soni, Warzenschnecken -	VI. 542
Conne, (Seeftern) Afteria papola	VI. 131
Sonnenfisch, (Spiegelfisch) -	IV. 144
Sonnenhahnchen, Chrysomela æstuans	- V, 179
Sonnenborn, (Rraufel) Trochus folaris	VI. 532
	. 145, <b>S</b> . 221
Ees	Some

•	Eb.	€.
Connentafer, die Klugelbecken fcwar;, mit rot	sen	
Rleden	V.	160
bie Flügelbecken, fcmars, mit mei	Ten	
ober gelben Flecken -	" <b>V</b> .	162
rothe ober gelbe Flügelbecken t	nit	
schwarzen Punkten -		147
rothe ober gelbe Flügelbecken mit m		••
fen Bleden	^ v.	157
- ungeflecter, Coccinella impunétate		147
- ungestedter, Coccinella impustulat	a V.	160
Connenschauer, (Eibechse) Lacorta helioscopa	<b>e</b>	186
Connenschirmwirbel, Vorticella fellata	VI2.	
Connenimentori, voluccia tenara		999
Connenstaubchen, (Stechniege) Conops atomari		22\$
Sonnenstral, blauer, (Scheibe) Solen radiatus		249
- Ceilonischer, (Tellmuschel) Tellina v		233
gata —	371	229
- rother, (Scheide) Solen strigilatus		308
Connenseiger, (Rammunschel) Oftrea oblitterats		
Sophorarapillon, (Lagschm.) Papilio Clio		585
Cophorapapillon (Lagidom.) Papilio Sophors	Ę V.	597
Sopi, (genuef.) Dintenfisch	-	115
Sopra cielo, (ital.) Leberfisch —		198
Sorciere, (fr.) Depenmeister -		530
Sorex, Hausmans —		349
Sorex, Spigmans - 1. 30	o. S.	36
- Americanus, brasilianische Spismans	Ş.	_
aquaticus, Wassermans -		302
— — aquaticus, Wasserspigmans —	Q.	-
araneus, Spismaus -		302
— — cristatus, Hagrnase —		300
minutus, Zwergmaus		301
- murineus, Mansetopf		302
Sorgia di casa, Sorice, (ital) Dausmans		349
Sorgo marino, (venet.) Weerquappe	IV.	98
Sonakan, (amerif) Yoffelichnabel		368
Souchet, (fr.) Loffelente, Ohrentaucher	290.	_
Souci, (fr.) Hauventonig		520
Souffleur, (Delphinus) ber Blafer -		508
A 400-1-1 /m 1 1	S	ouf-

Soumeur	Sparus	443
	•	Th. S.
Souffleur, (fr.) Delphin	-	I. 504
Soupenvin, (fr.) Kropftaube		S. 131
Sourd, (fr ) Feuersalamander	-	III. 118
Souris, (fr.) Spismans, Hausmans	I.	300, 349
Soutanda, (nordamerif.) Saafe	-	I. 318
Sow, (engl.) Kelleraffel	-	V2. 1153
Sow, (engl.) Schwein		I. 461
Sow.fish, (engl.) Hundshaan		III, 273
Spaansch S. Giacomo - dubblet, (boll	) Jafobiter	Ce
muschel -	•	VI. 303
Spaanse Vyg, (holl) die Frige	-	VI. 410
Spaanie Zee - Kat, (boil ) Ceefage	-	VI. 117
Spadelente, (loffelente)	•	11. 200
Spadelfopf, (Grashupfer) Gryllus o:	xycephalus	S S. 266
Spalte, (Klirpfleber) Patella Fisura	•	VI. 615
Spaltfleck, (Nachtschm.) Phalmna tw		V. 747
Spaltfuß, (Bastardwelpe) Spitex Fis	lipes	V2. 868
Spaltfuß, (Meerschwalbe) Sterna Fis	Tipes	II. 354
Spaltwirbel, (Gefpenftfafer) Mantis	bicornis	V. 414
Spanier, (Golbhabnchen) Chryfomela	octoguttat	a V. 188
Epanter, (Rafer) Scarabæus Hispan	us	V. 63
Spannenmesser, (Blutigel) Hirudo G	eometra	VI, 51
Spannenmeffer, Edflügel, (Nachtichn	ketterlinge)	-
Phalænæ Geometræ		V. 703
— — Rundflügel	-	V. 707
mit Burftenfühlhornern	und Ecfsi	Ü•
geln -		V. 711
mit Burftenfühlhörnern	und runde	n
Flügeln	-	V. 713
Spargelhabnchen, Chrysomela aspara	gi -	V. 199
Spargelraupe, (Burm des Punkthabn	chens)	V. 174
Sparling-Fowl, (engl.) Lanchergans	-	II. 304
Sparmochia, (ital.) Garnale	-	V2, 1125
Sparo, (ital.) Seebrachsem -	IV.	176. 180
Sparrow, (engl.) Sperling	•	IL 392
Sparrow Hawk, (engl.) Sperber	•	II. 89
Sparrow - Hawk, (engl.) Beigbacken	•	S. 69
Sparus, Meerbrachsem	•	JV. 176
		Sparus.

	T6. S.
Sparus annularis, Schwarzeingel	- IV. 180
- argyrops, Silberauge .	IV. 189
auratus, Golbbrachsem -	' IV. 177
boops, Großauge -	IV. 185
capistratus, Zugelbrachsem -	IV. 193
chrysops, Goldauge -	IV. 188
- dentex, Zahnbrachsem -	IV. 189
- erythrinus, Nothschuppe	1V, 184
- Galilæus, Galilaifcher Meerbrachfem	IV. 194
— — melanurus, Schwarzschwanz —	IV. 180
- mormyrus, Murmelbrachsem	- IV. 192
— — pagrus, Sacftosse —	IV. 184
radiatus, Stralauge	IV. 191
fargus, banbirter Meerbrachsem	IV. 180
faxatilis, Steinbrachsem -	IV. 182
smaris, Rothflosse -	IV. 181
—— spinus, Dornbrachsem	IV. 190
- Virginicus, Birginischer Meerbrachset	
Sparverius, Sperber -	- II. 89
Spalma, (Vespertilio) fliegende Rate	- I. 154
Spakvogel, (Reuntober) Lanius jocolus	II. 118
Spatule, (fr.) Loffler	II. 361
Spag, angolischer, Fringilla Angolensis	- II. 591
Bengalifcher, Fringilla Amandava	IL 584
Caapfcher, Fringilla Alario	· II. 584
Spatierer, (Pflangenflob) Podura ambulans	V2: 1021
<b>O</b> # 0.040, 0.00=0	218. 5. 91
— von Canada —	II. 228
— — von S. Domingo	II. 228
	121: 5. 73
Specktafer, schwarze, (Dungkafer)	V. 114
Specktaferchen, (Aleintafer) Dermeltes larde	irius V. 100
Specimaus, (Flebermaus) Vespertilio larde	arius 👟 15
Spektrum, (Conus) Gespenst -	Vi. 382
Speltrum, (Sirex) Gespenst -	V2. 838
Spectrum, (Vespertilio) Flatterer -	L 153
Speculatie-goed, (boll.) grune Rerite -	VI. 591
Speeldubblet, (holl) Spieldublet -	VI. 270
·	Speer-

Speerhaa <b>y</b>	8phex	445
		₹b. €.
Speerhaay, (boll.) Dornhaan, Spor	nhaay III.	
Speernafe, (Fledermaus) Vespertili	o foricinus	Č. 14
Speisefliege, Musca cibaria		V2. 975
Speldewerks - roll, (holl.) Spigenre	ગાર	VL 381
Speldewerks - toot, (holl.) Rleppelfi	uffen	VI. 367
Spelta, (Bulla) Joch	-	VI. 406
Sperber, Falco Nisus	-	II. 89
Sperbermotte, (Rachtschm.) Phalæna	cucullatell	a V. 742
Sperberfauger, Chermes forbi	. •	V. 523
Sperga, (venet.) Paubentaucher	• .	II. 34E
Sperling, Fringilla domestica		II. 592
Chinefischer, (gesprenkelter S		II. 551
gestreifter Senegalischer, (	Cenegalisch	
Rernbeiffer)	•	II. 552
Sperlingartige Bogel, Pafferes	II. 49	r. S. 131
Sperlingmilbe, Acarus passerinus	<b>.</b>	V2. 1048
Sperlingparfit, (Papagen) Plittacus	pailerinus	
Sperlingeammer, Emberiza pafferin		S. 155
Speclingsburgel, (Ammer) Emperiz	a Pithiornu	_
Sperlingespecht, Picus passerinus	_	II. 222
Sperlingtaube, Columba passerina	-	II. 512
Sperma deti, Wallrath -	•	1, 449
Sporma ranarum, Froschlaich	•	III. 68
Spet, (fr.) Pfeilhecht		IV. 337
Spheroides, (Echinus) Seetnopf	T7- 04-	VI. 149
Sphex, Bastardwespe	V2. 803	. <b>E.</b> 321
— Aegyptia, Egipter		V2. 867
antarctica, Subermefpe - appendicaftra, Sangtorper		V2. 870
	_	V2. 867
- arenaria, Sandwespe - Asiatica, Afier -	•	V2. 873 V2. 865
— — hidens, Doppelborn	•	V2. 868
- bidens, Anglicher Doppelborr		©. 323
— Capensis, Afrikaner	. –	V2, 865
- clypeata, Schildtrager	-	V2. 871
— coerulea, Blaubastarb	_	V2. 865
— coerulea, Blauforper	-	V2. 874
— — collaris, Gelbhale	.~	V2. 873
	•	Sphex

•	0-L @
	Th. C.
Sphex cribraria, Siebbein -	V2. 870
ephippia, Sattelwespe	V2. 870
- erythræa, rothe Baftardmefpe	S. 322
— — fervens, Brenner -	$V_2$ . 866
- fossoria. Graber	V2. 873
fusca, Braunflügel	V2. 869
— — gibba, Buckelwespe -	V2. 873
— Indica, Indianer	V2. 871
— — Indostana, Indostaner -	V2. 866
.— — lacerticida, Eidechsentoder -	<b>S.</b> 321
— — leucoptera, Beißflügel -	<b>€.</b> 322
— — leucostoma, Weismund —	V2. 874
- manticata, Rangeltrager -	<b>S</b> . 322
— — Mauritanica, Barbar -	V2. 872
- mystacea, Anebelbart -	V2. 870
- Pensylvanica, Pensilvanier -	V2. 865
:— — sabulosa, Sandwolber •	V2. 8h4
- Samariensis, Samarier -	<b>S</b> . 321
semiaurata, Goldtrager -	V2. 873
— tropica, Neujorter —	V2. 872
— vaga, Schwarmer -	V2. 874
- variegata, Scheckfügel -	V2. 869
- viatica, Wanderwefpe	V2. 368
	<b>1. €.</b> 301
- apiformis, Bienenschmetterling -	V. 644
- Caffra, Caffer -	V. 646
- Capensis, Caapscher Pfeilschwanz	V. 638
- Caricæ, Papajenvogel	V. 638
- Carolina, Carolinischer Pfetischw.	V. 637
- cerbera, Kaper	V. 646
- coarctata, (Cerberi) Rahenschwanz	<b>S</b> : 304
convolvuli, Windenschmetterling	V. 637
— — creusa, Rothrand	V. 646
— — cruenta, Blutting	S. 301
culiciformis, Muchenschmetterling	V. 644
— — Euphordiæ, Wolfsmildvogel —	V. 641
— — fausta, Glücksvogel —	V. 647
	Sphinx

Sphinx	Spierlingsfafer	447
		Th. G.
Sphink ficus, Feigennascher	•	V. 639
Filipendulæ, Steinb	rechfchmetterling	V. 645
fuciformis, hummels	dmetter ling	V. 643
— — infausta, Unglücksvog	gel _`	V. 647
- Labruscæ, Weigpuni	it	V. 639
Ligustri, hartriegel	• •	V. 638
— — lugubris, Dammerun	gsvogel 💮 🕳	<b>6</b> . 30t
Nerii, Oleandervogel		V. 636
— — ocellata, Glanzauge	-	V. 635
Ocypetæ, Wolfenpfe	il –	V. 636
pectinicornis, Biolet	flugel -	V. 647
- phegea, Ringelmotte	•	V. 645
Pinastri, Trauerpfeils	chwant -	V. 642
populi, Zahnflügel	-	V. 636
satellitia, Trabant		<b>S.</b> 303
— — Statices, Taubenhals	•	V. 648
stellatarum, Taubens	amanj —	V. 643
— terfa, Langlinie	·	<b>€.</b> 302
- Tiliæ, Lindensauger		V. 636
tipuliformis, Schneck	ensometterling	V. 644
- velpiformis, genfterft	luget -	V. 644
— — vitis, Weintrinker Sphinx, (Papio) Bavian		V. 640
Sphyræna, Anjovis	-	I. 122
Sphyræna, (Elox) Pfeilhecht		IV. 347
Spider, (engl.) Spinne		IV. 336
Spiegelente, (bunte milde Ente	· · · · ·	/2. 1066
Spiegelfisch, (Mulensteinfisch)	_	II. 300
Spiegelfische, Zei	•	III. 319 IV. 142
Spiegelmeise, (Kohlmeise)	_ `	
Spiegelroche, Raja Miraletus		II. 626
Spiegelruden, (Goldhahnchen)	Chrysometa notice	III. 243
Spiegeltrager, (Rachtschm.)	Phalana Hefnesus	V. 172
Spiegeltrager, großer, (Pfane	ninicael)	V. 651
Spielart, (Rachtschm.) Phala	ena luforia	V. 651 V. 676
Spieldublet, (Benusmuschel) !	Venus Chione	VI. 270
Spiering, (holl.) Stint		IV. 323
Spierlingtafer, Scarabæus Sp	ireæ _	S. 219
		Epies,

	Th. <b>S</b> .
Spiesband, (Rachtschm.) Phalæna hastata	V. 717
Spiekhorn, (Pfeilschw) Sphinx Auge -	V. 647
Spiestrabbe, Cancer haitatus -	V2. 1112
Spicsnatter, Coluber Pelias	III. 197
Spiestrager, (Rafer) Scarabæus Lancifer	V. 57
Spicewurm, (Rellerwurm) Oniscus Entomon	V2. 1149
Spignola, (rom.) Salmbarsch -	IV. 228
Spill, (holl.) Fiußspindel -	VI, 510
Spillbaummotte, (Rachtschm.) Phalana evon	y-
mella -	V. 736
Spillkraka, (schwed.) Specht	II. 219
Spinachia, (Gasterosteus) Dornfich -	IV. 254
Spinael, (schwed.) Spinne -	V2. 1066
Spinarella, (Gafterofteus) Zwergstichling	IV. 255
Spindel, frangofifche, (Stachelichnede) Mure	K
Cotus -	V1. 511
— — Javanische, Murex Javanus —	VI. 511
Riederlandische, Murex antiquus	VI. 515
- mordische, Murex despektus -	VI. 515
- Rumpfe, Murex Trapezium	VI. 519
Spratusische, Murex Syraculanus	VI. 520
Spinifer, (Cancer) Ctachelborn -	V2. 1115
Spinifer, (Cassida) Stacheltrager -	V. 138
Spinipes, (Carabus) Stachelfuß -	V. 360
Spinipes, (Vespa) Dornfuß	V2. 882
Spinne, (Stachelschnede) Murex Tribulus	VI. 494
Spinnekop, (hou.) Spinne	VI. 494
Enimen, Aranez - V2. 106	6. 6. 342
Spinnen, Spinnekoppen, (holl.) Spinnen	V2, 1066
Spinnenbod, (Bodfafer) Cerambyx araneife	)r
mis	V. 200
Spinnentafer, (Ruffeltafer) Curculio emeritus	V. 239
Epinnentrabbe, Cancer araneus -	V2. 1109
Spinnenwebdattel, (Olive)	VI. 419
Spinner, (Milbe) Acarus telarius -	V2. 1049
Spinner mit glatten Rucken, (Rachtschmetterling	30)
Phalænæ Bombyces -	V. 663
Spinner mit Wendeflügeln, (Rachtichm.) Phale	næ
Bombyces =	A• 020
	Spino-

Spinoletta	Splitterstrich	449
		₹b. €.
Spinoletta, (Alauda) Florent	inische Lerche	II. 520
Spint, (holl.) Geesplint	÷	VI2. 782
Spinus, (Fringilla) Zeifig	-	11. 589
Spio, (Papilio) Rucflugel	<b>~</b>	V. 633
Spipola, (ital.) Wiesenlerche	· ·	11. 518
Spipoletta, (flor.) Felblerche	, · •	11. 119
Spirifex, (3phex) Schrauber		V2. 866
Spirillum, (Serpula) Schnirl		VI. 523
Spirinchius, Spirinthus, Me	erstint 📥	IV. 323
Spiriolus, Eichhorn		I. 355
Spirling, (Karpfe) Cyprinus	Aphya 🚗	IV. 390
Spirula, (Nautilus) Posthorn	<b>—</b>	VI. 358
Spittfish, (engl.) Pfeilhecht	<b>-</b>	IV. 337
Spiza, (griech.) Fint	. •	IL 580
Spizbergifches Rinthorn, Bucc	inum glaciale	VI. 467
Spizbubin, (Schlupfmefpe) T	enthredo vafra	V2. 834
Spizbattel, (Balge) Voluta if	pidula 🛶 🐪	VI. 421
Spizenforalle, Madrepora cel	Hulofa -	VI2. 720
Spizenrolle, (Sute) Conus T	extile -	VI. 381
Spigfinne, (Rlippfifch) Chæton	don acuminatus	IV. 164
Spigiloffer, (Rarpfe) Cyprinu	s Idus –	1v. 392
Spieffugel, (Nachtschn.) Phale	ena Mouffetella	V. 752
Spigliefer, (Rablruden) Gymi	notus rostratus	IV. 49
Gristorfe, (Grasbupfer) Gry	ili Acridæ	V. 417
Scizeopf, (Rogfifch) Blennius	l'holis 🛥	11. 105
S. igling, (Wange) Cimex acu	minatus	V. 491
Spizmaul, (Mal) Muræna My	rus ∸	ĬV. 41
Spigmaul, (Roche) Raja Ox)	rinchus	III. 242
Spigmaus, Sorex	- İ. 300	
Spizmans, Sorex araneus	•	I. 302
Braftlianische, Sorex	Americanus	S 36
Seignadel, (Radelfifch) Syngn		III. 34t
Cigebr, (Riebermans) Vefpe	rtilio Marmotte	S. 19
& issehmange, Cepolæ -	•	IV. 110
Spigichwang, (Dunnschwang) Ti	richiurus lepturus	IV. 52
Cisfebrang, (Etustorf) Cory		14. 123
Erizwichel, (Grasbunfer) Gr	yllus acuminatus	V. 430
Splitterftrich, (Rachtschnie) Pl		V 702
	Ff	Spot

•	Th. G.
Epôtter, (Kalte) Falco cachinnans -	-
Spotter, (Deme) Larus Arricilla -	*** 390
Spotter, (Raupentober) Ichneumon delusor	V2. 852
Spondylus, Lajarustlappe - VI.	279. 🛎. 366
antiquatus, Kornerklappe -	€. 366
gæderopus, gejadte Lajarustfapp	ė VI. 230
plicatus, Kaltenklappe _	VI. 281
regius, Stachelflappe -	VI. 281
Spongia, Meerschwammi -	VI2. 790
_ aculeata, Trompetenschwamm -	VI2. 797
bacillaris, Stedenschwamm	VI2. 804
basta, Tuchschwamm _	VI2. 793
_ cancellata, Gitterschwamm _	VI2. 798
cancellata nigra, schwarzer Gitt	et)
schwamm -	VI2. 799
- Ceylonica, Cellonischer Schwanm	VI2. 801
crateriformis, Becherschwamm	VI2. 795
- Cynosbati, (Cynips) Rosenbobrer	V2. 811
dichotoma, hirschgeweihschwamm	VI2. 804
fasciculata, Bockschwamm	VI2. 799
fistularis, Robrenschwamm	VI2. 796
- flabelliformis, Fecherschwamm	VI2. 794
— — floribunda, Korfschwamm — fluviatilis, Flußschwamm —	VI2. 781
- fluviatilis, Flußschwamm	V12. 805
— — frondola, Blatschwamm —	VI2. 795
- fulva, Stedenschwamm -	VI2. 804
— hircina, Bodschwamm	VI2. 799
- infundibuliformis, Trichterschwammi	
lacustris, Weiberschwamm -	VI2. 805
— muricata, Stackelschwamm	VI2. 803
— nodola, Knotenschwamm	VI2. 803
— oculata, Augenschwamm —	VI2. 801
— omenimis eteratericalement	VI2. 799
— panicea, Brobschwamm — rubens, Knotenschwamm —	VI2. 800
— - Arigola, Runzelschwamm -	VI2. 803
- tomentole, Wollenschwamm -	VI2. 793
— tubulosa, Seehandschu —	Vl2. 803 VI2. 797
	Spongia
•	Change.

Spongia	Springer .	451
•	•	Th. S.
Spongia ventilabra, Webelfe	hwamm <b>-</b>	V12, 792
Spongie, Spons, (holl.) Me	erfcwamm	VI2. 790
Spongites, (Cellepora) Ech	wammstein	VI2. 725
Spongites, (Millepora) St	einschwamm	VI2. 721
Sponsa, (Phalæna) Braut	<b>-</b> ,	V. 687
Spookjes, (boll.) Gespenste	fer -	V. 408
Spoon-bill'd Duck, (engl.)	Breitschnabel	II. 294
Spooren, (boll.) Sonnenhor	n —	VI. 532
Cporn, (Mondschnede) Tur		VI. 546
Sporn, (Nautilus) Nautilu	s Calcar	VI. 356
Sporn, (Sonnenhorn)	-	VI. 532
Sporufint, Fringilla calcarat		S. 161
Spornflugel, (gedornter Rieb		II. 430
- Domingischer, Pa	arra Dominica	II. 431
- Mexikanischer, P		II. 432
	Parra Senegalia	II. 431
Spornfuß, (Wange) Cimex	calcaratus -	V. 505
Epoenhaan, Squalus spinax	-	III. 256
Sporntrager, (Rafer) Scarab	æus calcaratus	V. 73
Sprat, (engl.) Sprotte	-	IV. 370
Sprattus, (Clupea) Sprotte	-	IV. 370
Spreckelflügel, (Tagschm.) P:		V. 611
Sprebe, (Staar) Sturnus vu	lgaris –	11. 522
Sprengleretafer (Rugeltafer	Curculio Sprengler	i V. 222
Sprenglersmulchel, (Korbmul	ருர்) Mactra Spren	l•
gleri		VI. 254
Sprenkelbarich, Perca puncta		IV. 237
Sprenkeler, (Biene) Apis van		V2. 898
Sprenkelfisch, (Stußkopf) Co		IV. 118
Sprenfelgest enft, Mantis irre		V. 413
Sprenkelnerite, gerippte, Ner	ita grotia	VI. 593
Serenfling, (Nachtschm.) Pha		V. 708
Spriet-Korallyn, (boll.) Si		VI2. 843
Springer, (Barfching) Perca		IV. 240
Springer, (Citaden) Ranatra	e laitatoriæ	V. 461
Springer, (Eidechse) Lacerta	agilis -	III. 92
Springer, (Fliege) Musca sal	tatrix —	V2. 965
Springer, (hou.) Windbeutel,		III. 70
	Ff 2	Sprin

7,-	-	
1 / /		Th. E.
Springer, (Rrebs) Cancer Locusta	-	V2. 1135
Gringer, (Lippfifch) Labrus scarus	-	IV. 196
Soringer, (Maus) Mus jaculus		1. 352
Springer, (Springtafer) Elater Speci	olus	V. 317
Springfisch, (fliegender Fisch) Exocoet	us exfilie	ns E. 209
Spring-haan, (boll.) Deufdrede	-	V. 437
Springhahnchen mit biden hinterbeiner	•	V. 180
menfarbiges, Chryson		
Springfafer, Elater -		5. 6. 241
beutscher, Elater German	us,	V. 324
Sprods, (engl.) zwenjahrige Lachse		IV. 312
Sproetje, (boll.) Commersproffen		VI. 479
Sprones, ein Englander, mog 569 Pfui	ide	<b>⑤</b> . ₃
Sprotte, (Bering) Clupea Sprattus	.1	IV. 370
Gruge, (Rautilus) Nautilus Sipunci	1105	VI 361
Sprügenwurm, Sipunculus		/VI. 45
Spruger, (Springfafer) Elater Sputat	.0 <b>.</b> ****\	V. 323
Sprugfchlange, (Umboinische Brunetna	uu) DuGatas	III. 190
Spubrer, (Raupentober) Iehneumon	Kuipator	V2. 856 S. 27
Spuhrbund mit gestußtem Schwanze		
Spuitwormen, (holl.) Sprugenwurme Epulmurmftern, (Schlangenfcmang)	·	VI. 45 VI. 139
	7/1 -	5. <b>S</b> . 353
Spunge, (engl.) Meerschwamm	V 1+ 3	VI2. 790
Spurre, (engl.) Meerschwalbe		IL 352
Spurygfisk, (chweb.) Seceule	_	IIL 330
Sputator, (Elater) Spruger	_	V. 323
Sputte, Bleksprutte, (norm.) Meersp	inne	VI. 115
Squagia, (rom.) Dickfopf -	-	IV. 385
Squaja, Squagua, (ital.) Meerengel	•	III. 257
Squalus, Dicktopf -		IV. 385
Squalus, Haanfisch -		III. 252
- caniculus, hundhaan	-	111. 262
- catulus, Scebundchen	-	III. 264
- centrinus, Sauhund	-	III. 255
galeus, Mccrfau	-	III. 260
— — glaucus, blauer haan	-	III. 272
maximus, Pferdhaap	•	III. 265
	•	· Squalos

Squalus	Stacheldorn	453
•	•	₹b. €.
Squalus muftelus, glatter Saan	_	III. 271
- fpinax, Spornhann	_	III. 256
fquatinus, Meerengel	•	III. 296
ftellaris, Sternhaan	-	III. 264
Squamula, (Anomia) Schuppe	-	VI. 320
Squatina, (Squalus) Meerengel		III. 256
Squilla, (Cancer) Equillentrebe	-	V2. 1124
Squilla lutaria, Rrabbe Diogenes		V2. 1120
Squille arenariæ, Schwanenfreb		V2. 1132
Equille, (Cafpischer Rrebs)	_	5. 346
Squi'le, (fr.) Garnale	`	V2. 1125
Squillentrebe, Cancer Squilla	-	V2. 1124
Squirrel, (engl ) Eichborn	•	1. 355
Squirrelfish, (engl.) Blautopf	•	IV. 245
Staar, Sturnus -	•	II, 523
bunter, Sturnus Contra		II. 525
Caapfcher, Sturnus Caper	ılis 🖚	II. 524
Indianischer, (Plapperer)	-	II. 193
Louistanischer, Sturnus Lu	dovicianus	II. 524
Ctaatenfabne, (Blafe) Bulla Phy	fis -	VI. 409
Staatenfahne. (Brinzenfahne)	-	VI. 413
Staatenfahnennabel, (Balge) Vo	luta fanguifuga	VI, 428
Staaten-vlag, (boll) Staatenfal	ne <del>-</del>	VI. 409
Staatenvlag - Pen, (holl.) Staate	enfahnennadel	VI. 428
Staatstafer, Scarabæus festivus	, —	V. 75
Staatslivree, (Lagichm.) Papilio		V. 616
Stachelafter, (Wange) Cimex fer	atus -	V. 480
Ctachelbariche, Gafteroftei	-	IV. 246
Ctachelbarich, Perca asper	-	<b>E.</b> 204
Stachelbart, (Bodtafer) Ceramb	yx (pinibarbis	
Stachelbart, (Klippfisch) Chætod	lon canescens	IV. 162
Stachelbauch, Tetrodon	-	III. 312
geffecter, Tetrodon	ocellatus	III. 316
geftreifter, Tetrodor	n lineatus	III. 315
Stachelbesen, (hornkoralle) Gorg	gonia muricata	
Stachelbruft, (Meclfafer) Teneb		V. 374
Stacheldecke, (Rußelkafer) Curcu		V. 237
Stachelborn, (Arabbe) Cancer sp		V2. 1115
F f	3	Stachele

## 454 Stacheldrache Stachelschnecken

	Eþ.	₩.
Ctachelbrache, (Petermannchen) Trachinus Draco	IV.	76
Stachelbreneck, Donax pubescens	VI	259
Ctachelfitch, groffer, (Igelfifch) Diodon Hyftrix	III.	326
Ctachelfiob, (Erbnob) Mordella aculeata		386
Ctachelflunder, (Ceitenschwimmer) Pleuronelte	s	-
Passer -	IV.	161
Stachelfuß, (Erdfafer) Carabus Spinipes	V.	360
Ctachelhaafe, Cyclopterus spinosus -	IIL	•
Ctachelberg, (Bergmufchel) Cardium echinatum	VI.	
Ctachelhorn, (Boctfafer) Cerambyx rubus		219
Ctachelfafer, (Ruffelfafer) Curculio scabriculus	€.	233
Ctacheltaferchen, (Rleintafer) Dermeftes murica	<b>!-</b>	
tus		103
Stachelflappe, (Lazarustlappe) Spondylus regius	VI.	281
Ctachelforf, (Klippfisch) Chætodon cornutus	IV.	
Ctachelforalline, Sertularia echinata -	Vl2.	
	V2.	
Stachelfrabbe, Cancer Tribulus -	V2.	
Ctachelfragen, (Jgelfisch) Diodon holocanthus		327
	V2.	
Ctachelleguan, (Eidechfe) Lacerta Agama		106
Ctachelmaul, (Grechfliege) Conops aculeata	V2.	
Stacheinatter, Coluber scaber -	III.	192
Stachel: ober Erillraupe, (Raure bes Roniginnen	•	
rage) -	· V.	576
Stachelroche, Raja Batis -	IIL	240
Stachelruden, (Bocttafer) Cerambyx quadrima		•
culatus –	V.	262
Ctachelruden, (Geeraupe) Aphrodita aculeata	VI.	
Ctachelruden, (Ctachelfdmein) Hyftrix dorlata	I.	315
Stachelfau, (Meerscorpion) Scorpæna Scropha	IV.	140
Stachelscheere, (Rrebs) Cancer Cancharus	V2.	1128
Stachelscheide, (Seescheide) Ascidia echinata	VI.	
Stachelschild, (Meelkafer) Tenebrio muricatus	. V.	373
Stachelschnabel, (Fliege) Musca scolopacea	$V_2$ .	954
Stachelichnabel, (Guctguck) Cuculus scolopachu		
Stachelschnecken, Murices - VI. 492	. S.	379
— — blatterige —	VI.	497
	Sto	del

	• (	Sta	d)elsd)n	ecten	St	aphylii	nus		455
				•			9	Eb.	6
Ctach	elfcon	ecten	, borni	ge		-			493
		-	gefchm		_	VI.	510.	6.	379
	-	_	gethürt	nte		<del>-</del>	•	VI.	521
	_	_	ungesch	wänzte	, V	_	1	VI.	506
_			warzige			-	•	VI.	500
			n, Spor				V	7I2.	803
Stack	elschn	anz,	(Eibed	)(e) La	certa (	Cordylus		III.	89
						culeatu		III.	299
					lteria a	culeat <b>a</b>			139
		ein,	Hyftri			-			311
	<b>-</b>		Urritan	ildes,	Hyltri	x cristat	2	I.	312
<u> </u>	 -1 <i>C</i>	_	gelchma	mztes,	Hyltri	x prehe	nfilis	I.	
	elleed	uno,	(Seeta	(D) Ph	oca hili	pida		<b>G</b> .	26
State of	ellecto	ifet,	(Karer	uinladet	) Chite	on hispi			197
Cracy	erleeri	4 (6	eestern	Aiter	na êdne	eitris			137
Clam	eitauc	e, C	gelfisch	Diod	lon ech	inatus			325
	ettrag	eţ, (	andioi	arer)	-aiiida	Spinife			138
State (	twim.	ze, c	Cimex	Acanth	aris			V.	487
Olau):	HOIM	per,	(Kradu	e) Can	cer lup	percilio	us V		
Clant	erer,	(200)	rtafer)	Ceran	ibyx li	quilitor			269
Stafei	(e, (e	oanp	auter)	Cicind	iela Vi	rginic <b>z</b>			329
Stag, Store 1	(engt	() <u>2</u> )	amhirid			_			390
Stag - I	r iy,	(eng	l.) Hirl	Domili	er - I nei	٠ .		V.	
Stalfil Stalfå	igei,	( 2 a)	gichm.)	rapili	Can T	nax onobnio	<b>a</b> ka (	٥.	288
Cimita	iler, c		pæns	missin	ilet) I	enebrio		<b>T</b> ?	
<b>2</b> 4	nlina			N DL -	, 	— 			369
Staining Staining	naad naad	(30)	milmi	.) Fig	sens bi	rofopiar	12 :	٧. <sup>،</sup>	710
	nuub, maiGl	LICH	auenme	08) <u>C</u> o	raitina	fragiliff			
	.ean (	81, <u>(</u> ;	Biene)	Apis ti	runcor	um		2.	894
Stana	71 EE, (	Mai Mai	peniooe Sánco	t) icun	eumon	inculca	tor V	2.	855
Stapai	linus	ecour.	danger						606
stapity	mina		aubkafei		 	. <b>V</b> ,	387- (		
	_	P:	guttatus	s, wron	auge	•			392
		Di]	puftulat	us, ui	oppunti :	_			393
			leti, 🥝				Ţ	٧.	395
			itharell					٧. :	393
	_		nestre	Liluy, E	Lander.	háhnchen		V. :	394
	_	610	ngatus:	zangj		_	,	٠, ١	392
					Ff	•			-et?

	T6.	€.
Staphylinus erythropterus, Rothflügel	-	389
flavescens, Gelbrand -		392
hirtus, Barenrauber -	V.	388
lignorum, Holzdich -		39 I
littoreus, Strandrauber -	V.	393
lunulatus, Halbmond .	V,	390
maxillosus, Groffiefer -	V.	38%
murinus, Mistrauber -	V.	388
obtusus, Stumpf -		39I
piceus, Pechdecke -		394
politus, Politer -	V.	390
riparius, Uferrauber		39t
- rufus, Wedelfühlhorn -		39 <b>0</b>
sanguineus, Bluffingel		393
subterraneus, Rellerrauber -		392
— — Tataricus, Lartarifcher Rauber		261
Starda, (ital.) Trappgans		441
Stare, Starling, (engl.) Stage		523
Ctaubfingel, (Yangfuß) Tipula hirta	V2.	
Ctaubtafer, Scarabæus farnoius	V.	
Staubling, (Rachtichm.) Phalæna pulveraria		708
Staubschild. (Soldhahnchen) Chrylom. tomento	la V.	198
Stecher, (Raupentider) Ichneuman compuncto	ŗ V 2•	854
etechflicaen, Conopes -	V 21	990
Stechpalmenblat, (Rachtschm.) Phalmna ilicifol	13 V	050
Ctedenschwamm, Spongia bacillaris -	VI2.	
Steckmuschel, Pinna	VI,	
Stednuschelmachter, (Rrabbe) Cancer pinnother	\$\$ V 2(I	404
Steen-Amaranth, (boll.) Rrofestein -	Vl2.	
Steen-Bid, (ban.) Langflosse		332
Steen-Bok, (holl.) Steinbock	3/1	407
Steen - Mossel, (boll.) Steinmuschel		332
Steen-Pikkers, (holl.) Steinpider	VI.	
Steen-Slak, (holl.) Steinschnecke	Vl2.	
Steen-Sue, (norm) Steinsauger	III,	
Steen - Tieken, (oftfriegl.) Relleraffel	V2.	_
Steen-Ulk, (norw) Meerfrosch	III.	-
Stehende Fliegen, (Schweber) -	V2. 1	teifa

Steifbart	Steinschnecke		457
		Th.	Œ.
Cteifbart, (Bele) Silurus mil	litaris —		296
Steifruden, (Ruffeltafer) Cu			224
Steilobr, (Sund) Canis Lyca			- 28
Steinabler, (Golbabler)	_		65
Stelnapfel, (Geeapfel) Echine	us faxatilis		149
Steinaffel, (Rellerwurm) Onil		V2.	
Steinbeiffer, (Dochschauer) Co	bitis Tænia	IV.	283
Steinbod, Capra Ibex	-		407
Steinbodlein, (Bodfafer) Cer	rambyx Alpinus	V.	269
Cteinbohre , (Pholade) Phola	is Dactylus	VI,	212
Steinbohrer, (Sectausendbein)	Nereis pelagica	<b>\ I.</b>	80
Steinhobrer Terebrellæ	_		100
Cteinbolt, (Kabeljau) Gadus !	barbatus		88
Steinbrachsem, Sparus fexatili	is -	IV.	182
Steinbrechschmetterling, (Pfeil	(chw.) Sphinx Fil	i•	
pendulæ	-	V.	649
Steinbutte, (Seitenschwimmer)	) Pļeurone&tes ma	<b>!-</b>	•
ximus		IV.	160
Steinchen, (Kinkhorn) Buccint	am Lapillus	VI.	463
Steineule, (Rauglein)	-	II.	104
Steineule, Strix funerea	•	11.	105
Steinfalte, (Pergfalte)	•	II.	
Steinfisch, (Lippfisch) Labrus	cynædu <b>s</b>	IV.	216
Steinherz, (Kerznuschel) Card	ium lithocardium	Œ.	36 t
Steinbupfer, (Spinne) Arane:	a rupestris	V2. 1	1083
Eteinbummel, Apis lapidaria	_	V2.	904
Steinforalline, Sertularia scru	pola -	VI2.	858
Steinfrahe, (Bergdohle)	•	II.	180
Steinmerle, (Rrammetevogel)			534
Steinmilbe, Acarus rupestris	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V2. 1	056
Steinmuschel, (Micemuschel) M	lytilus lithophagus	VI,	332
Steinricker, (Dornfisch)		IV,	254
Steinpicker, (Anorrhabn) Cott		ĮV.	133
Steinpider, (Schnirkelschnede)		ΥI	563
Steinpinsel, (Steinbobrer) Te	rebrella lapidaria	VI.	100
reinqualle, Medusa porpita	-	VI.	123
Steinschmezer, (Thurmfalte)	₩.	ĮI.	80
eteinschnecke, Triton	<b>-</b>	VI.	103
•	Ff q		teini

,	Th.	5.
Steinschnede, (Sternforalle) Madrepora Limax	VI2.	678
Steinschwalbe, Hirundo Apus -	II.	633
Steinschwamm, (Bunktforalle) Millepora Spong	<b>i-</b>	-
tes -	VI2.	721
Steinfcwamm, (Sternforalle) Madrepora Aga-		
ricites —	VI2.	683
Steinwange, Cimex faxatilis -	V.	497
Steinwefpe, (Doppelfpige) -	V2.	884
Steinzeifig, Pipra rupicola -	II.	621
Stekel - Baarfe, (boll.) Stachelbariche -	IV.	247
Stekel - Buiken, (boll ) Ctachelbauche -	III.	312
Stekel-Hoorens, (holl.) Ctachelichneden	VI.	
Stekel-Varken, (holl.) Grachelschwein -		312
Stelenes, (Papilio) Augenschwanz		574
Stella Avis, fleine Trappe		444
Stella, Geeftern	VI.	129
Stellers Ente, Anas Stelleri -	ੴ.	102
Stellio, ber Araus, (Salamanber) -	III.	117
Stellio. (Lacerta) Dorneidechse -	III.	90
Steljenlaufer, (Golbbabnchen) Chrysomela Inda	V.	202
Stelgenlaufer, Grallæ -	II.	357
Sten - bit, (fcweb.) Korelle -	IV.	317
Stenecorus, hehrdisches ?		269
Ctengel, (Gradbupfer) Gryllus Peda -	€.	267
Stengel, manbernder, (Gefpenfttafer) Mantis phth	1	
fica -		409
Stengelbohrer, (Ruffeltafer) Curculio Alliaria		215
Stenlake, Stensimpa, (schweb.) Raulforf	IV.	
Stercorarius, Strundfager -		348
Stercus muscarum, (Conus) Aliegendreck	VL.	<b>377</b>
Sterlet, (Stor) Acipenser Ruthenus -	III.	
Sterna, Meerschwalbe	11.	351
— — fuscata, E. Domingische Meerschwalbe	II.	354
— — minuta, kleiner Kischer -	11.	353
nævia, Kirrmewe	П.	353
- migra, schwarze Meerschwalbe -		353
—— stolida, Pinsel -		351
Sternente, (Pfeilschwanz)	Ш,	307

Sternflige	Stinkertje	4	159
•		Th.	e.
Sternfische, (Seefterne)	•	VI.	
Sternhaan, Squalus stellaris	•	III.	
Sternforalle, Lithophyta: M	ladrepora	VI2.	672
Sternnadel, (Klugelschnecke) S		VI.	475
Sternpatelle, (Rlippfleber) Pa		VI.	607
Sternroche, (Spiegelroche)		111.	244
Sternfalamanber, (Feuerfalam	lander) -	111.	117
Cternseber, Uranoscopus	_	IV.	72
Sternstamm, (eble Roralle) Ilis	s Asterias	VI2.	742
Sternftein, (Sternforalle) Ma	drepora Astroites	VI2.	687
Sternstor, Acipenser stellatus	-	ල.	194
Sternwirbel, Vorticella stella		VI2.	878
Sterrekoraal, gestempeld, (b		VI <sub>2</sub> .	690
Sterrekyker, (holl.) Sternsel		IV.	72
Steurer, (Raupentoder) lehne	numon moderator	V2.	854
Ctickling (Ctachelbarsch) Gal	terosteus aculeatu	IV.	247
Stiege, (Stachelschnecke) Mur	ex Dolorium	VI.	518
Stiegenbod, (Bodfafer) Ceri	ambyx scalaris	V.	272
Ctiegliz, (Distelfink)	•	II.	583
Stieglig, gruner, Fringilla Me		II.	584
Cticlforalle, Madrepora stell		VI2.	691
Cticlnug, (Gallarfelmurm) C	lynip <b>s querc</b> us pe	•	
tioli	-	V2.	813
Stier, (Muerochfe) Bos Tauru		I.	432
- fliegender, (Rafer) Sca	rabæus Actæon	V.	. 51
- tleiner, (Rafer) Scarat	æus Thyphæus	V.	55
Stigma, (Cerambyx) Warte	•	V.	278
Stigma, (Curculio) Brandfle		V.	230
Stigma, (Perca) Beichenbarfd	<b>b</b> -	IV.	240
Stigma, (Sphex) Mahltrager	•	V2.	871
Stine marin, (fr.) Stink	•	III.	99
Stincus, (Lacerta) Stinf	•	JII.	
Stincus, Meerstint	_	IV.	323
Stindt, (Grundel) Gobius pa	ganellus -	IV.	128
Stint, (Eidechse) Lacerta Sti	ncus •	III.	99
Stinfameist, Formica foetida		V2.	916
Stinter, (Meeltafer) Tenebr	10 mortilägus	V.	372
Stinkertje, (holl ) Läusefresser	•	V2.	793
	*	æ	sind.

<b>4</b>		Tb.	6.
Stinffliegen, Hemerobii -	V2. 791	. <b>G</b> .	316
Stinffuche, (Krett) Vixerra Memphitis	8	I.	245
Stinfhahn, (Bicdehopf) -	•	II.	250
Stintkafer, Buprestis -	V. 332	€.	247
- gedructer, Buprestis depressa		€.	247
- mit an ben Spigen gegabnelten C	3dilden	V.	335
- mit bauchigen Flügeldecken	-	V.	333
— — mit glattrandigen Schilden		V.	
- Tartarifcher, Buprestis Tataric	<b>A</b> .	€.	
Stintfafer, Scarabæus stercorarius	_	V.	71
Stinffalm, Salmo foetens -		IV.	329
Stintspringer, (Springkafer) Elater Bupi	restordes	3 V.	326
Stinkthier, (Frett) Viverra Putorius			
Stinfvogel, (fleine Doble) Gracula foetic	ia	II.	_
Stipje, (holl.) Punkt -	•	VI.	
Stirngrubler, (Bremse) Oostrus ovis		V2.	927
Stinte mit gegeneinanderstehenden Ruck		137	
Ufterflossen, Olmeri Stockerus, (Cimex) Bengaler -	_	IV. V.	325 •=0
Stockstus, (emick) Bengant -	_	IV.	
Stockfisch, (Robeljau) Gadus Merluccius		IV.	•
Stodschlange, (Gerpent.) Boa Scytale		III.	
Stoeker, (engl.) Baftardmafrele		IV.	
Stor, Acipenser —	•	III.	
gemeiner, Acipenser Sturio	_	III.	
Sibrfrabbe, (Squillenfrebs)	. v	2. 11	194 194
Stok - Dove, (engl.) Ringtaube -	_	II. 5	06
Stok - Spons, (holl.) Steckenschwamm	. V	12, 8	
Stomoxys, (griech.) Wadenstecher -		V2. 5	
Stomp Kieviz-ey, (hoff.) Staatenfahne	•	VI. 4	.00
Stomp Venus - hart, (holl.) das stumpfe			-,
berr -		VI. 2	<b>4</b> 6
Stompe-Spil, (holl.) stumpfe Spindel		VI. s	
Stompje, (boll.) Bootshafe -	1	VI. 4	77
Stompje, (boll.) das Stumpfchen -	<b>-</b> '	VI. 2	50
Stompvissch, (boll.) Krampffisch	- 1	II. 2	37
Stone-Curlew, (engl.) Dickfuß	•	II. 4:	20
Stoparola, Floreminische Lerche	-	IL. 5:	20
•		Storr	

	Stoppelvogel	Strandskjura	461
		• .	Th. €.
Storpelve	gel, (Florentinische L	erche) -	II. 520
Stord, (			4. 6. 111
fdi	warzer, Ardea nigra		II. 376
	isfer, Ardea Ciconia		II. 374
	8. Pediculus Ciconi	æ , ∸	V2. 1034
Storione.	Sturione, (ital.) @	tor –	III. 286
Stork. (er	ial.) Storc	-	II. 375
Stormhoe	den, (boll.) gehörnt	e Sturmhanben	VI. 449
Storno. (	ital.) Staar		II. 523
Grosfalte	, (Brittanischer Falk	e) —	II. 76
@toevoac	l, (Weihe)		II. 71
Strag - W	hale, (engl.) Knoten	fild) -	I. 493
Ctralanac	:, (Meerbrachsem) Sj	parus <b>radi</b> atus	IV. 191
Giraiforb	, (Rorbmuschel) Ma	ctra stultorum.	VI. 256
Stralpate	lle. (Rliepfleber) Pai	ella nimbofa	VI. 616
Stralpenu		, <del>-</del>	VI. 268
Stranball	el, (Rellerwurm) Or	rifcus affimilis	V2. 1152
Stranbiá	ger, (Erbfafer) Cara	bus velox	V. 363
Strandfra	ibbe, Cancer Moena	9 -	V2, 1106
<b>E</b> trantilái	ifer. Tringa	— II. 40	4. 6. 113
	- brouner, Tringa	fuica -	E. 114
	— gestreifter, Tring	ga striata	II. 407
	- punktirter, Tring	ga Ocrophus	II. 410
	- Senegalischer, T	ringa fulca	II. 414
Strandmu	ischel, (Korbmuschel)	Mactra folida	VL 256
Strandri	eiffer, (Regenpfeifer)	Charadrius His	ıti-
	cul <b>a</b>		II. 415
Strandpip	oare, (schweb.) Reas	enpfeifer -	II. 415
Strandrái	uber, (Raubfäfer) St	aphylinus littore	us V. 393
@trandsch	leicher, (Steinschnecke	e) Triton littorei	18 VI. 102
Etrandich	necke, (Mondschnecke	) Turbo littoreu	IS VI, 541
Strandsch	nepfe, Scolopan To	tanus -	II. 400
Strand - S	chulpje, (boll.) Etr	andmuschel VI	. 241. 256
Etrandsch!	warmer, (Langfuß)	Fipula littoralis	V2. 937
Etrandfchi	walbe, (Uferschwalbe		II, 632
Strandsch	wimmer, (Schwimm)	concee) Nerital	it.
n	toralis	564	VI. 589
Strandskj	ura, (schwed.) Austei	thicher —	II. 429
			Strand

	Th.	€.
Strandwulken, (holl.) Rieberlanbifche Spinbel	VI.	
Strasburger Ente, (bie weiffe Monne) -		306
Straffentauber, (Raubfliege) Alilus crabronifor		,
	V2. 1	1002
Straubschnede, (Bischoffsmuge) -	VI.	
Strauchmelbenhabnchen, Chrysomela Atraphaxi-		7,
dis –	€.	224
Straule, (lappl.) grave Meme		345
Strauskasuar, Didus -	II.	455
Strausschnecken, (Flügelschnecken) -	VI.	474
Strausvogel, Struthio -	11.	446
Amerikanischer, Struthio Rhea	II.	452
Streberbarsch, Perca asper -	٠I٧.	227
Streifbod, (Bodfafer) Cerambyx striatus	V.	278
Streifbund, (Krausel) Trochus striatus	VI.	135
Streifvede, (Dedfisch) Stromateus Fiatola	IV.	61
Streifer, (Rafer) Scarabæus erraticus	V.	66
Streifflugel, (Nachtschm.) Phalæna grammica	V.	677
Streiftiel, (Schnirfelschnede) Helix ftriatula-	VI.	564
Streifforb, (Rorbmuschel) Mactra striatula	VI.	
Streifrand, (Tagichm.) Papilio Milippus	V.	597
	VI2.	
Streifschale, (Baftarb) Anomia ftriatula	VI.	
Streifschild, (Springtafer) Elater linearis		320
Streifschwanz, (Stachelbarsch) Gasterosteus occi	j-	•
dentalis	IV.	250
Streitthunfisch, (Matrele) Scomber Amia	IV.	
Strepsiceros, (Antilope) Condoma -		55
Strepsiceros, (Ovis) Rutu -		429
Streupunkt, (Lagichm.) Papilio Argiolus	v.	626
Strichbarsch, Perca striata -	IV.	
Strichbede, (Meeltafer) Tenebrio striatulus	V.	377
Stricheule, (Baffereulchen) Phryganea ftriata	V2.	785
Strichtafer, Scarabæus Lineola -	V.	76
Strichling, (Tagthierchen) Ephemera ftriata	V2.	7 <b>8</b> 1
Strichschale, (Drepect) Donax striata -	VI.	
Strichschildlein, (Bange) Cimex ftriatus	V.	502
Strichwespe, (Raupentoder) Ichneum. lituratorius	V2.	848
	a	. قدنسه

Y.	
Carlthurford S.L. a. (Manus Ameliticity T.T	Th. S.
Strifdublet, achtes, (Benusmufchel) Venus literata	VI. 277
Ottiunadel, (kinthorn) Buceinum maculatum	VI. 469
Striemboa, (Boatafer) Cerambyx liciatus	V. 280
Etriemenichild, (Schildkäfer) Cassida Vibex	V. 138
Striga, Rageneule -	II. 92
Strigilis, (Phalæna) Drenring -	V. 696
Stripho-Kamelos, (griech.) Kameelftraus	II. 446
O	IV. 146
	· <b>©</b> . 67
- accipitrina, Habichteule	
	<b>6.</b> 67
— Cajenensis, Cajennische Eule	. S. 67
— deminuta, fleiner Schuhu	5. 70
	<b>6</b> . 67
— Domingensis, Domingische Eule	<b>©.</b> 70
—— flammea, feurige Eule	II. 102
- funeres, Steineule	IL 105
- inauriculata, ungehörnte Cule II. 100	<b>. 6</b> . 67
, nyetzea, Tageule	II. 100
- pafferina, 3mergeule -	II. 106
- pulchella, Mignatureule -	<b>G</b> . 69
— Scandiaca, Lapplandische Eule -	II. 97
stridula, Brandeule .	II. 103
- Uralensis, Uralische Eule -	<b>E</b> . 68
Strix, (Phalena) Trauereule -	V. 679
	VI. 412
	VI, 613
	IV. 6r
Strombus, Flügelichnede - VI. 474.	
	VI. 491
	VI. 490
	VI. 487
	VI. 483
	VI. 478
	VI. 476 VI. 486
	VI 400
	VI. 479
	VI. 491
	VL 482
- mer Pringeres Dingethat.n	VI. 482
	Strom-

	Th.	C.
Strombus minimus, fleines Segel -	<b>6.</b> 3	
— oniscus, Affelschnede -	VI.	
- palustris, Bastardsectonne	VL:	
_ pugilis, Fleischschnecke	VI.	
spinosus, Dornkanaet -	VI.	
- fuccinctus, breite Kanarienschnecke	VI.	
- vittatus, aufgemickeltes Besaansfegel	VI.	
Strontjager, (boll.) Struntjager -	II.	
Strontvogel, (boll.) Menschenfresser -	11.	
Stroutliokamelos, (griech.) Rameelstrans	11.	
Struntjager, (Meme) Larus parasiticus	11.	
Struthio. Etrausvogel -	IL.	
Struthos, (aricch.) Sperling +	11.	
Struzza, Struzzo, (ifali) Etrausvogel -	II.	
Strukyzer-vissch, (boll.) Blegeleisen -	III.	304
Seuhenfliege, Mulca Domettica -	V2.	967
Rankant Sufer (Sirelfater)   enebrio Curior	<b>V.</b>	370
Sindierlampe, (Springkafer) Liater noeillucus	<b>V.</b>	318
Seimnschen (Propistate)	VI.	177
Assume than (Drenect) Donax Irunculus	VI.	259
Granbfafer) Staphylinus obeulus	<b>V.</b>	391
example (bitable) Cleads apters —	V. 4	164
Same Skafe (Wincipater) Curculo incanus	V. :	237
Summfonde (Sessmustal) Lelling Donacing	VL 2	3.8
Etumpshorn, (Baltarovoa) Necharis previcor		
tils —	V. 2	296
Stumpfflaffer, (Rlaffmufchel) Mya truncata	VI.	815
Stumpftrabbe, Cancer mutus	72. 10	99
Sumpfmuschel, (Baftard) Anomia retula	VI.	<b>32</b> 1
Stumpfnabel, (Stachelichnede) Murex decollatus	VL 9	724
Stumpfnafe, (Rrabbe) Cancer grapfus	V2. 1	ı t6
Stumpfrucken, (Biente) Apis retula	V2.	X93
Etumpfiquaer, (Nachtichm.) Phaiæna vitis ideæ	V. (	580
Stumpfichlog, (Baftart) Anomia truncata	VI.	
Stumpfichloß, (Bennemufchel) Venus edentula	VI.	
Crumpfichmang, (Rlapperichlange) Crotalus mutus	IIL	145
Stundenthierchen, (Lagthierchen) Ephemera ho-	<b>1</b> 7.	_ <b></b>
raria -	¥2.	7×1

Sturgeon	Suguntu	465
		Th. S.
Sturgeon, (engl.) Ctor	_	III. 286
Sturio, (Acipenter) gemeiner Stor	III.	286. 287
Sturmbaube, gefaltene, (Rinthorn)	Buccinum	207
plicatum	_	VL 447
gehörnte, Buccinum cor	nutum	VI. 449
gerippte, (unachtes Attal	ifches Rleib)	VI. 453
rothe, Buccinum rufum	-	VI. 450
Sturmbaube, (Bafc)	_	VI. 436
Sturmschwalbe, (Ungewittervogel)		IL 315
Sturmtegler, (Strandlaufer) Trings	lobata	II. 408
Sturmverfundiger, Procellaria Puffi		II. 317
Sturmvogel, Procellariæ		IL 314
Sturnus, Staar -	II, 523	. S. 138
- Capentis, Caapicher Staar	-	II. 524
cinclus, Bafferstaar	-	IL 525
- Ludovicianus, Louisianischer	Staar	II 524
militaris, Dagellanischer St	aar	<b>6.</b> 138
- vulgaris, Sprebe	_	Ц. 523
Stuger, (Fliege) Musca festiva	-	V2. 962
Stuffugel, (Erbfafer) Carabus trun	catellus	V. 366
Stugtieme, (Bering) Clupea Sinenfie		IV. 377
Stufforper, (Grasbupfer) Gryllus b		V. 42E
Stufforf, Coryphoena -		<b>5. 203</b>
- gestreifter, Coryphoena Po	mpilius	IV. 123
- gruner, Coryphoena virem		IV. 124
Suagia, (venet ) Biered, (Seitenfcha		IV. 159
Subbuteo, (Falco) Baumfalfe	-	11. 78
Suber, (litthauisch) Bison	_	L 439
Sucet, (fr.) Sauger		IV. 113
Suckingfish, (engl.) Sanger		IV. 113
Subelfpige, (Rachtschm.) Phalena p	eteluno	V. 715
Sudes, Pfeilbecht -	opulaca	IV. 337
Sue, (fr.) gemeine Krote	_	III. SE
Suen moodra Cavky, Malabarifch	er Rorfohrts	71
schnabel —	~·····	IL 355
Sufflator, (Falco) Blafer	<b>-</b> .	IL 80
Suglum, Surglum, (turf.) Kafan	•	IL 473
Suguntu, (peruv.) Menschenfresser		IL 56
Gg	•	Suber
· ,	T .	- ··· · · ·

	Th. G.
Subermefpe, (Baftarbmefpe) Sphex antaretic	2 V2. 870
Sublander, (Scorpion) Scorpio australis	V2. 1092
Sublander, (ungeflugelte Biene) Mutilla Ame	
cana -	V2. 919
Cubpoler, (Biebbreme) Tabanus antareticus	
Cufbolibod, (Bodtafer) Cerambyx Glizyerh	izæ 🛎. 238
Sula, (Pelecanus) weisser Fischer -	II. 332
Cultan, (Bafferbubn) Fulica Porphyrio	II. 428
Sum. (poln.) Wels -	IV. 290
Sumpsbrummer, (Langfuß) Tipula palustris	V2. 944
Sumpfhottermotte, (Rachtschm.) Phalæna calth	ella V. 750
Sumpfheideleule, (Rachtschm.) Phalæna Myrti	III V. 698
Sumpfigel, (Blutigel) Hirudo stagnalis	VI. 51
Sumpffrebs, Cancer stagnalis - 1	V2. 1136
Eumpfmans, Mus paludolus —	<b>E</b> . 39
Sumpfmeise, Parus palustris —	II. 627
Sumpfnerite. (Schwinumschn.) Nerita lacustru	VI. 590
Sumpfupmphe, (Jungfer) Libellula Puella	V2. 774
Eumpfotter, Mustella Lutreola -	L 264
Sumpfnaticer, (Baffertafer) Dytilcus paluiti	tis V. 350
Eumpfiglemender, Lacerta paluitris -	Ш. 114
Eumpfichmein, Sus hydrochæris	i. 467
Cumpfichwingel, (Rachtschm) Phalæna Feltuc	28 V. 689
Sumpfipinne, Aranea palustris -	V2. 1085
Sumpftelline, (Tellmuschel) Tellina cornea	V1. 242
Sumpfwurm, (Kabenwurm) Gordius lacuftris	VI. 34
Sunfish, (engl.) Mublenfteinfisch -	III. 319
Gurinamer, (Bodfafer) Cerambyx Surinami	us V. 272
Curinamer, (Gespenstäfer) Mantis Necydalo	ides V. 415
Curinamer, (Graebupfer) Gry llus Surinamen	fis V. 442
Eurinamer, (Goldbabnchen) Chrysomela Sur	ina-
mensis —	V. 185
Surinamer, (Summel) Apis Surinamensis	V2. 906
Gurinamer, (Raderlad) Blatta Surinamensis	V. 403
Curinamer, (Wafferscorpion) Nepa grandis	V. 471
Surinamerin, (Befpe) Vespa Surinama	V2. 886
Surmulet, (fr.) Riesenbarbe -	IV. 270
Sus, gemeiner Stor -	III. 287 Sus,
	رحيات

•	Th. G.
Sylpha quadripunstata, Bierpunte -	V. 128
- quadripustulata, Bierfied -	V. 125
- reticulata, Breitsopf -	V. 130
- rugola, Rungelkäfer	V. 129
- Russica, Russic -	V. 126
sabulos, Sandgrabet	V. 129
- Indulois, Canograper	F. 131
— — scabra, Raubpelj — — succincta, Gürtelträger	V. 131
	V. 133
testacea, Bieglet	V. 128
- thoracica, Schildtrager	V. 391
Sylphoides, (Staphylinus) Graberranber	l. 120
Sylvanus, (Simia) Waldteufel	IV. 187
Synagris, (Sparus) Purpurbeachfem	III. 339
Syngnathus, Rabelfifch	III 343
= = squoreus, Meernadel	III. 344
barbarus, Kahlichwang _	IV. 189
Synodon, (griech.) Zahnbrachfem	
Sprier, (Mantafer) Meloë Syriaca -	V. 381
Sprier, (Springfafer) Elater Syriacus	V. 320
Syrinx, Rablfprüße	¥1. 46
Syrmas, (fcweb.) Spieswurm -	V2, 1049
Syrfa, (schweb.) Sausgrille -	V. 424
Sysje, (boll) Zeisig	II. 590
<b>E.</b>	
m 11 (Canadia) mailiat C	\$2
T, album, (Curculio) weifies E	V. 221
E, weiffes, (Ruffeltafer) Curculio T, album	V. 221
Taalinkje, (boll.) grave Salbente -	II. 293
Labatspfeife, (franzossische Spindel) -	VI. 511
Labatepfeifenfifch, Fistularia tabaccaria	IV. 333
Tabaks-pyp, (holl.) franzosische Spindel	VI. 511
Tabaks - pyp, (boll.) Labatspfeifenfifch	IV. 333
Tabanus, Biebbreme antareticus, Gubpoler -	V2. 982 V2. 987
- autumnalis, Perbstbreme	V2. 981 V2. 985
barbatus, Bartbreme -	V2. 985 V2. 984
- bovinus, Ochfenbreme	V2. 984
- Anathral Sallanasana	Tabanes

Tabanus	Tagmensch	469
		£6. €.
Tabanus bromius, Grasbreme	•	V2. 986
- calens, Beiflander	**	V2. 985
— — coecutiens, Blingler	-	V2. 987
exæstuans, Feuerbreme		V2. 985
— — fervens, Amerikaner	-	V2. 986
— — lugubris, Tranerbreme		V2. 988
Mauritanus, Afrifaner	-	V2. 984
Mexicanus, Mexitaner	. •	V2, 986
occidentalis, Abendlande	£	<b>V</b> 2. 986
- pluvialis, Regenbreme	-	P2. 987
- roftratus, Ruffelbreme	•	V2. 984
rusticus, Dorfbreme	-	V2. 986
- tarantinus, Reunthierbrei	<b>MC</b> -	V2. 985
tropieus, Regendeuter		V2. 986
Tabelle ber Linneifchen Gintheilung	der Ordnung	
der Infetten	-	V. 21
Tacataca, (peruv.) Loufan	-	II. 155
Tachasch, (bebr.) Seetub	-	1. 175
Tachmas, (bebr.) Rachtigal	-	IL 602
Tacoco, (ind.) Flaminger	-	II. 358
Sabler, (Raupenteber) Ichneumon	culpatorius	V2. 845
Tænia, Bandwurm	-	VI2. 902
canina, fchmaler Banbwurm		VI2. 908
cucurbitina, einmundiger &	andidurm	VI2. 904
- grifen, weißgrauer Bandwur		VI2, 906
— hydatigena, Bandwurmpoly	ibe –	VI2. 891
lata, breiter Bandwurm		VI2. 907
- vulgaris, zweymundiger Bai	www	VI2. 906
Tænia, (Cepola) Wurmfisch	, <del></del>	IV. 110
Tænia, (Cobitis) Steinbeiffer	-	IV. 283
Tænia hæruca, Bartwurm		VI. 44
Läubchen, (Flügelschnecke) Strombi		VI. 487
Laubchen, (Polimespe) Sirex Colu	moa 	V2. 838
Tagdieb, (Bocklafer) Cerambyx m	eriqiznus	V. 269
Tages, (Papilio) Braunmalve	•	V. 632
Tageule, Strix nyclæa	 -iliana-i-	II. 100
Tagling, (Nachtschm.) Phalæna paj		V. 710
Lagmensch, (vernänftiger Mensch) Ho		
· Gg	3	Tage

	Th. G.
Tagschläfer, (Ziegenmelfer)	II. 636
Lagthierchen, Ephemeræ -	V2. 776
mit breyburftigem Comange	V2. 778
mit zwenburftigem Schwanze	V2. 780
Tagvogel, (Cometterlinge) Papiliones V. 542.	
Tajacu, (Sus) Muscusschmein -	L 469
Tai-ibi, (braf.) Philander -	I. 291
Sainten, (Lachsforelle) Salmo Taimen -	<b>S</b> . 208
Taimen, (sibir.) Lachs -	IV. 312
Taisson, (fr.) Dachs -	1. 281
Talapoin, (Simia) Schwarznase —	<b>6</b> . 7
Talaus, (Papilio) Rothwurzel -	V. 628
Talbit, (schwed.) Rernbeisser -	II. 546
Taling, gekappde, (holl.) Bedertappe -	II. 301
Talpa, (Cyprea) gelber Maulmurf -	VL 391
Talpa, (Madrepora) Seemaulwurf -	VI2. 677
Talpa, Maulmurf - I. 29	5. 6. 35
- Americana, rother Maulwurf -	<b>6.</b> 36
- Afiatica, Afiatischer Maulmurf	1. 299
Europæa, Europaischer Maulmurt	I. 295
- Frisia, gefteckter Maulmurt	<b>S</b> . 36
— Virginea, Purpurmaulmurf —	<b>6</b> . 35
Tamandua, (amerif.) Ameifenbar - 1.	180. 181
I amarijen izotati, ii, Coolanii	VI2. 835
Tamatia, Sobifconabel	II. 368
Tanagra, Merle - 11. 572	. 6. 158
	575. 577
_ atrata, Köbler	II. 575
- Brafiliensis, Brafilianische Merle	11. 576
- Brefilia, fcarlachfarbige Merle	IL 573 IL 576
- Cajann, Cafennische Merle	IL 570
_ Cajana, gelbe Merle	
chlorotica, schwarzgelbe Merle -	IL 178
- cristata, Haubenmerle	IL 578 IL 574
- cyanea, blaue Merle -	5. 159
cyanocephala, Blautopf	IL 176
Dominica, Domingifche Merle -	S. 160
- elegans, Kaisersmerle -	Tanagra

	Tanagra'	Tantalus	471
	,	t in the second	Th. E.
Tanagra	fusca, braune Merle		G. 159
	galaris, Purpurfehlchen		II. 576
	gyrola, grune Merle		II. 574
	jacapa, schwarze Merle	-	II. 572
	jacarina, Gabelschmanz	_	II. 573
	maxima, große Merle	<b>₹</b>	S. 159
	Mexicana, Mexifanisch	Merle	11. 575
	militaris, Kardinal	₹	II. 577
	mitrata, Saubenmerle	-	E. 159
	nigra, fcmarje Merle	_	E. 159
	Pompadura, Pompadur	-	<b>5</b> . 159
	punctata, gefprentelte D		II. 577
	rubra, rothe Merle	-	II. 573
		-	IL. 577
	varia, bunte Merle	<del></del>	S. 158
		Retle -	II. 574
· —		•	IL 578
		-	S. 153
Tanche.	(fr.) Schleihe	-	IV. 383
Tand - B	rasen, (boll.) Zahnbrad	fem -	IV. 189
Tand - I	loorens, (holl.) Meergah	nchen -	VI. 618
Tangara	s, (braf.) Merle	_	II. 576
Tanglak	e, (schwed.) Aalmutter		IV. 107
Sannene	lster. (Rusbåber)	━.	II. 177
Sannent	afer, (Ruffelkafer) Curcul	lio Anchorago	V. 231
Sannent	oralline, Sertularia abiet	ina -	VI2. 836
Sannenn	neife. Parus ater	-	II. 627
Sannenn	ager, (Schlupfwefre) Te	nthredo abieti <mark>s</mark>	V2. 828
Sannenfo	uger, Chermes abietis	-	V. 525
Sannenn	sante. Cimex abietis	• •	V. 505
Sannenn	pespe, (Raupentober) Ich	neumon Strob	<b>i-</b>
<b></b>	lellæ	-	V2. 853
Tantalus	s, Brachvogel -	II. 389	. E. 112
	albus, weiffer Brachvog	લ -	II. 392
	castaneus, Donauer	• •	E. 112
	falcinellus, Sichelschnab	el +	II. 390
	fulcus, brauner Brachvo	gel —	II. 392
	minutus, fleiner Brachv		II. 39E
		Gg 4	Tan-

		Th.	E.
Tantalus ruber, rother Brachvogel	-	II.	392
Tantalus, (Sphinx) Beifgurtel	•		643
Eanzende Mucken, (Dupfer)	•	V2.	
Taos, (griech.) Pfau -	-		457
Taoffa, (fchweb.) gemeine Rrote	_	III.	Şŧ
Tapeçon, (fr.) Bargentopf	_	IV.	72
Tapetenmotte, (Rachtschm.) Phalæna ta	pezella		74£
Tapeti, Thabitl, (braf.) Saafe	-	L 318.	
Tapiira, (braf.) Elendthier	•		389
Tarandus, (Cervus) Rennthier	_		394
Tarangulo, (ital.) Regenvogel	-	H.	395
Sarantel, (Spinne) Aranea Tarantula	V2, 10	82. 🗲.	
Tarantola, (ital.) Ceecibechfe	•	īv.	
Tarantula, (Aranea) Tarantel	¥2. 10	82. <b>C</b> .	
Tarbot, (boll.) Steinbutte	-	IV.	
Tardigrada, Schildfrote	-	IH.	15
Tardigradus, Kaultbier -	•		177
Tare franc, (fr.) Meerabler		IH.	245
Tare-ronde, (fr.) Pfcilschwang	-	III.	247
Tarier, (fr ) Braunkehlchen	-	II.	609
Tarin, (fr.) Zeifig -		IL.	590
Tarin, (Fringilla) Reujorter	-	6.	163
Tarna, (fcmed.) Meerschwalbe	-		358
Tarpeja, (Papilio) Ruffischer Argus	. •	€.	294
Tartar, (Grasbupfer) Gryllus Tataric	US	V.	44E
Tartar, (hirschood) Antilope Scytica	•		53
Sartar, (Regenpfeifer) Charadrius Tat	aricus	€.	116
Sartarlerche, Alauda Tatarica	-		136
Tartaruca, (ital.) Schildfrote	-	III.	
Tartuga, (fpan.) Schildfrote	• •	ill.	
Safchen, (Rammuscheln mit schiefen Obre	en)	VL	311
Safchentrebs, gemeiner, Cancer paguru	S	V2. 1	108
Tasso, (ital.) Dachs			<b>28</b> 1
Taffot, (fr.) Sumpffalamander	-	· III.	114
Talugo, (span.) Dachs -	-		281
Tatao, (Tanagra) Baradicemerle	•	II.	575
Tatoe, (amerif.) Schuppthier	•	L	185
Tatu, (braf.) Armadill, Pangerthier	3 - 2	l. 188.	
,		Tat	ub,

Tatula	<b>Taucher</b>	473
		Th. G.
Tatula, (ital.) Doble	·	II. 175
Tau, (Gadus) Krotenfisch	-	IV. 96
Tau, (Phalæna) Ragelfleck	, -	V. 653
Taube, Columba	- II. 496	. <b>6.</b> 131
— — Afrikanische, Columba A	fra —	II. 510
Amboinische, Columba An	nboinensis II.51	4. <b>6.</b> 132
Amboinische, Columba vi	irid <b>is –</b>	II. 50 <b>8</b>
Batavifche, Columba Ind	ica —	<b>©</b> . 133
- braune, Columba fusca	_	<b>©</b> . 134
- Caapide, Columba Cape	eniis —	II. 514
- Canadische, Columba Can	nadenfis -	II. 510
Carolinische, Columba Ca	arolinenlis	П. 514
Chinestsche, Columba Sin	iica —	II. 509
- geranbelte, Columba mar	rginata -	II. 515
- geftreifte, Columba ftriat	:a	II. 506
- grune, Columba viridis	-	<b>E</b> . 132
Guineische, Columba Gui	nea —	II. 505
— — Jamaifaische, Columba J	amaicenlis	II. 508
Indianische, Columba Inc	dica -	II. 509
Madagascarische, Columbia	a Madagaicarien	lis II. 507
Martinitsche, Columba N	viartinica	П. 508
Moluttische, Columba æi Moluttische, Columba M	nea .	II. 503
— Ritembarische, Columba	Nicebesies	<b>©</b> . 133
— rothbauchige, Columba S	anagalanga	II. 509
- Cenegalische, Columba S	enegalennis	€. 133
Epanische, Columba His	inanies :	11. 509
- Eurfische, Columba Turc	panica -	II. 499
Laubenen, (Blase) Bulla Nauci	in —	II. 502
Caubenhabicht, (Falte) Falco pa	dumharine	VI. 407 II. 88
Taubenhale, (Pfeilschwang) Sphi	iny Statices	V. 648
Taubenlaus, Pediculus Columb		V. 045 V2. 1037
Laubenschwang, (Pfeilschwang) S	nhiny Gellsenm	V. 643
Laubensperber, (Falte) Falco c	olumbarine	li, 82
Lauchente, Mergus	~	II. 303
- meiffe, (Langichnabel)	•	II. 305
Taucher, Colymbus	- 11. 228	<b>6.</b> 107
Domingischer, Colymbu	s Dominicus	II. 343
	3 5	Taucher,
		7**/

	Tb. G.
Saucher, rothbalfiger, Colymbus Septentrionali	
Taucher, (Baffertafer) Dytiseus Fuscipes	V. 346
Caucherente, (die weisse Monne)	II. 306
Sauchergans, Mergus Merganser -	II. 304
Taucherhuhn, Colymbus Troile -	II. 339
Taumler, (Taube) Columba gyratris -	II. 502
Taupe, (fr.) Maulmurf	1. 295
Taupe-grillon, (fr.) Maulmurfgrille .	V. 423
Taur, (arab.) Stter	I, 431
Taureau, (fr.) Stier -	L 431
Taurus, (Bos) Stier - I. 4	32. 6. 57
	V. 52. 57
Taurus, (Scarabæus) Dechslein .	V. 65
Taurus, Ctier	1. 431
Tavano, Taono, (ital.) Biehbreme .	V2. 982
Taxisbornspindel, (Bastardpapstfrone) -	VI. 522
Taxus, Dachs -	I. 281
Taya, (ind.) Berkebetschnabel -	II. 355
Tchorz, (bohm.) Itis -	I. 269
Teal, (engl.) Rriechente	II. 297
Tecolotl, (mex.) Horneule -	II. 99
Tectum Persicum, (Turbo) Chinesisches Dach	VI. 545
Tecuixin, Tejuguacu, (ind.) Ratheidechse	III. 109
Tecuocholli, (mcr.) Pauwis -	II. 465
Tegnixin, (Lacerta) Ratheidechse -	IIL 109
Tekken, (holl.) Baldmilben, Kuhmilben V2.1	046, 1047
Telamon, (Papilio) Zwened -	V. 624
Telamon, (span.) Wasserhubn —	II. 429
Telemachus, (Papilio) Blaustral -	V. 578
Telemon, (Papilio) Goldpage -	<b>S.</b> 297
	V2. 1145
Telemus, (Papilio) Uffelraupenschmetterling	<b>€</b> . 296
Telescope, (fr.) Sectonne	VI. 536
Telescopium, (Trochus) Sectonne -	VI. 536
Tellina, Tellmuschel	VI. 231
- albida, Epertelline -	VI. 235
- angulata, weisse Ectelline	VI. 233
- balaustina, Salbsäge -	VI. 239
, i	Tellina,

v	Tellina	Tenebrio	475
	•	,	<b>L</b> b. <b>S.</b>
Tellina	Balthica, rothe Bohne	- `	VI. 241
<u> </u>		-	VI. 241
	carnaria, Kleifcblinfe	•	VI. 241
	cornea, Sumpftelline	-	VI. 242
	digitaria, geflecte Erbf	· -	VL 242
	divaricata, meiffe Erbf	· - ·	VI. 242
	Donacina, Ctumpfende	-	VI. 238
	foliacea, golbene Bunge		VI. 236
	fragilis, Dunnschale	-	VI. 234
	gargadia, gezahnelte 2	enus -	VI. 232
	Gari, Bafaffandublet	-	VI. 233
	inæquivalvis, Milchsch	aale <del>-</del>	VI. 237
	incarnata, Jungfer	-	VI. 238
<b>_</b> _	lactea, Milchlinse		VI. 241
	lævigata, glatte Rofe	-	VI. 236
	piliformis, rothe Erbfe	-	VI. 242
	planata, Rosendublet	-	VI. 236
	radiata, Rothstral	,	VI. 237
	remis, Sandtelline	-	VI. 239
	reticulata, Liegergunge	-	VI. 240
	roftrata, Ronfeftichintd	en —	VI. 237
<u> </u>	scobinata, Robbengung	•	VI. 240
	trifasciata, Drenftral	-	VI. 238
	truncata, Cage -	-	VI. 239
	virgata, Ceplonifcher C	onnenstral	VI. 233
	fcheln, Tellinæ	-	VI. 231
	— oval und dick	•	VI. 232
		'	VI. 235
	— rund —	•	VI. 239
Temelo	, (ital.) Aesche -	• ,	IV. 327
Tench,	(engl.) Schleibe	• .	IV. 383
Tenebi	rio, Meeltafer	- V. 367	. S. 252
	angulatus, Edflache	-	V. 374
	barbarus, Afritaner	-	V. 370
	chaly bæus, Guineifche	r Staltafer	V. 369
	coeruleus, Blauling	· <b>-</b> ,	V. 373
	collaris, Dichals	-	V. 374
	culinarius, Ruchengaft	-	V. 370
			Tene-

- festinans, Klüchtling. - 5. 252
- gibbus, Hochrücken - V. 373
- grossus, Rervenschild - V. 373
- leucogrammus, Beißschrift - 5. 253
- levigatus, Glattschild - V. 376
- linearis, Linie - V. 374

— Mauritanicus, Algierisches Zahnschild V. 369 — minutus, Mignatur V. 371 — mortilagus, Stinker V. 372

— muricatus, Stachelschild — V. 373
— pallens, Blaßrücken — V. 371
— quisquilius, Rostmaul — V. 372

— rostratus, Schnabelbehrer — V. 373
— rugosus, Runzelschild — V. 375

— fpinosus, Stachelbrusk - V. 374
— striatulus, Strichdecke - V. 377

— — tibialis, Plattfuß — P. 376
Tenella, (Chrysomela) Zartling — P. 196

Tenthredo, Schlupswespe - V2. 819. S. 318

— abietis, Lannennager - V2. 828

— alni, Erlennager - V2. 839

— Americana, Amerikaner - V2. 824 — amerinæ, Weidenschlupfer - V2. 823

- - atra, Köhler - V2. 829 - - betulæ, Birkensteiger - V2. 834

— — bicincta, Aingelschlupfer — V2. 831 — — campestris, Feldstreicher — V2. 829

- campentris, Kriofiteiget - V2. 829
- capræx, Beidennager - V2. 836

— — carconaria, Weismaus — V2. 832 — — cerali, Kirschblatwickler — V2. 828

- - ciliaris, Haarhorn - V2. 825 - - convolvuli, Windenschlupfer S. 318

- cynosbati, Painbuttenlecker  $V_2$ . 833
- duodecimpunctata, Dujendpunkt  $V_2$ . 832

– – enodis, Glatthorn – V2. 825 Tea-

		Tenthredo	477
			Th. G.
Ten	thred	o erythrocephala, Rothfopf -	V2. 833
		fasciata, Braunband -	V2. 824
_	_	femorata, Dickschenkel -	V2. 822
		flava, Roststed -	V2. 835
		intercus, Marksauger -	V2. 835
_		juniperi, Wachholderfresser -	V2. 826
-	-	livida, Weißring -	V2. 83E
	_	Ionicera, Geisblatschleicher	V2. 836
-	_	lucorum, Buschfriecher -	V2. 823
-		lurida, Braunbauch -	V2. 831
	_	lutea, Gelbschlupfer -	V2. 822
_		marginata, Beigrand -	V2. 822
-	_	mesomela, Schwarzrucken -	V2. 829
_	_	naffata, Dezflügel	V2. 832
_	_	nemoralis, Buschschlupter -	V2. 833
_	· '	nigra. Mobt —	V2. 831
	-	nitens, Glanischlupter -	V2. 825
_	-	ovata. Runbrucken -	V2. 830
	-	padi, Bogelfirschennascher -	V2. 828
-		pini. Tubnfreffer -	V2. 826
-	-	populi, Papelnschleicher -	V2. 833
-		pruni, Phaumenbohrer -	V2. 835
_	_	rapæ, Rubenschlupfer —	V2. 83 E
-	-	reticulata, Reiflügel -	V2. 834
-		rolæ, Rosenriccher	V2. 830
-	_	rumicis, Sauerlecker -	V2. 835
-	_	rustica, Landstreicher -	V2. 826
-		falicis, Beibenfreffer -	V2. 828
	_	faltuum, Jager -	V2. 834
_		Scrophulariæ, Braunwurzschlupfer	V2. 827
-		septentrionalis, Rorbschlupfer	V2. 832
-	-	sericea, Aupferbauch -	V2. 824
-	_	sylvatica, Waldschlupfer -	V2. 833
-		ulmi, Ulmenschaner -	V2. 835
-		ustulata, Brandmaal —	V2. 825
-	-	vafra. Spizbubin -	V2. 834
-	_	viridis, Grúnrúcten —	V2. 830
•	-	vittellina, Dotter -	V2 823
		,	Tepe-

		Th. S.
Tepetototl, (mer.) Pauwis	- II	. 465. 466
Tercelo, Terzolo, (ital) Sperber	-	IL 89
Terebellum, (Bulla) Bottcherbobrer	. •	VI. 412
Terebra, (Turbo) Erommelschraube	_	VI. 557
Terebratul (Baftarb) Anomia Terebr	atula	VI. 324
Terebratula, (Anomia) Terebratul	•	VL 324
Terebrella, Steinbohrer		VI. 100
lapidaria, Steinpinsel	-	VI. 100
Termes, Soliwurm -	•	V2. 1022
- fatale, Bermufter	_	V2. 1023
— — fatidicum, Wandschmid	-	V2. 1025
- pulsatorium, Rlopfer		V2. 1024
Ternier, (fr.) Baumlaufer	-	II. 254
Terpsichore, (Papilio) Gelbflugel	-	V. 583
Terrabufo, (ital.) Robrbommel		II. 386
Terrapen, (span.) Carolinische Childi	trôte	III. 45
Tespis, (Papilio) Beiffled	-	V. 626
Testacea, Konchilien	VI.	9, 14. 157
Testicles, (fr.) Knotennabel	-	VI. 586
Testiculus, (Buccinum) undotes Attali	ides Cle	
Testo russo, Riosterwenzel	· - ·	II, 610
Testudine, (ital.) Schildfrote	_	111. 15
Testudo, Schilbfrote	_	IIL 15
- caretta, Raretschildfrote	-	III. 30
_ carinata, Kielschild		111, 45
- Carolina, Carolinische Schilber	Ste	III. 44
Carolina, Cutoffff Commen	-	III. 16
coriacea, Leberschild	råte	IIL 43
- denticulata, gezähnelte Schildfi - geometrica, geometrische Schild	nfråtø	III. 45
geometrica, geometricate culti	_	III. 44
græca, mosaische Schildfrote		
- imbricata, Schuppenschilb	_	•••
- lutaria, Schlammschildfrote	_	
— orbicularis, Klusschildfrote		
— pusilla, Zwergschildfrote	_	77
— — scabra, Landschildfrote	_	- JY
— ferpentina, Schlangenschildfrei	· <b>·</b> · · ·	III. 47 II. 510
Tetaru, (perf.) Turteltaube	_	VI. 83
Tethium, Tethys, Wargenscheibe	=	Tethys,

Tethys Tettigometræ	479
	Lh. E.
Tethys, Seehaase -	VI. 91
- fimbriata, Kerbenmaul -	VI. 93
— — leporina, Saarmaul —	VI. 92
Tetragonoptrus, geflecter Salm -	IV. 329
Tetrao, Berghuhn - II. 478.	S. 127
- Afer, Afrikanisches Berghuhn -	<b>5</b> . 129
bicalcaratus, Doppelsporn -	ll. 490
- Canadenlis, Canadifches Berghuhn	II. 482
- Chinenlis, Chinesische Bachtel -	II, 491
- Chinensis, Perlhubn	S. 129
criftatus, Meritanische Bachtel	II. 491
Europæus, Europaischer Berghuhn	6. 129
- Francolinus, Indianisches Subn	II. 486
— — lagopus, Schneehubn	II. 482
- Marilandicus, Marilandisches Rebhuhn	IL 490
- Mexicanus, Merifanisches Rebbuhn	II. 489
— — paradoxus, Bastardhubn	<b>5</b> . 127
- pedibus hirsutis, Reberfuß -	II. 478
- pedibus nudis, Kablfuß -	II. 486
rufus, rothes Rebbuhn	II. 483
Senegalensis, Cenegalisches Berghuhn	<b>6</b> . 127
- togatus, Mantelhubn -	П. 485
— — umbellus, Kragenhubn	II. 485
— Virginianus, Birginisches Rebhuhn	II. 490
Tetrastichon, (Elater) Punktstirn -	V. 326
Tetrax, (Otis) fleiner Trappe -	II. 444
Tetrax parva, Ralanderlerche	II. 521
Tetrio, (Sphinx) Biered -	<b>6</b> . 301
Tetrix, (Tetrao) Birthubn -	II. 480
Tetrodon, Stachelbanch -	III. 312
hispidus, Geeflasche -	III. 318
lævigatus, Windbentel -	III. 317
- lagocephalus, Saasentops	IIL 313
lineatus, geftreifter Ctachelbauch	III. 315
- ocellatus, geflecter Stachelbauch	III. 316
- testudineus, Schildfrotenfisch	IIL 313
Tette-chevre, (fr.) Ziegenmelfer	11. 636
Tettigometræ, (griech.) Eikadenwarmer	V. 459
	Tetti-

	Th. G.
Tettigoniæ, (Grylli) Gabelheuschreden	V. 427
Teucer, (Papilio) großer Atlas -	V. 579
Teufel, fliegender, (Chelfischteufel) Calyonim	us
Lyra -	IV. 68
Indianischer, Callyonimus Indicus	IV. 70
Teufel, (Meertage) Simia Maimon -	I, 123
Teufel, rother, (Pangerhabn)	IV. 273
Leufelsband, Alcyonium: Manus Diaboli	VI2. 788
Teufeistlaue, (Bootshate)	VL 476
Seufeistrabbe, Cancer Maja -	V2. 1113
Teufeleschlange, (Ratter) Coluber melanis	<b>6.</b> 191
Teuthis. Relsensisch	IV. 305
- hepatus, Lebernia	IV. 305
Javus, Javaischer gellenfisch -	IV. 306
Teuthlacoth - Zauphin, (ind.) Rapperschlange	III. 133
Texon, (span.) Dachs -	I. 281
Textile. (Conus) Spigenrolle -	VL 381
Textor, (Cerambyx) Weber -	V. 267
Thabhia, (chald.) Reb	I 401
Thalia, (Holothuria) Rammblafe -	VI. 98
Thalia, (Papilio) Beifiband	V. 586
Thallo, (Papilio) Gelbband	V. 584
Thamyras, (Papilio) Schmargrand	V. 625
That, (fr.) Sumpffalamander	III. 184
Chaubock, (Bockfafer) Cerambyx irroratus	V. 275
Thauhquechul, (mer.) Loffelgans -	II. 363
Thaufafatu, (Papagen) Plittacus roratus	S. 77
Thauleder, (Bliege) Musca roralis -	V2. 971
Thaumantias, (Trochilus) Joli	IL 266
Thaumotte, (Nachtschm.) Phalæna rorella	V. 739
Thaunfisch, (Matrele) Scomber Thynnus	IV. 260
Theha Ohert - be, gruner Reuntober -	<b>E</b> . 72
Thelia, Elefantenfisch -	IV. 60
Thero, (Papilio) Schwanzbaner -	V. 623
Ebetis, (Pfeilschwang) Sphinx Thetis -	<b>6</b> , 303
Theylia, (Sphinx) Schwarzschnur	V. 642
Thiare, (fr.) Pabsterone — Ehiere, haben Empfindung und Bewustfeyn	VI. 432 L 1
Chiere' hunen crablemand and Semalelehn	Ebiere
	e Diete

	Eh. <b>S.</b>
Thiere, ihr Rugen	Ī. 21
ihre Ausbunftung	· I. 31
- ihre Empfindlichkeit -	I. 25
— ihre Gefährlichkeit —	L 20
— ihre Rahrung —	I. 34
ihre Reigbarkeit -	i. 25
menschenahnliche, Antropomorpha	I. 61. 6. 3
— mit Pferdegebif, Bellum	- I. 445
- nagende, Glires - 1	. 311. 6. 37
— ob sie schoner als die Menschen	- I. 6
ab fle vernünftige Seelen haben	· L z
ohne Schneidegahne, Bruta	L 158. S. 21
- ohne Seelen, tonnen nicht fepn -	VI2. 951
— faugende — —	· I. 50
- mibertauenbe, Pecora - 1	. 363. 6. 51
Thierpflanzen, Vermes: Zoophyta VI. 10.	23. VI2. 729
— — angewachsene, Zoophyta fixat	VI2. 728
Thierreich, ob darinnen ein faures Sals ftatt	habe I. 32
Thi-ki, (chin.) Fasan —	H. 472
Thistle-finch, (engl.) Distelfint	- II. 542
Thiaspus-Bloem, (boll.) Buschelpolppe	VI2. 869
Thoas, (Papilio) gelbes Fledenband	• \$. 284
Thomasparkit, (Papagen) Plittacus S. Tho	mæ 6. 81
Thomasschmetterling, (Pfeilschwang) S	
Pugione -	- V. 647
Thomastaucher, Colymbus S. Thomas	- 6. 107
Ebonbiene, Apis argillosa -	V2. 899
Thonfaden, (Rabenwurm) Gordius argillac	
Thonyn, (holl.) Thaunfisch -	IV. 260
Thoracici, Bruftbaucher -	IV. 109
Thorn - back, (engl.) Stachelruden	- III. 249
Thou. (fr.) Thaunfisch	IV. 260
Thouarou, (guajan ) Meetschwalbe	- II. 352
Thous, (Canis) Gurinamischer Fuchs	- I, 228
Thouvouyou, (quajan.) Amerikanischer Str	aug II. 452
Thrax, (Papilio) Hatenborn	V. 63 t
Thrips, Blasenfuß	V. 538
- falciata, bandirter Blasenfuß	V. 540
Hh	Thrips,

1	Eh. G.
Thrips junipera, Wachholberblase -	V. 539
- minutiflima, unfichtbarer Blafenfuß	V. 539
paradoxa, Baftardblafe -	V. 538
Thriffa, (Clupea) Borftenfloffe -	IV. 374
Throstle, (engl.) Drossel -	IL. 527
Thrush, (engl.) Krammetevogel -	II, 127
Thuis, Bürftenkoralline	V12. 838
Thuringer, (Scorpionfliege) Panorpa hyemalis	V2. 803
Thurmchen, geflugeltes, (Bogelfuß) -	VI. 476
Chilemoken (Thurmmalte) -	VI. 427
Thirmchen, umwundenes, (Walje) Voluta illari	s <b>5</b> . 374
Zpumpfaffe, (Ketubelilet) Poxis hallings	Tr. 146
Shurmfalte, Falco tinnunculus —	IL &
Thurmfaltenlaus, Pediculus tinnumuli	V2. 1032
Shurmmake, Voluta Virgo	VI. 427
Thurnus, (Papilio) Kaiserschmetterung	<b>6.</b> 284
Thym, (fr.) Acide -	IV. 326
Thymallus. (Salmo) 24 (dot —	IV. 326
Thynnus, (Scomber) Thaunfisch	IV. 260
Thyphæus, (Scarabæus) fleiner Stiet -	V. 55
Thyra, (Papilio) Gilberpurpur -	V. 624
Thysbe, (Papilio) Goldfleck -	V. 624
Tibleen, (Cicada) Pfr.fer	V. 459
Tiburo, (Squalus) Schauffelfisch —	III. 259
Ticks, (engl.) Waldmilben	V2. 1046
Tieger, (Raje) Fells Tigris	I. 235
Tieger, (Porzellane) Cyprea Tigris -	VL 3%
Tieger, (Ganblaufet) Cicindela Maura	V. 330
Lieger, (Sonnenkafer) Coccinella tigrina	V. 162
Lieget, (Lagichm.) Papilio Damone -	V. 591
Tieger, (Tute) Conus literatus	VL 366
Liegerbein, (Liegernadel)	VL 470
Tiegerdublet, (Benusmufchel) Venus maculata	VL 270 VL 470
Liegernadel, (Kinfhorn) Buccinum subulatum	
Liegerspinne, Aranea tigrina	S, 34 <sup>2</sup> VI. 24 <sup>0</sup>
Liegerzunge, (Tellmuschel) Tellina reticulata	IV. 38
Tjelobcha, (bebr.) Aal	II. 89
Tiercel, (fr.) Sperber	Tjerk,
•	1)64

Tjerk	Tipula	483
	1	Th. 🛎.
Tjerk, (holl.) rothe Pfulschnepfe	` •	II. 398
Tigris, (Cypres) Eteger	•	VI. 395
Tigris, (Felis) Tieger -	•	l, 235
Tija, (bras.) Meerotter -	•	I, 259
Tiklin, (ind.) gestreifte Ralle	•	II. 437
Tillkraka, (schwed.) Specht	-	II. 219
Tillsaame, (Schnirtelschnecke) Helix	fpirorbis	VI. 568
Timantes, (Papilio) Augenspiße		V. 627
Tinca, (Labrus) Meerschleibe	•	IV. 207
Tinca, Schleihe	٠ 🖚	IV. 383
Tineæ, Motten	, •	V. 735
Tinschemeth, (hebr.) Schwan	-	II. 276
Tintinabulum, (Lepas) Meertulpe		VI. 204
Tipha, (Papilio) Schwarzunmphe		V. 609
Tipula, Langfuß	V2- 929	. G. 334
annulata, Ringler	-	V2. 934
annulata, Weißringel	-	V2. 937
arundineti, Robemude	. •	V2. 936
— atrata, Schwarzpunkt	•	V2. 934
— — barbicornis, Bartborn	•	V2. 936
bimaculata, Braunfied	•	V2. 934
bipunctata, Doppelpunft	•	V2. 945
brevicornis, Kurzborn	•	V2. 940
contaminata, Comumude	•	V2. 933
cornicina, Arabenfutter	. •	V2. 933
erocata, Cafranmucke	•	V.2. 932
culiciformis, Schnakenfliege	-	V2. 943
- enlicornis, Degenborn	-	V2. 935
falciata, Bandmucke	•	V2. 934
— — febrilis, Krankenwärter	•	V2. 941
ferruginata, Mostforper	•	V2. 940
flavescens, Gelbtorper		V2. 935
flexilis, Schleuberfuß	-	V2. 938
- florilega, Blumenschanber	•	V2. 941
hirta, Staubflugel	•	V2. 942
hortorum, Gartenwühler	• '	V2. 932
- hortulana, Gartner	•	V2. 942
— — incarnata, Rothrucken	-	V2. 944
Hh 2		Tipula

TUT			
			Th. G.
Tipula	Johannis, S. Johanniefliege	•	V2. 940
	juniperina, Bachholderfliege	-	V2. 943
	littoralis, Stranbichmermer	•	V2. 937
<u></u>	longicornis, Langhorn	•	V2. 944
<u></u>	lunata, Mondzeichen	•	V2. 933
	macrocephala, Groffopf	•	V2. 939
	Marci, Muchenfliege	•	V2. 939
	minutissima, Flobfliege	•	V2. 945
	monitis, Schnurfliege	•	V2. 938
	monoptera, Einflügel	•	V2. 935
	nigra, Schwarzbuckel	•	V2. 933
<u> </u>	notata, Beiffect	•	V2. 943
	ocellaris, Schwarzauge	•	V2. 434
	oleracea, Pflanzenschander	•	V2. 932
·	palustris, Sumpfbrummer	•	√V2. 944
	pektinicornis, Kammhorn	-	V2. 930
	pennicornis, Doppelkamm	•	V2. 946
		•	V2. 943
	- C M h [ C.A.	•	V2. 936
	polygama, vielmanniger Lang	fuß	<b>€</b> . 334
	pratenfis, Gelbstirn		V2. 9}}
	pulicaris, Flohmuce	-	V2. 946
	pusilla, Zwerglein	•	V2. 939
	. putris, Moderfliege	•	V2. 941
	quadrimaculata, Victiled	•	V2. 931
	regelationis, Frühlingsmücke	•	V2. 935
-	. replicata, Krummhuyci	-	V2. 935
	rivola, Bachmuck	-	V2. 931
	. sericea, Atlasmucke	•	V2, 945
	. solstitialis, Zwergmücke	, <del></del>	<b>5.</b> 334
	- terrestris, Erdwühler	•	V2. 933
	· Thomæ, Gelblinie	•	V2. 940
	- tremula, Zitterfuß	-	V2. 9i8
-	- variegata, Buntrucken	•	V2. 932
·	- vibratoria, Schwingelfuß	•	₹V2. 938
	- virens, Braunschuh	.•	V2. 938
	- viridula, Wirbelhorn	•	V2. 939
Tipu	loides, (Asilus) Langfuß	•	V2. 1005
-			Tique,

•	Th. E.
Tique, (fr.) Diste -	V2. 1044
Dirann, (Bliegenfanger) Muscicapa Tyrannus	II. 597.
	<b>C.</b> 169
Tirann, (Natter) Coluber atrox	111, 188
Lischfied, (Rachtschm.) Phalæna trapezina	V. 683
Tisiphone, (Sphinx) Parallelschnur -	V. 642
Titanoceratophyta, hornforallen -	VI2. 748
Titelbarsch, Perca Diagramma -	IV. 241
Tithonus, (Papilio) deutscher Bauer -	<b>5</b> . 298
Titillator, (ichneumon) Kujler	V2. 852
	604.605
Titmoule, (engl.) Meife -	11. 625
Titt-Lark, (engl ) Biefenlerche -	II. 518
Tityus, (Scarabæus) Einhornzwerg -	V. 53
Tlaquatzien, (amerit ) Beutelrage 1. 288.	. 291. 292
Tlehua, (ind.) Kenerschlange -	III. 151
Toad, (engl.) gemeine Krote	III. 41
Toad, (engl.) Meerfrosch -	III. 280
Toadfish, (engl.) Carolinischer Rrotenfisch	I\'. 96
Tobacco-pipe, (engl.) Tabackspfeifenfisch	IV. 333
Tobackspfeife, (frangofische Spindel) -	VI. 511
Tobackspfeifenfisch, Pistularia tabaccaria	IV. 333
Lobiasfifch, (ber Europaische Wels) -	IV. 291
Tocht, glimmenber, (leuchtender Rafer) Lampyr	
rostrata -	V. 304
Ecco, (Coutan) Ramphastos Toco —	<b>E.</b> 82
Todeneule, (feurige Machteule) -	ll. 103
Todenfliege, Musca mortuorum -	V2. 967
Todenfreund, (Rleinkafer) Dermestes violaceus	V. 105
Todengraber, Sylpha - V. 12:	
— — Ameritanischer, Sylpha Americana	V. 126
— — Carolinischer, Sylpha Carolina	<b>6. 220</b>
— — Indianischer, Sylpha Indica	V. 126
Tobentopfchen, (Baftarb) Anomia craniolaris Tobentopf, (Rrebetrabbe) Cancer Caput mortuun	VI. 318
Todentopf, (Meertage) Simia morta	I. 137
Todentopf, (Pfeilschwang) Sphinx Atropos	V. 638
Todentopf, (Secapfel) Echinus lacunofus	V. 038 VI. 143
Hh 3	Toden.
	~~~~

Tor

	Eb. E.
Lobentrube, (Beinfisch) Ostracion Cubitus	III. 311
Todenube, (holzwurm) -	V2. 1022
Tobenvogel (Braunfeblden) -	<b>1L</b> 609
Todier, (fr.) Baftarbeisvogel -	II. 234
Todus, Baftarbeisvogel -	II. 274
- cinereus, aichgrauer Baftardelsvogel	II. 235
- viridis, gruner Baftarbeisvogel -	II. 234
Tolpel, (Giranstasuar) Didus ineptus -	II. 455
Topfer, (Baftardweise) Sphex Figulus	V2, 867
Tortlein, (Urche) Arca undata -	VI. 298
Toser, (Krosch) Rana bombina -	III. 61
Toffsmissa, (schweb) haubenmeist -	II. 626
Tojoan, (oftinb.) Schupptbier -	I. 137
Toit chinois, (fr ) Pagodenschnecke -	VI. 545
Tolchiquatli, Mexisanische Eule -	II. 107
Tollen, (boll.) Krausel	VI. 525
Tollmacher, Aranea Curacavensis —	<b>S.</b> 342
Tollwurm, Furia infernalis -	VI2. 915
Tomaote, (braf) Weißbelphin -	IV. 303
Tom-tit, (ind.) Baftarbeisvogel -	II. 234
Tong. (boll.) Zungenfisch	IV. 157
. Tonne à mammellons, (fr.) gefronte Bargenbad	e VI. 438
Tonno, (ital) Thaunfisch -	IV. 260
Tooten, (holl) Euten -	VI. 362
Toovenaar, (hou) Derenmeifter -	VI. 530
Toovenaar, (boll.) Raferschnecke	VI. 562
Tooverhoorntje, (boll) Zauberschnede	VI. 417
Toovervissch, (bost.) Zauberfisch	VI. 147
Toparagno, (ital ) Spigmans -	I. 303
Topau, Machornvogel	II. 162 III. 260
Tope, (engl.) Meersau -	
Topf, (Baise) Voluta Olla	VI. 440 I. 295
Topo, (span.) Maulmurf	II. 302
Toppertje, (boll) Daubenente	VL 573
Top - Slakken, (boll.) Wirbelschnirfel	IL 374
Toquil coyotl. (mer.) Kranch	I, 431
Tor, (chald.) Stier	IL 510
Tor, (hebr.) Eugeltaube	Tor.

Tor	Toupin	487
		₹6. <b>S</b> .
Tor, (boll.) Kafer	<b></b>	V. 49
Torcol, (fr.) Wendehals	-	II. 216
Toreollo, (ital.) Wendehals	<u> </u>	II. 216
Torda, (Alca) Alf	-	II. 30 <b>8</b>
Tordo, (ital.) Rranmetsvogel	-	II. 527
Toredo, Polibohrer	•	VI. 631
— — navalis, Schifsbohrwurm	-	VI. 631
Torgoch, (wallisch) Bergforelle	_	IV. 320
Torndyfwel, (schweb.) Stinktafe	<b>-</b>	V. 72
Toro, (fpan. und ital.) Stier	•	·I. 43E
Torpedo, (Raja) Krampffisch	***	III. 237
Torpedo, Bitteraal	• '	IV. 47
Torquato, (ital.) Krummichnabel	•	II. 394
Torquilla, (Wendehale)	<del>-</del>	II. 216
Torraca, (finnl) Oftindianer	<del></del>	V. 405
Torrentina, (ital.) Forelle	-	IV. 317
Torretje, (holl.) Kleinkafer	-	V. 99
Tortelduif, (holl.) Turteltanbe	• •	II. 510
Tortino, (ital.) Ortolan	***	II. 562
Tortino, (venet.) Florentinische Le Tortoile, (engl.) Schilbfrote Tortola, (fpan.) Turteltaube	rcht –	II. 520
Tortoile, (engl.) Schilbfrote	,	III. 16
Tortola, (fpan.) Turteltaube	<del>-</del>	ñ. 210
Tortora, (ital) Lurteltaube	~	II. 510
Tortrices, (Phalenæ) Blatwicker		V. 723
Tortrix, (Cyrculio) Blatroller	, 🕶	V. 234
Tortue, (fr.) Schildfrate	_	III. 15
Tortue, d'aigue, (fr.) Flusschild	frote	III. 33
Tortue franche, (fr.) Riefenschild	fròte	III. 19
Tortulosa, (Murex) Gurtelnabel	_	VI. 523
Totano, (venet.) Regenschnepfe	-	II. 399
Tottovilla, (ifal.) Baumlerche	-	II. 519
Eoutan, Ramphastos		153. 5. 82
- blauer, Ramphastos glaucu	\$	II. 84
Brafilianischer, Ramphastos	atacari	II. 156
- gelber, Ramphastos flavus	•	II. 84
- grimer, Ramphastos viridis	-	II. 154
Evulon, (Guctouct) Cuculus Toul	011	<b>5</b> , 90
Toupin, (fr.) Springkafer		V. 315
. H1	h '4	Tour

	Th.	<b>«</b>
	-	
Toursco, Suineischer Sucguct —		213
Tourdelle, (ft.) Bachholderdroffet -	11.	•
Touret, (fr.) Zirdroffel -		530
Tourniquet, (fr.) Drebtafer -		117
Tourterelle, (fr ) Eurteltaube -		510
Tourterelle mulette, (fr ) Lachtaube -	II.	512
Trazglooper, (bell.) Kaulthier -		1-9
Trabant, (Pfeilschwang) Sphinx satellitia		303
Trabantenvogel, (Rachtschm.) Phalæna satellitia		700
Trachinus, Petermannchen -	IV.	
Tragelaphus, Rennthier -	_	395
Trago-camelus, (Antilope) Rameelbod	E.	
Tragos, (griech.) Bock -	I.	404
Tragos ægrios, (griech.) Steinbock -		407
Tragulus Guineensis, Guineisches Reh -		378
Trana, (schwed.) Kranich	II.	372
Tranquebarin, (Benusmuschel) Venus prostrata	VI.	274
Transparant, (Bastard) Anomia Placenta	VI.	325
Transparant, (holl.) Transparant -	VI.	325
Trapezium, (Murex) Stumpfspindel -	VI.	
Trappe, Otis tarda -		441
Aethiopische, Otis Afra -		445
— - Arabische, Otis Arabs —		444
- fleine, Otis Tetrax -		444
Trappgans, Otis -	II.	441
Traquet, (fr.) Braunkehlchen -	· II.	
Trasle, (fr.) Zipdrossel		530
Traubenforalline, Sertularia Uva	VI2.	
Traubenlecker, (Pfeilschwang) Sphinx Celerio		639
Traubentrager, (Childflob) Monoculus quadri	•	
	V2.	
Trauerbod, (Bodfafer) Cerambyn triftis		267
Trauerbreme, Tabanus lugubris -	V2.	
Trauercule, (Nachtschm.) Phalma Strix		679
Trauergraber, (Tobengraber) Sylpha Germanica	V.	123
Trauerflett, (Springtafer) Elater triftis -		324
Trauermantel, (Tagschm.) Papilio Antiopa		609
	Ere	mth

Trauernatter	Trigonoides	489
		£6. €.
Ermernatter, Coluber pullat	us. –	III. 203
Erauerpage, (Tagschm.) Papi	lio Helenus	V. 567
Trauerpfeilschwang, Sphinx p	inastri -	V. 642
Trauerrock, (Sanblaufer) Cic		S. 245
Trauerrock, (Tagschni.) Papil		S. 288
Trauervogel, (Rernbeiffer) L		S. 152
Traut, (engl ) Forelle	<u> </u>	IV. 317
Tree - Creeper, (engl ) Baun	nläufer –	II. 253
Tree · Falcon, (engl.) Baum		11. 78
Treillis, (fr') Gitter -	•	VI. 616
Tremulus, Bitteraal	•	IV. 47
Treppe, (Rintborn) Buccinus	m spiratum	VI. 464
- geftreifte, (Mondichned		VI. 554
Ereffenbod, (Bodfafer) Cera	mbyx festivus	V. 256
Triangel, (Drepedmufchel) D	onax Scortum	VI. 249
Triangel, (Benuemufchel) Ve		S. 364
Triangular - Fish, (engl.) D		III. 306
Tribulus, (Cancer) Stachelt		V2. 1111
Tribulus, (Murex) Spinne		VI. 494
Tribulus, (Murex) Spinne Trichas, (Turdus) Mariland	otiche Droffel	II. 531
Trichecus, Ceefub	- I. 171	. S. 21
Manatus, Ceefuh		l. 174
- Rosmarus, Wallre	<b>9</b> -	l. 171
Trichiurus, Dunnschwanz	· -	IV. 52
— — lepturus, Spizsch	jwang -	IV. 52
Trichoides, (Tubularia) Afti	tocher -	VI <sub>2</sub> , 816
Trichterschwanm, Spongia in		VI2. 794
Trichterwurm, Sabella alveol		VI. 635
Trigla, (ital.) Meerbarbe	_	IV. 269
Trigla, Ceebahn	- IV. 272	. G. 205
Asiatica, Languase	•	IV. 277
— — Carolina, Carolinische	r Seehahn	€. 20 <b>5</b>
cataphraeta, Pangerba	ibn —	IV. 272
— — cornuta, Pangerhahn	•	IV. 273
— — evolans, fleiner Kliege	r —	IV. 278
— — minnta, fleiner Geekal	hn _	<b>6</b> . 205
— — volitans, fliegender Ki	(d) <b>–</b>	IV. 278
Trigonoides, (Cardium) De	repeckers -	<b>6</b> . 361
•	Hhe	Sriffer.

	Th. E.
Triller, (Fliege) Musca vibrans -	V2. 977
Trillraupe, (Raupe des Koniginnenpage)	V. 576
Trillroch, (holl.) Krampffisch, Ziverhal II	
Trinca, (Cyprinus) Schleibe	IV. 383
	404. 6. 113
- Alpina, Lapplandifcher Stranblaufer	
- arenaria, Sanblaufer -	IL 412
calidris, gruner Stranblaufer	II, 413
- fulciaria, grauer Riebig -	II. 409
- fusca, brauner Stranblaufer -	<b>6.</b> 114
fusca, Genegalischer Stranblaufer	II. 414
- gabetta, rother Reuter -	II. 407
- Helvetica, Schweizer -	IL 410
- Hudsonica, Subsonier -	<b>6.</b> 114
- hyperborea, Eistiebis	II. 409
- Islandica, Islander -	S. 113
- littorea, brauner Reuter -	IL 413
- lobata, Sturmfegler -	II. 408
- maculata, geflectter Riebis -	II. 408
- morinella, Schwarfcnabel -	II. 408
— — pugnax, Kampfhahn —	II. 404
- pusilla, Zwergreuter -	II. 414
- Senegalensis, Senegalier -	<b>©</b> . 113
fquattrola, Parber	II. 414
- ftriata, gestreifter Stranblaufer	- IL 407
- varia, Scheck -	IL 414
Tringa, (Voluta) Schnepfe -	VI. 426
Trinfer, (Rachtschm.) Phalena potatoria	V. 657
Triops, (Gryllus) Drenauge	V. 430
Tripudia serpentum, Brillenschlange -	IIL 184
Trissa, Alse	IV. 372
Trite, (Papilio) Querband -	V. 592
Triton, Steinschnede	VI. 102
— — littoreus, Strandschleicher -	VI. 102
Tritoneborner, (Steinschneden)	VI. 102
Tritons-Hoorn, (boll.) Tritonsichnecke	VI, 515
Eritonsschnede, (Stachelschnede) Murex Trit	onis VI. fif
Trochilus, Colibri — II.	262, S. 100
	Trochi-

	Trochilus	<b>Trochus</b>	491
1			Th. €.
Trochi	lus Capenlis, Caapfcher Colil	bri -	S. 100
<del></del>	colubris, Goldfeble	•	II. 268
	cristatus, Saubencolibri	•	II. 270
	Dominicus, Domingischer	Colibri	IL 267
<del>-</del>	elatus, Rothkappe	-	II. 270
	TOT IT AND TOTAL CONTRACTOR IN THE CONTRACTOR IN	, <b>-</b>	II. 265
		I <u>~</u>	II. 267
	jugularis, Blauhals		©. 100
-	1-2-1-1-1 01:144 ut	•	IL 266
		-	II. 266
	21.00.11.0	-	ll. 269
	manitarios and anti-		II. 270
	minimum Omaturation	-	II. 271
	mordaread oftenbladiania	•	II. 269
	niger, schwarzer Colibri	-	II. 259
		ri –	II. 263
	0 , 0 , "	-	IL 269
		\ <b>-</b>	II. 265
<del>_</del> -		_ =	II. 271
	luperciliolus, Cajennischer	: Collbri	II, 264
	lus, (Motacilla) Läufer		II. 620
	ıs, Kráusel — —	•	VI. 525
	constructed Control control	, <del></del>	VI. 531
	cruciatus, Kreuzfráusel	-	VI. 529
<del>_</del> —	divaricatus, Blutband	_ ,	VI. 531
	dolabratus, Schifsfahne	-	VI. 537
	hybridus, Labprinthichnede	•	VI. 529
	maculatus. Enotice Viramid	e -	VI. 527
	modulus, Knopf	- '	VI. 530
	muricatus, Dornfrausel	•	VI. 530
	Niloticus, glatte Piramide	•	VI. 526
	papuanus, (longævus) Pag	sobenschnecke	VI. 545
	perspectivus, Perspettivschi		VI, 528
	perverlus, verfehrte Rraufe		VI. 537
— , —			VI. 529
	punctatus, punttirte Rrause	inadel	VI. 538
	scaber, rauber Krausel	•	VI. 531
-	folaris, Sonnenhorn	•	VI. 532
. **	•		Trochus

		\$6. C.
Trochus striatellus, gestreifte	e Kraufelnabel	VI. 538
ftriatus, Streifbund		VL 535
- umbilicatus, Wirbel	schnecke -	VI. 532
varius, bandirter Kre	ausel -	VI. 531
vestiarius, Wulftnab	el -	VI. 533
Zizyphinus, Jubufer	ntráufel -	. VI. 535
Troglodytes, (Motacilia) 3		II. 619
Troglodytes, Rachtmensch	_	I. 109
Trogon, Baumhacker	•	II. 202
Curucui, Schwarzfe	ble -	II. 203
friatus, geftreifter &		- II. 202
- viridis, gruner Baun	nhacker .	. II. 203
Troile, (Colymbus) Taucher	rhuhn -	II. 339
Troilus, (Papilio) Rammerji		` V. 567
Troldgrabbe, (norm.) Teufe	elstrabbe -	V2. 1113
Trombetta, (ital.) Schneppe	nfisch -	. HI. 337
Trombotto, (ital.) Robrden	iniel -	11. 386
Trommelfdraube, (bunte Ed		VI. 556
Erommelfchraube, (Mondfchne		bra VI. 557
Trommel-Schroefen, (bell.)		
Trompet - Hoorn, (holl.) Et		VL 515
Trompetta di Awa, (amerif.	) Trompettenfiss	
Trompette, (fr.) Blindfisch	•	III. 34°
Trompette, (fr.) Farger	-	II. 440
Erompette, (gezactte Beige)	• •	VI. 514
Trompette, (Benusschaft)		VI. 627
Erompettenfifch, Fistularia Cl		IV. 334
Trompettenfisch, (Schneppenfi		Ш. 337
Trompettenfcneden, (Rinkbot		VI. 442
Trompettenschneden, (Steinfd		VI. 102
Eromrettenschwamm, Spongis		VI2. 797
Trompettenvogel, Genegalisch		II. 163
Trompetter, (Rranich) Ardea		<b>S</b> . 110
Tronfo, (ital.) Spanische La		II. 499
Tropfendattel, blaue, (Spizda	(Itel)	VL 421
Tropfpuntt, (Connentafer)	Coccinena anti	
punctata	-	V. 157
Tropifer, Phaëton		IL 325
		Tros-

•	<b>24. 6.</b>
Tubularia crystallina, Slodentocher	VI2. 820
- fiftuloli, Robrentocher -	VI2. 816
- fragilis, Kalchtocher -	VI2. 817
- gelatinola, Federbufchpolype	VI2. 820
indivili, Eplindertocher -	VI2. 814
_ papyracea, Papiertocher -	VI2. 821
- ramola, Aftfocher -	VI2. 816
splachnea, Paartocher _	VI2. 819
Tubuli marini, Meerzahnchen -	VL 618
- vermiculares, Robrenschnecken	VL 622
Luchmotte, (Rachtschm.) Phalæna vestianella	V. 739
Luchschwamm, Spongia Basta -	VI2. 793
Tuchtrauer, (Tobengraber) Sylpha obscura	V. 129
Tucurubi, (braf.) bae Lorbeerblat -	V. 428
Tui, (bras.) Parkit	II, 137
Tuimelaar, (holl.) Caumler	IL soe
Tunder, (Nachtschm.) Phalmna dealbata	V. 717
Turf, (Eibechse) Lacerta Turcica -	III. 92
Turt, (Golbbabnchen) Chrysomela facra	V. 179
Turt, (Nachtschm) Phalæna Turca -	V. 691
Tuitje, (boll.) Schnauzennadel -	VI. 521
Tulas, (griech.) Zipdroffel -	II. 130
Tulbaghia, (Papilio) Bunfauge -	V. 607
Tulband, (holl.) turfifcher Bund -	VI. 533
Tulipa, (Conus) Tulpe	VI. 383
Tulipa, (Murex) Agathirn -	VI. 517
Tulpe, (Eute) Conus Tulipa	VL 383
Tumbler, Turner, (engl.) Taumler -	11, 502
Lummler, (Delphin) Delphinus Delphis	I. 505
Tunga, (bras.) Sandfloh	V2. 1042
Tunga, (ichweb.) Bungenfifch -	IV. 157
Tungpleder, (dan) Zungenfisch -	IV. 157
Tunin, (fr.) Delphin	I. 504
Tunnyfish, (engl.) Thaunfisch -	IV. 260
Tun. (enal.) Widder	I, 421
Tupinamb. (bras.) Schlangentopf -	IL. 333
Turapin, (engl.) Cacolinische Schiotrote	. III. 44
Turbinellus, (Voluta) Morgenstern -	VI. 435
	Turbo

Turbo	Turbot	495
·		Lh. E.
Turbo, Mondschnede	<b>-</b>	VI. 539
— — acutangulus, Scharfrippe	• ′	VI. 556
ambiguus, Baftardwenbeltre	ppe	VI. 553
- annulatus, Ringelfcraube	`` <b>—</b>	VI. 558
arevrostomus, gerippter Gil	bermund	VI. 549
— — bidens, Zahnschraube	-	VI. 558
— — chrysostomus, Goldmund	-	VI. 544
corneus, Horntreppe	•	VI. 555
- crenatus, geferbte Wendeltre	ope	VI. 554
crenellus, Rerbenschnecke	. —	VI. 551
- distortus, gerippter Delphin	-	VI. 550
dupplicatus, Doppelrippe	-	VI. 556
— — exoletus, alte Schraube	-	VI. 557
- imbricatus, bunte Schraube	-	VI. 555
— — lacteus, Milchtreppe	<del>-</del>	VI. 554
— — littoreus, Strandschnecke		VI. 541
- margaritaceus, bunter Silbe	rmund	VI. 549
- marmoratus, Schlangenhaut	-	VI. 546
- muricatus, Reisbreymonbschn	ieæe	VI. 542
- muscorum, Moosschraube	-	VL 559
— Nautileus, Nautilusschraube		VI. 560
- obtusatus, stumpfe Mondschn	ette	VI. 540
— olearius, Riesenoht	-	VI. 548
— personatus, Larvenschnecke	_	VI. 543
— — perversus, Linfsschraube — — petholatus, Rassauer		VI. 558
- politus, Lecfteinchen	_	VI. 543 VI. 559
- reflexus, Hanglippe	_	VI. 555
- replicatus, glatte Schraube	_	VI. 556
- rugosus, Runzebund	_	VI. 546
fanguineus, rothe Erbse	•	VI. 549
Sarmaticus, Sarmatier	_	VI. 547
- fcalaris, achte Wendeltreppe	•	VI. 551
- friatulus, gestreifte Ereppe	-	VI. 554
— — thermalis, Baadschuecke	<b>—</b>	VI. 551
— — ungulinus, Ragelschraube	-	VI. 558
- variegatus, Aberschraube	•	VI. 558
Turbot, (engl. und fr.) Steinbutte	, •	IV. 160
,	,	Turca,

	· · · · · ·	₹b. €.
Turca	, (Phalæna) Türf -	V. 691
Turd		527. S. 139
	Americanus, Amerikaner -	<b>5</b> . 140
	30 00 4 1 10 4	- II. 538
		S. 140
		II, 534
		<b>S.</b> 139
	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>6.</b> 140
	- 0 M Cl A	IL 535
	m	11, 532
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>6</b> , 140
	castaneus, Kastanienvogel -	<b>E.</b> 143
	)	<b>6</b> . 144
		<b>E</b> . 140
	* Management and	<b>6.</b> 141
	coronatus, Kronendroffel -	<b>E.</b> 144
	f 4 MM 1	II. 538
	cvaneus, Blaufopf -	<b>E</b> . 145
	Dominicus, bunte Droffel -	<b>5.</b> 145
	Dominicus, Domingischer Krammetel	pogel IL 136
	Carre Marchallant	<b>6.</b> 143
<u></u>	ferragineus, roftfarbiger Krammeten	ogel C. 141
		<b>6</b> . 142
		<b>S</b> . 146
		<b>6.</b> 144
		/ II. 530
		S. 145
·	maculatus, Schwarzschnabel -	6. 141
		<b>5</b> . 139
		II. 531
	Moluccensis, Blanflugel	<b>S.</b> 144
	mulicus, Singbroffel -	II. 530
		IL 534
	olivaceus, Olivendroffel -	II, 531
	palmarum, Palmbroffel —	II. 535
<del></del>	Philippensis, Gruntopf -	S. 145
	pilaris, Wachholderdroffel -	II. 928
	plumbeus, blepfarbiger Rrammetsvog	pel II. 133
	· ·	Tordus

Turdus	Tutenbohrer	497
		Th. <b>E.</b>
Turdus polyglottus, ber Melet	bift 🕳 '	·H. 532
- pulcher, goldgruner Rr	anmetevogel	S. 139
— — Puniceus, Pompadur	_	II. 541
purpureus, Purpurvog	el . <b>–</b>	G. 143
- roleus, resenfarbiger Ri	rammetsvogel	II. 534
rufus, rother Krammete	vogel -	II. 532
faxatilis, Steinmerle	•	11. 524
Senegalus, Senegalische	r Rrammetsvogel	S. 142
Sinensis, Chinefischer &	rammetsvogel	H. 535
- 10marius, Empledler	<b>~</b>	<b>6</b> . 148
fordidus, Schmuzer	<b></b> .	<b>E</b> . 143
superbus, Angolische D	rerle —	<b>6.</b> 142
Surinamus, Surinamife	pe werte	II. 539
- torquatus, Ringdroffel		Ш. 537
— — triftis, dunkelfarbiger R. — viridis, grüner Rramme		G. 145
- viscivorus, Misteldroffe	1 १८७७ में देखें	S. 142
— Zevlonus, Reilonesische	m1.	II. 528
— Zeylonus, Zeilonesische Turdus, (Labrus) Meeramsel		II. 53.9
Turdus Mainatus, ber Plapper	• !	IV. 212
Turdus, Mecrofan		II. 193
Turssteen, (boll ) Torfftein		V. 200
Turky-Cock, (engl.) Eruthabn		12. 694 IL 461
Turnftone, (engl.) Dolmetfcher		IL 407
Turlio, Meerschwein	•	L 504
Turfie, (Phyleter) Maftfich	-	1. 503
Burteltaube, Columba Turtur	-	11, 510
Turteltaube, indianifche, (Beiffi	igel) –	11. 505
Turtle, (engl.) Ricfenfchildfrote		IL 19
Turtle-dove, (engl.) Eurteltan	be -	II, 510
Turtur, (Columba) Burteltaube		IL 510
Dute, Genuesifche, Conus Genus		VI. 372
Luten, Coni -		VL 362
— — banchige —	. 1	VI. 382
— — birnfórmige -	- 1	VI. 369
— - langliche ftumpfe -	- 1	VL 378
— — stumpfe —	- 1	/L 364
Tutenbobrer, (Bottcherbobrer)	· • • 1	VL 412
;	15	Tuten

		Th.	<b>K</b>
Guermannia (Reseastant) Vontinalla di	ioitalic	VI2.	
Sutenwirbel, (Seegallert) Vorticella di	RICATIZ		
Tuyeaux de mer, (fr.) Meersahnchen		VI.	
Tuyeauz d'orgue, Secorgel	-	V12.	
Tweekoppen, (holl.) Ringelschlangen	•	III.	
Tweestiert, (schweb.) Ohrwurm	-	V.	397
Tye guacu, (amerit.) Meisenzeisig		IL (	622
Tyeguacu parota, (braf.) Rernbeiffer	•	II.	548
Tyepiranga, (brat.) Merle	-	II.	573
Tyger-pen, (holl.) Liegernabel	•	VI.	
Tyger-toot, (boll.) Tieger	_	VI.	
Tygers-tong, (holl ) Liegerjunge	_	VI.	
Typhle, (Syngnathus) Blindfich	_	III.	
Typhics (Sylighathus) Shinhichleiche	_	III.	
Typhlos, (griech.) Blindschleiche	_	III.	
Typlus, (Coluber) Rleinauge		_	-
Typographus, (Dermestes) Buchorud	: <b>T</b>	V.	-
Tyrannus,' (Lanius) Burger	•	II.	
Tyrannus, (Muscicapa) Tirann	II. 597		
Tyria, (Coluber) Purpurnatter	•	Ħι	
Tzanahoci, Merifanische Elster	-	11.	179
Tzeiran, (turt.) Hirschoof	-		414
Tzephardeach, (hebr.) Frost	_	III.	
Tzinitzean, (mexit.) Baumhacker	-	-II.	203
Tzirgnah, (bebr.) Befpe	<del>-</del> '	V2.	878
Tzitzihoa, Mexifanische Ente	-	11.	
Tzopilotl, (mexit.) Menschenfreffer	•	II.	-
•			

## u.

Ubirre, Bitteraal -	IV. 47
Uca, (Cancer) Morastfrabbe -	V2. 1103
Uccello Pescatore, (ital.) Eisbogel -	II. 237
Ufergas, (Tagthierchen) Ephemera vulgata	V2. 778
Ufertafer, (Tobengraber) Sylpha littoralis	V. 127
Ufermilbe, Acarus littoralis	V2. 1056
Uferohrmurm, Forficula riparia -	<b>5.</b> 262
Uferrauber, (Raubtafer) Staphylinus riparius	V. 391
Uferschwalbe, Hirundo riparia -	II, 632
Uferspinne, Aranea riparia	V2. 1074 Uftt

Utersteiger	Ungeziefer	499
* •	*	Th. S.
Ufersteiger, (Sandlaufer) Cic	indela riparia	V. 330
Ufermange, Cimex littoralis	_	V- 481
Uhu, (Horneule)	<del></del> .	11 92
Uebereinstimmung der Thiere m	it ben Pflanzen	l. 28
Uil, (holl.) Eule		II. 93
Uilen, (holl ) Schmetterlinge	•	V. 555
Ulf, (schwed) Wolf		I. 219
Ulka, (ban.) Donnerfrote	-	IV. 137
Ulm, (Feuerfalamander)	-	III. 18
Ulmenkletterer, (Bange) Cimer	r Ulmi —	V. 503
Ulmenlaus, Aphis Ulmi	_	V. 512
Ulmenfauger, Chermes Ulmi	-	V. 522
Ulmenfchaumer, (Schlupfwefpe)		V2. 835
Ulmenschild, (Schildlaus) Coch		V. 532
Ulmenfteiger, (Cifabe) Cicada	Ulmi -	V. 467
Ulula, (Strix) Rauglein		II. 104
Ulysses, (Papilio) Blausonne	•	V. 571
Umber, (engl') Aesche	-	IV. 327
Umberfisch, Sciæn2 —	. •	IV. 217
Umbervogel, (Taglchm) Papili	o Jairus -	S. 289
Umbla, (Salmo) Rothling	-	IV. 322
minor, Bergforelle	-	IV. 321
Umble-chevaliere, (fr.) Sali	oolin —	IV. 321
Umbra, (Lacerta) Bolfenscha	tten —	III. 106
Umbra, (Sciæna) Geefrabe	•	IV. 219
Umbrino, (rom) Umberfisch	•	IV Arm
Unbestand, (Bastardrusseltafer)	Attelabus poly	•
morphus	_	G. 234
Unbestand, (Bockfafer) Ceram	byx variabilis	V. 278
Unbestand, (Fliege) Musca mus		V2. 961
Unbestand, (Infusionsthierchen)	Chaos Proteus	VI2. 920
Unbestand, (Rafer) Scarabæus	variabilis	V. 89
Unedo, (Cardium) rother Apfe		VI. 250
Ingar, (Ecorpion) Scorpio Ca	irpathicus	V2. 1091
Ungewittervogel, Procellaria p	elagica —	II. 215
Ungeziefer, Benennung folcher 3	injekten, welche po	r,
şüglich schäblich si	mb -	V. 1
Ingeziefer, (Klapperschlange) C		III. 141
1	i 2	1inalinate

,	
· ·	Th. G.
Unglucksvogel, (Reuntober) Lanius infaustus	IL 119
Ungluckvogel, (Pfeilschw.) Sphinx infausta	V. 647
Unguis, (Mytilus) Ragel -	VI. 232
Unguis odoratus, Krausschnecke -	VI. 498
Unguis, (Patella) Ragel -	VI, 612
Unicornu marinum, Narval -	L 477
Uniform, (Tagschm.) Papilio amilis —	V. 619
Unique, (fc.) linkische Reige -	VI. 514
Unique, (fr.) Birbelschnirkel -	VI. 573
Unruhen, (achte Pfeilschwänze mit raubem After)	V. 643
Unterarten des Haushundes -	<b>E.</b> 27
Unterarten des Wolfes	<b>5</b> . 25
Unterschied ber Werkzeuche ber Thiere -	i. 51
Unterschied des Geschlechtes der Insetten -	V. 10
Unterschied swischen der Seele und dem thierische	
Leben	i. 27
Unterfchied swischen Thieren und Pflangen -	I. 30
Upupa, Wiedehopf	II. 249
- epops, gemeiner Wiedehopf	II. 249
- paradifea, Paradiefischer Wiedebopf	II. 251
- promerops, Caapscher Biedehopf	II, 251
Urania, (Papilio) Chineser -	V. 584
Uranoscopus, Seedrache	IV. 70
Uranoscopus, Sternseber	IV. 73
Ccaber, Bargentopf	IV. 72
Urbicola plebeji, (Papiliones) Burgervogel	V. 630
Urceus, (Strombus) Höckercanari -	VI. 489
Urf, (Karpfe) Cyprinus Orfus -	IV. 393
Urgias, (norm.) Ringelgans -	II. 286
Uria, Papagentaucher, Gronlandische Taube II. Urinator, (Colymbus) Erstaucher	30% 338
Urogallus, Phierbabn	IL 342
Uromaftia, (griech.) Schleuderschwang	II. 479 III. 83
Ursus, Bar -	
- formicarius, Ameisenbar -	L 277 L 180
— luscus, Wolfsbar	1. 285
Urtica marina, Geenessel	VI. 87
	VI. 120
Anny Administra	Uruhu

Uruhu	Veau 501	E
Uruhu, (braf.) Menschenfresser Urutausana, (bras.) Rauber Ustilago, (Chaos) Brandforn Utias, Springer, (Maus) Uva, (Sertularia) Traubenforalli Uva, (Turbo) Bienenforbchen Uyen-Schil, (holl.) Iwiebelschaal	- VI. 554	5 3 2 3 5 1
33.		
Vaal-hert. (holl.) Dambirsch Vaar-aal, (holl.) Spigmaul Vaca, (span.) Ruh Vacca, (lat.) Ruh Vacca, (Scarabbus) Rühlein Vache, (fr.) Ruh Vache a Dieu, (fr.) Sonnentaseu Vache marine, (fr.) Wallros Vagina, (Solen) Rinnendublet Vagra, (peruv.) Elendthier Vairon, (fr.) Eründling Valvatæ, Schwimmschneckeu Vampyrus, (vespertilio) sliegent Vanellus, (Tringa) Riebig Vanneau, (fr.) Riebig Variole, (fr.) Riebig Variole, (fr.) Riebig Variolus, Korelle Varken, (holl.) Bertel Varkens-torretje, (holl.) Rüstell Varkens-torretje, (holl.) Rüstell Varkensige, (boll.) Schweinchen Base, (Walge) Voluta Capitellum —— gezactte, Voluta ceramica Vastrange, (fr.) Pfeilschwang, (R Baterland der Kische Vaudoise, (fr.) Weißsisch Vautour, (fr.) Geper Veau, (fr.) Rast	I. 172  VI. 225  I. 389  IV. 383  VI. 584  Der Dund  I. 152  II. 406  IV. 230  IV. 317  I. 461  VI. 434. 435  difer  VI. 421  VI. 436  VI. 437  VI. 436  VI. 437  IV. 390  II. 49  I. 431	

	T6. €	5.
Vecchio marino, (ital.) Ceefalb	- I. 19	4
Veen-mol, (holl.) Maulwurfgrille -	- V. 42	
Begation, was sie ist	VI2. 94	12
Begetiren, mas es beiffet -	VI2. 94	15
Vell Hoorn, (boll.) Hautschnede -	VI. 50	>3
Vellicula, Ohrwurm -	V. 39	
Velvet-runner, (engl.) große Bafferralle	II 43	)6
Venator, (Ichneumon) Jager -	V2. 8	52
Venilia, (Papilio) Ordeneband -	V. 6	12
Ventou, (ind.) Daubenspecht	- II. 22	21
Reuns, achte, (Renusmuschel) Venus Dion	c VI. 26	
- aeripote, (herinnifdel) Cardium cos	tatum VI. 24	45
- platte, (Benuemuschel) Venus comp	ressa S. 36	55
Venus, Benusmuschel - VI	. 263. <b>S</b> . 36	
- Borealis, Seennmphe	— VI. 27	76
- cancellata, Gittervenus -	VI. 26	7
casina, Krummrippe -	VI. 20	
caltrenlis, griechisches U	- VL 27	71
- compressa, platte Benus -	- 🥰 36	55
- decussata, Kreusschaale -	VI. 27	
- deflorata, Blutlipre -	VI. 2	
- dysera, Dunnrippe -	VI. 2	
edentula, Stumpffchloß -	- VI. 27	77
- eryvina, Quafer	VI. 26	
exoleta, Bettel	VI. 2	76
- fimbriata, Lippdublet	- VL 2	
flexuosa, Scherbe	VI. 20	
- gallina, Stralvenus -	VI. 20	
- incrustata, Rindenschaale -	- VI. 2	
- Islandica, Islandisches Dublet	• VI. <b>≤</b>	
læta, Blaulippe	VL 2	71
literata, achtes Strickbublet .	VI. 2	77
- maculata, Ticgerdublet -	VI. 2	
- marica, Baftarbvenus -	VI. 20	
- mercenaria, Geldmuschel	- VI. 20	
orbicularis, Pfersichblat	- VI. 2	
- Paphia, bas alte Beib	- VI. 20	
- pektinata, Benuskamm -	VI. 2	70
	Ven	US

Venus	Verdone	503
		Th. G.
Venus Pensylvanica, Penfilvar	ierin —	VI. 275
- petulca, Langafter	` -	VI. 268
- proftrata, Tranquebarin	•	VI. 274
punctata, Munktschaale	•	VI. 275
- reticulata, Baffeleifen - rotundata, Gabeljahn	-	VI. 273
rotundata, Gabelgabn	•	VI. 278
rugola, Runzelvenus		<b>S.</b> 363
feripta, Baftarbstrictbul	elet –	VI. 276
fquamola, Echuppenven	us –	VI. 273
succineta, Sobifeble		<b>©.</b> 364
tigerina, raube S. Dom	ingo i Muschel	VI. 274
tripla, Triangel	-	<b>©.</b> 364
tumidula, Kugelvemus	-	<b>6.</b> 364
- verrucofa, Bargenrippe - virginea, Jungfer	-	VI. 267
Vanue bare (1.22 200 ct	-	VI. 278
Venus - hart, (holl.) Menschenh	erj wester Combine	VI. 245
Benusherz, drenseitiges, (herzm hemicardium	injoyer) Cardini	m Tre com
	*********	VL 247
- fumpfes, Cardium re Benustamm, (Benusmufchel) V	iulum -	VI. 246
Venus-Kousjes, (holl.) Benus		VI. 276
Venus-labaar, (holl.) das Pfer	uinichein	VI. 263
Benusmuscheln, Veneres	:jiwotat 	VI. 275
	- VI. 20	3. 8. 363
bergformige, mit gi mit rauben 3mickel	iaiten zwiaten	VI. 267
ovale, mit glatten		VI. 264
runde, mit glatten		VI. 277
Venusschafft, (boll.) Benusscha	Sivilitiii ft	VI. 274 VI. 627
Benusschaft, (Rohrenschnecke) S	ernula nolythal	VI. 027
mia	er bare bord mer	VI. 627
Ver à soye, (fr.) Seibenwurm		V. 660
Ver de terre, (fr.) Erdwurm	_	VI. 38
Ver solitaire, (fr.) einmundiger	Bandmurm	Vl2. 902
Verdadeiro, (port.) Armadia	-	I. 192
Verdier, (fr.) Grunfint		II. 559
Verdier, (Loxia) Reichsvogel		G, 153
Verdone, (ital.) Grunfint	- II.	554- 563
Verdone, (ital.) Grunling		IV. 211
	Ii 4	Beri

	Th.	E.
Berdoppeler, (Rachtschm.) Phalæna Jungiella	V.	754
Veretellum, Bitterblase -	VI.	
Berführer, (Raupentober) Ichneumon perfis	<b>!-</b>	-
forius	V2.	
Vergonbolo, (beal.) Schuppthier -		157
Bergulder, (Nachtschm.) Phalena Frischella		752
Bergulder, (Raupentoder) Ichneumon Rutilator		
Berhaarer, (Geelunge) Laplysia depilans	VI.	
Verkeerd Pennetje, (boll.) vertebrte Rraufelnabel		
Berkehrischnabel, Rynchops -		355
fahler. Rynchops fulva -		356
— — — schwarzer, Rynchops nigra	II.	355
Ver-lion, (fr.) Wurmlowe		455
Berlobte, (Rachischm.) Phalæna pasta	_	657
Ver-luisant, (fr.) Johanniswurm -		298
Vermes, Würmer		. 27
- curcubitini, Bandwürmer -	VI2	
— - Lythophyta, Korallen -	Vl2.	
- Zoophyta, Thierpflanzen -	VI2	729
Vermiculi, Robrenschnecken -	VI.	622
Vermilen, (Mulca) Wurmlowe -		914
Vermissons de mer, (fr.) Robrenschneden	V۱,	622
Veron, (fr.) Elrize -		3.99
Verrat, (fr.) Eber -		461
Verres, Cher		461
Vers curcubitins, (fr.) Bandwürmer -	VI2.	
Berschwinder, (Pflanzenfloh) Podura pulilla	V2	
Vertaga, Laumler		. 542
Vertumnus, (Scarabæus) Frühlingefafer		217
Be: wandlung der Insesten		, 12
Berwirrer, (Kliege) Musca intricaria -		959
Bermufter, (holimurm) Termes fatale	V2.	1022
Berwunderungszeichen, (Rachtschm.) Phalæns exclamationis —	V.	. 695
Bermunberungszeichen, (Schilbkafer) Caffida et clamationis	ζ- V	. 141
Bergeichnus einiger illuminirter Siguren aus anbe	rn	
. Schriftstellern, zu den funt erft	cn	-4-
Rlassen des Thierreichs -	V 12.	, 901 elp4

<b>V</b> ef <b>þ</b> a	Vespertilio	505
• ,	_	Th. G.
Vespa, Bespe 🔻 💆 -	- V2. 8	13. E. 325
annularis, Ringelmefpe	• , - •	V2. 882
arvenlis, Actermespe	•	V2. 883
bidens, 3wenjahn	-	V2. 884
bifasciata, Doppelband	• 🕳	V2. 883
biglumis, Doppelfpize	•	V2. 884
Caffra, Cafferin	-	V2. 885
calida, Mobrin		V2. 887
· campeftris, Keldwespe	•	V2. 883
Canadensis, Canaderin	_	V2. 886
- Capensis, Sottentottin		V2. 886
Carolina, Carolinerin		V2. 879
coarstata, Schmalbauch	_	V2. 883
cornuta, Porntrager	-	V2. 885
emarginata, Randelin	-	V2. 886
- galbula, Glanzwefpe		S. 325
— — Gallica, Franzésin	_	V2. 881
- maculata, Fledwespe	•	V2. 880
minuta, Zwergin	<b>—</b> '	V2. 387
muraria, Maurer	-	V2. 882
- orientalis, Orientalische	Wespe -	<b>S</b> . 325
parietum, Wandwespe	```	V2. 881
quadridens, Biergahn	-	V2. 884
rufa, rothe Wefpe		V2. 831
lignata, Beichentragerin	-	V2. 386
Surinama, Surinamerin	-	. V2. 886
tricolor, drepfarbige We	spe -	<b>S.</b> 326
uniglumis, Childfpije	-	V2. 884
viatica, Wandermespe	-	$V_2$ . 868
vulgaris, gemeine Befpe	_	V2. 880
espertilies, (boll.) Flederman		VI. 434
l'espertilio, Pledermaus	- I, 1	50. <b>E</b> . 14
auritus, Langobe	•	I. 154
barbatus, Bartflede		<b>5</b> . 17
Borealis, Reujorter	<b>-</b>	<b>©</b> . 20
equinus, Hufelsenne	ije -	<b>9.</b> 20
hastatus, Kleeblatna	ije —	<b>5</b> . 14
me aution Chimun		<b>6</b> . 15
, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i 5	Velper-

•		Tb.	€.
Vespertilio leporinus, Paasenscharte	•	6.	
marsupialis, Beuteltrager	<b>-</b>		19
murinus, Maukobr	-	L	154
perspicillatus, Brillnase	_	L	154
piltus, Buntflugel	_	<b>ල</b> .	17
foricinus, Speernafe		€.	14
Vespertilio, (Lophius) Einhornteufel	-	III.	283
Vespertilio, (Voluta) Flebermaus	-	VI.	433
Vespillo, (Sylpha) Bisamtafer	_	v.	123
Vetula, (Baliftes) bas alte Beib	•	III.	
Vetula, (Cuculus) Langschnabel		II.	209
Vetula, das alte Beib, (Benusmufchel)	-	VI.	265
Bettel, (Benusmufchel) Venus exoleta	-	VI.	276
Veuve, (fr.) Paradiesammer	-	IL	568
Vibex, (Buccinum) glatter Bejoar		VI.	456
Vibex, (Caffida) Striemenschilb	•	$\nu$ .	138
Biceadmiral, (Eute) Conus Vicarius	_	VI.	371
Biebbremen, Tabani -	•	$V_2$ .	982
Vieille, (fr.) bas alte Beib. (Deerfchlei	be)	IV.	207
Vieille ridée, (fr ) bas alte Weib, (Benus	tmufche	D VI.	265
Bielauge, (Tagichm.) Papilio Hippotho	ë	$\nu$ .	629
Bieled, (Eibechse) Lacerta angulata	-	III.	94
Bielfras, (Amelfe) Formica omnivora	-	$V_2$ .	914
Bielfras, (Biefel) Mustela Gulo	-	I.	265
Bielfuffe, Juli -	-	$V_2$ .	1162
Bielfuß, (Pflangenfloh) Podura polypod	la	$V_2$ .	1018
Bielfuß, (Polype) —	•	VI2.	881
Nielfußschnecke, Strombus Millepeda	•	VI.	479
Bielhorn, (Rafer) Scarabæus polyceros			214
Bielpunkt, (Tagschm.) Papilio Cereus	•	V.	633
Bielftral, (Geeftern) Alteria multiradia	ta	VI.	143
Bieljahn, (Rachtschm) Phalæna polyod	on	$\nu$ .	698
Bierband, (Cifade) Cicada quadrifasciat	<b>:</b> 2	$\nu$ .	455
Bierband, (polibod) Leptura quadrifai			287
Bierborn, (Spinne) Aranea tetracanta		$V_2$ .	
Bierect, (Cifade) Cicada rhombea	-		452
Biered, (Nachtschm.) Phalæna Brunicht	ma		730
Biered, (Rachtschm.) Phalena quadra	-		686
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		S	Biar

	Vierect	, Wiolen!	bogel		507
				Th.	ੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑੑ
Vierect, (Pfe	illanu.) Sp	hinx Tetrio	-	(ex	201
Dicred, Geit	enfcwimme	r) Pleuroneste	s R hombu	S IV	150
Bierfeber, (9	Rachtschm.)	Phalæna tetra	dativia		757
Dierfled, (D	ungfafer) L	lister quadrin	naculatus	v	116
Literfled, (R	afer) Scara	bæus quadrim	naculatus		91
Dierflect, (La	nafuß) Tip	ula quadrima	rnlete		
Bierfled. (D	Paitafer) M	eloë quadrim	roulate	V2.	256
Bierfled. (@	dilbfåfer)	Cassida Petive	rione		
Picrfled.(Go	nnenfåfer) (	Coccinella qua	dring@ula	V.	143
Bierflect. (To	benaráber)	Sylpha quadri	innOntosa		
Rierfuß, (Ma	Ifchiance) A	nguis quadrup	.harrarara	777	125
Bierfuß, (Ma	chtichm.) Ph	ialæna tetrapo	ApHe C2	111.	209
Rierrunft. (9	Smeife) For	mica quatuori	one (yete	V.	744
Riernunft (2	Eliege) Mud	ca quadripun	Donctata		
Ricrossift 1@	Saunenfáf M	Coccinella qua	ciata	$V_{2}$ .	978
Biernunft (6	Sninnel Ar	anea quadripu	aripunctat	<b>2</b> V	149
Miserunte (S	'shanarákan	Sulpha and	nctata	V2. I	079
Wierundeman	iser (Sann	Sylpha quad	ripunctata	· <i>v</i> ·	128
2000 milliofite and	quatuorpu	enfafer)Coccin	iena nigm		
Miantahu (M			•		156
Wienschn (W	Rental Cim	quadridentata	. C.	V2.	
Wierialni, (2)	builde) Cittle	ex quadrilpin a quadridens	olus		487
Wierzahnstas	selbe) velb (Sannantás	a quadridens		V2.	884
Dierzegnfieu,	pustulata	.) Coccin. qua	tuordecim		
Mianzahmannfi	t (Sannenf	áf.) Coccin.	• •	ν.	16 <b>t</b> .
2000 gegitpunt	cimpuneta	to	dustnorde		
Mierrehntronf		ta ) Coccin. quat	 	$\nu$ .	154
Ziei Jeynicopi	guttata	Coccini. quat	uoraecim		0
Vignot, (fr.)		nhiduada	<del>.</del>		158
Vigilot, (11.) Vilain, (ft.)	Olettant	mojujueue	-	VI.	
Vildhaniekoa	william (put	\ (#1. 4.46;\b		IV.	385
Vimba, (Cyp	anyn, (bul.	.) Flackeseiden	itorauine i		
Vimba, (Sala			_	IV.	397
Vindila, (spai	n ) Sia Miss	the carre	-	IV.	327
Vinger - ville	hen Than \	ime, (ente)		II.	298
Vinger - visse Vink, (hou)	Cinf	Qingerhlab6		IV.	
Vinula, (ital.)	ZYIII V <b>Stocksio</b> e			II.	579
Riolennoel	Tarken V	e Papilio Aglaj <b>a</b>	•	V2.	996
~·vicinouger, (	(enalment)	r whiten water	•	V.	
				33(11	Met.

	Th.	€.
Bioletauge, (Rachtschm.) Phalæna oculata	V,	720
Bioletfiect, (Baumlaufer) Certhia notata	€.	99
Bioletflügel, (Bolbbahnd.) Chryfom. zquingetial	is V.	185
Biolethügel, (Pfeilschw.) Sphinx pellinicornis	V.	647
Bioletflugel, (Baffereulchen) Phryganea azurea	$V_2$ .	788
Biolethammel, Apis violacea -	$V_2$ .	902
Bioletlinie, (Rachtschm.) Phalena Brunichella		755
Bioletreiber, Ardea violacea -	II.	382
Bioletruden, (G. Job Bliege) Cantharis violace		313
Bioletruffel, (Ruffeltaf.) Curculio violaceus	ν.	233
Bioletspize, (Erbfafer) Carabus Germanus		362
Biolewogel, (Lagiom.) Papilio Herse -		29l
Viper, (engl.) Biper		. 154
Biper, (Europaische Ratter) -		. 161
Biper, (Ratter) Coluber Vipera -	, 111	
Vipera, (Coluber) Biper -		. 153
Vipere, (fr.) Biper		. 154
Bivernatter, Coluber Prester -		. 167
Virgadelle, (fr.) Goldstrich -		187
Virgo, (Ardea) Rumidische Jungfer -		• 371
Virgo, (Conus) Menonitentute -		. 368
Virgo, (Libellula) Flugunmphe -		773
Virgo, (Phalæna) Jungfer —		. 663
Virgo, (Voluta) Thurmwalle -		42,
Viri Petri piscis, Petermannchen -	•	- 75
Vis, Vissch, (boll.) Fisch	IV.	
Vison, braune Wiesel aus Canada -		. 26i
Viffch - huifje, (boll.) Fischweiberhaube -		. 603
Vitello, (ital.) Ralb		431
Vitellus, (Cyprea) Salgtornerporgellane		. 394 -ak
Vitellus, (Nerita) Eperdotter		. 589 . 699
- compreffus, gefchobener Eperdotter		, 587 600
Vitrée, (fr.) Weißschwanz		, 609
Vitulus, Kalb	VI.	43i
Vitulus, Wafferfaben, (Fabenwurm) -		. 30 . 77
Vive, (fr.) Stachelbrache Viverra, Krett – I. 24		
, as occur, Occur	3. E. E.	
— — fusca, Braunfrett — -		verra

V iverra	Hommond	504
		Th. S.
Viverra mapurita, Mapurit	-	S. 32
- narica, Rrettbar	•	I. 250
- naluta, Rasenfreit	•	I. 247
putoria, Stinfthier	- I. 25	1. S. 31
— — putoria, Stinkthier — — toffana, melittes Frett	-	<b>S</b> . 32
- Zibetha, Zibetthier	-	I. 253
Viverra, Wiesel -	•	I. 271
Vivius, Stachelbrache -	•	IV. 77
Vlaggetje, (boll.) Schifsfahne	•	VI. 537
Vleermuis, Vlerkmuis, (boll.) &	ledermaus I. 150	. VI. 434
Vleesch-hoorn, (hou.) Bleischsch	mecte -	VI. 481
Vleesch-hoorn, (holl) gezacte	Schweizerhose	VI. 485
Vleet, (holl.) Stachelroche	•	III. 240
Vierk-hoorn, (holl.) Lappenschi	necte -	VI. 482
lerk-wormen, (holl.) Klügelt	vårmer	VL 110
Vliegend Eenhoorn, (holl.) flie	gendes Einborn	V. 50
Vliegend Hert, (boll.) hirschich	roler -	V. 94
Vliegende Visschen, (boll.) flieg Vliesvleugeltjes, (boll.) Insel	iende Kilche	IV. 278
Vliesvieugelties, (holl) Infel	ften mit hautige	en
Klügeln -	•	V2. 808
Vlinder, (boll.) Schmetterling	- 11 - 666	V. 542
Vlinder-vissch, (boll.) Schmet		<i>IV</i> , 102
Vloo, (boll.) Floh	Internation	V2. 1040
Bogel, Aves. Sind die zwote R	lane ver Epiere	II. 27
Bogelchen, (Diesmuschel) Myti	lus mirungo	VI. 338
Voet-hoorn, (holl) Kußborn		VI. 502
Bogelbeerwirbel, Vorticella crat		VI2. 872
Bogeldarm, (Robrenschnecke) Se	rpuia giomerat	a <i>V I</i> , 026
Bogelfuß, (Flügelschnecke) Strom	ous res relecan	
Bogelfirschenlaus, Aphis Padi Bogelfirschennascher, (Schlupswe	 Mal Tanthada	V. 514
Padi -	ibe) renunced	V2. 828
Bogelforalline, Sertularia avicul	laria _	VI2. 857
Bogellaus, fliegende, Hippobolo	_	$V_2$ , 1010
Vogel-pootje, (boll.) Bogelful		VI. 476
Vogel-Struis, (holl.) Straugo	, <u> </u>	II. 447
Volador, (span.) fliegender Fisch	) -	IV. 278
Bollmond, (Rachtschm.) Phalæn	2 Lunus	V. 653
And the state of the state of the state of	L	Volue.

	<b>21.</b> €.
Bioletauge, (Rachtschm.) Phalena oculata	V. 720
Bioletfied, (Baumlaufer) Certhia notata	<b>6</b> . 99
Bioletflugel, (Golbhabnd.) Chryfom. zquingl	
Bioletiligel, (Pfeilschw.) Sphinx pettinicorn	is V. 67
Bioletflügel, (Baffereulchen) Phryganea azur	ea V2.78
Biolethummel, Apis violacea -	V2. 902
Bioletlinie, (Nachtschm.) Phalæna Bruniche	
Bioletreiber, Ardea violacea	11. 382
Bioletruden, (S. Job Bliege) Cantharis viol	
Bioletruffel, (Ruffeltaf.) Curculio violaceus	V. 2}}
Bioletfpige, (Erbtafer) Carabus Germanus	V. 362
Biolewogel, (Tagichm.) Papilio Herse -	<b>€</b> . 29 <sup>1</sup>
Viper, (engl.) Biper	ML 154
Biper, (Europaifche Ratter) -	III. 161
Biper, (Ratter) Coluber Vipera -	: <b>111.</b> 1/3
Vipera, (Coluber) Biper -	IIL 153
Vipere, (fr.) Biper	III. 154
Bivernatter, Coluber Prester -	III. 169
Virgadelle, (fr.) Golbstrich	1V. th
Virgo, (Ardea) Rumidifche Jungfer	11, 371
Virgo, (Conus) Menonitentute	VI. 368
Virgo, (Libellula) Flugunmphe	V2. 773
Virgo, (Phalæna) Jungfer	V. 663
Virgo, (Voluta) Thurmwalze	VI. 47
Viri Petri piscis, Petermannchen -	IV. 78
Vis, Vissch, (bott.) Filed	IV. 1
Vison, braune Biefel aus Canada -	1, 26
Vissch-huifje, (holl.) Fischweiberhaube - Vitello, (ital.) Kalb	VI. 603
Vitellus, (Cyprea) Salzfornerporzellane	- I. 431 VI. 394
Vitellus, (Nerita) Eper*	VI. 58
- co-reffus, r	VI. 581
Vitrée	11. 600
Vite	1. 40
Vit	VI 30
	4.5

Viverra	Rollmond	509
\$75		Th. C.
Viverra mapurita, Mapurit	-	<b>€</b> . 32
- narica, Rrettbar	•••	I. 250
- naluta, Rafenfrett	•	I. 247
putoria, Stinfthier	- 1, 25	ı. S. 31
toffana, melirtes Frett	-	<b>S</b> . 32
- Zibetha, Zibetthier	•	I. 253
Viverra, Wiesel	•	L 271
Vivius, Stachelbrache -		10. 77
Vlaggetje, (boll.) Schifsfahne	abanmana T	VI. 537
Vicermuis, Vierkmuis, (boll.)	mode – 150	
Vleesch-hoorn, (boll.) Beischsch Vleesch-hoorn, (boll.) gezacte	Admeirerhale	VI. 481 VI. 485
Vleet, (holl.) Stackelroche	Cadiacidechole	III. 240
Vierk-hoorn, (holl.) Lappenschi	iecte -	VI. 482
Vlerk-wormen, (holl.) Klugelr		VL 119
Vliegend Eenhoorn, (holl.) flie	gendes Einborn	V. 50
Vliegend Hert, (boll.) Dirfchich	róter -	V. 94
Vliegende Visschen, (boll.) flieg	ende Fische	
Vliegende Visschen, (boll.) flieg Vliesvleugeltjes, (boll.) Insel	ten mit bautige	n
Flügeln -	The state of the	V2. 808
Vlinder, (boll.) Schmetterling		V. 542
Vlinder-viffch, (boll.) Schmett		IV. 102
Vloo, (boll.) Floh	A THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY	1. 27
Bogel, Aves. Sind die gwote R	alle der Thiere	338
Bogelchen, (Diesmuschel) Mytil	us IIII ulluv	502
Voet - hoorn, (holl ) Fußborn Bogelbeerwirbel, Vorticella crat	V12.	372
Bogelbarm, (Robrenschnecke) Sei	egaria 6	26
Bogelfuß, (Flugelschnecke) Stromb		76
Bogelfirschenlaus, Aphis Padi	7	14
Bogelfirschennoften. (Schlupfwie)		
Segunda de la constante de la	525	
ria Pinario	100	
îpp <sup>a</sup>	10	•
Wayd /	1	
C Vin	1/2	• .
120	100	
The state of the s	4	
A CHIPPON THERE		8. 7
		hed by Google
	138	200816

			Th. €.
Va	lpc,	(ital) Fuchs -	I. 224
Vo	luta	, Walje - VL 315	· 6. 374
_		Aethiopica, gefronte Bargenbacke	VL 48
	_	arenata, Fliegendrecketute -	VL 377
			VI. 428
		cancellaria, Gittermalge -	VI. 426
_		ceranica, gejactte Bafe -	VI. 436
	_	coffea, Raffeebobne -	VI. 418
			VI. 426
_	-	filaris, ummundenes Thurmchen	S. 374
-		glabella, glatte Gurfe -	VI. 423
-	-	Hebræa, milde Ruste -	VI. 434
_	_	ispidula, Zickjackdattel -	VI, 421
		Lapponica, Lapplandische Lappenschnecke	VI. 437
		livida, Blenwalze -	VI. 417
		mendicaria, Bettler -	VI. 425
		mercatoria, brutenbes Taubchen	VL 424
		miliaria, hiefentorn -	VI. 422
<del></del> .	_	monilis, Armring —	VI. 422
_	_	musica, Rotenschnecke -	VI. 432
	_	pallida, Jungfer -	VI. 423
		paupereula, armes Weibchen -	VI. 425
		Persicula, Persianer -	VI. 422
_		pertusa, Monchekappe -	VL 430
4		plicaria, knotige Bandnadel -	VI. 430
		porphyria, türkisches lager -	VI. 418
			VI. 424
	<del></del>	ruffina, gerippte Rabelmalge -	VI. 427
	-	rustica, Olivenfern	VL 425
	_	fan guiluga, Staatenfahnennabel	VI. 428
		Tcabricula, ranhe Madelmalze -	VI, 427
	_		VI. 417
	_	tornatilis, Drechselwalze -	VL 417
	_		VI. 429
Vo	lutæ	, Tuten	VI. 362
Vo	lva,	(Bulla) Weberspul -	VI. 405
Vo	kovl	, Rugelthierchen -	VI2. 910
-	-	bicaudata, Achtec -	VI2. 911
			Volvox

	Eh. G.
Volvox dimidiata, Salbfugel -	VI2. 914
Vomer, (Zeus) Pflugschaar -	IV. 142
von Lotens Bogel, (Baumlaufer) Gerthia Loten	ia II. 261
Voorn, (holl.) Rothflosser, Rothaugtonig	IV. 392
Vorschen-poppen, (holl.) Froschschneden	VI. 501
Borforge der Thiere auf den Winter —	1. 17
Vortex, (Helix) Schlangenschnittel -	VI. 566
Vorticella, Seegallert -	VI2. 865
— — anastatica, Buschpolype -	VI <sub>2</sub> . 868
berberina, Reiselbeerwirbel	VI2. 875
Bolteni, Boltenische Seegallert	S. 383
conglomerata, Pinselgallert -	VI2. 870
convallaria, Glockenwirbel -	VI2. 877
- crategaria, Bogelbecrwirhel -	VI2. 872
digitalis, Eutenwirbel .	VI2. 876
opercularis, Deckelwirbel -	VI2. 873
- ovifera, Enerwirbel -	VI2. 879
- Polypina, Seepolyre -	VI2. 867
- pyraria, Birngallert -	VI2. 871
- ftellata, Sternmirbel -	VI2. 878
- umbellata, Sonnenschirmwirbel	VI2. 874
- urceolaris, Krugwirbel -	VI2. 877
Vos, (holl.) Kuchs -	l. 224
Vrillette des tables, (fr.) Hauskaferchen	V. 105
Vrillette Sovoyarde, (fr.) holibobrer -	V. 112
Vulcath, (fr.) Scheckflugel -	V. 611
Vulpanser, Brandgans -	II. 279
Vulpecula, (Voluta) Fuchsthurm -	VI. 429
Vulpes, (Canis) Fuchs -	I. 224
Vulpes, (Elox) Fuchshecht	IV. 338
Valtur, Gener -	II. 48
— — albiulla, Fischgener —	II. 6t
- barbatus, Bartgeper -	II. 57
- percnopterus, Egiptischer Erdgeper.	11, 59
Vulture, (engl.) Gener	II. 49
Vydra, (poln.) Iliis	I. 269

28.	~4.	<b>.</b>
Bagfisch, (Sammerfisch) -	UL.	258
Waayer fpens, (holl.) Fecherschwamm	VI2.	794
Wachholderblafe, (Blasenfuß) Thrips junipera	V.	539
Wachholderdroffel, Turdus pilaris -		528
Wachholderfliege, (Langfuß) Tipula juniperina	V2.	
Bachholderfresser, (Schlupfwespe) Tenthredo		
juniperi –	V2.	
Bachholdermotte, (Rachtschm.) Phalæna juniperel		
Bachholderstecher, (Raupentober) Ichn. juniperi		
Machholdervogel, (Rachtschm.) Phalæna juniperat		
Bachholderwanze, Cimex juniperinus -	V.	
	VI2.	
Wachelicht, (Menonitentute) -	VL	
Wachethum der Kische	IV.	15
Wachsthum der Frucht im Mutterleibe -	L	83
Wachtel, Chinesische, Tetrao Chinensis -		491
fliegende,(fliegenderFifch)Exocoetus evola		
- gemeine, Tetrao Coturnix II. 492		
Merifanische, Tetrao cristatus -		491
Wachteltonig, (Ralle) Rallus Crex -	ľ'.	
Bachthalter, (Eibechse) Lacerta Monitor	III.	
Babenftecher, (Stechfliege) Conops calcitrans	<b>V</b> 2.	
Bachter, (Reuntober) Lanius Tyrannus		114
Wachter, (Raupentober) Ichneumon Incubitor	V2.	Kto
Balger, (Rugelthierchen) Volvox Globator	VR.	
Balger, (Raupentober) Ichneumon volutatorius	V2.	
Wanglein, (Waffermange) Notonecta minutifima		
Baffeleisen, (Benusmuschel) Venus reticulata	VŁ.	273
Waffelyzer, (holl ) Baffeleisen -	VI.	273
Waffentrager, (Nachtschm) Phalmna Bucephala	V.	659
Wagell, (engl.) bunte Deme -		348
Wagglus, (schwed.) Wange -	V.	477
Baghale, (Fliese) Musca arrogans -	V2.	97
Wagtail, Water - wagtail, (engl.) meife Bachftels	t II.	60
Wahrsager, (Raupentober) Ichneuman Ariolator		
Waifentind, (Rachtschm.) Phalmna materna		686
Waizenforn, (Rafer) Scarabæus granarius	V.	64

<b>Waideune</b>	Wall-Lowie	51
	•	₹6. €
Walbeule, (Rachtschm.) Phal		V. 680
Maldfint,, Fringilla petronia		II. 591
Baldfliege, Musca nemorum	-	V2. 958
Baldgartner, (Kleinkafer) De	ermestes piniperda	V. 104
Waldgott, (Bavian) Simia no		I. 121
Waldgott, (Meerkage) Simia		I. 126
Baldhahnchen, Chrysomela n	iemorum -	V. 183
Waldhorn, (Schnickelschnecke)	Helix cornea	VI. 567
Waldhummel, Apis sylvarum	<u>~</u> • .	Ve. 906
Maldiager, (Sandlaufer) Cie	cindela fylvatica	V. 329
Baldjager, (Bange) Cimex :	nemorum -	V. 499
Balomans, Mus sylvaticus		I. 352
Waldmensch, Homo sylvestris	-	I. 112
Waldmilbe, Acarus American		72. 1046
Balbmotte, (Machtschm.) Pha	ilæna nemorella	V. 739
Walonymphe, (Meertage) Sim	ia Hamadryes	I. 124
Balbraje, (Philander) Didely		L 292
Waldrebenkafer, (Mankafer)	Meloë Clematides	S. 257
Waldsánger, (Bachstelze) Mo		IL 606
Waldschlange, (Natter) Colub		S 191
Waldschupfer/(Schlupfwespe)	Tenthredo sylvatica	V2. 833
Waldschnecke, (Erdschnecke obn		
Balbichnede, (Schnirfelichned	e) Helix lucorum	VI. 577
Baldschnepfe, Scolopax Rusti	cola -	IL 396
Balbspinne, Aranea trilineate		72. 1074
Waldstreifer, (Wange) Cimex	(ylvekris	V. 504
Baldteufel, (Affe) Simiz Sylv	anus -	J. 120
Walfisch, Balæna	-	L 480
—  — Grönlandischer, Balær		L 481
Walfischassel, (Kellerwurm) ():	nifcus Ceti V	2.1150
Walfischfang, Beschreibung bef	Telben -	ļ. 482
Walfischlaus, (Krebespinne) Ph	alang. Balænarum	V2. 1063
Walfischlaus, (Punktirschild)		VL 199
Walfischpocke,(Weereichel) Lep	as Diadema VI. 204	. B. 357
Walfer, (Nachtschm.) Phalæn	a fullonica	V. 655
Balterroche, Raja fullonica	-	IIL 245
Wall-Creeper, (engl.) Baun	ıláufer ` 🕳	11, 254
Ballersische, Amiss	-	IY. 286
Wall-Lowfe, (engl.) Wanje		V. 477
the state of the s	Kk	Wel-

) <b>- T</b>	M write b	Consideration of	and all an	_	
			•	Σį.	€.
Wallop	(Official) Kri	numbanapet	-	n.	394
<b>B</b> allrat	b, Sperma Ceti		•		499
Ballrof	Trichecus Ros	marus		1,	171
Wallub	ora, (ceplon.) Ko	Condica	-		595
Walten,	(Tuten)	_	X71	VI.	
	Volutæ	•	VI. 415	VI.	374
	bauchige	ana Minhun	į.	VI.	
	mit uneingeschnitt	CHEL MANNAM	•	VI.	410
	rollrunde			VI.	
	schief enrunde				•
	fpinbelrunbe	Lian		VI.	•
Wampo	fe, (ind.) Elendt	MCE 	•		389
Wanber	broffel, Turdus	nigratorius Carilles mim		14. 37	531
Wander	er, (Grasbupfer)	Grynus migr	aterios	. V.	440
Banber	er, Surinamischer	, (Sandlanier	Cicinge	<b>3</b>	
	æquino&i	Mz	<b>-</b>		329
<b>Banber</b>	falte, (Pilgrimfal	T()	•		76
Bander	tanbe, Columba wespe, Vespa via	magratoria			\$13
Wander	mespe, Vespa via	tice	-	V2.	
Manha	icae. Muica Dario	etina		V2.	-
Wand st	mid, (Politunem)	) Termes tatt	aicum	V2.	
Wandw	efpe, Vespa parie	tum	-	V2.	-
Wanne	nvaher, (engl.) 9	Churmfalte	<del>-</del>		<b>3</b> 0
Banner	weber, (Thurmfe	alfe)	-	II.	80
Wants,	(boll) Wange	,	<b>-</b>		477
Wangen	, Cimices	•	V. 479		
		. —			504
	dornige				484
	dunne Parallelme	injen : Oomini	•		505
<del></del>	gelbfüchtige, Cim	nces icterici	•		484
	langliche	, <b>-</b>	•		496
	langbornige	m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	_		502
<b></b>	mit burftenartige	n Kudidornern	<b>-</b>	V.	493
	mit leberartigen I	Dece and the second			481
	mit Schilben fo le	rig als oet Hi	HILLIAN.		478
	ovalrunde, obne	<b>DOCUMENT</b>	<b>-</b> ,		487 482
	platte, bautige	a Panisi		77	.06
	turfische, Cimice	s runci s runci	e cimición	rea	400 222
Monten	turfisce, Cimice frauttafer, Sonne	ilit. Voccitien	u simenin	200	njen

<b>M</b> ankenjayi	necte ·	Ruggerd	octen		51
				Eb.	5
Wangenschnede, (Mond	chnecke)	Turbo Ci	imex	VI.	542
Wangenscorpion, Nepa			•	V.	471
Wardiertjes, (boll.) 3				Viz	917
Wardioe, Guineucher!		b	-		595
Warffe, (engl.) Deerfe	Hene	•		117	
Barjenbade, gefronte, (	Walse) \	oluta Aet	hiopica	VI	420
Wargenbuckel, (Seefch	necte ob	ne Haus)	Doris	· • <del>,</del>	730
verrucal	ì			£77	69
Warzenbotter, (Schwifit	dnede) l	Nerita Ma	mmilla	VI	40=
Wargenflunder, (Seiter	ischwimm	ter) Pleur	conette	· · ·	10%
papillofi	<b>I</b> C .			24.	161
Barjenfreffer, (Grashu	ofer) Gry	Ilus verru	civorus	V.	422
Margentopf, (Sternsche	r) Uran	olcopus lc	aber	TV	-52
Bargentoralle, (Sternfo	ralle) M	ladrepora	Verru-	- • •	72
caria	-		- 1	VI2.	67.
Barjentoralle, Bellenton	raffe)Cel	lepora ver	rucofa	Vła.	74
Mattenmant (Minact	) FHITUQ	OCTOCHIA	2	<b>778</b>	
Wargennerite, (Schwim	mfønede	) Nerita e	xuvia	Vi	500
Bargenrippe, (Benuemi	ifcheD V	enus verr	ncofa	VI.	777
Bargenscheide, (Ceefche	ide) Asc	idia papil	lofa	vi.	83
Warjenschnede, (Erbfc	necke ob	ne Daus)	Limax		05
papillofu		_		VI.	δş
Bargenschnirfel, (Schn	irfelfchne	rde) Heli:	K mam-	•	~1
millaris		-		VI.	572
Bargenfchwang, (Dornft	(d) Balin	les verru	eofus	111.	200
Wargenftern, (Ceeftern				VI.	136
Bargenftinter, (Ctinffa	fer) Bup	restis var	iolaric		248
Bargenfirn, (Grasbup					420
Wargentrager, (Ruffelt.)					240
Bafcbecten, (Gienmufe				VI.	284
Walp, (engl.) Befpe	· -	•	•	V2.	878
Bafferaalden (Geetau)	endbein)	Nereis la	cultris	VI.	78
Bafferamfel, (Bafferfte		•	,		525
Bafferaffet, (Reflermurn	n) Onika	us aquatic	us l	72. 1	
Bafferbeiffer, (Bertebei			-		355
Baffetblafe, (Blafe) Bu			<b>-</b> ' '	Vi.	408
Wassetblase, (Polype) 1			•	VI2.	891
Wafferdocken, Jungfer	n)	•		V2	
	· K	k a		Me	fore

	EÞ. 6.
Baffereulchen, Phryganese —	V2. 783
mit unbewaffnetem Schwanze	V2. 785
mit zwo abgestuzten Borften	am
Sawanie -	V2. 74
Wafferfaben, (Fabenwurm) Gordius aquaticu	s \ L 30
Masserstiege, Musca Hydroleon -	V2. 951
Massersob, (Schildsob) Monoculus Pulex	V2. 1142
Wasserfrosch, größter Amerikanischer, (Ohrang	3e) III. 63
Bafferfrosch, gruner, Rana esculonta -	IIL 68
Wassergriffel, (Nabelscorpion) -	V- 474
Mafferbubn, Fulica -	II. 426
— — braunes, Fulica fusca	IL 426
Carthagenisches, Fulica Carthage	na IL 429
ruffarbiges, Fulica atra -	IL, 427
fcmarjes, Fulica aterrima _	- II. 427
Bafferbuhnlaus, Pediculus Fulicæ	V2. 1035
Bafferbuhnchen, (Schnepfe) Scolopax Gallie	rula 11. 398
Wafferhund mit fraugen Daaren -	6. 27
Bafferburen, (Jungfern) -	V2. 763
Bafferjungfern -	- V2. 763
Baffertafer, Dytisci	V. 343
mit blatterigen Fühlbornern	V. 344
mit Burftenfühlhornern -	V. 347
Baffertalb, (Bafferfaben)	VI. 30
Bafferlaufer, (Fliege) Musca petronella	V2, 974
Mafferlaus, (Schildflob) Monoculus Pedicul	μο V2, 1143 Γ 202
Wassermans, (Spigmans) Sorex aquaticus	I. 302
Baffermerlen, (Eisvogel)	II. 236
Baffermilbe, rothe, Acarus aquaticus	V2. 1053
Baffermude, (Bange) Cimex lacustris	V. <b>5</b> 05 III. 195
Baffernatter, Coluber Situla	V2. 763
Baffernymphen, (Jungfern)	Il. 386
Wasseroche, (Robrdommel) Wasserpatscher, (Tobengraber) Sylyha aquat	ica V. 131
Wafferpflanjen find in Anfehung des Wachst	humel
von den Erdflanzen unterschieder	VII. 95
Bafferrabe, (Sornvogel) Buceros Hydrocors	X IL 16
Wasserabe, (Kormoran)	II. 32
Bafferrabe, (Peletan) Pelecanus graculus	IL 310
YORIIstanoti (4 secondo Paracres	Baffer

<b>R</b> Bafferralle	Water-Sp	rceuw	5	17
			Σb.	€.
Bafferralle, große, Ralius	aquaticus	•	II.	436
fieine, Rallus F	orzana	•	Н.	437
Wafferraupeneule, (Baffe	reulchen)	Phrygane	2	
grandis	· •	_	V2:	
Befferrage, Mus amphibiu	S	-		346
Wasserrosenland, Aphis Ny	mph <b>æ</b>	<del>-</del>	<b>V</b> . 4	
Wassersäbler, Rercurvirost		-	11.	<b>423</b>
Wafferfalamander, (Cidechfe		aquatica -	III.	114
Wasserscheerer, (Berkehrtsch	ndbel)	- `	11.	35 <b>5</b>
Wasserschlange, (Gerpent.)			III.	
Wasserschmetterling, (Rachti			V.	72 i
Wasserschmetterling, (Wass		Phrygane		
Phalænoides Phalænoides			V2.	
Wafferfcnede, (Schnirtelfc		e stagnalis	VI.	<b>280</b>
Wasserschnepfe, (Heerschnep		-	H.	
Wasserschwalde, (Uferschwa		•	II.	
Wasserschwimmer, (Polsbock			<b>V</b> .	
Wafferschwimmer, (Sandlan	fer) Cicinde	la aquatic		
Wasserscorpionen, Nepæ		-	<b>V.</b>	
Wasserspinne, Aranca aqual		·- '	<b>V2.</b> 10	
Wasserspinnen, fliegende, (B		•	V2.	
Wasserspinnen, (rothe Wasse		<b>→</b> '' '	V2. 1	053
Wasserspilmäns, Sorox aqu		-	€.	
Wasserstaar, Sturnus eineli	13	-	II.	5 <b>25</b>
Wafferstelze, (Bachstelze) M	lotacilla tip	h <b>ia</b>	II.	
Bafferftelje, (weife Bachfte	લું છ	-	_II. (	
Wassertretter, (Pflanzenflob)			V2. 1	
Wassertrichter, (Polype) H		rea	VI2.	892
Wassertropfen. (Ligerporsel			VI.	3 <b>95</b>
Wasserwachtelkönig, (Pfeilfe	pront)	<b>-</b>	11,	307
Wasserwanzen, Notonectes		V. 469	. 😇	275
Basserwelle, (Epringkafer)	Liater raid	TRIUS	V.	324
Wasserwoge, (Rachtschm.) l	naiæna nuo	TURTA		718
Bafferwolke, (Gpringkaf.)			V.	324
Water-Cracke, Water-Ou				525
Water - Est, (engl.) Sump			III.	
Water - Padde, (boll) Su		krute	III.	49
Water - Rall, (boll.) Baffe			11.	436
Water-Spreeuw, (hou.)	Mallerhaar	.—	II.	52 <b>f</b>

As a keep of the same of the s	
Strates Trans. Man & Marketten	Er G
Water-Toren, (boll.) Wassertäser –	V. 343
Water-Uilties, (boll.) Wassereulchen	V2. 782
Water-Wagtail, grey, (engl.) grane Bachfelse	<b>6.</b> 177
.Water, Zoodie, (boll.) Barfcbinge mit Beterfili in bloffem Waffer gefocht	IV. 224
Watsby Piket, (engl.) Pifengdroffel -	IL 189
Wattadragaren, (schweb.) Reopfgans -	II. 324
Waxbill, (41961.) Genegalischer Rernbeisser	IL 552
Waygehoe, (guin) Rotondieb	11. 595
Weazel, Weezel, (engl.) Dermelin -	I. 274
Weazel - Coat, Weezel Kost, (engl.) Lauchen	te 11. 201
Beber, (Bodfafer) Cerambyn Textor -	V. 267
Beberinecht, (Krebsspinne) Phalangium Opilio	V2. 1060
Beberfruf, (Blafe), Bulla volve -	VI. 405
Bechfelpunft, (Rachtschm.) Phalma Zoegana	V. 724
Webelfühlhorn, (Raubfafer) Staphylinus rufus	V. 390
Bebelfchwamm, Spongia ventilabra	VI2. 792
Bebler, (Springfefer) Elater fabellicornis	V. 316
Weeghuis, (holl.) Warzenschnede	VI 542
Weeuwtie, (holl.) Paradicsammer -	IL 568
Weever, (engl.) Petermannchen -	IV. 76
Weever-spoel, (holl) Puberfoul -	VI. 405
Wegdernnuniphe, (Tagschm.) Papilio Dejanica	V. 606
Wegefters, (weiffe Bachftelse)	IL 607
Wegftectlein, (Blantebichen)	II. 616
Begtenttafer, (Ruffeltafer) Curculio polygoni	
Beib, altes, (hornfish) Balistes Votula -	III. 300
Beib, akes, (Bandmuschel) Venus Paphia	VI. 265
Weibchen, armee, (Balge) bolute paupercula	Vt. 425
Beiben, (Merle) Tanagna foomina -	S. 160
Beichauch, (Stachelbersch) Gasterakeus ovate	
Beichsoffe, (Bels) Silvers incress -	IV. 296
Beichstill, (Bohrfafer). Ptimus mollis	V. 112
Beidenbinder, (Goldbahnah.) Chrysomela viminal Weidenbohren, (Ruffeltafer) Cuvenlie cyangus	W. 174
Weldenfresser, (Schuffwesser) Cuseum Cyangus Beidenfresser, (Schuffwesser) Tanthredo Salicia	V. 215
Weibenguckerlein, (Blaufnichen)	IL 616
Beibenhahnden, Chrysomele pallida -	V. 172
Beidenlaus, Aphis Solicis	V. 518
EDLINGHER TO SERVICE	Weiden

Acadenmilbe Accipourses		519
	Eb.	€.
Beidenmilbe, Acarus Salicis -	V2. 1	
Weibenmotte, (Nachtschm.) Phalæna salicella	V.	740
Beidennager, (Schlupfweipe) Tenthredo Capres	t V2.	836
Beibenfauger, Chermes Salicis -	V.	525
Beibenschild, (Schildlaus) Coccus Salicis	· <b>v.</b>	533
Beidenschlupfer, (Schlupfmespe) Tenthredo Am	•	
rinæ —	V2.	
Weidentanzer, (Ruffelkafer) Curculio Salicis		227
Weibenwidler, (Nachtschm.) Phalmna clorana		724
Weihe, (Falfe) Falco Milvus	IL,	
Beiberschwamm, Spongia lacustris -	VI2.	805
Weinbergschnecke, Helix pomaria —	VI.	509
Weinstockish, Fringilla vitis	<u> </u>	16
Weinstockschild, (Schildlans) Coccus vitis Weintrinter, (Pfeilschwanz) Sphinx vitis		533
Weistader, (Stinfsliege) Hemerobius albus	V2.	640
Weigarich, (Sirichbod) Antilope pygarga	<b>5</b> .	775
Beigauge, (Cifade) Cicada leucophthalma		462
Beigange, (Erdfafer) Carabus leucophthalmps		354
Weißauge, (Rachtschm) Phalmna ocularis		683
Weigange, (Papagen) Plittacus leucophthalmus	6.	75
Weißauge, (Porzellane) Cyrea erola -	VI.	400
Weißbacken, (Eule) Strix Caporoch		69
Weißband, (Bocklafer) Cerambyx desertus		2/13
Beigband, (Fliege) Musca Maura -	V2.	
Weißband, (Kernbeisser) Loxia notata —		152
Weißband, (Rachtschm.) Phalæna fasciana		723
Weißband, (Rachtschm.) Phalsena leucatella		744
Weißband, (Lagschm.) Papilio Iphicle -		613
Beigband, (Lagschm.) Papilio Thalia -		586
Beigbarfc, Perca Alburnus	IV.	229
Beigbart, (Meertage) Simia Silenus —		124
Weißbart, (Raubsliege) Alilus ater —	V2. 1	
Weißbauch, (Ammer) Emberiza notata	G.	157
Weißbauch, (Biene) Apis helvola -	V2.	895
Weißbauch, (lerche) Alauda plumata -	€.	137
Beigbauch, (Taube) Columba ventralis	♥.	143
Beißblatter, (Erbfäfer) Carabus quadrimaculatu	is V.	366
Beißburgel, (Kernbeisser) Loxia leucura	<u>S.</u>	150
Kk▲	200	}ei₩

,		•
	Th.	
Beiffburgel, (Reuntober) Lanius leucorinus	<b>G.</b>	71
Weißbusch, (Zeisig) Pipra albifrons -		622
Weißdach, (Kafermuschel) Chiton albus -	VI.	
Weiftbornmotte, (Rachtschm.) Phal oxyacantolls	V.	738
Weißdroffel, (Zipdroffel) -	11.	530
Beifece, (Rachtfom.) Phalæna Robertella	V.	752
Beiffelb, (Rachtschm.) Phalæna albicillata	V.	717
Wetkfeld, (Tagicom.) Papilio Athemon	V.	627
Beigfifth, (Uefthe) Salmo Albula -	IV.	326
Beiffisch, (Karpfe) Cyprinus leuciscus	IV.	390
Wifflache, (Tagfchm.) Papilio Evippe -	V.	590
Beiffled, (Rrammetevogel) Turdus Merle		159
Weißfleck, (Langfuß) Tipula notata -	V2.	943
Weiffled, (Ruffelfaf) Curculio quadrimaculatus	V.	223
Weiffiett, (Tagfchm.) Papilio Panthous		571
Weifisted, (Lasschm) Papilio Tespis -		626
Beiffied, (Baffertafer) Dytifcus maculatus		349
Weißflosser, (Karpfe) Cyprimus Grislagino	K.	
Weißflügel, (Bastardwespe) Sphox leucoptera		322
Beifffügel, (Cifabe) Cicada lateralis -	. <b>V.</b>	
Beifflügel, (Zaube) Columba leucoptera	II.	504
Beiffuß, (Rliege) Musca leucopa -	V2.	
Beifibals, (Rabe) Corvus albus -	€.	
Brifibals, (Touten) Ramphaltos monilis	<b>S</b> .	
Beifigabel, (Pflangennob) Podura vaga	V2.	
Beiggartel, (Pfeilschw.) Sphinx Tantalus		643
Beiffehlchen, (Bachftelje) Motacilla rubicula		610
Weißteblchen, (Weißschwang)		609
Beifteblchen, (Beifig) Pipra gutturalis -		623
Beiftopf, (Citade) Cicada leucocephala		462
Wigtorf, (Eisvogel) Alcedo leucocephala	€.	
Beiffopf, (Kalfe) Falco leucocephalus -	IL.	64
Weißtopf (Rliegenfang) Muscicapa loucocophali	a C.	169
Recistopf (Kernbeiffer) Loxia Maja -	II.	549
Weißtopf, (Klippfisch) Chætodon arnanus	IV.	172
Beißtopf, (Matter) Coluber candidus .	III.	
Weißfop, (Papagen) Plittacus fasciatus	6	74
Weißtopf, (Papagen) Phitacus leucocephalus		143
Beißtopf, (Ractervogel) Coracias leucocephalu		86
		3ei <b>ù</b> .

ι	'streibtobl	Resembly	anz		521
			•	Eb.	€.
	(Taube) Columba			H.	504
Weißtopf,	(Wange) Cimex le	ucocephalus		V.	402
Weißtopf,	(Waffereulchen) Ph	iryganea albi	frons \	V2.	789
Weigfrage	en, (Kalfe) Falco ru	lfticolus	-	Ii.	67
Weißling,	Afritanischer, (Tags	chm) Pap. Da	plidice	v.	589
!	Barbarischer, Papili	o Monuste	•	V.	589
<del>-</del> - (	Eaapscher, Papilio H	lellica	-	V.	588
3	Deutscher, Papilio C	Cartægi -			587
9	Indianischer, Papilic	Idea ·	-	V.	587
(	Surinamischer, Papi	lio Odites		6.	290
Beigling,	(Ente) Anas albeol	la	<u>.</u>	II.	290
Weifiling,	(Meerasche) Mugil	Albulá	• ]	IV.	353
Beigling,	(Rachtschm) Phala	ena betularia	1	V.	709
Beigling,	(Ratter) Coluber I	Alidras .	<b></b> )	III.	160
Beiflingto	ifer, Scarabæus alb	ellus -		€.	217
Beiglinie,	(Cifabe) Cicada ft	riata	-	V.	462
Beiglinic,	(Rachtschm) Phala	ena parentess		V.	743
Weißlinie,	(Tagicom.) Papilio	Oileus	-	V.	632
Weißmaul,	(Sanbläufer) Cici	ndela coerule	a	<b>€</b>	245
Weißmaus,	, (Schlupfwespe) Te	nthredo carc	onaria	V2.	832
Weißmund,	(Baftardwespe) S	phex leucoste	oma '	V2.	874
Weißnack:	1, (Zeisig) Pipra M	lonacus	<b>-</b> `	II.	624
Beifinafe,	(Meerfage) Simia	petaurista		<b>€</b> K	0
Weißnath,	(Ruffelfafer)Curcul	io quinquepu	nftstne	V	022
riseigniere,	(Machicolus) Luara	ena niciitans		V.	60 I
Weiße unft,	(piciliamani) Sp	hinx Ixion		V.	643
Weißr untt,	(Pfeilschw.) Sphir	ix Labruscæ		V	620
Weißrunkt,	(Cchiupfwefpe) Ten	thr.Punclum	alhum'	Va .	040
ereikhnutt,	(Englayon) Papulio	Luterpe		V.	584
KRCIBDIINEE,	(Zaaram.) Papin	o Neleus	_ '	V.	440
Weißrand,	(Grashupfer) Gry	llus v <b>iri</b> dulus		<b>17</b>	
eweigrand,	(Campingle) (c	nthredo marc	rinate 1	V2.	822
weißring,	(Galindlinelbe) i eu	ithredo livida	, ,	72.	83 E
Weißringel,	, (Langfuß) Tipula	annulata	1	7a .	~
Weiß ingel,	(Ringelfchlange) &	Amphisbæna:	alha i	II.	222
weißiaum,	(Entade) Cicada m	arcinata	_ 1	<b>(</b> /	
lisci i fiction ab	el, (Merle) Tanagra	albiroffrie	TT ~		
weikimtiit!	Lucterrater) Lenet	orio leucogra	mmus (	<b>6</b> 5. <i>i</i>	252
Weißschwar	i, (Bachstelse) Mo	tacilla Oenar	ithe 1	II. <i>(</i>	509
	•	Kks		213	

,	Eb.	•
Beiffchwang, (Colibri) Trochilus leucurus		256
Beifichwanz, (Klippfifc) Chætodon leucurus	IV.	
Beiffcman, (Tagfcm.) Papilio Orontes	V.	574
Beiffpije, (Lagfchm) Papilio Medon -		579
Beiffprentel, (Rachtichm.) Phalæna cembrella		747
Beigstirn, (Biene) Apis Fabriciana -	<b>V2.</b>	
Beitsstirn, (Citade) Cicada albifrons - Beitsstirn, (Fliege) Musca albifrons -		462
Beikstien, (Fliege) Musca albifrons -	V2.	
Beißstirn, (Rableuden) Gymnotus albifrons	IV.	• -
Beigstien, (Ruffeltafer) Carculio albinus		237
Beikstral, (Tagichm) Papilio Pasithoë		582
Beikstrich, (Kliege) Musca Microkan	V2.	
Beikstrich, (Rachtschm) Phalmna putataria		705
Beißstrich, (Bassereulchen) Phryganea bilineata	V2.	
Beifftriem, (Rachtschm.) Phalmna nigrella	€.	-
Set Ditte All Comments on Barrens	490.	• .
Weißwolfe, (Rachtschm.) Phalæna Leucomelas		701
Beigwolle, (ungeflügelte Biene) Mutilla albeola	S.	
Weitasch - dubblet, (hou.) Jagertasche	VL	
Beitauge, (Porzellane) Cyprea stercoraria	VI.	
Weitsted, (Golbhabnehen) Chrys, quadrimaculat	2 V.	197
Beitmund, (Kinkhorn) Buccinum patulum	VI,	
Beitftern, (Sternforalle) Madrepora interftincha	V 12.	087
Weling, (Rachtschm) Phalmaa Wanaria		709
Wellenbarich, Perca undulata	IV.	
Wellenbock, (Bocklafer) Cerambyx undatus		280
Bellenflügel, (Rachtschm) Phalmna repandata		712
Bellentaferchen, (Rietntafer) Dermestes undatus		101
Wellensmie, (Tagschm) Papilio Ariadne		610
Bellennerite, (Schwimmschnecke) Norita undata	VI.	
Wellenfilber, (Rachtschu.) Phalma Bonnetella	. V.	754
Bellenstrech, (Racheschus) Phalæna Thymiaria	IV.	
Bels, Silurus -	iv.	
— Assatischer, Silvens asotus —		
— banbirter, Silurus fasciatus —	IV.	200
- Europäischer, Silurus glanis	1V.	
— gerippter, Silurus costatus —		_
- rauber, Silurus Alpredo -	IV.	
Sirisper, Silurus Cous -		298 ( <b>15</b>

<b>XDelb</b>	wniting	523
		£b. €.
Wels, (Wallerfisch) -	•	IV. 286
Belebelphin, Silurus Callichthys	•	IV. 303
Beljer, (Rugelthierchen) Volvox (	ilobator '	VI2. 850
Welser, (Raupentober) Ichneumon	volutatorius	V2. 847
Wendehals, Yonx	-	11. 216
Wenbeltreppe, achte, (Mondschnecke)	Turbo fealaris	VI. 551
— — geterbte, Turbo crenal — — gemeine, Turbo clathr	ms -	VI. 554
— — gemeine, Turbo clathr	atus -	VI. 553
Mendefirfel, (S. Joh. Bliege) Cant	haris tropica	V. 312
Wenteltrap, (boll.) achte Benbelt	reppe	VI. 552
Wermuthabuchen, Chrysomela Abs	ynth <del>ii</del>	S. 225
Wermutlaus, Aphis Absynthii	•	V. 516
Bespe, Vespa	V2. 878.	
brenfärbige, Velpa tricolor		<b>5.</b> 326
gemeine, Vespa vulgaris	• •	V2. 880
— — prientalische, \ espa orienta	lis -	€. 325
- rothe, Velpa rufa	٠	V2. 881
Welpen, (holl.) Wespen	-	V2. 878
Wespenameise, (Raupentoder) Ichn.	formicatus	V2. 858
Wespensliege, Musca vespisormis	-	V2. 961
Wettetrabe, Procellaria æquinostis	alis —	II. 316
Wettervogel, (Krununschnabel)	•	II. 394
Wetterwange, Cimex mutabilis	-	V. 504
Wewer, (poln.) Bár —	•	1. 277
Whalo fish, (engl.) Balfisch	•	I. 480
Whame, (engl.) Bremfe	•	V2. 925
Wheat-ear, (engl ) Beißschwang	-	II. 609
Whelke, (engl.) Rieberlandifches!	Linthorn	VI. 467
Whewer, (engl.) Pfeifente	•	II. 294
Whik - tail, (engl.) Beiffchwang	-	11. 609
Whimbrell, (engl ) Regenvogel	_	11. 395
Whin chat, (engl ) Brountebleben	<b>—</b>	II. <b>6</b> 00
Whip-poor-will, (engl ) Birginift	e Machtschwalbe	! II. 637
Whitle - fish, (engl.) Weerquappe	•	IV. 98
Whistling, (engl ) Pfeifente	·•	II. 294
White-cunt, (engl.) Spigmaul	•	HI. 243
White - horse, (engl.) Balfer	-	III. 245
White-shark, (engl.) Menfchenfre		III. 266
Whiting, (engl.) Beifibarfch	-	IV. 229
		¥X7hi.

) <del>- T</del>	***************************************	U		
	•		Eh.	6.
Whiting,	(engl.) Bittling, Stinffalm	IV.	91.	
Whiting.	pollak, (engl ) Pollack	-	IV.	93
Whiting -	pout, (engl ) Steinbolt	-	IV.	88
BRideler, (	(Ratter) Coluber pliatilis	•	III.	
Bidelflug	el, (Grashurfer) Gryllus cor	volutus	V.	427
Bidelfinb.	, (Bienenkörbchen)		VI.	
Widelschn	pang, (Gefpenftibier) Lemur	Havus	€.	13
Widenlau:	8, Aphis Craceæ	•		515
Widennaf	der, (Ruffeltaf) Curculio	Craccæ		215
Bibber, A	Aries –	•		421
Bibber, (	Solibod) Leptura arietis	-		290
Bibberhot	rn, (Schnirfelschn.) Helix Co	rmi arioti	B VI.	508
Bibberlau	18, Pediculus ovis	•	V2. 1	031
Biberftos	laus, Aphis Lychnidis	•_		514
Biberftrel	ber, (Raupentoder) Ichneum.	Reluctato	r V2.	850
Widgeon	, (engl.) Pfeifonte	-	u.	294
Widwol,	(engl.) Solbbroffel	-		186
Wiedehop	f, Upupa —			249
	- Caapscher, Upupa promei	rops		251
	- gemeiner, Upupa epops	-		249
	- Paradissicher. Upupa Para	difea	_	25 i
Wiebertau	ende Thiere, Pecora -	. I. 2	63. <b>S</b> .	
Wielewas	al, (holl.) Golddroffel	. •		186
Wiervree	eter, (boll) Rothfopf		IV.	
Biefel, M	Iustella —	I. 2	58. 🥰	
- fab	warje, Mustella barbara			265
Mieleleich	born, Sciurus palmarum	•		357
Biefenblu	menfauger, Chermes Calcha	3 —		523
Wiesenbur	nmel, Apis pratorum	~	V2.	
Wiefenlere	che, Alauda pratenfis		11.	518
Wiefenmo!	tte, (Rachtschm.) Phalsena p	ratella		738
Wiefenschr	walbe, Hirundo pratincola	•		636
Wiefenfpir	nne, Aranea labyrinthica 🦈	-	V2. 1	
Wiefenwa	nie, Cimex pratentis	•	· <b>V.</b>	498
Wigeon,	(engl.) Winterhalbente.		II.	<b>2</b> 96
Wilde M	lusiek, (holl.) wilde Rust	-	VI.	434
Wildfang,	(Fliege) Musca fera	<b>-</b>		969
Bildfang,	(Wange) Cimex ferus	_		503
	, (engl.) Gems -			409
_		. ,	v	Vilk

	Th. G.
Wilk, (poln.) Wolf	, L 219
Billis raumet ben Thieren eine Art ber Bernunft e	
Wimba, (Karpfe) Cyprinus Vimba -	IV. 397
Wimper, (Wange) Cimex superciliosus —	V. 498
Windbeutel, (Krosch) Rana boans -	III. 70
Windbeutel, (Stachelbauch) Tetrodon lævigatus	III. 317
Windenschlupfer, (Schlupfwespe) Tenthr. convolvu	li <b>G.</b> 318
Winbenschmetterling, (Pfeilschm.) Sphinx convolvu	li V 637
Windhund, Canis grajus -	1. 207
Windvogel, (Krummfchnabel) —	II. 394
Windwanner, (engl.) Thurmfalte -	II. go
Winkelhaak, (holl.) Binkelhaken -	VI. 315
Wintelhacken, (Kammmuschel) Ostrea llogonum	VI. 315
Winkelhaken, (Nachtsch.) Phalæna rectangulata	V. 720
Binter, (Rrabbe) Cancer vocans	V2.1103
Binterente, Anas hyemalis -	II. 295
Bintergartner, (Erbtafer) Carabus vaporariorum	V. 361
Binterhalbente, Anas querquedula -	II. 296
Binterhalbentenlaus, Pediculus querquedulæ	V2. 1033
Winterkoning, (holl) Zaunfonig -	II. 619
Bintermewe, Larus tridactylus -	II. 345
Binterschmetterling, (Rachtvogel) Phal. brumata	V. 722
Bintervogel, (Anmer) Emberiza hyemalis	II. 561
Wipstaart, (holl.) Bachstelle -	II. 602
Wirbelhorn, (Langfuß) Tipula viridula -	V2. 939
Wirbetpunkt, (Wange) Cimex bipustulatus —	V. 485
Wirbelschnecke, (Krausel) Trochus umbilicatus	VI. 532
Wirbelschnirtel,(Schnirtelschnede)Helix perverla	
Wirrband, (Rachtschm.) Phalæna Anastomasis	V. 668
Wirrfneuel, (Robrenschnede) Serpula intricata	VI. 624
Wischauge, (Lagschm.) Papilio Helic -	V. 605
Bischflügel, (Nachtschm.) Phalæna derasa -	V. 695
Bifchtropf, (Sonnentafer) Coccinella oblitterat	a V. 159
Bitfifch, (Rachelot) Physeter Catodon -	I. 497
witte Aardbesje, (holl) meiffe Erdbeer -	VI. 249
witte Gat. (boll.) punftirter Strandlaufer	II. 41£
witte Halvmaantje, (boll.) weiffer halber Mond	VI. 183
witte Jamboes, (holl.) Jambus -	VI. 406
witte Kievitsey, (hou.) Caubenet -	VL 407
	witte

,	77.200		7-11-1-11		
				Th.	
witte	Mazelen, (boll.) wei	sse Masern	•	VI.	347
witte	Mier, (boll) Bermu	iter –		V2.1	032
witte	Wolfstanden, (boll.)	Pundszábin	e —	VI.	
Witte	rtje, (holl.) Weikfisch	-		IV.	
Witte	valch, (schweiz.) Goldd	roffel	-		186
Mitti	ia. (Resteling)	_		IV.	
Rint	na (Kabeljan) Gadus	Merlangu	S	IV.	
<b>Bittn</b>	e, (Ammer) Emberiza	Vidua -	-		569
Wittn	oc. (Ente) Anas vidua	ta	_		298
<b>ER</b> ittn	oc. (Rliege) Musca vio	duata.	- '	V2:	
Mittn	e. (Rachtschm.) Phals	ena Hebe			663
· Wittn	se, (ungeflügelte Biene)	) Mutilla V	riduata	e.	3 <b>3</b> 1
Witm	e von Peru, (Tagschn	ı.) Papilio I	Protefilan		
Bolf,	(Dunt) Canis Lupu	is,	-		<b>Ž19</b>
	– aus Mexico	•		€.	28
	— schwarzer aus Can	aba	_	€.	28
Wolf	fisch, (engl.) Seewol	f -	-	IV.	- •
Wolf:	thar, Ursus luscus	-			285
<b>W</b> elf	Miege, (Raubfliege)		-	V2.1	
<b>W</b> olf	shund, Canis Corfac			€.	
<b>M</b> Bolf	smildvogel, (Pfellschw	.) Sphinx E	uphorbia		-
<b>W</b> olf	Rieger, Felis Guepare			€.	
<b>Bolf</b>	straptafer, (S. Joh. Blie	ge)Canthar	isCardiac	æV.	310
<b>W</b> olf	sabn, (Meerzahnchen)	Dentahum	dentale	VI.	
<b>W</b> olg	aer, (Tagschm.) Papil	10 Sabbro	-		286
Wolk	bakje, (boll.) Bolde	RDACEC	-	AT	383
Wolf	enbacke, (Eute) Conus	bullatus	<del></del> -	VL	383
<b>Wolf</b>	enband, (Rachtschm.) f	'naiæna w 2	utoomum 		
Wolf	endecte, (Ruffelbaf.)	urcuno nei	onioras	۰. 12 - ا	238
Both	enfeder, (Rachtschm.) F	paissna ten	cracacty.	a v.	757
<b>W</b> olf	enflosse, (Lippfisch) La	Drus INIDO	iqus -	IV.	
Bolt	enflügel, (Tagfchm.) P	apino Scyn	2 - 		902
Wolfe	enflügel (Waffereulchen)	Luryganca	Deditions		784
Wolfe	engespenst, Mantis Car	rolina	 11-		414
Wolf	enpatelle, (Klippfleber)	ratella. N	HOCCUIA		617
<b>Wolf</b>	enpfau, (Tagfcom.) Pe	ipitio Aonis	•		600
Wolf	enpfell, (Pfeilschw.) S	pninx Ocy	perm -		636
Wolf	enritter, (Tagfchm.) Pa	bino Brane	us –	· ' V.	•
233olf	enschatten, (Eidechse) l	Lacorta Ud	IOCA -		roh Jien
				<b>TUU</b>	HUN

sourcelliting souther ) 2/
Bollenschitt, (Schildtafer) Cassida nebulosa - V. 137
Wolfenschlie, (Schildtafer) Cassida nebulosa - V. 137 Wolfenschnecke, (Lute) Conus striatus - VI. 381
Wolkhoorn, (holl.) Bolfenschnede VI. 381
Bollivern, gefrontes (Kronenbade) - VI. 383
Boltenschlange, (Ratter) Coluber nebulatus III. 189
Bollenafter, (Rachtschm.) Phalmna lanestris - V. 658
Wollenbock, (Bockfafer) Cerambyx Juvencus - V. 271
Bollenhahnchen, Chrysomela pubescens - V. 201
Wollenhuhn aus Japan - S. 123
Bollennug, (Sallapfelwurm) Cynips quercus ramuli V2.814
Mollensack, (Raupentoder) Ichneumon globatus V2. 861
Mollenschild, (Krabbe) Cancer lanatus — V2. 1109
Mollenschwamm, Spongia tomentola - VI2. 803
Bollentrager, (Kafer) Scarabæus lanigerus - V. 85
Wollenwange, Cimex lanatus - C. 277
Bollfuß, (Meeltafer) l'enebrio Lampes - 6, 252
Bollfrantbodlein, (Jolibod) Leptura Verbasci V. 290
Bollerautfreffer, (nagender Afer) Byrhus Verbalci V. 120
Moltrautseule, (Rachtschm.) Phalma Verbalci V. 694
Wolverlei, (Fliege) Musea Arnica - V2. 979
Wood-chat, (engl.) Kinfenbeisser - II. 114 Wood-cock, (engl.) Schnepfe - II. 393. 396
Wood-patridge, (engl.) Canadisches Berghuhn II. 482
Wood-pelican, (engl.) Rimmerfatt - II. 389
Wood-picker, (engl ) Specht - II. 210, 220
Wermbuizen, (boll.) Robrenschneden - VI. 622
Woudluis, (holl.) Baldmilbe - V2.1046
Wouw, (holl.) Beibe - II. 71
Wouwouwen-Koning, (boll.) Rablhals - IL 54
Wrakfogel, (schwed.) Tauchergans - Il. 304
Wren, (engl.) Zauntonig — II. 619
Wriand, (schweb.) Pfeifente - II. 294
Wryneck, (engl.) Wendehale — II. 216
Burfelfleck, Baffereulchen) Phryganea rhombica V2. 787
Murfelflügel, (Rachtschm.) Phalæna tessella – V. 742
Mürfelfalm, Salmo rhombeus  IV. 331  Mürfelfchilb, (Rrabbe) Cancer Rhomboides  V2.1104
Muser, (Ratter) Coluber Conficient V2.1104 Muser, (Ratter) Coluber Conficient III, 194
Burger,

COZAL BANGER HIS

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	er æ
Würger, (Reuntober) Lanius Tyrannus	Th. C.
Mourger, (Occumbert) Lamus Tyramius	
Burtung ber thierifchen Rorper machet die veft	
Salze fluchtig -	I. 30
, ap 0.0000, 0 0.00000	VI. 6. 27
- mit Gehaufen , oder Konchilien VI. 157	<b>1. ©.</b> 357
- mit Gliedmassen, Molusca VI. 9. 12. 57	7. 😂. 355
ohne Gliedmassen, Intestina VI.	8. 11. 27
Wulk, (boll.) Riederlandisches Rinthorn	VL 467
Wulk, (holl ) Riederlandische Spindel -	VL 515
Buit, (holft.) Donnectrote -	IV. 137
Mulft, (Blase) Bulla gibbosa —	VL 407
Bulftnabel, (Kraufel) Trochus vestiarius —	VI. 533
Militantel, (Atamel) Frocias vertaxias	IL 394
Wulp, (boll.) Rrummschnabel	V. 584
Bunderpapillon, (Lagidm,) Papilio Ricini -	
Burfschlange, Anguis Jaculus -	III. 212
Murmlome, (Fliege) Musca Vermileo -	V2. 954
Murmschlange, Anguis lumbricalis -	III. 215
Murmschlange, (Dormchlange) –	VL 626
Burjelnager, (Rachtschm.) Phalmna oleracea	. V. 698
Wydmonders, (boll.) Weitmunde	· VL 463
Wyd oog, (boll.) Beitauge	VL 390
Wyewyorka, (poln.) Eichhorn	I. 355
Wyewyorka lataiaka, (poin) fliegendes Eichbi	orm I. 250
TITUE DE LA CLAR & CONTRACTOR CON	VL 569
Wyngards-slak, (boil.) Beinbergefconcie -	H. 406
Wypa, (schwed.) Kiebis	IV. 91
Wyting, (holl) Wittling	VI 480
Wyzer, (holl.) Zeiger	VE 480
<b>X.</b>	
Kanthornus, Schwarzfopf, Pifangbroffel II.	187. 189
— 161610cephanus minericanus, spaninanni	che
Golddroffel -	11. 19:
Xanthus, (Papilio) Palbmond -	• <b>V.</b> -598
Zanrifchnecke, (linkische Feige)	VI, 514
Xibia, (fpan.) Dintenfisch -	VL jis
Ximio, (fpan.) Affe -	L ris
Kiphias, Degenfic	IV. 64
Xochitenacatl, (merif.) Loutan	IL 155
Xochitenacatl. (mexit.) Pisangbrossel	IL 189
	1, 228
Koloitzeuntli, Mexikanischer Fuche -	Xoloitz-
	WINTAIT.

Aoxouquihaaeth	Zähnelafter	529
YayangnihaaDii Zman S Chillia		Eb. G.
Xoxouquihaactli, (mer.) Reiher	Annan P .	II. 378
Zulanesische Buchstabenmuschel, I	onax icripta	VI. 261
Xulaneesche Letterschulp (boll ftabenmuschel	.) Æuldnesssche	Bra,
Xuthus, (Papilio) Keilsteck		VI. 251
Xylokopos, (griech.) Specht	_	V. 576
Xylophthoroi, (griech.) Larven 1	her læstikanisa	II. 218
n	ver Cirichentell	V. 78¢
Vacacinthin (man) his statement		
Yacaciuthly, (met.) bet Gultan		II. 429
Yandou, (Indian.) Amerikanische	r Straus	II. 452
Yar-welp, Yarwip (engl.) Geif Dbich, (ichweig.) Steinbock	stopf -	II. 402
Yellow-fish, (engl.) Gelbfifc	-	I. 407
Yellow-hammer, (engl.) Ammer,	Walanan H	IV. 214
Yellow-tail, Yellow-til, (engl.) Sel	botoammer 11.	560. 563
Yohualcuachtli, (ind.) gedornter	inicipatif 1A*	229. 266
	Attall =	i II. 431
Possion, (Cintex) Spinon Possion, (Wange) Cimex Apsilor		V. 486
= effeines, (Nachtschin.) Phal	j ————————————————————————————————————	V. 486
- weisses, Phalæna Tarquir	· rarquinia D	<b>9.</b> 306
Ysdubblet, (holl.) Eisdublet	lia na —	S 306
Ysvogeltje, ostindisch (boll.) Ein	innait	VI. 311
Yunx, Wendehalb -	onfikt =	S. 93
torquilla, Drebebals	_	II. 216
Yvana, (ind.) Kammleguan -		II. 218 III. 103
Yzervarken, (holl.) Jgel, Stath	elicomein i.	304. 314
Yzquauchli, (amerik) Rauber	1	
Yzquiepatl. (amerif.) Stinkfuchs		1. 245
Yztactzonyayauhqui, (mex.) Hau	henente	II. 301
Ö		-1. JOI
Zaadje, (holl.) Saamenkern	<b>a</b> .	<b>₹</b> 7 <b>₹</b>
	<b>4</b>	VI. 623
Zaagertje, (holl.) Eáge Bottenflügel, (Lagfchm.) Papilio P	edêrî a	VI. 239
3actenfluger, (Lugichus, Papino P 3actenflumni, (Rlippflebet) Patella	neigety -	©. 294 VI. 612
Backenschung (Repose Pateria	XA 5	V2. 894
Zadik, (arab.) weisser Stores	·	11. 374
Sahnchen, Dentalium minutum		VI, 621
Sahnelaster, (Arabbe) Cancer Phi	j m sirëtel	2.1164
t 1	-	Partlina.

	Tb.	6.
Bartling, (Golbhabnchen) Chrysomela tenella		1196
Zariling, (Mans) Mus subtilis -	Œ.	46
Zahubrachsem, Sparus dentex -		189
Sabucanari, (Klugelschnecke) Strombus dentatus	: VI.	490
Colufeber, (Geefeder) Pennatula mirabilis -	\ [2.	899
Salmfligel. (Battardruffelfaf.) Attelabus Suriname	nfis V	,244
Rahnstigel, (Nachtschm) Phalæna Maura	- V.	689
Sahnflügel, (Nachtschin.) Phalsena tremula	· V.	671
Zahnflügel, (Pfeilschw.) Sphinx populi -		636
Rahnbecht, Esox synodus -	IV.	339
Sabulinie, (Cifabe) Cicada vittata -	-	463
Rabumaul, (Rarpfe) Cyprinus dentex -	IV.	397
Babnschaale, (Dreicomuschel) Donax denticulat	a VI	. 260
Rabuschenkel, (Grasbupfer) Gryllus tibialis -	– ez	. 272
Rabnicild, Algierisches (Meelf.) Teneb. Mauritan	icus \	.369
Zahnschraube, (Mondschnecke) Turbo bidens	VI	• 558
Zabustrich, (Nachischm.) Phalæna pusiella	. 7.	• •
Zajac, (poln.) Haase -		. 318
Zak - braasem, (holl.) Sackflosse -		- 185
Zambus, (Simia) Mongue		. 12
Zandloopers, (holl.) Canblaufer -		· 327
Zangenschmant, (hurfer) Empis forcipata -		2 595
Ray fenmotte, (Machtschin,) Phalæna Strodinella	1	. 746
Bapfenstecher, (Gallapfelm.) Cynips falicis strobil	1 V2	. 810
Zatto, (ital.) Meerfrost	111.	. 280
Zauberfisch, (Meerscorp.) Scorpoena horrida		. 141
Zauberschnecke, (Walse) Voluta Auris Judæ -		. 417
Bauberer, (Fliege) Musca tarda -		- 954
Bauberer, (Rachtschm.) Phalæna immorata		. 719
Baunhupfer, (Bachftiege) Motacilla caprata		. 614
Bauntafer, Scarabæus Sepicola		. 77
Baunfonig, (Bachstelje) Motacilla Troglodytes		. 619
2011	401	
Zebra, (Cyprea) grauer Maulwurf	_	. 391
Zebra, (Equus) gestreifter Esel		. 456
Zebra, Essequebischer (Tagschm.) -		. 633
Bebra, (frangofische Schellenschnecke) -		. 414
zebrabodlein, (Bodtafer) Cerambyx Capenlis		. 265
Zoc-aigret, (hou.) Reausforaline :	A 13	. 842 Zce-

<b>Z</b> ee-appel	Zee.	puitaal	531
	•	-	Th. S.
Zee-appel, (boll.) Secarfel	•		· VI. 144
Zee-arend, (boll.) Mecrabler		•	III. 245
Zech, (hebr.) Wolf	-		I. 219
Zee beurs, (boff) Secbeutel	-		VI2. 785
Zee-bissebed, (hon.) Kafermu	ichel .	-	VI. 196
Zee-brazem, (boll.) Meerbrad	hsem	-	IV. 176
Zee-denneboom, (holl.) Seefic		-	VI2, 766
Zee-drakje, (holl.) Secorache	•		IIL 348
Zee-duivel, (boll.) Meerfrofd	. <del>-</del>	•	III. 280
Zee-egel, (holl.) Eccaptel	-		VI. 144
Zee-eike, (holl.) Zwergforallin		-	VI <sub>2</sub> . 834
Zee-hagir, (boll.) Dedelforalin		•	VI2. 834
Zee-haanen, (boll ) Seechahne	-	•	IV. 272
Zee-handschoen, (holl.) Ceebe		-	VI2. 798
Zee-heester, (boll.) Pornforalle	: -	•	VI <sub>2</sub> . 748
Zee-hond, (hell.) Robbe, Geel		₹,	I. 198
Zee-nonigraat, (holl.) Gechoni	gfuchen		VI2. 684
Zee-harlel, (holl.) Secbremie	-		V2. 1147
Zee-houtworm, (boll.) Solibel	brer	-	VI, 631
Zee-kampernoetje, (boll.) Ech	wannnt:	oralle	VI2, 676
Zee-kat, (boll.) Blacfisch, Din	tenfisch	- VI	. 112. 119
Zee-katje, (holl.) Cecfaschen		-	III. 309
Zee-kikvorich, (boll ) Einhorn	teufel	_	III. 283
Zec-koe, (boll.) Sectub -			I. 175
Zee-kous, (boll.) Austernessel		•	VI. 88
Zee-krab, (holl) gemeiner Taf	chenfrek	8	V2. 1108
Zee-lambrey, (holl.) Lamprete	•		III. 230
Zeelt, (hou.) Schleihe		•	IV. 383
Zee-luis, (holl.) Moluffischer !	<b>R</b> reb8	•	V2.1139
Zee-mol. (hou.) Seemautwurf	•		VI2. 677
Zee-nagel, (holl.) Krausschnecke			VI. 498
Zee-netel, (holl.) Secnessel	`•		VI. 87
Zee-onren, (boll.) Meerobren			VI. 596
Zee-oranjeappel, (holl.) Seepo	meranje	-	V12. 784
Zee-paardje, (holl.) Geerferdd	en		III. 344
Zee-palm boom, (boll,) Sternfl	amm		VI2. 742
Zee-pennen, (boll.) Geefedern			V12, 897
Zee-pokken, Zee puisten, (hou.	)grosseC	zeepocken	VI. 202
Zec-puitaal, (boll.) Meerquappe	2		17, 98
L	12		Zee-

Tee numbers that & State	TL.	<b>G</b> .
Zee-pynboom, (boll) Cecide -	VI2.	766
Zee-pypjes, (holl.) Weerzahnchen —	VI.	
Zee-rugkorallyn, (hell.) Zwergkoralline —	VI2.	
Zee-rupsen, (holl) Geeraupen -	VĮ.	
	VI2,	
Zeo-scheiden, (boll.) Geescheiben -	Āľ	
	VI2.	773
Zeo-schytor, (boll.) Laxiersson	IV.	184
Zee-scorpioen, (boll.) Mecrscorpion -	IV.	139
Zee-flak, (boll.) Larvenschnecke	VI,	
Zoe-flak, (boll.) Seeschnecke ohne Haus	VI.	69
Zee-snook, (boll.) Salmbarsch —	IV.	
Zee-sterr, (holl.) Seestern	VĮ.	
	VI2.	
Zee tulp, Zee-pok, Zee-eikel, (holl.) Meertulpe	VL.	301
Zee-Ulk, (Dan.) Stachelsau	ĮV.	149
Zee-wazier, (boll.) Seefecher	VI2,	
Zec-wolv, (boll,) Scewolf	IV.	
Zeewylk, (holl.) Riederlandische Spindel	V (,	919
Zee-zeelt, (boll.) Merschleibe —		207
Zee-zwalluw, (holl.) Meerschmalbe	,11, 37 -4	352
Rebuffed, (Sonnentafer) Coccinella decempustula	IA V	101
Zehnpunft, (Sonnenf.) Goccin. decompunctata		144
Bebntropf, (Sonnent.) Coccin. decomguttata		157
Beichenbarsch, Perca Stigma	IV.	240
Beichenbeuter, (Raupentober) Ichneumon deugn	<b>ā</b> ~	
torius — —	V2,	
Zeichenflügel. (Nachtschm.) Phalmna notata -	V.	714
Reichentragerin, (Wefpe) Velpa fignata -	A 5'	886
Beichner, (Rleinfafer) Dermeftes polygraphus		104
Zeiger, (Flugelschnede) Strombus Gallus		480
Zeilers, (boll.) Schifsboote	V 1,	347
Beisig, Fringilla Splinus -		589
Beifig, Pipra - II. 621		177
rother, Pipra rubra		177
	Vl2,	
zeskantige Naaldvissch, (boll.) Blindsisch		349
Zetes, (Papilio) Punktwolke -		599
Zettelpunkt, (Tagschm.) Papilio Niso -		633

Zeus	Aingelbarla		533
	•	Th.	<b>G.</b>
Zous, Spiegelfisch	-		142
Zeuxo, (Papilio) Zwergrapillo	R	¥.	625
Zhik, (poln.) Dachs -		Į.	281
Bibetbrage, (Biber) Caftor Zibe	ethicus -	Į,	333
Libeththier, (Frett) Viverra Zi Zichiach, (Rachtichm.) Phalmna	betha =	Į,	253
Siction (Manielland) Phalena	Liczac -	V.	072
Bickjack, (Porgellane) Cyprea	Ciczae -	VI.	397
Ziczac, (Cyprea) Zicklack	<del></del>	VĮ.	419
Ziczac, (Cyprea) Stannahuhlat	-	VI.	397
Ziczac, (Ostrea) Joppehublet Ziczac, (Phalena) Bictioct	**	V 1.	303
Biege, Capra	<b>₩</b>	V,	672
Afritanische, Capra Dorca	, <u> </u>	ţ.	404
Cibirifce, Capra Ammor		Ť	416
Enrifche, Capra mambrio	19	i i	417
- Sartarifche, Capra Tatari	ica —	Ī.	408 417
Biegelbod, (Bodfafer) Ceramb	vx Lulitanus	€.	236
Biegelbock, (Bockfafer) Ceramb Biegelboch, (Dolphock) Leptura	toftacea	v.	285
Alfaribabbabbab. Cheviamen in	Uranica _	Œ.	223
Biegelmufchel, (Bafchbecten)	-	νĭ.	284
Biegelrippe, (Dergniufchel) Card	lium Ifocardia	VI.	249
Biegelmufchel, (Wafchbeden) Biegelrippe, (Perzmufchel) Card Biegelruden, (Gegraupe) Aphro	dita imbricata	<b>X71</b>	74
Altariumituut, ( Chininitat i mem	APODING TARKABING	V2.	795
Biegelwelle, (Rachtidm.) Phalæn	a bilineata	ν,	718
Biegenmelfer, Caprimulgus Biegler, (Todengraber) Sylpha: Biel und Lebensende des Mensch Zimurella (ital) Messiunka	•	II,	636
giegler, (Todengraber) Sylpha	testaçea -	V,	133
Biel nud kebengende des Meuld	en —	I,	89
MISCIETTA (THE ) WITELINGEE	•	ĮV.	204
ANGRAY, (Tr.) STORCODE	<b>T</b>	IV,	669
Zillo, (ital.) Weerjunker		ĮV.	204
Zilverlaken, (holl.) Spizenrolle	.c.c	VI.	38 t
Zilvorvisschie, (boll) Spiegelfi Zimmher (Moldanisch Bisan	109 -		142
Zimmber, (Moldautsch.) Bison Zimmermann, (Bockfafer) Ceran	nhuy Faher	7.	439
Rimmersninnen (Erekesninnen)	ilnår tiinés	ν·.	254
Rimmethlat. (Machtschm.) Phalm	na Canentis	V 2. 1 37	654
Rimmetbock, (Bochtafer) Ceramb	VX cinnamomen	· V	244
Rimmetfligel, (Tagfchm.) Panilie	Chryfinnus	V	#11 #0#
Rimmetflugel. (Lagfcom.) Papilie	o Erippus	œ.	256
Rimmetvogel, (Bachftelze) Motac	illa cinnamomea	Ĭĭ.	614
Zimmermann, (Beckkafer) Ceran Zimmerspinnen. (Krebespinnen) Zimmerblat, (Nachtschm.) Phalæ Zimmerbock, (Bockkafer) Ceramb Zimmerstügel, (Tagschm.) Papilio Zimmerstügel, (Tagschm.) Papilio Zimmerwassel, (Backfelze) Motac Zimmerwassel, (Backfelze) Bulla ape Zingaleser, (Bockkafer) Ceramb Zingaleser, (Bockkafer) Ceramb	rta	VI.	408
Bindelfifch, (Gtreberbarfch)	-	ÍV.	227
Bingalefer, (Bocktafer) Ceramb	yx atratus	V.	257
Zingel, (Perca) Zingelbarich	-	ĮŲ.	227
Pluatibulia, kerci Tmeel	-	IV.	227
LI	3	Rin	ams

• • •			Th.	æ
Dinamman	Embariza Cia	_	II.	505
Sinbross!	Emberiza Cia Turdus iliacus		II.	530
Zinhan (	hahu ) Smarling	_	ii.	770
Zipnar, (i	bebr.) Epersing (Gespenstfafer) N	Inntic Congulade	ie V	370
Zipperiein,	(Welbeultralet) 14	rantiz Gong Atome	.3 4.	56
Bictettobi'	(Rafer) Scarabæi	is innaris —		618
Bilder, (K	sachstelle) Motacil	ia nona	111.	010
Bilder, (a	Ratter) Coluber sib	Hans -		•
Bifelrate, (	Maus) Mus Cite	Hus -	<b>. .</b>	
Bitteraal, (	Rableuden) Gymi	JOSHE GIÈCELICHA	IV.	40
Ritteratte.	Simia trepida	-	4	130
Bitterblafe,	Holothuria trem Musca tremula	ula –	VI.	96
Ritterfliege	, Musca tremula	_	V2.	970
- Qitterfuß. (	Yanatur) libula t	remuia —	V2.	938
Ritterpappe	eler, (Oftanzenlaus)	Aphis tremula	· V.	518
Qahel (M	iesel) Mustella Zib	ellina —	I.	272
Schelfchnie	tterling, (Lagichm.)	) Papilio Pelias	€.	281
Zon. Zon	eh, (bebr.) Chan	-	ı.	421
Zonarius.	(Cerambyx) Gur	tler -	V.	275
Zonne-ho	orn, (boll.) Sonn	enborn -	VI.	512
Zonhyta	Ebierpflangen	VI. 10. 27. VI	2. 612.	652
Z00pujta	kata unuemudifent	Shierpflanien	V 12.	738
	xata, angewachsene ocomotiva, Pflanze	enthicre -	VI2.	885
Or substant	haben alle Kenngeit	tion her Manuen	VIa	000
Zoopphien	ooln.) Reanich	den der Muniten	II.	274
Zoraw, (I	poln.) Kranich (r.) Mapurit (Springtäfer) Els (Pflanzenflob) Po (Raupentöber) Ichn	_,	<b>E</b>	37
Zorille, (f	r.) Waputu	stan Briatus	V.	34
Zotenatier,	(Springtalet) De	dues villates	V2. 1	319
Zotenbalg,	(sprangennoo) For	uura viijoia Journa alamerati	v 2, 1	62G
				Pot
Zotenfilch,	(Sornflich) Baliste	s comencolus	III.	297
Zotenfrabb	e, Cancer cuphæu	S - ,	V2. 1	110
Zotskap,	(boll.) Rarrenkapp		VI	
Zotskap-1	patelle, (boll.) Ro	rrentappe	Vi.	
7 Autkorre	ities. (BBU.) 🗩 QIXI	rdeneeduegeuane	VI.	394
3schwitsche	r, (Citabe) Cicada	itridula –	V.	450
Quefertrene	E' ( Stutetle ) Louin	CA IACCHALIANTA	, V 2.	913
Buctergaff,	Lepilma facchari	n <b>a –</b>	V2. 1	015
Auderfora	ne, Millepora alcie	cornis VI	2. 710.	713
Zucteriectei	C, Lepitina		√V2. I	014
Sucternage	i. (Baumlaufer) Ce	erthia flaveola	ĮI.	259
Sudfuß. (	angfuß) Tipula m Mus migratorius	otitatrix	V2.	938
Quamaus.	Mus migratorius	-	€.	43
Shaetbrach	iem. Sparus capisti	ratus 🔫	IV.	193
Zuigvissch	fem, Sparus capifti , (holl.) Cauger	~	IV.	113
			IV.	396
Sunge. (S	eitenschwimmer) Pl	euronettes Solea	17.	157
שושל ויפושל	***************************************		3ı	inge

	Th. €.
Zwergfell, (Miesmuschel) Mytilus bilocularis	VI. 333
Amergfledermaus, Vespertilio Pibistrelle Amerghaase, Lepus pubillus –	S. 16
Amerabaase, Lepus pusillus -	S. 37
Smerahabuden, Chrylomela minuta 📁 🗕	V, 180
Amergin, (Wassermanze) Notonecta atomaria Amergin, (Wesse) Vespa minuta — Amergiabeljan, Gadus minutus —	G. 275
Omergin (OResne) Vestra minuta -	V2. 887
Omerafaheliau. Gadus minutus	IV. 90
Omerafernheisser. Loxia minuta -	IL 559
Omeraforatine. Sertularia pumila	VI2. 834
Swergfernbeisser, Loxia minuta Zwergforalline, Sertularia pumila Zwergfrebs, Cancer Atomos	V2. 1135
Swerglein, (Langfuß) Tipula pufilla -	V2. 939
Smerifelli, (tunging) Lipun puma	II. 361
Amergloflet, Platalea pymma - Smergmaus, Mus minutus -	
Supergindus, tytus minutus	9. 41 1. 301
Zwergmaus, Sorex minutus Zwergmuce, (Langfuß) Tipula solstitialis	<b>5</b> . 334
Spergmuce, (tungjug) Tiputa tonentana	IL 145
Amergpapagen, Plittacus pullarius —	V. 62
Zwergpapillon, (Lagschm.) Papilio Zeuxo	
Zwergpatelle, (Rlippfleber,) Patella miliaris	<b>©</b> . 381
Zwergpholade, Pholas pusillus -	VI. 214
Intergreiber, Ardea punna	<b>G</b> . 111
Imergreuter, (Girandiaufer) i ringa punna	II. 414
Zwergreiber, Ardea pufilla Zwergreuter, (Stranblaufer) Tringa pufilla Zwergruffel, (Ruffelfafer) Curculio Pusio	V. 229
Smerdichibitote. Lettudo Duma —	, III. 46
Swergstichling, (Stachelbarfch) Gafterolteus Sp	le etż sa
narella -	IV. 25
Zwergtaube, Columba minuta -	IL 512
Swergwasserrabe, Pelecanus pygmæus - Zwergwespe, (Holzwespe) Sirex pygmæus	©. io
Amerdmelbe' (Doilmeibe) Ditex bakmen?	V2. 846
Zwergzeisig, Pipra minuta	II. 624
Swetschgenmanniben, (Ruffeltaf.) Curculio pruni	V. 217
Zwiebelschaale, (Bastard) Anomia Cepa	VI. 319
Iniebelschaale, (Rinthorn) Buccinum olearium	VI. 444 V. 61
Zwillingetafer, Scarabæus didymus	
Zwinka zamorska, (poin.) Meerschweinchen	L 334 VI. 368
Zwirntute, artanische, Conus Miles —	
Zwittertafer, (Maitafer) Melos Profcarabeus	V. 379
Swolfborn, (Rrabbe) Cancer Dodecos	V2. 111
Swolfpuntt, (Rachtschm.) Phalæna dodecella	V. 747
3mblfplintt, (Connentafer) Coccinella duodecir	D-
punctata —	V. 15
Zwyn, (holl.) Schwein	1. 46
Zygæna, (griech.) Baffernnmphe -	V2. 76
Zvæna. (Squalus) Dammerfisch =	III, èşi



•



